

*Dionysii Guerinii D. M. C. 1615.*

IOAN. PHILIPPI

INGRASSIAE

SICVLI RACHALBVTENSIS,

MEDICI ET PHILOSOPHI CELEBERRIMI,

IN ALMO NEAPOLITANO GYMNASIO

publici olim ac ordinarij Professoris,

NECNON IN SICILIAE REGNO REGII

*summiq; Archiatri,*

IN GALENI LIBRVM DE OSSIBVS

DOCTISSIMA ET EXPECTATISSIMA

COMMENTARIA,

N. V. N. P. R. I. M. V. M. S. E. D. I. C. I. O. I. N. L. V. C. E. M. E. D. I. T. A.

*& apud Naturam imitantibus Iconibus insignita.*

QVI BVS APPOSITVS EST GRECVS GALENI

contextus, una cum noua & fideli eiusdem Ingrassiae in latinum versione.



SUPERIORVM PERMISSVM

PANORMI, Ex Typographia Io. Baptista Maringhi.

M. DCIII.

MATTHAEVS DONIA PANORMITA,  
 PHILOSOPHVS ET MEDICVS,  
 IN AVTHORIS EFFIGIEM.



Est hic dotatus veneranda fronte PHILIPPVS,  
 Sicanus Archiater, Sicanus Hippocrates;  
 Effigies animum pandit, mihi credito verum:  
 Ex hac perfectum non nisi pende Virum.

PANORMI, Ex Typographia Jo. Baptistae Manigliae.  
 M. DCIII.

DON FRANCISCO BOSCO  
MISILMERII DVCI, ET VICARI COMITI,

FOELICISSIMI PANORMITANI

SENATVS PRÆTORI OPTIMO,

Necnon Bernardo Yermo, Garcia Oliuera, Alexandro Settimo,  
D. Euritio Bononio, D. Mario Corso, D. Ludouico Spatafora  
eiusdem Senatus P. P. C. C. vigilantiss. & Stephano  
Riggio Sindico fidelissimo.

Nicolaus Ingraffias V. L. D. Felicitatem perpetuam.



**V**M mecum repeto, SENATVS ILLUSTRISIME, repeto autem sa-  
pissime, quam misera sit hominum vitæ conditio, quanta eius infirmitas, quanta mobi-  
litas, non possint nos admirari, ac grauissimis calamitatibus, quæ nos semel in vultu vi-  
ta curricula se nobis opponunt, & hominibus quasi tantis lapsis impendunt, attenta  
cogitatione considerari, neminem adesse senes, qui illas non sentiat, qui sepe etiam do-  
lent non lacrymetur. Quod vel ex eo clare conuenit, ac perspicit cum plerique nos  
quomplurimum amos homines adiuuatores laboribus contenderint, atque quæ ea, qua  
mente conceperant, ne ipsa perficiant, statim omnibus vitæ quærensibus non sine maximo gene-

ris humani detrimento vel improbia, vel immatura morte contingit. Vt ne longius quàm par est diuagari vi-  
deantur, cum Philippus Ingraffias Auius meus quia semper in omni re flagitauit benignitate impulsus, ea munda  
litterarum typis in animo haberet, quæ & Medicis, & agrorum summo, utriusque utilitatem esse allatura: ecce tibi  
mors eius rapuit, rapuit Panormitanæ Resip. studiosissimum virum, rapuit (licet tibi quos fecit liberi di-  
cere) præclarum, & doctissimum Philosophis, ac Medicinæ Doctorem; cuius nomen & dignitate, & doctrinæ  
tantum est, quæcum eius eruditissima monumenta testantur, hæc autem etiam tanti viri memoria in animis im-  
pressa mortalium eloquentissimo silentio prædicare videtur. Quis enim eius scripta legendo, & illustrium præ-  
ceptorum multitudinæ, & verborum nitore referta valde non commouetur? aut quis ut eis acutissimum inge-  
nium, solidamq; doctrinam vtilissimam veterum Medicorum præceptis iure optime comparandam nõ agnoscat?  
Quo pacto igitur nescio (sine id Philippi doctrinæ, seu etiam in omnes, quæper etiam, actenus benignitati vi-  
deatur adscribendum; vel vtriq; potius, quod propius attingere veritatem pato) quo pacto inquis uisceris  
ita in omnium memoria Philippus visus, ac viget, ut in morte obliuiscatur, aut potius apud homines immortali-  
tatem morte fuerit consecutus, igitur: cuius quidem rei & si non singuli modo homines, sed & Tribes integra,  
eãq; nobilissimæ, ac celeberrimæ possunt esse tibi locupletes testes: illud tamen erit argumentum quamfidelissi-  
mo: cum mihi, SENATVS ILLUSTRISIME, ea qua semper id te viget Siculorum omnium,  
ac Panormitanorum imprimis amantissimi viri memoria commotus: anno proximo mandasti, ut librum illum,  
qui de Offibus ageret, ab ipso diligentissima cura compositum quamprimam reuocari carerem. Ego igitur tâto li-  
beritatis rem hanc, qualiscumq; sit illa, complector, quanto magis tuo mihi carissimo dabo in videri, quanto etiam  
fatorum erit, ut clarior tua per insignis beneuolentia in eos, qui suam omni studium, ac operam Panormitanæ  
Resip. deuouerunt, euocet Populus; ac nationibus innotescat: Quæ tibi igitur actum in gratias, SENATVS  
ILLUSTRISISIME, patet? quæ habebuntur in omni te in opere ad huius scientiæ studiosis viris, dum hoc  
volumen perlegent, ac diligenti cura tractabunt? quæ homines libri huius causa unogre sanitati restiterunt?  
Non magis Authoris ope, quàm tua restituta esse fatebuntur. Ego incertus præter hæc nactus occasione debita  
PANORMITANORUM SENATVS studium meum declaranda, quo me hoc ipsum opus, quod te im-  
bente imprimendum curauit uolentem, ac alacrem ducit, in spem veni posse a me tibi quidem inuicem satisfactis  
ipso verò Ingraffias plurimum, quando nobilissimum hoc, ac longuin omnibus ratione mandum opus clarissimè tua  
nominis luce collustratum prodire curassem. Vale.

MATTHAEVS DONIA PANORMITA,

PHILOSOPHVS ET MEDICVS

LECTOR

MISILMERI DUCI ET VICARI COMITI

FOELICI PANORMITANI

SENAVS PRAELORE OPTIMO



**H**AVD longa verborum syntaxi, et iam nimis per se celebrem, nunquam tamen satis laudatam Ioan. Philippum Ingrassiam Siculum nostram extollem; sua sequentem praeterea non paucis Medicae Artis monumenta (vltia nobilium profapia, & Christianis, quibus optime scribatur, docet) suam ipsius testantur condiditorem. Hic enim praeterquam quod in alio Neapolitano Gymnasio publicus Lector summo innumerarum auditorum applausu Concurrentem suam, ita ut vnicui ac sine pari annis multis exinde remanserit, longe superavit; rem Anatomiam in super magno coram spectantium oculo publice nulli Anatomicorum secundus professus est; immo primus Stapham, seu mentis Deltoidem ab ipso nominatum officulum, auditoria facultatis non ignobile instrumentum, eiusq; usum (quod ipsemet in huius operis proemio enarrauit, & doctissimus Fallopius reuerenter cum in celum efferens fateretur) & novam cribrosi ossis fabricam, et in primi capitis commenta sexto hic legitur, adinuenit; Unde merito Neapoli cum a discipulis, tum a Principibus omnibus magno in pretio habebatur, eumq; idcirco publica in gymnasio testudine affixa inscriptioe in hanc vsq; diem perdurante, huic in modum honoratur; PHILIPPO INGRASSIAE SICULO. QUI VERAM MEDICINAE ARTEM, ATQVE ANATOMEN PUBLICE ENARRANDO NEAPOLI RESTITUIT, DISCIPLINAE MEMORIAE CAUSA PP. MM. D. &c.

Postmodum naturali Patriae, suorumq; amore attractus (mira discipulorum, ac Neapolitanorum Procerum, immo vniuersi Populi, qui eum prece, pretio, ac nixu omni frustra desinere tentant, dolore) in Siciliam reuersus est; & non nisi diuino id consilio factum esse reor, siquidem ab eo max. pelisera ingluuiet, qua tunc hoc in Regno grassabatur, solertissime, ac scientissime profugata fuit, vt hinc non ab re Siculus Hippocrates dici mereatur. Hic inuicidissimè gentilia potum post medicamentum purgans ingenti cura exterozum administratione, ac iusto inmensiq; agrosantium inuamine amplificauit. Humanas literas, sicut & graecicas tantopere Medicis proficius calluit. De Philosophia, & Medicina non est vt ambigam; in hac enim praecipue tanti fuit, vt ne dum vulgares, sed Magnates, & Heroes omnes non solum Frbis, & Regni huius, verumetiam alienigeni ad eum vnderent; reparari eam, Quid mirum igitur si a Catholico, Inuicidissimod; Rege nostro Protomedicis huius Insignibus, Iuribusq; vna durante, quod rarissime alijs concedebatur, decoratus fuit? Quod minus ita laudabiliter exercuit, vt non nisi a se ipso examine recognitis, approbatosq; (sive Physici, sive Chirurgi, quos dicitur Licentiatos, sive Barbitiones, quos aptius phlebotomia restituit, reuisiones nuncupabo; sive Obstetrices fuerint) admittit; Quoniam, eatenus Medicinae zelotipus extitit, vt primus ipse Doctores etiam ad conclusiones publice sustentandas, Regia impetrato iussu, impulerit. Hoc vnum praeterea de tanto viro notandum occurrit, quod in Regni sui protomediceali, vt dicitur, vrsitatione, suo subditis officio, sequendo delinquebant, acri tantum facta correctione, lucra posthabito, sibi que dumtaxat facto praemicio, vigente in reliquis Constitutionum obseruantia, paxas humaniter vel modificabat, vel vt plurimum penitus remittebat. Statis rursus temporibus, e Regno Panormum omnibus ferè conuocatis Medicis, publicam Anatomiam (praeter frequentes priuatis factas corporum sectiones, velut etiam alias medicas lectiones) vt qui ex hac Medicorum omnium peritiam emanare noscebat, nauquam dimisit; Ita quoq; licetis adactus fuit, vt nihilom obstante senio (posteriore enim diu prioris esse discipulam, ac tã didactosã di ter videt; huius optime scribat) sapissime nosces pro bono u Anthorum lectione, infirmos duxerit absiduosq; inter diu suu Medicis, atq; aliarum scientiarum professoribus, lauis dissertationibus versabatur; quo factum est, vt eius domicilium oppositè a cunctis bonarum disciplinaru vocaretur Emporium. Et quod minime silentium est, iunioris Medicos, quos ingeniosos & videntes agnouisset, praeponebat, ac paternè fouebat, eorumq; vota in consultationibus neutiquam despiciebat; immo quò magis suam ipsius opinionem scientificè disceptando impugnabat, eò magis canos habebat, atq; magnificiebat, sicut alios ex aduerso, qui vel adulanter, vel ignouanter suis dictis plaudabant, contra hodiernum abusum, negligebat. Ceterum sua que in lucem prodierunt, ac per manus doctorum hominum vagantur opera, que haecenus habuerim, & audiuimus, haec sunt; De Tumoribus praeter naturam liber doctissimus. In Galeni Artem Medicam Commentaria

*fertillissima. Tetrapsodia, Quæstio; Que capitis vulneribus, ac phrenitidi medicamenta conveniunt. Tractatus de pestifero & contagioso morbo, Italico sermone conscriptus, & in quinque partes digestus, verè opus accuratum, à cunctis mèberle Medicis cordatè legendum, latinamq; , ut alijs imperinetur gentibus, dignam versione. Ducis Terrænoe casus enarratio, & curatio, è quibus tum penetrantis in thorace vulneris, tum fistule curanda & methodus elucescit. Quæstio; Vtrum vitibus à principio ad statum usq; subtilizando, an postiq; ingrossando procederè debeat. Quæstio alia de purgatione per medicamentum, & de sanguinis missione; an sexta die fieri possint. Constitutiones Protomedicæ. De Medicina veterinaria; quòd formaliter vna eademq; cum nobilioris hominis Medicina sit, materia dumtaxat nobilitate differens, &c. De Malisibus Piscaria morbo, ac moria. De frigida potu post medicamentum purgans, Epistola. De monstruoso embryone Epistola alia. Et demum Commentaria hinc in Galeni librum de Ossibus, Nicolai Ingrassia I. pervisivi, Vtri aquè probi ac solentis industria, magno Artis Mèdicæ emolumento impressa; quæ quantificandâ sint, ne adulatoris notam subeant subiecto: ipsa verò doctrina sumit Authoris præstantiam demonstrabit. Extant præter has & alie boni Sænis non minus momenti compositiones, qualis est Tractatus de humano partu ad Obstetrices. Methodus dandi relationes Pro mutilatis, Pro torquentis, aut à tortura excusandis, Pro deformibus, venenatisq; iudicandis, Pro elephantiasis extra vi bem propulsandis, sive intus vi bem domi sequantibus, vel foras publicè conuersari dimittendis, ac Pro semestrinum, octimestrum, undecimestrinum, ac aliorum suæ maiorem, sive minorum successibus defendendis; Deq; frigidis, aut impotentibus, & maleficiatis; ac tandem Pro gemellorum duorum, sine plurium primogenio determinando: Opera meo sanè iudicio Philosophis incandæ; iuris verò professoribus, Magistratibusq; , ac Medicis propter subtili necessitatem, & Authoris dignitatem insinuarè exquirendus: His accedat Consilia in quibus pauca, necnò dilucida in Hippocratis Aphorismis, & in Galeni libris de Anatomicis administrationibus Commentaria, quæ omnia sanè DEO quemprimò ipsismet Nicolai, cui sui memorie typis curanda curabit; Tu interim Lector humanissime Authori gratias habere, & Vale.*

**E I V S D E M,**  
**IN OPERIS, ET AVTHORIS LAVDEM,**  
**AD TYRONES HEXASTICHON.**

**C**orporis ossa basis veluti sunt firma caduci,

Sic opus hoc Artem fulcit a pollincam.

**Q**uot, quibus, & quare connexa sit ossibus, & qua

Nostra caro serie, discere nunquid aues?

**I**n GRASSIA docet præstans, accede libenter,

Accede o Tyro, quo bene doctus eas.





**I**FFLAGITASTIS (noſtri tanquam filij Chariffimi) non ſemel, aut bis, verum affiduis quarimonibus, quaſi quibusdam negligentia conuulſis (eo modo quo mecum ſemiliter conuerſari ſolitis) interepuiſtis, vt quod ſape vobis ſpōpondaram, pro Charurgicorum, aliorumq; non paucorum Medicorum, quinimmo potius pro

eorum, quos ipſi mederi, atq; curare ſolent, vtilitate, Galeni opusculum de offibus enarrate, atq; elucidare velim: prout me publicè illud enucleantem, annotantemq; ſapenumero audiueratis. Cum introducto quedam ad ſolà anatomen; alioſq; omnes libros anatomicos vſq; adeo pernecessaria ſit: vt facilius, citiusq; celum volando pertingere dignitolo queamus, quam ſiue offium per cognitione, anatomes reſiduū intelligere. Accipite igitur, ne amplius me torqueatis, Galeni de offibus ad Pyromes, anatomesq; candidato enarrationem, quibusdam cum annotationibus: Preſertimq; vbi ex ſimiarum diſſeccionē deceptus Galenus à vera hominis conſtructione, ac ſcelecto deniat. Verumtamen haud nobis continget, quod alijs ſere omnibus: vt pretermiſſa, ac penitus ſprata antiquarum debita reuerentiā, primo ſtatim obtutu, perfricta fronte ad illorum deriſum, turpeſq; contumelias, medum rei cōtradictionē deueniamus. Noſtra enim intentio ſemper fuit, in quibus omnibus veteres deſendēre interpretando, elucidare, atq; excuſare poſſimus, eas deſendamus, interpretemur, elucidemusq; & excuſemus, ac tandem pro viribus omnimō à nimium liberis, audacibusq; detractōribus liberemus. Id quod præcipue in proprijs huius libri expoſitione patebit. Vbi verò poſt longas lucubrations, diligentiffimumq; examen, nullam ſiue Galenus, ſiue quiuis priſcorum recipiat medelam, nulloq; pacto excuſari queat, cum omnibus præferenda ſemper veritas ſit, eam modeſte propalabimus habita quidem vbiq; præceteris Galeni Medicorum proculdubio luminis reuerentiā, ſæpiuſcule interim pro quadam eius, ſiue aliorum conſolatione, quam errandi cauſa extiterit, declarabimus. Quod in huiusmodi opusculi, neſum an aliorum poſterius adendorum enarratione, quam pyimum patebit. Haudquaquam verò illud obſeruabimus, quod plurimis familiare eſt, in margine inquam annotare [Galeni error] ſeu [Auicenna error] & ſic de reliquis. Fortaſſis enim meus, & non illorum error eſt. Verum nihilominus eſt, quod mea ſententia contra illorum decreta erit. Idcirco noſter mos fuit, eritq; ſic in margine libri annotare [contra Galenum] vel [contra Auicennam] idemq; de reliquis. Atq; idipſum (vt diximus) honeſtatis, modeſtiāq; gratiā, prout in noſtro libro de tumoribus præter naturā quilibet obſeruare poteſt, reſeruatū intereā contumelijs aduerſus pertinaciſſimos, perſidiſſimoſq; ac refractarios homines, duræq; cervicis calūniatores. Sed interim filij dilectiſſimi valeatis, meq; (prout bucuſq; indefinenter conſueuiſtis) tanquam veſtrū patrem reciproce diligatis. Nos verò ad propoſitum, pro veſtris votis, conuertamur.



ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΟΣΤΩΝ, ΤΟΙΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙΣ.

# GALENI DE OSSIBVS, AD TYRONES.

## TEXTVS PRIMVS.

Τὸν δὲν ἕκαστον δίδωσι ἐκείνῳ αὐτὸ καὶ ἰσότη, καὶ ἂν ἔχῃ τὰς ὁμοῖς ἄλλα καταστάσεις, ἐπίπεδοι ἢ κυρτοὶ καὶ κοίλοι, ἢ ἄλλα ὅμοια μέλην τότε κατὰ φύσιν αὐτοῦ, καὶ τὰ ἐξωτερικὰ ἴσθηται.

Ex ossibus quodlibet quale quid est ipsū secundū in seipsum, & quam inuicem cum alijs constructionem habet, scire medicum oportere dico: siquidem rectè tum fracturas ipsorum, tum luxationes curaturus est.

## COMMENTVM PRIMVM.

*Tametsi nostri Siculi Balamij versionem commendamus; clarioris tamen, ac tutioris doctrinae gratiā (quod ad possibile, sine praeiudicio, fuerit) serē verbum verbo reddere conabimur, latino interim candore faciliorem, apertiolemq; ac tutiorem sermonem preferentes.*



**V**ALERE quid] intellige secundū propriū temperamentū (de quo postea loquemur. .a. Quod quidem tēperamētum, iuxta Galeni, quem interpretamur, decreta, quod ossium, sicuti & aliarū partium similiarium essentia, formaeue substantialis est, quemadmodū alibi .b. vberimē ostēdimus. Adeo vt idem sit ita dicere [quale quid vnumquodq; sit] ac si diceremus [quodnam sit vniuscuiusq; temperamentum] siue [quemam sit cuiuslibet essentia, seu quidditas] eo modo, quo primo Artis medicinalis dictionem eandem [qualia nam sint] secundū eorum definitionem, de salubribus, insalubribusq; & neutris corporibus intelligendum fore demonstrauimus. .c. Idem enim [ὁμοῖοι] & [πρόσῳτοι] & [ἀπρόσῳτοι] hoc est latine [quale quid] significat. Quod à substantijs etiam secundis significari, Aristoteles. .d. testis est. Dicit autem Galenus [quale vnumquodq; sit] statimq; Græcè [αὐτὸ καὶ ἰσότη] quod claritatis gratiā

a. Tex. 3.

b. T. 275. med. cō. 25. & 2. cō. 3.

c. Com. 13. 14. & 20. lib. 1.

d. In præfatio cap. de substantia circa ossa.

gratia vertimus [ ipsum secundum seipsum ] quanquam dicere possemus cum interprete Balamio [ per se ] hoc est, seorsum, & secundum propriam suam essentiam. Verum enimvero quantum principaliter de ipsorum ossium singulorum temperamento discutiendum, pertractandumq; esse, hac distione [ quare quid quodlibet sit ] intelligatur: Nihilominus tamen & alia quoq; septem subintelligenda hic sunt: videlicet vsus, magnitudo, propria eorum corpora moles, siue substantia, forma, seu figura, numerus, foramina, & sensus. Necesse igitur est Medicum præscire ossium singulorum hæc octo: videlicet primum temperamentum, formamque substantialem: Secundum vsus: Tertio magnitudinem: Quarto propriam eorum corpoream molem, siue substantiam: Quinto exteriorum formam, siue figuram: Sexto numerum: Septimo foramina: Octauoq; demum eorum sensum. Quorum quidem octo prænotanda Galenus quatuor prima generatim prius cum Galeno declarabimus: *e.* videlicet temperamentum, vsus, magnitudinemq;, & propriam corpoream substantiam. Reliquæ verò quatuor, nos ex ipsis etiam monumentis supplebimus: *f.* videlicet figuram, numerum, foraminaq;, & sensum: Ex ipsius inquam monumentis figuram namq;, numerumq;, & foramina primo capite tanget, ¶ ac de duobus horum primis capite enā tertio: \* de sensu autem capite quarto: dum solis dentibus illum inesse ait. § Speciatim verò in singulorum proprijs capitibus: ubiq; opportunum fore nobis videbitur. Hæc igitur de ossibus per se, ac secundum seipsa prænotanda Galenus proponit: Deinceps verò quam structuram, siue compositionem, aut coniunctionem ( quæ Græcè *σύνθεσις* dicitur ) vnunquodq; cum alijs habeat siue principalibus ossibus, siue eorundem proprijs appendicibus. Cum quibus maxima ex parte per lynchondriam, interdum verò per eam, quæ sine medio remanet, symphyis ipsa vniuntur. Præscire igitur medicum oportet singulorum ossium non modò prædicta octo per se, ac seorsum secundum seipsa: sed quam inuicem structuram habeant. An scilicet per articulum, Græcè *αρθρῶν*, an per eam speciem, quæ *σύνθεσις* dicitur: verū inquam vni, coalescentiaq;: Quòd si per articulum: an per eam articulationis speciem, quam *σύνθεσις* Græcè, latine autem dearticulationem vocant, propter motum quidem manifestum perpetuò factam: An per aliam

*σύνθεσιν*, latine coarticulationem appellatam? quæ propter motum occultum maxima ex parte: Nonnunquam verò etiam sine motu existit? Quemadmodum symphyis ubiq; ac necessario propter quietem est. Hatum igitur omnium constitutionum species quoq; sigillatim prænotare Medicus debet ( de quibus infra loquemur. ) siquidem rectè curaturus est tam ossium ipsorum fracturas, quam luxationes quoq; ipsas: quum scilicet à sua sede dimouentur. Cuius propositi necessariæ præcognitionis rationem euestigio subdit,



... [ The text in this column is extremely faint and largely illegible due to the quality of the scan. It appears to be a continuation of the medical text from the main column. ]



Odo per-  
cognoscen-  
da.

e. Infra tex.  
3. 4. & 5.  
f. Com. 1.

¶ Figuram  
tex. 1. vsq;  
ad 7. nam.  
tex. 1. 4. &  
7. forami-  
na tex. 3.  
\* Ferè per  
totum.  
§ Tex. 1.  
B. Tex. &  
com. 10. &  
sq.



TEXTVS SECVNDVS.

Διὰ γὰρ δι' ἐν ἰσάκσει τῆς ἐν ἰατρικῇ, σκοπεῖ ἔχει διὰ τὸ κατὰ φύσιν ἵστασθαι τὸ ἀγνοεῖ, ἕτι ἔτι τὰ  
 οὐκ ἐπιβλεπόμενα τὰ φύσιν ἵσταται, ὅτι ἐν γὰρ ἀπὸ ἰατρικῆς ἐστὶ κατὰ φύσιν ἵσταται ὅτι ἐν ἰατρικῇ τὰς  
 φύσιν, ἢ ἵσταται ἑβρίον ἴσχυοντα.

Et enim in omnibus, quæ ad medicinam pertinent, perspicuum est, id, quod secundum Naturam  
 est, scopum habendum esse. Quisquis verò id ignorat, neq; ubi à Natura sua patientia membra  
 distrahuntur, intelliget; Neq; quemadmodum ad id, quod secundum Naturam est, reduci debeant.  
 Quæ de re nec morbos noscere, nec rectè illos curare poterit.

COMMENTVM SECVNDVM.



**U**NIVERSALE axioma est sexcentis in locis ab ipso etiã Galeno celebratum: In  
 omnibus .f. his, quæ ad medicinam pertinent, quinimmo & in cõctis, quæcunq; sint,  
 quæ correctione, ac reductione indigent, id q̄ secundum Naturam est, tanq̄ scopum  
 necessarium habendum esse: siue intemperitè, siue malâ quamlibet cõpositionis speciem,  
 aut vitiatâ solutionem tunc noscere, tunc curare aggrediamur. Verum enimverò addidit hic  
 aliquid à nobis restat. Galenus enim ossium præcognitionem, videlicet qualia nam singula per se,  
 ac secundum seipsa sint, tunc quã inuicè structurâ habeant; medico necessariã esse, in præcedenti  
 textu inquit, ob speciales quosdam causas: scilicet si luxata locare, vel fracta instaurare intendit.  
 cuius tamen vniuersalè rationem assignauit in præsentì contextu. vt id. f. q̄ secundum Naturam est,  
 tanq̄ scopum in omnibus habeamus. Nos autè generalissimã esse eam ossium anatomies necessitatem  
 demonstribimus, nõ his tantummodo chinurgis luxata, fractaq; curatibus: sed alijs quoq; omnib;  
 & vulnera, & vlcera, præsertimq; maligna, & corrosiua, tumores quoq; omnes, ac præcipuè, qui  
 ex Gallica lue, nostra hæc ætate, oriuntur, curare voluerint. Sed ne chirurgicis quidè solis præ-  
 dicta ossium doctrina pernecessaria est: sed physicis quoq; vocatis, qui magis in curandis morbis in  
 intemperie factis, ac præsertim calida & sicca, vt febrili omnium genus est: Itemq; in mala corpõ-  
 ris cõpositione, vt præ ceteris in meatu, seu via: cuiusmodi obstructions sunt, vniuersum studium  
 suum reponunt. vt qui nisi totius corporis, maximeq; viscerum anatomem pernouerint, venarum  
 quoq; arteriarum, & neruorum: Itemq; musculorũ omnium diligentem, exactamq; habuerint præco-  
 gnitionem: morbos quosuis exactè nosce, aut curare minimè gentium poterunt. Potius enim sine  
 alijs volabunt, quã sine horũ exquisitissimã notitiã methodicè quenq; curare valebunt. (Quam-  
 uis minime præterit ab ignauissimis scyphantis, Thralombusq; plus garrulitatis, seu scurrili-  
 tatis propriæ, quã cuiuslibet scientiæ confidentibus, totam siue mortuorũ, siue viuorũ anatomem  
 floccipendit, non secus ac omne quoq; studium, omneq; doctrinã deridentibus negligi.) Sed his  
 tanq̄ pernitiõssimis Naturæ inimicis, omnino prætermittis, cõdemnatissiq; ad propõsitũ reuer-  
 tamur. Necessaria inq; ipsi quoq; physico quomodocunq; curare volenti est viscerũ omnium ana-  
 tomes præcognitio, præsertimq; trũ principalem: vt cerebri cũ suis neruis, spinaliq; medullis;  
 cordis cũ suis arterijs, ac hepatis cũ suis venis. At quomodo sitũ, nexumq; horũ noscere quisquis,  
 nisi prius omnium ossium tam per se, quã cũ alijs inuicem structurũ perfectã notitiã habuerimus?  
 Necessaria deinceps physico nuncupato medico est in musculorũ omnium cognitio. Sed quis erit,  
 qui musculos ipsos, absq; ossium exquisitissima præcognitione, noscere, aut describere poterit?  
 Quamobrem Galenus libro de anatomicis administrationibus primo, .b. sic anatomes ordinem  
 fortissimè disposuit. [Ossium (vt dixi) omnium Natura perdiscenda est, siue in humano, siue in  
 simiæ corpore, modò possis: præstat autè in vtroq;. Post illa mox ad musculorũ anatomem pro-  
 perandũ. Nã hæc duæ corporis partes reliquis omnibus veluti fundamenta subiecta sunt. Deinde  
 licebit quoduis discere primũ, siue arterias, siue venas, siue neruos: Atq; in horum anatomis tibi  
 versato, viscerum Naturã, adhæc intestinorũ, adipis, & glandularũ innotescet. Quæ rursum ipsa  
 per se exquisitis inspicere cõuenit. Hunc igitur exercitiũ ordinè sequi potius tibi iussferim, &c.]  
 Ecce igitur, quod ossium anatomie omnibus alijs præstenda venit. Quamuis autè ossa, & muscu-  
 los, vtraq; aliarum partũ fundamenta Galenus in iam iam prælegatis verbis dixerit: ossa tamen  
 priora sunt, & ipsorum quoq; musculorum fundamenta, vt paulò post cum ipso etiã Galeno de-  
 clarabimus. .i. Quamobrem & idem consulebat, .k. vt vniuersiq; domi suæ ossium structuram  
 (veluti plurimum nos corporum, quatuorsumq; animalium domi habemus) quam Greci scõleton  
 vocant, retineant. Hanc igitur ob causam & sic liber inter anatomies primò scriptus, etiã  
 primò legendus est: veluti Galenus idem quoq; perdocuit. .l. Sed tempestiuũ iam est, vt aliquam  
 ex prænominatũ ossium qualitatibus interpretemur, incipiãmusq; ex ossibus, qualia nã sint singula

h. Cap. i. in  
 sine.  
 Anatomies  
 ordo.  
 i. Infrã tex.  
 & com. e.  
 k. Primò de  
 anat. ad-  
 min. cap. 1.  
 post prin.  
 l. Primò de  
 anat. adm.  
 o. 3. i. prin.  
 & de libris  
 pprijs cap.  
 3. i. prin. &  
 de ordine  
 librorum  
 mod.

per se, ac seorsum prius contemplari. Ab ipsorum igitur temperamento cum nostro, quem interpretari aggressi sumus, Galeno, exordiamur.

TEXTVS TERTIVS.

Ἔτι μὴ δὲ τὰ οὐ σαλευόμενάς, καὶ ἐμύετα τὸ ἕξι ἕξι; καὶ δὲ (ἀνίσταται) Γενεῖσιν.

Sunt autem ossa durissima, siccissimaq; animantis membra; Et (vt quispiam dixerit) maxime terrestria.

COMMENTVM TERTIVM.

**O**SSIVM corporis membrorum ossa siccissima sunt. Quamvis enim pilos Galenus, & eius interpres Avicenna .n. ossibus siccioris posuerant; Pili tamen vere corporis membra non sunt, sed excrementa quaedam ex fuliginosis, crassiq;, & terreis vaporibus iniuicē ordine inspissatis, cōpaētisq; (vt Galenus .a. ait) genita: quae tunc interiori Natura corpus expurgare. Quare nec ipsorū vilū est regimen (eodē auctore .p.) sed generatio sola. Ossia igitur inter corporis vera membra, verasq; animatas partes maxime; (vt Galenus addit) inter ea, quae cutis operit, siccissima sunt, indeq; durissima. Velut enim humiditatem sequitur mollities: ita siccitate durities. Est ergo durities effectus siccitatis, sed nobis notior, de eod; prius de duritie meminit, ex cuius notitia in siccitatis cognitionē peruenimus. Quamobrem per se illē dicebat Aristoteles .q. [Nervi, & ossa calore interiore cōfirmantur, siccescēte humores quōlibet resoluti ab igne nō possunt: quomodo testa indissolubilis est. Quasi enim in fornace excocta à calore generationis ita cōstat. Hic autem calor nec ex quolibet carne, aut os facit, neq; quolibet modo, aut tempore: sed ex materia apta, & vt aptē, & quā aptē effici potest.] Hec Aristoteles. In quibus verbes Nota, qd ex materia quidē apta fieri dicit: quia ossa ex terrestriore, crassiorēq; ac per hoc frigidiore, sicciorēq; sanguinis (secūdum Aristotelem) parte fiunt. Ex diuersis enim feminis partibus diuersas partes Natura generauit, Galeno enī ipio singula enarrate, hoc modo in primo de semine, de ossibus (vt alias interim partes omiserimus) scribente .r. [Reliqua crassiorē, ac terrestre, minusq; ad distrahendū idoneā in ossibus sede Natura deposuit.] Solū igitur inter hos auctores differētia est. Quoniam Aristoteles sanguinis mensurā, Galenus verō feminis crassiores partes materiā generationis ossū voluit. Sed Galeui verba prosequamur. Paulō enī infra alterā Aristotelis sententiā de calore cōfirmat, dicens [Vtq; est ad ossium procreandem, calor is maxime facultate, quae torret ea, ac prorsus arefaceret. Id quod in his sanē ipsis fuit: tūc quia dura esse debeant: tūc propterea qd omnis, quēcūq; inerat, pinguis pars, quasi effluat: sic nūc spuma quēdam effundi, atq; exire illi ita maxime poterat.] Paulo, antea & calor is effectum, & materiam quoq; tangens, hoc etiā modo ait [ Simulq; ipsa ossa pinguisissima quaeque parte suctu extracta, terrestria, atq; arida, nec nō pinguedine hōm prius carentia reddidit.] Sed de ipsorum temperamento satis superiq; dictū huculq; sit. Quae erunt verō, cor siccissima, durissimaq; & maxime terrestria esse ossa Natura voluit: Quamprimū respondet Galenus, secundum multū, qd antea .f. proposuimus, tangēs, scilicet ipsorū ossium vim. Etenim Orbis vniuersi fundamentum terra est elementorum cōtinuum siccissima: cui ossa ipsa comparantur.

Tacite ob-  
solutio.  
m. 1. de cō-  
peramentis  
in fine ca-  
pituli .9.  
n. Prima  
primi doc.  
3. cap. 1.  
o. 1. de tem-  
peramentis  
cap. 5.  
p. 2. pro-  
med. tex. 11  
22.  
q. 1. de gene-  
raci. ani-  
mal. cap. 4.  
post med.

f. Supra  
com. 1.

TEXTVS QVARTVS.

Ἐπιπέδον δὲ, καὶ διὰ τὴν ὑπερβολὴν τῆς ἀσθενείας καὶ, καθότι τὴν βελανίαν, Πάσσα γὰρ ἐστὶ πῶς οὐκ ἐπιπέδον, καὶ ἐπιπέδον.

Subijciuntur autem, ac veluti fundamenta quaedam reliquae corporis substantiae: quas subtile, reserunt. Omnia enim ossibus ipsis adnascuntur, stabiliunturq;.

COMMENTVM QVARTVM.

**V**INQVE ossium vsum assignari queunt. Non inquit qd singulorū ossium quinq; vsum sint: Sed diuersorū ossium diuersi quoq; vsum existunt: quāquā aliqua sint, quae duos, aut tres etiā vsum habeant. Reliquis verō generalior hic est, quem Galenus hoc loco refert. scilicet vt sint omnium aliarū partū fundamenta, seu sustentacula. Ad quōrū variātionem, aliae quoq; omnes partes variantur: praesertim figura, magnitudoq;, numeroq;, & situs. Tamen Galenus de duabus primis tantum, hoc est, figura, & magnitudine locutus est, in primo de anatomicis administrationibus libro, dicens .t. [Quod in tenoris praesentis palis, & in quibus panetes,

Ossis vsum  
quinq;  
t. cap. 1. in  
prim. idē in  
not. Arist.  
2. de part.  
cap. 1. post  
prin.

parietes, id nimirum in animalibus officium substantia. Quippe ad huius imitationem cetera in animalante solent effingi, mutantq;. Vt si animalis calvaria sit rotunda, necessarium cerebrum tale fuerit. Quoadmodum etiam ibi oblonga sit, tale quoque; figuram huic ipsi animalis cerebrum induet. Iam vero si maxillae paruae, faciesq; tota exstat rotundior, necessarium quoque; ipsarum musculi parui erunt. Pari ratione si longae, longa statim huiusmodi animalis erit tota facies, eiusq; musculi tales apparebunt. ] Pauloque; infra rursus ita inquit [ Hi enim (scilicet musculi) ossibus foris protenditur: Quare etiam tum magnitudinem ipsorum, tum figuram imitantur. Hos rursus arteriae, venaeq;, & nervi sequuntur: Haec igitur similia in similibus ossibus existunt. Itaque; cum corporis forma ossa repraesentent, & his aliarum partium Natura respondeat: Dignum est te imprimis exactam humanorum ossium experientiam indispici, &c. ] Haec de duabus primis, scilicet figura, & magnitudine Galenus. Nos autem tertium scilicet numerum addemus. Aliarum enim partium numerus ipsorum quoque; ossium numerum sequitur. Si quidem igitur quatuor digiti manus, pedisque fuerint, musculorum numerus (puta qui inter ossa postbrachialis, pedisque abconduntur) diminuetur. duo igitur musculi necessarii deficient. Sin vero sex digiti fuerint, ex praedictis duobus superabundare necessarium est. Bini enim in ossium postbrachialis, ac pedis quoque; interualis musculi intercluduntur. Ita venarum, artenarum, nervorum, tendonum, ligamentorumque; numerus comminuetur, vel augebitur. At quis demum de situ ambiget? Quod aliarum partium quoque; situs, ipsorum ossium situm necessarium sequuntur? Si enim musculi, venae, arteriae, nervi, tendones, aliaque; particulae omnes ossibus firmantur, ac superferruntur, quorsum ipsa ossa tendunt, verguntq;, eorsum & haec tendere, ac vergere necessarium est. Pro copiosissimo igitur habemus omnia serere ossa (praeter admodum pauca, quae in aliorum usum declarationem enarrabimus) sustentandi munus habere, ac fundameta aliarum partium esse. Quoniam vero quadrisariam corporis vniversi membra simplicia (Galeno docente. x.) diuiduntur. Aliqua enim sunt, quibus actio attribuitur (In omni enim organico membro vna inesse particula simpliciter, necesse est, cui attribuenda veniat actio, prout sexcentis in locis Galenus id ostendit. x.) Reliquae vero simplices illius cunctidem organici particulae omnes quandam vsuum, ac famulatum ad illam actionem praestant. Quarum particularum vsus triplex est. Nonnullae enim sunt, sine quibus actio illa fieri non potest. Nonnullae vero propter melius fieri eandem actionem. Quaedam denique; genitae a Natura sunt ad praedictarum omnium particularum salutem, & conseruationem. vt (verbi gratia) in oculo prima, cui attribuitur actio, particula simplex est, humor crystallinus. (Quoniam enim Aristoteles pupillae actionem attribuit, verè quidem reprobandus venit: Nisi quod prius magis esset, pro antiquiorum, praesertimque; tanti viri reuerentia, violentiam quandam glossam vellet et quispam afferre, pupillae scilicet nomine crystallinum intellexisse Aristotelem, docens quatenus scilicet per pupillam crystallinum reuocet, & suamque; coplet) pupilla vero (quae aliud verè non est, quàm vnae tunicae foramen) nervique; ophthalmici famulatur praestant, vsuumque; sine quibus actio videndi fieri non potest. Id quod patet in exquisitis, & copletisque; suffusionibus, aut vbi nervi illi quopiam crasso, terrestrique; aut leni humore oppletuntur, obstruunturq;. At palpebrarum, & superciliatorum puli vsuum quandam habent propter melius: vt scilicet visio perfectior, ac distinctior fiat, longiusq; tanquam magis vnita extendatur. (Omisit aliorum partium vsuum, defensionis inquam gratiam, tuitioque; à rebus desuper incidentibus) Sed ipsae demum venae, arteriaeque;, ac membranae quarum vsuum habent, videlicet propter tonum, & scalarum partium salutem, & conseruationem. Ita in manu quatuor haec contemplari possumus, cuius actio est apprehensio (Galeno etiam didascalo. y.) Id enim cui attribuitur actio, muscularis est, seu tendio. propter melius vero vsuum praestant ossa. Namque; in apprehensione ossa ipsa simpliciter necessaria non sunt (Galeno quoque; coprobante. x.) Polypos enim validissime iam apprehendit, retinetque; interdum natantur, erura, seu tibias, quibus inuoluitur: vt saepe numero illos summere faciat. Haud tamen ita commode, & perfecte, sicut homo suis manibus: quibus ensem variè pertractat, lanceamque;, pennam, acum, multaque; demum, & variam, paruaque;, & magna instrumentum: Manus quoque; exquisitè aperit, reataque;, & ipsas validè apertas tenet: Multaque; tandem facit, ad quae ossa deseruiunt, sustentando alias omnes partes, quae ipsi inferuntur. Non igitur simpliciter necessaria ad apprehensionem sunt ossa, sed ad meliorem quidem apprehensionem eisdemque; vitia sunt. Quare propter melius, vsuum habere dicenda sunt. Verum quae secundum vsuum praestant, vt sine quibus non, Articuli sunt, & quaecumque; illos circoscrunt, ligameta; praeterea nervi, per quos sentiendi, ac mouendi potentia a cerebro deicèdat. Absque; his enim motus fieri non potest: ac per hoc deficiente manus plicatione, ipsa manus apprehensio peribit. Cutis denique;, ac membranae, venaeque;, & arteriae vitium vsuum praestant: videlicet salutem, & conseruationem, ipsamque; nutritionem. Quod si de cruribus vestiges, quatuor haec eadem inesse coperies. Ipsorum igitur actio cum sit, deambulatio. x. & stans: simplex particula, cui attribuenda talis actio venit, muscularis quoque;, vel tendo erit. Ossia vero hic sunt, sine quibus non. Quomodo enim rectus stare poterit homo, & eleuato capite, ac toto corpore deambulare (vt eius proprium, Galeni dogmate, b. fuerat) nisi cruribus ossa intercluderentur? Quam ob causam & ipsa etiam spina necessaria in

Reliquae  
paruae ossium  
figuram  
imitantur.  
Magnitudi  
nem.

Numerum.

Suum.

Simplex  
mebri qua  
duplex.  
u. 2. de vsu  
par. cap. 1.  
& 10.  
x. v. ibidè,  
& 4. meth.  
12. meth.  
6. cit. med.  
& in fine,  
& alibi fac.  
p. 116. c. 10.  
Exemplum  
prima in  
oculo. cap.  
Cora Ari-  
stotelem.

Exemplum  
secundum in  
mano.  
y. de vsu  
p. 1. & 10.  
& 11. cit.  
cap. 1. circa  
p. 11.  
2. de v. p.  
cap. 12.

Exemplum  
tertium in  
cruribus.  
a. de v. p.  
1. de vsu  
p. 1. & 10.  
& 11. cit.  
cap. 1. & 3.

homine offea fuit; quonia rectus stare homo non potest, si ex molli quapiam substantia cōstituta fuisset. Articuli quoq; ac sua ipsorū ligamenta, magisq; nervi, per quos sensitius, motusq; virtus è cerebro descendit, ex corū numero sunt, sine quibus non. Sine his enim deambulatorio, statioq; fieri nō potest. Etenim ad standū etiā necessarij sunt. Nam si veluti marmorea, & sine articulis essent erura, adeo vt in introrsū, vel extrorsū, & vario modo aptari nō possent, stare homo rectus nequiret, sed caderet presertimq; in aspersis, inæqualibusq; locis. Pedū verò digiti necessarij simpliciter nō sunt ad crurū actionē, nisi propter metus, perinde ac ipso etiā Gale-

cap. 1. an-  
te med.  
Historia.

Historia.

Dubium  
Responsio.

d. vt r. cap.  
8. 10. & 16.  
3. cap. 13.  
in fine, &  
sup.  
e. 1. an. me.  
Ossificatio  
quæ?

f. lib. 2. cō.  
3.  
Ossū vsū  
primū qua-  
si.

Secundus  
ossū vsū.

g. infra cō.  
23.

h. cap. 1. d. r.  
ca. med.

ca. med.

de vsū partū libro tertio discere potes: quim sic dicebat. c. [ vidi autē & alios quosdā, quorū digiti soli mortificati à nise exciderant. Sed hi quidē neq; stando, neq; ambulando, neq; currendo in planis saltē, & leuib; vincebantur à fanis. Quod sicubi oporteret aliqūē persuadere difficultem locū, & maxime si preceps, ac pręruptus fuisset non solū superabantur, sed omnino erant inutiles, & præ illis impotentēs. ] Hæc Galenus, qui in planis necessarios nō esse pedum digitos ostendit: In aspersis verò, & pręruptis locis, inutiles esse, atq; impotentēs dicens eos, qui talibus digitis carerent, nō q̄ nullo pacto deambulare, vel stare potuissent, intelligit (salū enim id esse iam experti sumus.) At q̄ satis debilitet, & ignauo quodā modo vel incedebant, vel stabant. Sed quendā nouimus nostrā amicissimū hodie Panormi viuentem, cuius pedū digiti, ob validā, stricām; tibiariū prope tūū ligaturū (dum capite pluriēs in aquā summerso à crudelissimo pyrate Dragutto in antennæ extremo ligatus super tremibus atrocissimē torqueretur) denigrati, ac mortificati omnes vtriusq; pedis digiti fuerunt. Adeo vt ipse met, deficientē medicorū auxilio, proprijs manibus illos singulatim præcedens in mare proiecerit. Nulli tamen siue in planis, siue in aspersis locis, vel stando, vel deambulando apparenter cædit. At de his alibi fusiūs. Vitūm verò vsūm simpliciuū particularū eruris cōpleamus. Venæ igitur, arteriæq;, ac membranæ, & ipsa etiā cutis propter conseruationē, & salutē sunt. Sed quorsum hæc? dicit quispiā. Respondemus, nō aliorū, nisi vt ostendamus ad quem ex prædictis tribus actioni deseruientibus vsibus primus hæc à Galeno propositus ossū vsus reducendus veniat. Ex tribus inquit actioni deseruientibus vsibus: Etenim primum, q̄ cōsiderabatur, actio ipsa organici, aliquid tamen simplicij principaliter attributa, erat: Reliqua verò trā, vsus nuncupabantur. Qui quidē inter cō simpliciuū particularū vsus (veluti Galenus in libris de vsū partū stepius ostendit. d.) omnes propter ipsam actionem sunt; illiq; tanquā indigniores famulantur: quanquā alter illis nobilior organicorū vsus est, ex actione proueniens, illām; insequens: de quo quidē alibi vberius locuti sumus. c. Sed quæ ossū actio? Nulla esse, respondemus. Nisi fortassis dentū actionē quandā esse dixeris ipsā incisionē, cōtritionēq; ac molitionē glenulorū. Verūm exquisitē cōtemplantibus, dices quoq; nullā habere actionē, euectigio cōperitissimū fiet. Prædictę enim actiones musculorū infernā maxillā mouentium sunt. Dentes verò instrumenta potius quædā sunt, veluti malleus, gladiusq;, ac molendini lapis, neq; simpliciter ad tales actiones necessarij. sed propter melius (vt patet). Masticant enim senes dentibus vtrinq; carentes, sed non æquē benē, sicut dentati, prout rursus in fra dicemus.) Haud igitur necesse est, simplices particulas, omnes, nisi pauciores, actionē habere. Quinimo verū loquēdo, ipsis organicis actiones attribuuntur, ratione tamen simplicis particulæ, sed de hoc in arte medica f. vberius. Ad quem igitur horum trium reducetur hæc primus ossium vsus? Respondeo, q̄ in animali simpliciter considerato, necessarij non est. vt v. g. ille est, qui dicitur sine quo non. Innumera enim sunt animalia terrestria, & maritima (vt omnibus cōperitissimū est) sine ossibus, quæ mouentur tamen, & deambulant. In homine autē, qui rectus stare, ac incidere quoq; rectus debet, itemq; ascendere, & descendere, ac varijs tandem modis moueri: præterea manibus in bello, & pace, ac multis etiā sedentarijs artibus vtu: Nonnulla, immo plurima hinc eius ossa (veluti paulō ante diximus) esse necessarij sunt, sine quibus prædictę, aliq; inolete humanę actiones fieri nequeunt. Quemadmodū tibiariū, & femoris ossa, nec non spina, seu spinę vertebrę sunt, atq; etiā pedum ossa. Nec aliter de ossibus manū, vt ad plurimas humanas actiōnes, necessariarū, dandū est. Quanquā in alijs quibusdā particulis (perinde ac de dentibus prædictū iam est) ossa propter melius duntaxat fabricata fuerunt. Sed alios ossū vsus percurramus. Præter hunc enim, alijs quatuor inueniuntur: quos Galenus, tamen hoc loco breuitatis causa; dimisit, in suis tamen alibi scriptis cōmentarijs insinuat. Secundus ergo vsus est, vt alterius cuiusvis nobilioris particulę propugnaculū sint, ac veluti murus, seu vallū. siq; ad salutē, & cōseruationē nem. Quemadmodū crani ossa cerebri propugnacula sunt. Vnde (vt postea videbimus. g.) nomen tale merita sunt: quia velut cranon, id est, galea quandā cōstituit. Idemq; thoracis ossa, & posteriores, lateralesq; spine processus, nedum tota vertebrarū omnīū substantia, cordis, pulmonisq;, ac spinalis medullæ propugnacula ( vt loco suo videbimus) existunt. Sed neignorant quidē hunc vsū Galenus, cum libro de vsū partū sextodecimo posuerit, h. sic scribens. [Ossū porrō substantia multis quidē locis velut stabilimentum, ac sedes alijs partibus est subiecta: alibi etiā passim velut propugnaculū quoddā, ac pugnus. Hæc enim dure sunt ossium vitilitates. ] Hæc

Galenus,

Galenus, qui ad hunc quoque; vsum productum appendicū vsum, siue vtilitatem, de qua infra *i. sēmo* 1. com. 6.  
 fiet. Est autē & hic vsum non solum ad defensionem, conseruationemq;, sed etiā propter melius.  
 Id quod illi, quibus ob Gallicā lucem, maxima crani pars derosa, abscissaq; iam est, praeferunt.  
 Qui viuunt quidē, sed malē, & eū periculo cuiusmodi nō paucos agnoscimus. Vtrumq;, dictum  
 vsum tetigit Aristoteles, dicens [Quatenus igitur partibus ossa omnib; subiacent, aut flectendi gra-  
 tiā, si mouentur, aut obseruanda causā, si immobilia sunt, vt costae, quae pectus salutis viscerū gra-  
 tiā claudunt.] Tertius succedit quorundā ossium vsum: quae scilicet articulos manuum, ac pedum  
 intus in planta, digitisq;, nonnullis subiacent, ne laxius illi articuli moueantur, aut firmentur,  
 aut in nimū acutos inclinentur angulos: Quomodo etiā in genu patella efficit. Huiusmodi ossa,  
 praeter patellā, parua admodū sunt: Adeo vt veteres Anatomicarū aggressioni professores seles-  
 tino semini coparantes, selesmoidea ossa nomenclarint. De quibus in huius proemii calce ser-  
 mocinabimur. Est verō terps hic vsum vna ratioe propter melius. Abiq; his enim fieri statio,  
 ac deambulatio in planis ( licet non aequē benē ) poterat. In decliuibus autem locis dicendum est,  
 sine quo non. Quartus verō vsum effe dentū, videlicet incidendi, cōterendi, & molēdi. Incidendi  
 quidem, vt anteriorum, quos propterq; incisos nuncuparunt: Conterendi verō, vt caninorū.  
 Molēdiq;, demū, vt ipsōrum molariū vsum est. Quae omnia ad masticationē, cibiq;, elaborationē  
 pertinent. Sed hic quidē vsum propter melius est. Multos enim edentulos vidimus, puerosq;, aut  
 senes, masticare cibos incidendo, cōterendoq;, ac moliendo, quamuis nō adeo periclitē, nec faci-  
 liter, sicut dentati iuuenes faciunt: praeterq; si cibi duriores extiterint. Quorum tamen dentū,  
 praecipueq; anteriorū, alius quoque; vsum homini, seu rectius dixerimus, abusus est etiā propter me-  
 lius, scilicet vt ad distīctā loquelā adiuuet. Quamobrem & definitiō Medicae author ait.  
 [Dentes cibum conterunt, consiciuntq;, & ad vocis articulationē nonnulli faciunt.] Sunt verō  
 & alij duo dentū abusus ( vt postea & videbimus ) tū scilicet ad apprehendendū, retinēdūq;,  
 loco manus, tū ad offendendū, defendēdūq; loco armorū, suntq;: hi duo etiā propter melius.  
 Si quis autē tanquā distīctos hos quatuor dentium vsus annumerare voluerit, facillimē poterit  
 Tuncq; nō quinque, sed octo dēdē venirent ossium vsus. Nos autē faciliors memorae gratiā in  
 vnum omnes dentū vsus reducetes, ad quinque; restrinximus. Quintus igitur vsum est trium ossi-  
 colorum auditus: vt scilicet audiendi aēioni famulentur, hoc modo. Est enim primū os cuiusda  
 mallei formā praefereens, quod transversim tenuissimē illi mēbrae interitis sua cauda, capitulo  
 adnascitur, cohaeretq;, quae quidē auris foramen, amplā propē exteriorem cauitatem claudit, ne  
 exterior aer, siue quiduis aliud intus ingredatur, audiatq;: ledat, defendens, custodiēdūq;: inter-  
 numq; potius, natiuumq; aērem intus vt recludat, sine quo auditus fieri nequit. Verū est tamen,  
 qd exterior aer in quolibet sono percussus ( prout philosophorum omnium decretū est ) secundū  
 gyrum quendā per partē post partē ad aurē peruenit: veluti ex lapidis in aquā iactu gyrum hunc  
 in vndis efficiente ( Galeni etiā documento ) liquet. Ad aurē igitur exterior aer percussus ( vt  
 diximus ) perueniens, membranā praedictā percuit: praedictūq; ossiculū illi adnatū, malleūq;,  
 vocatum agitāt, occulteq; quodammodo mouet, infimūq; aēre aliū intus in aurs antris, caue-  
 nūsq; intus percuit. Alterū namq; a Natura intus aēre intus quiescentē, aliāq; ratione in eisdē  
 antris per petuū mobilē, rectissimē posuit Aristoteles, m. sine quo auditum fieri impossibile est.  
 Adeo vt illi audiendi aēione principiū, quāuis nō rectē, attribuent. Malleus verō ab externo  
 aere, siue sono sic percussus, agitatūq;, ac motus necessariū secundū sibi in extremo capitulo  
 coarticulatū, appressūq;, vinculis colligatū ossiculū cōmouet, percutitq;: quod quia incudē assim-  
 latur, incudē Vēralius nō temerē nomenclat. Fabrum enim ferrariorū malleū super incudē  
 positū, illamq; percutientem figura, & vsū duo haec ossicula quodammodo referunt. Id ipsū  
 igitur secundū ossiculū, quod incudē vocauimus, duo habet crura, ceu radices duas, quā ob causā  
 & molari quoque; denti duob; tantū radicebus sulcū assimilari potest. Quorum crurū alterū,  
 longiori inquā, ac tenuiori coarticulatū est sua apice tertium aliud a nobis repertū ossiculū praedi-  
 ctis duob; longē minus, quod dēste Graecē litere manifestē formā habet, sic. Δ. vnde os deltoideis  
 aliquando nuncupauimus. Quo autē modo id ossiculū primū nobis cognitū fuerit, enarremus.  
 Anno enim a Mūdi redemptione millefimo, quingentesimo, quadragesimo sexto, dum publicē  
 Neapoli theoricā, & practicā ambas medicīnē sic vocatas partes, atq; anatomē quoque; profite-  
 remur, id tertium ossiculū non inuenimus, sed reperimus. Ipsum enim minime querebamus,  
 quia nullā de eo notitiā, neq; suspitionē habebamus. Scalpro autē, malleoq;: aurs ossa percuten-  
 tes, vt internas cauernulas, & in ipsīs cōtētas substatias circūstitūbus scholaribus nostris osten-  
 deremus, Vbi iam duo priora ossicula demonstraueramus, tertium id ossiculū, nescio quomodo  
 in tabulæ plano casu potius inueximus. Quod inspectū, consideratūq;, ac admissū in per-  
 pensū, nō ex accidenti, sed ex Naturae proposito factū esse decreuimus. Vnde autē resiliēt,  
 & quis eius esset vsum adhuc ignorabamus. Statim igitur aliorū animalū, praesertimq; bouū di-  
 uerū capta, quae in macellis nō defuerant, dissecare aggressi sumus, facillimēq; singulas ossis in  
 quo

Quartus of-  
 sium vsum.  
 Dēti vsum  
 quatuor.

k. Cap. 4.  
 com. 1.

Vsum quin-  
 ossium  
 qui audie-  
 ma est.  
 Malleus.

l. 8. de v. p.  
 cap. 6. post  
 med.

m. 1. de ani-  
 ma cap. 8.  
 Contra Ari-  
 stotilem.  
 incus.

Deltoideis.

Ossiculū ter-  
 tij mūdo  
 huius  
 rita.

#  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10.

quo auditus fit, partes obseruado, alteri tandem, longiori scilicet, tenuioriq; incudis erari a nexum, pendensq; id tertium ossiculum inuenimus: Indeq; quamprimum ad humani capitis dissectionem reuerſi, perpetim illud vel clauis oculis inuenimus, cui quidē eueſtigio ſtaphē primum nomen impoſuitus: quia longē maiorem ſimilitudinē hoc ossiculum habet cum ſtapha, seu ſtapede, quam alia duo cum malleo, & incude. Nec me preterit ſtaphē nomen vulgare eſſe, nō latinum. (Nonnulli enim ſtapedem, alij verō ſtapedam Grammaticē potius, quā Latine vocant) ab initio tamen mei philoſophici ſtudij vocabulorum ſuper ſuſtuoſas obſeruaciones floccipedere, ac rerum ſententias, veritatēq; pro viribus emedulare decreui. Aduertendum tamen pro hac ſimilitudinis ratione, quod nō ſereq; noſtri tēporis ſtaphē, in qua equorum ſcillis inſi dētes pedes ſiſtunt, aſſimilauimus, prout nonnulli ſcripſerunt, inuentoris tulum ſibi vendicantes tam rei, quā in nominis. Cūm tamen à quibuſdā noſtris ſcholaribus (vt cōperitiſſimum habemus) & rem, & nomen, atq; vſum, licet imperfectē hunc, didicerint: Sed potius lignēe cuſtam ſtaphē à nobis cōparatum tale ossiculum eſt, quā in Sicilia vtitur, vicerega quiddā pragmatica olim prohibuit ne ſereis vtatur, quoties videlicet mulis, quæ ſtupendio quoddam locari ſolent, ſuperinſedamus. Triangulares enim abſq; vſu interm diſtincto foramine, per quod coriacorum lorum, ſtaphilē à noſtris nuncupatum, tranſmitteretur. Sed per idē amplum foramen, cuiq; ſuperius angulum acutum cauabunos ſines mularum domini traducunt. Quicunq; igitur è noſtris ſiculis auditoribus, qui prædicte nudis, ligneq; ſtaphē formā præcognouerant, nominis impoſitionem admirari quamprimum ſunt, exclamantes interim, nulli rei me potuiſſe aptius, quā illi ſtaphē huiusmodi tertium ossiculum nuper inuētum cōparare. Quanquā & antiquiſſimas veterum ſtapedas ſereas, vel rubigine ſemideroſas vidimus: quā in imminō & in veteranis quibuſdā piētues cuiusmodi etiā formę fuiſſe obſeruauius. At hæc obiter. Ad id verō, quod maioris momenti eſt, ossiculi inquam huius vſum conuertamur, exquisitiſſe interim & aliorum duorum vſus elucidatēs. Itaq; huius tertij ossiculi baſis oblongum quoddā, oualeq; foramen ſibi ſubiectum equaliter, & æquariſitē obturat: cuius quidem claudendi, aperiediq; gratiā factum eſſe id os à Natura verſimile eſt: vt niſi aliquo modo moueatur, in foramen illud ingredi nihil queat: per quod niſi hilominus foramen in effatu dignam quandā cauernā, labyrinthūq; à nonnullis nō temere nuncupatum; ingreſſus ſit, indeq; ad plures alios ſibi inuicem reſpondentes anfractus, ac gyros cochleam radicia chartilagineę auriculę in ſtar ( philoſopho etiā docente ) .x. reſſeſtantes. Primam nanq; cavitatem, in qua tria hæc ossicula cum prædicto ouali foramine cōtinentur, tympanum nonnulli appellent. Nos autem tympani nomine totum inſtrumentum ſuis cum cauernulis omnibus intelligimus. Exterior itaq; aer à ſonante re dura quapiam percuſſus, auris, tympaniq; primā membranam, malleūq; illi adneſcentē, coaleſcentēq; neceſſario percutit, agitātq;, ac mouet: Malleus autem ita cōmotus, agitātq; incudem eodē inſtanti percutit, eodemq; motu agitatur, ac mouet; ſauet autem tali in incidem mallei cōcuſſioni minimus quiddā muſculus (tempore videlicet, quo acſentius, arreſtis iam auribus audire conamur, voluntauq; nō nihil cōcurrit) Incus verō ſic percuſſa, & cōmotā deorsum aliquatenus grauatur, alteri cruri alligatā ſtaphā cōprimens, ſimiliq; modo percutiens, ſtaphāq; demum ſic deorsum cōpreſſa, ſua quidē bali ſub ſe contenturā; à natura; inſitum in labyrintho aerem alium cōprimit, percutitq; qui ſic denſeq; commotus, verberatq; per cauernulas, anfractuſq;, ac gyros ſecundę, ac tertię cavitatis dōcurrens (ad quos auditorius quinti paris neruus terminatur, in membranis qualdam diſſolutus, extenuatq;, illos obliuens) ibiq; tintinnans, quandā velut echo facit, per alā ſeneſtrā in eandem primā cavitatem reſiliens. Adiuuat autem huiusmodi reſonantiā & aliquantula inſitu in primā cavitare aeris percuſſi iam per ouale prædictum foramen violenter factus ingreſſus, dum cōpreſſa ſtapha, anteq; propulſa, nonnihil dehiſcit, coniuētq;, foramen illud. Qui quidem aer eadem ratione ſituetum in ſecunda, ac tertia cavitare reuerberans, eandem facit reſonantē. Quō magis autē talis ſonus, aerisq; repercuſſio procedit, eō tenuior, ſpiritaliorq; ſit, donec debita quiddā menſura, & ordinē talis alteratio, motuſq;, ac agitatio in auditorio neruum, ac ipſam deniq; cerebrū ſubſtantiam imprimatur, audiēdiq; actio cōpleatur. Ipſi enim neruus tanquam principalisq; ſitipſiq; interim totius organi particule (vt par eſt) talis actio, seu paſſio attribueda eſt. Neceſſarius autē ſuit percuſſi aeris per alā ſeneſtrā exitus, & ad primā cavitatem reuerſio. Niſi enim ſic à Natura conſtitutum eſſet, aer ille in ſis in cauernulis, & labyrinthi gyris, ipſiq; vltimo antro cochleam reſſeſtante incluſus, cōdenſatq;, & aſtrictus minimē reſonaret, membranalūq; illis interſipientes, cauernulūq; illitas fortē frangeret. Tympanum verō (vt dixi) nō primū modō autram (vt nonnullis anatomis proceribus nō ineptē interim placet) multoq; minus extumam duntaxat membranam, cui malleum inſeri præſtatum eſt (prout inſuperitē alij quidam ſumperant) ſe dōx tum os, ossiū meo connexum intelligimus auditus organum conſtituens, amplectētiq; à primā ſcilicet membrana prædicta ad extremū vſq; cochleę terminū. Velut enim in bellico, vel quouis artificiali tympano vtrinq; cornu in eſt, anterius in quā, poſteruſq;, quod in ſis vacuū eſt con-

cludens,

Cætera  
Realdj.Ossiculorū  
tū vſus.n. de hiſt.  
anim. cap.  
11. poſt  
prin.  
Tympanū  
quid apud  
nos.Tympanū  
quid ſecun  
dū nos, &  
ſecundū alios.

cludens, circum circa verò à ligneo quodam orbe cōprehenditur: Ita & hic velut anterior corium est prior, exteriorq; prædicta membrana, cui malleus adnascitur, acrisq; percussū primus impetus occurrit: posterius verò, oppositumq; corium est vitæmarum caavernularū terminus, illisq; obliquæ membranulæ, ad quas percussio, sonusq; penetrat, indeq; vltima resonatio velut echo fit. Nensum deniq; illud filum in medio primi antri protensum, inculdūq; & staphæ articulo annexum, ei chordæ respondet, quæ postero ri tympani corio attenditur, sonum (vt patet) marum immoionum adiuvans. Quod quidem filum, siue chordulam huc nō interioris modò acris, sed ossiculorum quoq; motus, percussioq; agitât, ac mouet, sicq; demùm perbellè sonus ibi representatur, neruūq; (vt dictum est) auditorio tanquam sensus cōmunis nuntio imprimitur, eōq; spiritalior, speciosiorq; auditus fit, quò magis intrò ad cerebrum vsq; penetrat. Officula igitur (vt ad principale propositum reuertamur) exteriorq; prædicta membrana, cui malleus adnascitur, ac modò præscriptam iam filum, vsū quemdam prestant: haud inquam, sine quo non. quia sine ipsa auditio fieri potest, prout in zibus peripiciam est, quæ nullam ex prædictis particulis habent. Itaq; propter meliorè, perfectioremq; auditum, præsertimq; in homine (in quo manifestius patent) posita hæc officula, mēbranaq; ac filum sunt. Membranulæ autē, quæ caavernulas illinant, ipsaq; etiā cauernulæ suis cum gyris, buccinosisq; contorsionibus necessariæ sunt, vt sine his (vt in quibus resonato, & echo fit) auditum perfecti impossibile est. Vsum igitur hæc habent, sine quo non. Sed de his hic quærit itatūm pro quomodo ipsorum offium vsū, & ferè ad nascit vsq; dictum iam sit: (cui enim officum huiusmodi auditorium tympanum factum sit, curq; sic anfractuositum, infra ex Galeni dogmate declaratum sumus.) Opere prægium ergo est, vt ad tertium, & quartum offium prædicatum cum Galeno conuertamur: scilicet magnitudinē, & substantiæ propriæ modum. Vt quælibet nam sunt ossa per se, adamussim singula permouerimur. Galenus enim hæc dicit insimul subiunxit, dicens.

TEXTVS QVINTVS.

Sunt autem in his, quædam grandia cavitates magnas medulla plenas habentia, quædam verò parua, solidaq; & sine medulla sunt: nullamq; sensibilem habent cūctatem.

COMMENTVM QVINTVM.

**D**ENES magnitudinem differentia est. Quoniam quædam sunt grãdia, vt ossa femorum, tibiurum, & humeri. Quibus ossa etiã addas, quæ sacri ossis lateribus vtrinq; connectuntur, & quauis tria secundum diuersas partes nomina habeant, illiã tamen ossa vulgò nuncupantur. Quædam verò parua sunt: vt ossa brachialis, dentes, & officula, quæ sefano assimilantur. Adde quod quædam medicioria sunt, vt ossa digitorum, & post-brachialis, ossa pedū, & tarsi, nec non vertebre: & huiusmodi multa. Penes substantiã verò differentia alia est. Quoniam quædam amplecti concava sunt, ac medullosa: vt ossa femoris duo, tibiq; duo; ac fure etiã due: Itemq; humeri duo, cubiti duo, radij, duo, Maxillaq; denum iuxta ipsum interior, cōmento frequenter patebit, textūq; etiã septimo. Hæc enim tredecim ponos solã medullosã. Tredecim inquam, vtriusq; lateris partes cōnumerando: Sex enim vtrinq; sunt, maxillaq; inferior vtriq; parti cōmunis. Alia verò cuncta absq; medulla esse insinuat. Idemq; libro de vsu partium vndecimo cōprehendat, sic scribens. *Ordendum igitur nobis ab eo est, quod cuius dentissimè in omnibus animalibus cōspicitur: quò nullum paruum os medullam habet, quò sinuq; nullum habeat cōmemotabilem, ac magnum: sed caavernulas duntaxat, easq; exiles, atq; angusta. Quandoquidem si præterquã quòd est exiguum, eamq; etiã extenderit, imbecilliam omnino fuisset. Quædam modum si quoduis magnoeam densum fuisset, ac sine sinu, grauissimum foret, ac gestu difficile.* Ecce igitur quomodo Galenus parua omnia ossa medullæ expertia posuit: pauca duntaxat medullosa supponens, quæ grandia sint, & intus concava. Cuius tamen oppositum de potentis naturalibus tertio: idem ostendit, sic testatur derelinquens. [Ossa verò, quò nutriantur, numerosa, quæ intercedat, mutatione indigent. Eūq; qualis carnibus sanguis talis ossibus medulla: scilicet in ijs, quæ parua sunt, sinusq; experta, caavernulis eorum insperata. In magnis verò, & quibus sinus nō desunt, vtriq; in ipsis collecta. Sicut enim in primo monstratum est libro. Quibus simplicis est substantiã, ijs mutant intus se fas est. Quibus inter ipsa est ductum, ea fieri similia, citra omnes, quæ in medio sunt, mutationes, nō possunt.] Ecce igitur quomodo in omnibus ossibus medullam posuit, tam scilicet paruis, quam etiam magnis, quem nutrimentum

mentum illorū esse debeat. Nisi quod magna quidem à paruis differūt, eò quod in magnis ipsi, in amplis concavitatibus acruata, condensataq; ea medulla est: In paruis autem, in proprijs minutis cauernulis, seu spongiositatibus dispersa est. Idemq; pariter eodem vñdecimo de vsu partium libro cōprobat, sic scribens. p. [ Nam in cōmentarijs de facultatibus naturalibus. q. demonstrauimus medullam ossibus propriam esse alimentū, & ossibus cauitate carentibus tale quidam in eorum cauernulis contineri. ] Iam vides ergo non in diuersis modis libris cōtradictionem: sed in eodem quoq; eiusdem libri vñdecimi de vsu partium capite decimo octauo. r. (vt patet): Nos autem hoc pacto, ex ipsius etiā Galeni monumentis, apparentem hanc cōtradictionem perbellè sedabimus. Quoniam scilicet medullę nomen bifariam capitur: videlicet verè, & metaphoricè. Verè inquam medulla est, quę ossium proprium nutrimentū est; & in ossibus omnibus, siue tanquam in pręparatorio, scilicet in ipsorum sinibus (vt in magnis) siue in proprijs cauernulis, & spongiositatibus (vt in paruis) omnino tanquam necessarium eorum nutrimentū continentur: vt ex tertio de potentijs naturalibus. f. & de vsu partium libro vñdecimo. r. patet: iam est. Metaphoricè autem, seu per quandā similitudinem dicitur medulla, de ipso cerebri, ac spinali etiā vocata medulla. Metaphoricè inquam, quoniam cerebrū, & spinalis medulla ita in ossium cauitatibus continentur, sicuti verā medulla: Ideoq; & hæc etiam ambo medullę nomine appellari consueuerunt. Atq; idipsum à Galeno etiā dices, quim sic de spinali loquens, ait. a. [ Accipitur autem non solum medulla ex ossibus, quę sanè reuera. est medulla; sed ex spina: quam & ipsam medullam nominat; spinalem videlicet, quę tū durior, tū ficior est, quam alia. ] Clarissq; alibi ab ipso quoq; scriptum inuenies, hoc modo. r. [ Spinalis medulla eiusdem quidē cū cerebro est generis: eam tamen perperam medullā appellarunt: cū medulla ipsa non modò spinali hac, verum etiam cerebro ipso sit humidior, ac mollior, & pinguior. Quòd verò in spine ossibus continetur, coloremq; habeat medullę assimilem, ob id ipsam medullā nominant. Quò hominē quidā ipsam quoq; cerebrū vocarunt. ] Propter etiā & libero etiā de vsu partium octauo. y. Platonem taxatè videtur quod cerebrū illi vocarūt medullam, credens quidem cerebrū substantiā reuera medullam esse: precipitq; Galenus, etiam si cerebrū medulla esset (generatum scilicet capiēdo medullam) cum additioe tamen nuncupandam: videlicet medullam encephalicā, hoc est, capitalem, seu cerebralem, vel medullam encephalū. q. d. medullam cerebrī, seu in capite. Quemadmodum & spine medullam non simpliciter medullam, sed spinalem medullam dicere debemus. Hoc igitur stante duplici medullę nomine vsu scilicet verè, & metaphoricè: hanc ponimus conclusionem. Quod omnia ossa nutrantur vera medulla, tantū scilicet magna ossa, quam parua: sicq; accipit medullę nomen Galenus, quādo in tertio de potentijs naturalibus. r. & vñdecimo de vsu partium. a. dicebat medullam propriā esse omnium ossium nutrimentū: Quoniam verò cerebrū, & spinalis medulla ossa, à quibus continentur, minimè nutriunt. Idcirco nō verè, sed metaphoricè (vt prædictum est) medullę nominari meriti sunt, vel secundū quid, cū additamēto: Verum tñ numero propriè dicta, veraq; medulla iterum dupliciter accipi solet, largè scilicet, & strictè. Igitur si largius verè medullę nomen capiamus, omnia (vt dictū est) ossa tam magna, quam parua nutriuntur medullis: sicq; omnia sunt medullofa. Sin verò strictius medullę nomen accipimus: tunc dicemus, quòd sola ea ossa, quę ampliam cauitatem habent, dicuntur medullofa. Ad eò vt medullam verā strictè intelligamus, nō omnem veram etiā medullam, sed eam duntaxat, quę in vnum collecta, & quasi coagulata, & omnibus euident est, & alonge apparet: perinde ac etiā dicere vulgè solemus. Ea inquam ossa medullam habere preferentes: in quibus eam vnitam, condensatam, & in ampla cauitate quasi congelatam conspiciamus. Qua quidem ad condendas epulas vtuntur: quasi credentes iterum, præter cauitates, in ipsa ossium substantia, vel spongiosis cauernis medullam nō adesse: Idcirco aliam, quę in paruis ossibus per eorum cauernulas insepertur, non medullam: sed humorem potius album nominare in tertio in Galeno placuit, sic scribenti. b. [ Quo dura, sicq; sunt, in ijs cernere spatia licet, sicuti ossium cauernulas: continent hæc naturaliter multum in se hæ humoris, huiusq; crassi, & albi in id comparat; vt ossa nutriat. ] Impresertim ergo præsertim quia cū tyronibus loquebatur Galenus, vulgarem sermonē magis obseruanti bus) strictè medullę nomen vsurpans, grandia tantum, & ampliter concaua; medullofa esse determinat. Sed enim uero quod maioris est momenti cōsideremus. Et enī in Galenus tredecim tantummodò prænarata ossa concaua, & medullofa posuit: plura verò præter hæc essatu dignę magnitudinis ossa manifestam cauitatē, & amplius; sinū habere inuenimus: Vt quartū vtrinq; superioris maxillę os, & temporū quoq; processus mamillares: ipsiq; auditorij meatus sunt. Itemq; octauo ossis apertæ. Sepenūmerò autem & frontis etiā, ac sphenoidis, hoc est, euñcisiformis (vt videmus) ossa præter quę, dentes quoq; manifestos in se sinus, cauitatesq; habent: capitisq; os octauū. Quamquam hæc nō medullofa existunt; sed ob alio quidē sepos concaua, sinuosaq; facta fuerūt. De quibus sigillatim proprijs capitibus sermonē habebimus: generalitatem verò paulò posteriore in præsentī etiā cōsistito. Plurima etiā parua sunt ossa, quę manifestā

p. Cap. 18. 22  
post med. 22  
q. Cap. 15. 22  
r. Post prin. 22  
& post me. 22  
Contra di. 22  
dionis so. 22  
lutio. 22  
Medulle 22  
nomen du. 22  
pliciter. 22  
f. Cap. 15. 22  
i. Cap. 17. 22  
post prin. 22  
u. r. sim. 22  
pliciu. c. 4. 22

z. y. de ali. 22  
m. facul. 22  
cap. 19. 22  
y. Cap. 4. 22  
post prin. 22

Conclusio. 22  
z. Cap. 17. 22  
a. Cap. 18. 22  
& lib. 1. c. 22  
16. in fine. 22

Medulla 22  
verè dicta 22  
dupliciter. 22

con. 22  
22  
22

b. Lib. de 22  
loqu. in 22  
temp. c. 1. 22

Contra Ga. 22  
l. 22  
Gla. alia 22  
concaua. 22  
\* Cap. 1. 22  
com. 3. & c. 22  
3. com. 2. & 22  
6. com. 3. 22  
Ossa alia 22  
medullofa. 22



cauitatem habent, medullâ; interea repletâ. Adcò vt verò medullofa dici queant: vt pedij ossa, postbrachialiq; , & ipsorum quoq; digitoru omnium tam pedis, quam manus ossa: quamuis Galenus de digitis loquens, .c. ipsorum ossa, minus rectè, solida esse expressè determinauerit. Sunt igitur, cum predictis à Galeno, cauitatem manifestè habentia ossa numero octoginta nouem: quæ scilicet medullofa etiâ dici queunt. Cum septem autem iam iam à nobis predictis, quæ sine medulla cauitatem tamen ampliâ habent, erunt omnia non agintafex. Non rectè igitur Galenus, vel cõcaua, vel medullofa ossa numerauit. Dentibus autè foramen inesse prius dicemus, in medullæ penitus expertem cauitatem, siue finem penetrans. Quod foramen in radice illorum existit, vsq; ad solidam, durissimamq; extra gingiuas propè existentem substantiâ, vnâ cù sinu pertransiens: Vt per ipsum venæ, artenq; , & nerui, pro dentu nutritione, ac sensu ingreditur, tunicaq; , sensu oportuna in sinu ex neruis deniq; , gignatur, cum dentibus igitur, auditorijsq; duobus tympanis, crunt sinuofa omnia ossa centu viginti & octo. Operè præmium verò esse diximus rationem emedullare, cum cõcaua, & medullofa ossa à Galeno predicta existunt. Itaq; sciendum omninò est, quadruplicem, ac diuersam diuersis ossibus, cõcauitatis rationem inesse: Quartu prima est, quæ in predictis non modò cõcauis, sed medullosis etiam ossibus valet. Quomam scilicet duo sunt Naturæ primi scopi, in animaliu generatione: videlicet motus, & difficilis passio. Motus inquit; derat: Ideoq; & instrumenta ad talem inotum idonea, præsertim in homine, fabricare conata est. Verum si vnus hic tantu scopus esset, scilicet motus, leuissima membra omnia fecisset, gracilliq; : Sed quoniam tunc facillè frangibilia fuissent, facillèmq; , haberent passionem, Idcirco alter succedat scopus: qui est difficilis passio, Græcè distaphia [ Cõmodiorè porrò (inquit Galenus.d.) in animalibus est motus, vt qui etiam ex ipsorū est substantia, siue essentia. Non enim quatenus est animal, ab iniurijs omninò est tutum, sed ex seipso mouetur. ] q. d. Motus intentio, scopusque prior, & principalior est: quia de essentia animalis est, quatenus animal. Difficilis autè passio intentio, secunda, posteriorq; , est, nec de essentia ipsius animalis: sed pro eius duratione, cõseruationeq; . Quamobrem propter motus promptitudinè, facilitatèmq; , ossa leuiora facere volens Natura, intus cõcaua, & sinuofa ea genuerit. Magis autem, minusve cõcaua in diuersis animalibus, secundum quòd eorū musculi ossa mouentes, attolentesq; , robustiores, aut imbecilliores fieri necessum fuit. Quæ tamen cauitas moderata intantum esse debet, vt internu distaphia cõseruetur. Si enim solam distaphiâ intendisset Natura: proculdubio solidissima, & calybe duriora ossa fecisset. Verum tunc ob grauitatem difficillimus, ac tardissimus motus fieret. Posita verò in ossibus cauitate, ob predictam leuitatem abutitur, hoc est, ex superabundantiâ deinceps Natura ad alium vsu: vt scilicet veluti quoddâ promptuariu esset verè, proprièq; , medullæ, quæ ossium nutrimentum esse debebat. Fortèq; , ad humectandum ossa ipsa, reposita ibi est, ne in vehementibus motibus nimium exsiccerent. Adcò vt ipsius etiâ medullæ in ampla cauitate congregatè vnus duplex sit, primus inquam ad nutriendu, secundus verò ad humectandū ossa. Verum ennuceor in Galeni reuerentiâ, maximâ, nos cõiuncta authoritas, medullâ determinatū à Natura ossium nutrimentu esse, (nisi necessitatis tempore) haud facillè concipimus. Si enim (vt idem ait) non est transitus de extremo ad extremu, nisi per medium. Medulla quidem hæc frigidior, sicciorq; , esse deberet, sanguineq; , ipso terrestrior. Cuius tamen oppositum apertissimè conspicimus, clam ea calidior, teruioiq; , & ad flammâ obnoxia magis sit, pinguiorq; : præterea si ossium nutrimentu est, sequeretur, q. aquilaru, leonumq; , ossa solidissima, ipsiq; , venus dentes, ac reliqua huiusmodi; vt soliditatè maximâ, penes ipsum quoq; , Galcnu habentia, vel carunculis, sanguineq; , crasso, nò medulla plena, vt fincipitis ossa, penes Hippocrate existunt, nutrimento careret. Dicerem ergo, potius ex Auerrhois, .c. nedum Aristotelis. f. dogmate nutrimenti ossu excrementum esse, quod pingue, ac tenue, calidumq; , est, & inceptu, vt in terra ossium substantiâ conuertatur: ideoq; , nò in quanto, sed in quali verum excrementum intelligimus. Quod interim excrementu in calidioribus animalibus, vt leone, ac aquila, & his quorum ossa solidiora esse oportebat, (supposito cum Galeno, ad quem loquimur, huiusmodi animalia cauitatis expertia ossa habere: cò tamen oppositum nonnulli reuocantes \* obseruaent) per halitum insensibile digeritur. In alijs verò, quoru interna cauitas necessaria fuerat, abutitur Natura ea cauitate, vt tale excrementu cõtineat. Quo deinceps præcipuè ad humectandū in vehementioribus motibus rursus Natura cadem abutitur, ne fragilia, spongiosaq; , eadè ossa superflue infirmantur, desiccentur. Hicq; , verior ipsius medullæ vsus est. Sed hæc vnicuiq; , iudicandj integrū sit. Prima igitur cauitatis ratio fuit propter motus agilitatè, medullæq; , deinceps cõprehensionem. Secunda autè cauitatis ratio etiâ sine medulla est, vel vt aerem cõtineat, amplectaturq; , (siue propter auditum, vocisq; , propriè resonantiâ quandâ: propter auditu quidè, vt que in ossibus tē porū, ac tympano præsertim existunt: propter resonantiâ verò propriè vocis, vt de cauitatib⁹ frontis, quartiq; , ossis maxillæ superioris, atq; , etiâ sphenoidis posterius ostendemus. \* Vel propter sensum tactus, ad membrânè inquam sentientis

35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

\* Ibidē, &  
c. 4. com. 5.  
\* Cap. 7.  
com. 3.

b. Supra  
com. 1.

Ossium fi-  
gura.  
Distributio  
prima.

\* Com. p. 2.  
com. 1.

Ossium nu-  
merus.  
i. Cap. 6.  
post med.  
k. Cap. 9.  
ante med.  
Os cordis.  
\* y. 7. anat.  
adm. c. 10.  
& ib. 6. de  
v. p. c. 10.  
Lin. sine hu-  
jus libelli.  
m. lib. de  
distrib. ma-  
cul. c. 17.  
& ib. 7. de  
v. p. c. 19.

\* In fine  
hujus li-  
bri.

Conclusio  
p. 10.  
Ossa 301.

b. com. 4.

extensionem, vt in dentib<sup>9</sup> demonstrabimus, vt demum, vt excrementa in se aliquomodo reci-  
piat, vt de octauis ossis capitibus antris postea declarabimus. Verum de his alijs vberius. Nunc ve-  
rò nostrū proficquamur proposito, caq; suppleamus, quæ quidē à Galeno prætermiſſa in præſenti  
libro fuerunt. Quatuor etenim duntaxat ossiū prædicata declarauit Galenus: videlicet primò tem-  
peramentum, secundò vsum, tertio magnitudinē, quartoq; demum ipsorum propriā substantiā.  
Nos igitur alia quatuor in præcedentib<sup>9</sup>, b. ex ipsiſus etiā monumentis à nobis propoſita ostenda-  
mus, ordine sic post illa numerando, videlicet: quinto formā, siue figurā: sexto numerum: septi-  
mò foraminā: octauoq; tandē ipsoriū sensum. Hæc igitur omnia prænouisse oportet: prius quidē  
generaliter, deinceps verò in proprijs capitibus speciatim. Vt qualia nam sint ossa singula, intel-  
lexerimus. Ideo autem in præſenti cōmento quatuor illa suppleere volumus, quoniā immediātē  
post hunc textū ad ossium cōpositionē, connexionē, sermōnē suū diuertet, ossiū (vt videbimus  
suis cū appendicibus structūrā tangens. Inprimis itaq; formā, figuramque ipsoriū ossiū generatim  
perpendamus. Quædam enim ipsoriū ampla sunt. Vt quæ fieri ossis laterib<sup>9</sup> annexa sunt: Itaq;  
scapule, ossa frontis, occipitiq; & etiā verticis: Alia angusta, gracilia, & longa, vt fibula, radius,  
vlna, & costæ: Alia demū oblonga quidē, & quadantenus angusta, non adēo tamen gracilia sicut  
prædicata, vt humerus, femur, & tibia. Præterea aliqua sunt quadrata, vt verticis ossa, quædā tri-  
angularia, vt scapule, quædā rotunda, vt patella. Insuper quædā sunt aspera, vt ossa petrosi: Quædā  
lenia, vt ossa frontis, pectoris, & costarū. Demum ossa quædā sunt, quæ varijs rebus assimilata, ex  
illis nomenclaturā obtinuerūt: vt sphenoides, id est, cuneiforme; quia assimilatur cuneo: Yoides,  
siue ypsiloides, quoniā simile est Græcæ literæ ypsilo. Sic zigoma q. d. iugale, quia assimilatur  
iugo, pariter & malleus, incusq;, ac stapha, paulò prius dicta ossicula, & alia quoq; plurima, quæ  
figillatim proprijs capitib<sup>9</sup> enucleantur. Nunc verò breuitatis gratiā duntaxat præſertim  
quia difficiliter vel intelligi, vel memoriæ mandari queunt, nisi præhabita singulatum, ac per se  
cunctori ossiū notitia. Itaq; ad festū pertrāsire tēpeſsum est scilicet ossiū humani corporis nu-  
merū: quem variam, ac diuersam Galenus ponit in diuersis locis. Etenim libello de formatione  
septus .i. ait ossa ducta esse, & amplius. Nonō autē de decretis Hippocratis, & Platonis. k. inquit,  
plura esse, quæ tercentū. In præſenti verò de ossib<sup>9</sup> libello duntaxat ducenta quadraginta duo de-  
clarat: præter ossicula duo, alterū cordis (quod ipse \* in homine si nō exquiritē os, proportiona-  
lem tamen substantiā quandā durā, chartilagineamq; ponebat, quicquid in homine non quā, sed  
in elephante potius à suo quodā familiari extractū, aut antiquo sortatis equo, vel boue in terdum  
vidisset.) Alterū verò nasi (scilicet cribrosū illud os intrinsecum, quod nos octauum capitū os  
nuncupabimus:) præter os quoq; gutturis (vt ait) .i. quod proprio nomīne yoides, ypsioides, &  
lambdoides ab eorū literarū similitudine, scilicet v. & .λ. quū subuertitur nominare anatomi-  
ci cōsueuerunt: prout ex cuiusdē Galeni monumentis .m. etiā didicimus. Herophilus παραίτης,  
intellige ὀστέον appellabat, quoniā scilicet lingua, ac pharyngi, hoc est gutturi, & faucibus assi-  
lit. Vnde οσφυγγίτης etiā dici solet. Quod quidem os vnicū, simplex nō est, sed ex pluribus  
cōstructū, magna quidē ex parte ex vndecim ossiculis in quæta prouectiorib<sup>9</sup> vris, nonnunquam  
verò ex tredecim, aliquando ex nouem, aut septem, vel etiā pauciorib<sup>9</sup>, præſertimq; in puens, ac  
maximē semellis cōstans. In quib<sup>9</sup> quidē puens, prouectiorq; etiā, quā masculorū quæte, semel-  
lis tria vere ossa perceptū (interiora scilicet) inueniuntur. Sunt ergo, quæ omniū vnā cū prædi-  
ctis duob<sup>9</sup> (scilicet cordis, & nasi) ossiculis, vt plurimū ossa trecenta. Quib<sup>9</sup> adde sesamūsimilia  
ossa in manibus, & pedib<sup>9</sup>, vt plurimū quadraginta & octo. Sunt igitur cuncta hæc sexaginta &  
vnū. Hæc in quā sunt, quorū definitiones prætermiſſe Galeno in præſenti opusculo placuit: tan-  
quā (vt dicit \*) tyronib<sup>9</sup> ipsiſus ad quos scribebat, minimē reputans necessariā. Quæ tamen si præ-  
dictas ab eo declaratis ducentis quadraginta duob<sup>9</sup> ossib<sup>9</sup> adiungantur: erunt omnia (si bene com-  
putaueris) tercentū supra tria. Nos autē prædictū Galeni numerū, & in quib<sup>9</sup> à veritate ipsiſum  
declinare censuimus, sigillatim proprijs in capitibus annotabimus. Impreſentiarū verò has sex  
ponimus in homine cōclusiones. Quarum prima est: ossa corporis humani, tametī diuersitates  
patiuntur innumeras, iuxta mensuram, necdum annorum diuersitates (quatenus in quā magis, mi-  
nusq; coagulata, & in vnū plura iam reducta sint) nihilominus tamen, si quidem grandior natū  
sit, cōpletusq; ac periectus iuuenis, ad summū sunt trecenta & quinque. Præter appendices in quā,  
quæ in huiusmodi corpore maxima ex parte suis cū principalib<sup>9</sup> ossibus cōiunxisse apparent: eorū,  
magis, quò maior natū homo fit. Secunda cōclusio est. Ossa puberum ante propriē dictā adole-  
ſcentiā, ad summū sunt trecenta & vnū. Tertia cōclusio succedat talis, ossa infantium, nuperq;  
natorum sunt numero ducenta septuaginta tria. Sed alia ratione sunt eorundē ossa trecenta qua-  
draginta quinque. Et hæc quarta fit conclusio. Atq; hæc omnia, præter appendices à suis ossibus  
distinguitas, intelligantur. Alius enim, longeq; maior numerus est, distinctus, ac per se cōsideratus  
appendicibus: tanquā scilicet alijs ossib<sup>9</sup> perpendis. De quib<sup>9</sup> tamen postea loquemur. Quinta  
verò conclusio est hæc. Exquiritus infantū ossa perlibrando, erunt duntaxat numero ducenta

quinquaginta nouem. Sexta demum cōclufio est, quod alia ratione perpenſa infantium ossa plura non erunt, quā centū nonaginta duo. Sed prædictas sex cōclufiones, pro exquisita ossū elucida-  
 tione, declaremus. Distinguenſo scilicet corpus offeum, sceleratone vniuersum in quatuor par-  
 tes, hoc est, caput, dorſum siue spinā, aut si manus dicere truncū, brachia, & crura. Sic enim cun-  
 cta facilius intelligemus, memoriæq; mandabimus. Caput autē accipimus hic totū cum maxilla  
 superiore, & inferiore, ac ipſo etiā ossē hyoide. Hęc enim omnia eōprehendit, qui caput alicuius  
 siue hominis, siue alterius cuiuscūq; animalis incidere solet. In hoc igitur toto, septuaginta ossa  
 sunt: videlicet octo capitis propria, quę cerebrū cōtingunt: Maxillę verō superioris duodecim:  
 Inferioris nō duo, sed in grandæſulis vnum: Auditorij organi sex. Ergo sunt prædicta viginti  
 septem. Adde his & dentes triginta duos: sicq; erunt quinquaginta nouē. Quibus deniq; adiung-  
 gas vndecim ossis vocati hyoidis officula (quemadmodū sepius esse solet.) Erunt igitur omnia  
 simul primę partis ossa, vt diximus, septuaginta. Quod si maxillę superiores totū os vtrinq; vnū  
 cum ipſo goide posuens, interim verō aliud vomens eultro perfimile addidens. Primę partis ossa  
 omnia numero sexaginta nouē dices. Secunda pars, quę est dorſum siue truncus, habet ossa sexa-  
 ginta septē. (Capinus enim largē dorſum hęc, facilius memorię gratiā, vt præter vertebra om-  
 nes, & os sacrū, coccygēq; coitas, scapulas, iugula, sternon, siue pectus, & ipsa etiā ossa, quę sa-  
 cro cōmittuntur, cōprehendat.) Sunt igitur vertebrae viginti quatuor: sacri ossis ossa quidē seti  
 coccygis verō quatuor: quę omnia huciq; sunt triginta quatuor. Itē sunt costę viginti quatuor;  
 quę addita prædictis, perueniunt ad quinquaginta octo. Quib; adde scapulas duas, ac iugula duo,  
 nec nō tria pectoris ossa, prout etate media vt plurimum inuenimus (quanquā antea ex plurib;  
 tandemq; ex pauciorib; ossibus cōstare sternon, pectus iue ipsū obseruamus.) Demumq; duo  
 illa ossa cōiungas, quę sacro, amplo nuncupato cōnectuntur. Igitur omnia secundę partis ossa  
 sunt ad summū sexaginta septē. Quod si vel os sacrū ex quinq;, vel coccyx ex tribus cōstet (velut  
 sepe numero contigisse vidimus) tunc duntaxat sexaginta sex erunt. Cum præcipue, vbi sex sacri  
 ossis sunt, coccygis tria inueniantur: vbi verō illa quinq;, hæc quidē quatuor incedant. Adde vt  
 simul iuncta maxima ex parte nouē, nō decē sint. Nos autē hic ad maximum numerum, (vt con-  
 tingit) attendentes, decē numerauimus, ac sup posuimus: sacri videlicet ossis sex, coccygis verō  
 quatuor proponentes. Tertia pars scilicet brachia, ossa cōtinē octoginta quatuor. At pro clariorē  
 doctrina prius alterū brachiū cōsideremus, quia eodē numero & alterum donatur. Est ergo hu-  
 meri os vnum, cubiti vnū, Radij quoq; vnum, quę sunt tria. Brachialis, seu carpi sunt ossa octo:  
 Metacarpi verō, seu postbrachialis quatuor: omnia igitur huciq; numerata sunt quindecim.  
 Alia verō quindecim sunt digitorum ossa. Ideoq; erunt si simul omnia triginta. In qualibet autem  
 manu sunt ferramina officula, vt plurimum duodecim, quemadmodum proprio loco demonstrabi-  
 mus: quamuis aliquādō plura, vel pauciora inueniri soleant. Sunt ergo cū prædictis quadraginta  
 duo. Totidē verō cū sint in altero brachio: Reliquū est, vt omnia tertię partis ossa sint octoginta  
 quatuor. Quarta demum pars, quę est crurum, ossa similit̄ habet octoginta quatuor: videlicet  
 femoris vnum (eodē namq; modo, sicut in brachijs obseruauimus, alterum crus prius perpenda-  
 mus (tibię quoq; vnum, surę seu fibulę vnū, vnaq; patella, & sic sunt quatuor; præterea tali vnū,  
 calcanei vnum, scaphoidis, seu nauicularis vnum: sic ergo sunt septē. Quibus adde ossa tarsi qua-  
 tuor, ac pedis quinque: sunt igitur huciq; sexdecim. Adiungas autē his ossa digitorum pedis qua-  
 tuordecim (superatur enim pes à manu quò ad digitos vnico ossē, quia pollex pedis duo tantum,  
 nō sicuti manus pollex, tria ossa habet) Sic igitur erunt omnia numero triginta. Præterea sunt in  
 altero quouis pede sciamoidca officula vt plurimum duodecim. Itaq; omnia in altero crure qua-  
 draginta duo erunt. Quib; adde alia quadraginta duo alterius pedis, siue cruris. Ecce igitur quo-  
 modo sunt omnia similit̄ manibus octoginta quatuor. Colligamus igitur nunc, cōiungamusq;  
 omnia prædicta ossa: scilicet primę partis septuaginta, secundę partis sexaginta septē, tertię verō  
 partis octoginta quatuor, & quartę demum partis alia octoginta quatuor. Erūt omnia (si fallor)  
 trecenta, & quinque. Atq; hæc pro prima cōclufione. Puberes verō, quoniam eis maxima ex parte  
 quę nuni desunt, idcoq; dentes insunt viginti, & octo tantum: alij omnib; ossib; inстар inuenimus  
 cōputatis, ossa habere dicuntur trecenta, & vnum. Hęcq; pro secunda cōclufione. Diuersificari  
 tamen hic numerus potest, prout aliqua ossa nōdum coaluerant, vt sterni ossib; cōtingere solet,  
 quę vel quatuor, aut quinque adhuc tria, plurāq; etiā, vel pauciora. Infantium verō, qui dentes  
 nōdum genuerunt, deficientib; quidē à prædicto cōputo cunctis numero duob; su pra triginta  
 dentibus, ossa remanent ducenta, septuaginta tria. Idemq; decrepitis accidere eōsuevit, quibus  
 scilicet dentes omnes ceciderunt. Plura verō, aut pauciora ossa vtrinq; habebunt, secundum quod  
 plures, vel pauciores dentes eis ceciderint, vel nōdum orti sint. Quamuis enim intus infantibus  
 dentes omnes tam primi, quam secundi orturi, id insunt. Quia tamen molles adhuc sunt, idco  
 inter ossa minimē numerantur. Talis inquā infantium ossū numerus esse apparet, quatenus à natu  
 gradiorib; dentū additione superantur. Hęcq; pro tertiet cōclufionis elucidatione præstentā

Seculi par  
tes qua-  
rue.  
Primo cō-  
clufionis  
probatio.  
Prima pars  
Caput.  
Ossa 70.

Secunda  
pars Dor-  
sum.  
Ossa 67.

Tertia pars  
Brachia.  
Ossa 84.

Quarta  
pars crura.  
Ossa 84.

totūq; 312

Secundę cō-  
clufionis  
declaratōe.  
Tertiet cō-  
clufionis  
diuatiō.

\* Vide infra  
C. 4. cōcl. 1.

Quare cō-  
clusionis  
operatio.

sint. Nihilominus tamen pro quartæ cōclusionis apertione dicendū; quòd alia ratione grandiorum numerum infantes excellunt, superantq̃. Et enim infantū vertebre omnes præter secundā, distinguuntur in tria ossa, per synchondrosim cōiuncta, in lateribus inquam; parteq; posteriore. Secundam verò vertebra in quatuor, prima ætate ob distantum tunc tēporis eius dentē, præter supradictas diuisiones distinguemus. Si ergo vertebra illas viginti tres (præter primā) singulas in tria ossa distinxerimus, erunt earum ossificia sexaginta nouē. Nos autē numerauimus pro viginti & tribus. Remotis ergo trib' & viginti iā enumeratis, remanent vt nunc addantur alia ossa quæ draginta sex. Rursus quia secunda vertebra in quatuor ossa distinguebatur, idē si vnici os eius in nato grandiorib' numerauimus, nunc in ipsi' infantib' alia tria addenda sunt: sciq; erunt huiusq; infantium ossium numero addenda alia quadraginta nouē. Præterea quia illorū ossa ampla, quæ sacro annectuntur, singula in tria distinguebantur, videlicet in superiorē ampli' de latē, quæ dicitur, os ilium; & anteriorē dictā, os pubis in posteriorēmq; siue exteriorē, quæ dicitur os coxendicis. Idē si ea tanquam duo scilicet dextrū, & sinistrum in iuuenib' numerabamus nunc in infantib' tanquā sex scilicet tria vtrinq; numerādo proponimus. Præter cōpotum ergo factum, in huiusmodi ossib' alia quatuor iam iam dicta addenda veniunt: vt sint cum prædictis, quinquaginta tria. Rursus quia pectoris os in infantib' ipsi' in octo ossa distingui solet. Nos autem tria duntaxat eius ossa in grandiorib' numerauimus: Igitur & alia quinque hic addenda sunt. Ad eò vt tantē remaneant ossa adiungenda quinquaginta & octo. Præterea infantium mentum in duo diuiditur, similiterq; os frontis: Alia igitur duo addantur, & sexaginta sint. Sed demū adde q̃ infantium os sacrum, veluti superioris etiā vertebre, in tria distinguitur: igitur sex eius prædicta ossa in decē & octo diuiditur. Ad addenda igitur prædicta sunt alia duodecim: sciq; erunt omnia infantilis addenda septuaginta duo; quæ prædictis ducentis septuaginta trib' in tertia cōclusionē declaratis addita, in numerum peruenient ossium trecentorū quadraginta quinque; (quæ autē addita sunt infantibus, primæ partis sceleti, duo tantum sunt, reliqua vero septuaginta secundæ partis existunt;) sed hæc pro quarta cōclusionē. Ad quintā ergo procedamus, quæ statim patet, si iam iam prænarato infantū ossium numero ea remouerimus interim, quæ nondum vera ossa in ipsi' reddita sunt: sed cartilagine. Vt sunt coxeporum, brachialiumue ossa sexdecim, tarsorum octo, coccygis quatuor, scissimoidæq; quadraginta & octo; itē patella, & hyoidis demum octo, præter prima tria semper ossa existentia. (Quæ omnia sunt numero octoginta sex.) Demptis igitur his ab illis trecentis & quadraginta quinque, in præcedenti cōclusionē declaratis, quæ remanent erunt ducenta & quinquaginta nouem. Ossa tamen hæc, cartilagine verius dictēda, paulò ante nuncupabamus, quatenus in ossa cōuertenda sunt, & per hæc à Natura ordinata sunt, quamuis verè nondum ossa sint, quia nondum ad ossis exquisitā duritiē peruenierunt. Sextam verò deniq; conclusionē cōnuectimus, dicentes, q̃ si ossa in quarta cōclusionē prædicta infantium, vt in diuisa capiuntur, scilicet vertebre, os sacrum, ossa sacro annexa, Mentisq; & frontis. Quorum diuisionis ratione sexaginta septē ibi addebantur (omissis interim sterni ossib' octo; vt stabat, tanquam ex propria natura diuisis) remoueanturq; prædicta quintæ cōclusionis octoginta sex, tanquam non adhuc ossa dicenda, sed cartilagine: Remanebunt omnia infantium ossa duntaxat centum sexaginta duo. Octo inquam sterni ossa ex propria natura diuisa sunt: quia septē eorum costis septē; quibus coarticulantur, respondent; octauū autē ipsi mucronate cartilagini: Quæ tamen demum paulatim, indurita intermedia cartilagine coalescunt. Ad eò vt sæpè non tria, sed duo, vel vnū ex octo prædictis fiant. Hæc autē de sex cōclusionibus satis dicta sunt. Quòd si tamen rursus ossa à suis appendicibus distinxerimus, in longē maiorem numerū deuient. Sunt enim appendices infantium ossibus adnascentes numero (exceptis etiā dentibus) trecentū & triginta, & vna cum viginti & octo verò dentib' essent in nato grandiorib' trecenta quinquaginta nouē (prout in sermone de appendicib' ostendemus). Idcirco infantium ossa dicere possumus absq; dentibus esse sexcenta septuaginta sex, videlicet ossa, ossiumue partes trecentum quadraginta quinq; (iuxta quartā prædictā cōclusionē) & appendices trecentas, & triginta, & vnā. Sed de ossium numero in præsentiarū satis, superq; dictū iam sit. Infra verò postquā de appendicibus, earumq; numero locuti fuerimus, nonnihil, quòd ad propostū conducet, elucidabimus. Id duntaxat pro sexta cōclusionē hic addentes, q̃ prima sceleti pars ossa habet triginta: secunda verò sexaginta & octo; Tertia autē quadraginta quatuor; Quartaq; demum ossa habebit in his infantibus cōpleta quinquaginta. Tem pestiuū ergo est, vt ossium forami na generatim perpendamus: præter ea uenulas enim spongiarū instar factas, seu cavitates, sinusue intrinsecos; Quædam etiā ossa foraminibus exterius apparentib' peruisa sunt. Horumq; nonnulla foramen ampliū habent: vt occipitū os, & vertebra, atq; ipsum quoc; os sacru; quò dorsali medullæ viam præbent. Nonnulla verò paruis quibusdā foraminib' dotata sunt; vel propter venarū, siue arteriarum, aut neruorum, siue duorū, siue omnū transitum: velut pleriq; capitis, maxillariq; ossa existunt: vel propter odoris, aerisq; intro, aut excrementorum aliquorum cœrēdi foras transitū; vt octauū capitis os est, quod

Quare cō-  
clusionis  
cōprobatio.

Sexue cō-  
clusionis  
probatio.

Appendices  
33.

o. cert. se-  
quenti.  
Infantium  
ossa 674.

p. comenti  
sequenti.  
Ossium Fo-  
ramina.

cribrosum ideo nuncupatur, quia inflat cribri multa foramina ad prædictos vñs ( Galeno docente .q.) obtinuit. Alia verò sunt ossa: quæ quidè exterius, & in superficie nullù sensibile foramen habent: vt carpi ossa, & digitorù, atq; ipsi etiã dentes. Quamquã nonnulli iniuste Vesaliũ inceptum in dentibus foramina negantè, illa interiora pendentes, quæ ad venarũ, arteriarũ, ac nervorũ quoq; tràsitum, receptionemq; ordinata sunt: Minime interim aduecentes Vesaliũ de foraminibus in exteriori superficie existentib⁹, apparentib⁹q; nõ de intrinsicis, abditib⁹, locutum. Ex quo & paulò ante dèctum sinus nominasse potius, quã foramina fibi placuit quamuis è foraminib⁹ in sinum transitus fiat. Sed hoc minimi quidè momenti est. Nõnulla demum sunt ossa, quæ tametì foraminulis quibusdam perforata sint: Ea tamen intrò minimè penetrant. Sed pro exteriori ossium nutritione facta sunt: vt scilicet per ea venæ, & arteriæ nõ in profundũ, sed circiter dures, densiores, ossium partes diffundatur: vt in calcei ossè, ac tali: Itemq; in grandioribus vertebri, & osse sacro, alijq; nonnullis patet. De quib⁹ omnib⁹ vberius in particulari cuiuslibet sermone, proprijs in quã capitib⁹ loquemur. Reliquò verò est, vt ossium sensum perhibeamus. Circa quem profectò pauca indigemus: cum decretũ omnino nõ, ex cõmuni omnium exquisitorum doctõrumq; tũ Philosophorũ, tũ Medicorũ sententiã, sit, nullum os sentire, præter dentes. Id quod quotidianum experientium cõprobat: velut tamen operæpretium fuit dèctis sentire, ac per hoc nervos ad eos peruenire, vt alimentorum differentes qualitates agnoscerent: Ita in eõdem, ac molestem Naturæ fuisse, alia ossa sentire: præsertim si opercula, & propugnacula nobiliorũ partium, vel sustentamenta omnium aliarum particularũ siue articulationũ firmamenta sint. Etenim nõ in magnis modò, sed in minimis quoq; motibus, ac laborib⁹ homo dolorè, tristitem sensu sentit pateretur, siq; in *dentibus*, hoc est, sempiternã passionè (vt alibi quoq; diximus \*) incidisset. Verum tamen est, qd periostij mēbranz ratione quadantenus ès sentire, non per se (vt dentes) sed ex accidenti (vt Hepatis externã partè, peritonij ratione) insensis nõ ibimus. Si quidè igitur exquisitiũs pendendas, nõ ossa sentiunt, sed mēbranz ipsorũ, quæ sensum ossib⁹ inesse, nonnulli ex recentiorib⁹ etiã philosophastris imposuerunt. Sed de hoc ossium, siue dentium sensu in capite proprio de dētibus .x. infra plura declaratum sumus: Ne id quidè cõmentum in nimis prolixum, ac tediolum extè datur. Præcognitis ergo prætæctis oĩs, videlicet ossium tēperamento, usu, magnitudine, proprietã, substantia, Itemq; figura, numero, foraminibusq; ac sensu: iam qualia nã sint per se ossa singula pernotã esse decretũ est. At generatim nunc prætæctã hæc sunt. Sigillatim verò, ac per se exquisitiũs proprijs in capitib⁹ enucleabimus. Occasio enim præceptis nos ad Galeni contextũ reuertit accelerat: præposita igitur ossium penès magnitudinem, ac substantiã, molestem, diuisione, (vt patuit in præsentũ textu) quoniam scilicet aliqua grandia sunt, caua, & medullosa: aliqua verò parua, sine prædictã cauitate, & sine medulla: Grandibusq; solis, ob veram, proprièq; ac strictè dictã medullã, appendices ossibus adnasci, existimans (vt scilicet illius opercula sint): ita quamprimũ in subdit.

TEXTVS SEXTVS.

11 *Tõn dē mēbranz tũs prædictis dētibus hũc partē tō mēbranz tēpũ dētũ: dũt Bæpõdũ iũs dũt, tēpũ dē.*  
 12 *ossũ: ossũ dē, nãl mēpũ; nãl pēpũ, nãl tēpũ, nãl dēpũ.*  
 13 *Grandium verò plurimis aliorũ ossiũ appendices in extrema parte sunt: vt pote humero quidè superius: cubito autem; inserius: Radio verò, ac femori: Tibiõq; ac surè vtrobiq;.*

COMMENTVM SEXTVM.

**Q**UID nam sit appendix, Græcè *κῆρῆς*, paulò postertus ipse etiam Galenus definit. *q.* Distinctũ nanq; os est ab osse maiore, cuius est appendix, illi tamen media prius quadam cartilagine, ac per hoc (vt videbimus) per synchondrosim coalescens. Quamquã deinceps in senibus, durefacte illa cartilagine, atq; in ossiam naturã exquisitè conuerã, absq; vilo medio coniungi nõnũquã appareat. Hanc verò appendicè indices, dum agnum, aut hẽdũ comedes, eorumq; ossa sigillatim cõtemplatus fueris, promptissimè cognosces: quomodo etiã facillimè ob elixationè tabefactã intermedia cartilagine, præsertimq; in tencilis, appendix ab osse, cui adnata fuerat, puta femore, aut tibia separatur. Non rectè igitur veterè nonnulli, artũ capita omnia epiphyces nuncuparũt, quamuis eos referens Galenus corrigere nõ curarũt, \* forte quia nõnulla huiusmodi sunt. Dicit autè Galenus, in extremo grandium ossium, nõ omnium, sed plurimorũ inesse, adnasci; appendices, vt qui duodecim tantũ hic prætæctorum ossium viginti appendices pernouerit: quæ apud ipsum nõ nisi quã parte ossa hæc appendicibus dotata cum alijs dearticulantur, eorumq; extremis colligantur, proprijs ossibus adnascuntur.

Quamuis

q. de v. g. cap. 6. & 7. & lib. 1. cap. dem. 3. Contra Realdu.

om. 1. q. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Cur dēntes sēnt, alia verò non, Ro.

\* 1. art. me. c. 6. l. ver. 1. fas s. m. q. Quomodo ossa quandoque sentiant. r. Cap. 4. sic com. vltimo.

11. de v. g. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1. de v. g.

\* 11. de v. g. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Appēdici  
vius secundū  
Galeoī  
duplex.

Cōtra Ga-  
lenum.

\*cap. 3. 122.  
6. & vide  
etiā c. 11.  
com. 2. &  
c. 26. com.  
2. & c. 101.  
188.

Appēdici  
vius secundū  
Galeoī  
duplex.

1. Tex. fa-  
quand.

Cōtra Ga-  
lenum.

Ossū ap-  
pendicibus  
dotatum  
numerus.  
244. 172.

Appēdici  
numerus.

Quis vnicū  
habet ap-  
pēdicē 13.

Quis habet  
duos 21.

Quis habet  
duos 21.

Quamuis perpetuū id nō esse, trōchanteron femoris appēdices p̄ferant. Vius p̄terea duos tantum earum agnosces, tūm scilicet vt medullę cooperimentū, ac defensio in attritionib⁹ articulorum sint, tūm vt inde ligamentis adnascantur, quę articulum ipsum in orbem colligunt, nō alibi esse appēdices posse arbitratus est, quā ad medulloforū ossium horumq; magnorū extremū, hoc est, vbi cum aliorū ossium extremitate cōiunguntur, articulanturq;. Nos autē cū pluribus alijs ossibus minimi nisi, medullęq; expertibus longe plures appēdices declaraturi sumus, ex his quoq; multas offendemus, quę neq; ad articulationē dantur. Dicit autē in p̄senti loco Galenus, aliorū ossium appēdices: intelligendo nunc *in ipsa* in abstracto: capiēdo scilicet p̄ adnascētia q. d. grandū extremis aliorū ossium adnascētia: sunt: hoc est, alia ossa adnascuntur, quę appēdices vocantur: sicuti ex alijs locis infra cōprobabimus. Vt igitur cuncta clarior elucēcant, sic exordium est. Quoniam scilicet duodecim duntaxat ossa a nostro Galeno cognita fuerunt, quibus appēdices in sui extremo adnascērentur, hæc q; grandia, & medullosa: vt humerus, cubitus, radius, femur, tibiaq;, & sura, quę sunt sex: atq; hæc quidē in dextro latere: Alia verō sex in altero latere existunt. Idcirco cuncta sunt duodecim. Quibus quidem p̄dictis duodecim ossibus appēdices numero duntaxat viginti, secundū ipsum, adnascuntur. Vna enim appēdix humero superius, secunda cubito inferius: Tertia, & quarta radio superius, & inferius: Quinta, & sexta femori, septima, & octaua tibię: Nona, & decima surę, scilicet in his quoq;, velut in radio, superius, & inferius. Sunt ergo decē appēdices. Sed in alio latere totidē sunt: puta in sinistro, velut in dextro. Cōcluditur ergo, q̄ viginti duntaxat appēdices cognouit Galenus: hæq; in grandioribus, ac medullosis tantum duodecim ossibus. Non igitur in omnibus a se p̄narratis medullosis (haud enim in inferiore maxilla, vt d̄debimus.) In medullosis verō posuit appēdices, vt verę, p̄prieq;, in illorū ampla cauitate retentę medullę opercula quędā sint: Nos autē exquisitis singula ossa per se cōsiderantes, multo plures appēdices esse demonstrabimus: Multoq; etiā plura esse ossa, quibus appēdices adnascuntur, & nō grandia tantum, & medullosa, sed parua etiā, ac mediocria quamplurima. Quinimodō grandibus illis a Galeno p̄numeratis plures inesse appēdices, quam Galenus ipse cognouit, declarabimus. Si queras igitur quib⁹ sit ossium numerus, quę appēdices dotata sunt? Respondeo q̄ p̄ter hæc duodecim a Galeno p̄narrata, sunt alia ossa centum triginta duo. Cuius ergo duodecim, sunt ce septū, & quadraginta quatuor. Cum quibus deinde, & viginti octo dentibus, erunt cuncta centū septuaginta duo. Sunt igitur ossa alia, quibus appēdices adnascuntur, in primis duo tēporum, os occipitis. (In prima igitur sceleti parte sunt tria) p̄terea sunt in secunda parte ossa appēdicib⁹ dotata quinquaginta et tria, videlicet, vertebre viginti tres, p̄ter primā: costę viginti quatuor: scapulę duę, iuguli duo: ossa quę sacro annectuntur duo. In tertia verō parte sunt alia triginta & octo, p̄ter sex a Galeno posita, videlicet ossa postbrachialiū octo: digitorumq; manus ossa triginta. P̄terea in quarta sceleti parte sunt alia triginta & octo, p̄ter sex a Galeno descripta, videlicet vtriusq; pedis ossa decē: digitorū deniq; pedis ossa viginti & octo. Hęc inq; omnia, quę insimul collecta sunt ossa centū triginta duo, suas appēdices habent. Quibus addamus, alia duodecim a Galeno p̄tracta. Erunt igitur omnia proculdubio centū quadraginta quatuor ossa, quę appēdicib⁹ dotata sunt. Cum dentibus verō centum septuaginta duo. Eundē verō cum suis, quibus adnascuntur, ossibus, numerū minimē obseruāt appēdices, cū sint hæc trecentę viginti septem, additis verō dentibus, trecentę quinquaginta noue. Etenim nōnulla p̄dictorum ossium vnicam tantum habent appēdicē, vt dentes viginti octo (si dentes ipsi appēdices habere ponantur, prout aliquā saltem in p̄culari verisimilitudinē habent: quamuis in nata maioribus nulla sit,) & secūda etiā vertebra in parte inferiore (Dentem enim eius, nō inter appēdices, sed inter ossium distictiones posuimus.) Vtriusq; ossium digitorū manus, ac pedis ordo: quę sunt ossa viginti, videlicet decem manū, & decem pedum, (parte scilicet singulorū superiore) costęq; vndecima, & duodecima lateris vtriusq;, quę ossa alia quatuor sunt: Appēdicēq; similiter quatuor, in extrema scilicet earū parte, quę sola cū vertebre corpore articulāt. Omnia ergo, si rectē annumeres, vnicam duntaxat appēdicem habentia ossa sunt quinquaginta tria. Quę de re & eorū quoq; appēdices erunt quinquaginta tres. Nonnulla verō sunt ossa, quę duab⁹ appēdicib⁹ dotata sunt: vt iuguli duo, in vtroq; scilicet extremorū cubiti duo, radij; etiā duo, tibię quoq; duę, ac duę etiā surę: ossa postbrachialiū octo, & vtriusq; pedis decem. Item primus, & secūdus ossium digitorū manū ordo, vbi sunt ossa viginti: & primus ossium digitorū pedis vtriusq; phalanx, atq; etiā secundus (p̄ter pollicem, qui duotantum ossa habet,) vbi sunt ossa duodeviginti: p̄dicta igitur hæc omnia supra, infraq; appēdices habent. Itemq; ossa tēporum vtriusq; & ipsum quoq; occipitis os, siue eius capitula. P̄terea costę viginti a prima scilicet ad decimā vsq; duobus inquam in locis, quibus cum vertebis articulātur, extremo scilicet cum vertebre corpore, ac alio in loco, vbi cū eius dē laterali processu cōstruuntur, p̄ter vndecimam, & duodecimam vtriusq;. Demumq; duo ossa, quę sacro colligantur. Cuncta igitur

(si bene cõnumeret) ossa, quæ duabus donata sunt appendicibus, numero sunt nonaginta & vni. Quamobrem erunt huiusmodi ossium appendices centi octuaginta & duo. Quædam præterea ossa tres appendices sortita sunt: cuiusmodi sunt tertia, quarta, & quinta, sexta, & septima cervicis vertebræ. Quinq; igitur hæc ossa quindecim habent appendices: supra scilicet infraq;, & in spinali processu posteriore. Nonnulla quatuor appendicibus donata sunt: vt duo femorũ ossa, duæq; scapulae (quamvis nonnulli quintã his adiungant in interno ipsarũ latere) & duo quoq; humerorum ossa. Quæ quidẽ cum sex tantum sint, appendices interea viginti quatuor obtinuerunt. Nonnullaq; demum sunt ossa, quib; quinq; appendices adnascuntur: vt duodecim thoracis vertebræ, & lumborum quinq;. Habent enim supra, infraq;, in lateralibus, posterioribusq; processibus. Cũ igitur decem & septẽ hæc ossa sint, erunt corũ appendices numero octoginta quinq;. Ecce igitur quomodo appendicum numerus equalis nõ est, nõ dico tantum ossium cunctorũ simul sumptorum numero, sed neq; illorũ ossium, quib; adnascuntur. Omnium enim numerus est pro ætate varietate (vt prædictũ est. u.) diuersus. Iuuenum quidẽ, ætateq; prouectorũ ossa sunt trecenta & quinq;, vel saltem trecenta & vnum: vt in duab; primis cõclusionib; patet. Infantium verò, vel ossa ducenta septuaginta tria (prout in tertiã cõclusionẽ prædictã est) vel ad summũ trecetã quadraginta quinq;. (vt in quarta) vel ducenta quinquaginta nouem (vt in quinta.) Admãus verò centum nonaginta duo; prout in sexta demum cõclusionẽ declaratũ est.) Ossium verò duntaxat, quibus illæ appendices adnascuntur numerus ab his diuersus est: sunt enim hæc (vt paulo ante iam diximus) centum quadraginta quatuor, cum dentibus verò, centi septuaginta duo. Appendicum autẽ (si prædictas exquisitẽ adnumeret) prepositus numerus est trecetarũ & triginta & vnus; cum ipsorũ verò dentũ appendicibus, erunt omnes tercenti quinquaginta nouem. Quas quidem omnes appendices (vt aptius faciliusq; eas memoriæ cõmittere queas) rursus hoc ordine repetentes, deic nemus; scæleton, seu manus ossium dicere vniuersum corpus in quatuor partes distinguẽdo: scilicet caput, dorsum, manus siue brachia, & crura. Eodem modo, quo in ossũ numero vñ sumus. x. Prima igitur pars, hoc est caput (si dẽtes post hæc omiserimus tanquã vera appendicibus minimẽ donatos) in tribus ossibus appendices habet sex: videlicet in duobus temporum ossibus appendices quatuor, duo videlicet ossa, quæ galorum calcæribus, scriptoris siue calami, aut columnis affimulantur. (De quibus tamen iterũ sermo fiet. y.) aliaq; duo, quos *scapulae*, hoc est, auditorios osses meatus appellant, anulosos osses, nos verò auditus tympana nuncupauimus. x. Præterea duas alias appendices habet occipitis os, in duobus scilicet capitulis, quibus cum prima vertebra dearticulatur. Secunda pars, quæ est dorsum, in ossib; quinquaginta tribus, appendices obtinuit centi scilicet & vnã: hoc modo. Iuguli duo quatuor habent appendices, in alterutro videlicet extremo. Ex viginti quatuor vertebus prima nullã habet appendicem, (quamvis in prima infantũ ætate in tria ossa distinguatur.) Secunda autẽ vnã obtinuit appendicẽ in inferiore in parte. Tertia verò, quarta, quinta, sextaq;, & septima tres habuerunt singulæ appendices, quæ sunt (vt antea diximus) appendices quo indecim, & eũ vnica secunda vertebrae sunt sexdecim cũ alijs verò quatuor, quæ erant duorum iugulorũ sunt viginti. Ossa autẽ vertebra, ad vigesimã quartã vsq; (quæ sunt numero decem & septem ossa) cum singulæ appendices quinq; obtinuerint, octoginta quinq; appendices referunt. Cum precedentib; igitur erunt omnes centum & quinq;. Præter hæc autẽ & in hac secunda parte, costarũ alie quadraginta quatuor appendices sunt: videlicet primarũ decem costarũ radicibus, quæ cum lateribus corporum, processibusq; lateralibus vertebrarũ dorsi articulantur, adnascentes duplices vtrinq;, vt sint hæc quadraginta: simplices verò duabus vltimis costis, quæ cum conponibus tantũ vertebrarũ constructurã, vt sint alie quatuor. Insuper duobus scapulis octo appendices inferuntur, singulis videlicet quatuor; duæ quidẽ ad ipsius scapulae basim; tertiã verò ad mucronẽ processus interioris coracoidis, siue ancyroidis nuncupati i quarta; demum ad acromion, summum humerum. Rursus alie appendices quatuor illis ossibus duobus insunt, quæ sacro cõmittuntur. Duæ videlicet alterutri, vna in superiore, lateraq; parte, quam os ilium vocant: Altera verò in infima parte, quam cocchendis os nominant. Sunt ergo (nõ error in cõputando intercedit) appendices dorsi largè sumpti (vt impressentiariũ capitum) ceterum scilicet & vna, in ossibus (vt patet) quinquaginta & tribus: scilicet in iugulis duob; vertebus viginti tribus, costisq; viginti quatuor, duabus scapulis, ac duobus deniq; ossibus, quæ sacro cõnectuntur. Tertia pars, quæ est manus tota, siue brachium, appendices in se obtinuit octoginta duos, in ossibus duntaxat quadraginta quatuor. Videamus ergo in altero brachio, vt alterũ inde cõprehenderimus. Habet enim humerus appendices quatuor: vnã quidem à Galeno cognitã superius, tres verò à Galeno ignotas inferius, in puerulis tamen adhuc apparẽtes, floet deinde validissimẽ coalescent, vt ne vestigium quidem in natu grandiorib; appareat: quæ est, vna quidẽ toti interno tuberculo adnascens, alia verò, quæ externo tuberculo (cui radice dearticulatur) inferitur, tertiãq; inter prædictas duas appendices adnascitur cauitatis partẽ, ac superculũ exterius exorians. Cubitus verò, ac radius supra, infraq; singuli

Quæ habet tres 5.

Quæ habet quatuor 6. Quæ habet quinq; 17.

u. com præcedenti.

x. com præcedenti. Prima pars appendices habet sex ossa tria. y. Cap. x. com. 7. vnus sus finem x. Suprà com. 4. Secunda pars habet appendices 141. ossa 13.

Quæ habet 11. Quæ habet 12. Quæ habet 13. Quæ habet 14. Quæ habet 15. Quæ habet 16. Quæ habet 17. Quæ habet 18. Quæ habet 19. Quæ habet 20. Quæ habet 21. Quæ habet 22. Quæ habet 23. Quæ habet 24. Quæ habet 25. Quæ habet 26. Quæ habet 27. Quæ habet 28. Quæ habet 29. Quæ habet 30. Quæ habet 31. Quæ habet 32. Quæ habet 33. Quæ habet 34. Quæ habet 35. Quæ habet 36. Quæ habet 37. Quæ habet 38. Quæ habet 39. Quæ habet 40. Quæ habet 41. Quæ habet 42. Quæ habet 43. Quæ habet 44. Quæ habet 45. Quæ habet 46. Quæ habet 47. Quæ habet 48. Quæ habet 49. Quæ habet 50. Quæ habet 51. Quæ habet 52. Quæ habet 53. Quæ habet 54. Quæ habet 55. Quæ habet 56. Quæ habet 57. Quæ habet 58. Quæ habet 59. Quæ habet 60. Quæ habet 61. Quæ habet 62. Quæ habet 63. Quæ habet 64. Quæ habet 65. Quæ habet 66. Quæ habet 67. Quæ habet 68. Quæ habet 69. Quæ habet 70. Quæ habet 71. Quæ habet 72. Quæ habet 73. Quæ habet 74. Quæ habet 75. Quæ habet 76. Quæ habet 77. Quæ habet 78. Quæ habet 79. Quæ habet 80. Quæ habet 81. Quæ habet 82. Quæ habet 83. Quæ habet 84. Quæ habet 85. Quæ habet 86. Quæ habet 87. Quæ habet 88. Quæ habet 89. Quæ habet 90. Quæ habet 91. Quæ habet 92. Quæ habet 93. Quæ habet 94. Quæ habet 95. Quæ habet 96. Quæ habet 97. Quæ habet 98. Quæ habet 99. Quæ habet 100.

Tertia pars habet appendices 34. ossa 44.

Quæ habet 11. Quæ habet 12.

finguli duas habent appendices. Sunt igitur hucusq; prædictæ appendices octo: præter quas aliae octo sunt, in quatuor metacarpi ossibus (suprà videlicet, infraq; in singulis) sicq; erunt sexdecim. Quibus adde quinque digitorum, appendices viginti quinque: videlicet in primis, secundisq; digitorum ossibus, suprà, infraq;, vt sint in quolibet eorū ossium ordine appendices decem. In vltimis autem ossibus suprà tantum appendices sunt, non autem infra: vbi scilicet vnus adnaucatur. Ideoq; in illis aliæ quinque; duntaxat appendices sunt. Omnes igitur in vna eorū omne (si exquirat perpendimus) numero quadraginta suprà vnam sunt. Cùm verò totidem in altero brachio sint cõpertissimum est octoginta duas esse tertie partis, hoc est, brachiorum appendices: in ossibus (vt diximus) in singulis brachijs viginti duobus, vt sint in ambobus, quadraginta quatuor. Scilicet in humero, cubito, radio, quatuorq; postbrachialis, & quindecim deniq; digitorū ossibus. Reliqua verò, quæ appendicibus desituuntur, hæc enumerare nõ oportet. In quarta demum parte similiter octoginta duas appendices insunt, in ossibus quoq; pariter quadraginta quatuor. Est autem quarta pars ipsorū crurum. Consideremus igitur in altero duntaxat crure (quemadmodum in brachijs obseruauimus) Femur quatuor habet appendices: videlicet suprà, infraq;, quas tantum nouerat Galenus: præter quas alias duas in rotatoribus habet, siue trochantensis: altera quidẽ in trochantere maiore: Altera verò in minore. Tibia verò duas obtinuit scilicet suprà, infraq;: sic etiã & fibula, perindeac recte Galenus agnouit: sicq; appendices octo hucusq; sunt. Quibus adde alias ossium pedij decem appendices: sunt enim ossa pedij quinque; suprà, infraq;: singula proprijs appendicibus dotata. Prædictis igitur additæ sunt duodeuiginti: præter quas, digitorū ossib; aliae insunt viginti tres: videlicet in primis, & secundis quatuor digitorū ossium phalangibus suprà, infraq; sunt sexdecim, in tertio autẽ ordine, cùm suprà tantum habeant appendices, sunt alie quatuor sicq; sunt viginti. In pollice autẽ pedis duo tantum ossa sunt: quorum primū duas habet, scilicet suprà, infraq;, secundū autẽ os vnica tantum appendix suprà habet, sunt igitur in pollice tres: cum prædictis ergo viginti, & alijs decem & octo, erunt omnes quadraginta, & vna appendices, in ossibus internū viginti duobus: videlicet femore, tibia, sura, quinque pedij ossibus, & quatuordecim ossibus digitorū. Totidem verò cùm sint in alio crure: propterea diximus in quarta parte, videlicet in ipsijs crurib; appendices esse octoginta duas, in ossib; quadraginta quatuor. Reliquæ enim ossa appendicibus desitata sunt. Colligentes igitur cunctas totius corporis, & omnium partū eius appendices: videlicet primæ partis sex: secundæ partis centū sexaginta & vnã: tertiæ partis octoginta duas: Quartæ demum partis alias octoginta duas: ni fallimus inueniemus omnes simul esse trecentas & triginta & vnam. Eo autem plura, paucioraq;, tam appendices, quàm ipsa etiã ossa erunt, quò magis, aut minus in ætate processerit animal. Plura enim ossa, pluresq; similiter appendices erunt in minoribus: quæ deinceps coalescentia numerum diminuent. B quibus demum omnib; præsentis liq; uet, aliqua mulierem vtero gerentẽ, in prima scilicet existentem adhuc pubertate, non inest femur; maximū ossium numerū in se cõtinere: qui posset ad quatuor ferè milia ascendere. Habet enim ossa propria iam prædicta iuxta primã cõclusionem trecenta & quinque; propriaq; appendices iam iam declinatas trecentas triginta & vnã, quæ sunt simul sexcenta triginta sex ossa: Itemq; infantis adhuc in vtero exiitẽs ossa habet iuxta quartã cõclusionẽ trecenta quadraginta quinque; propriaq; illis appendices: quas supponamus etiam trecentas triginta & vnã: simulq; 676. sicq; vtero gerens hæc suo cū embryone, ossa habere dici potest mille, trecentum, & duodecim. Quid igitur erit si plures in se fetus cõtineret? Quòd si igitur quinque perfectos conceperit (vt sepe cõtingit in vna etiam muliere, Aristoteles quoq; testis est \*) sunt autem in vno quoq; infante cum suis diuisionibus, & appendicib; sexcenta septuaginta sex ossa: quinque igitur hæc multiplicata erunt tria milia, trecenta, & octoginta, quæ proprijs matris ossibus sexcentis triginta, & sex adiuncta, erunt quater milia, & sexdecim. Tot igitur ossa mulierem vtero gerentẽ quinque; fetus, habere proferre possumus. Plus, manifeste, pro infanti numero, ac diuersitate. Hæc enim exempli gratiã dicta hæc sint, nõ quòd certū determinant numerum, Sed præcipue vt quãto itinere à vtero icopo deriuant Galenus hic, viginti duntaxat appendices, hæc, in grandibus, medullosissq; tantū ossibus ostendens demonstraretur. Quam ob causã & in eorū vltiua declaratione deceptus est: dum ipsas appendices o percula quædã esse: intentionis ossium medullæ tanquã duriores existentes ossibus, quorū a ppendices sunt, inquit. Imprimis enim falsum esse, cuius oculos, & manus habenti liquet, duriores esse appendices ossibus, quorū appendices existunt ( præter dentes, quorū tamen veras esse appendices, nõ temere posteriores abnegantur, licet illis assimilentur.) Cùm spongiosum, ac tenerrimum earum corpus sit, magis, quã ossium, quibus adherent; siue ipsum recens, siue exciccatum cõsideret. Fragiliores ergo, ac molliores appendices sunt ipsi ossibus, quib; annexantur: ac per hoc vt defensoria opercula duntaxat præter ratione cõputari nõ debent. Præterea si ossibus minimè medullosis appendices etiã quamplurimis in prima, & secunda scæleti parte numeratis insunt: quomodo propter medullas, earumq; defensionẽ, & cooperimentū generatim factas esse appendices, dicere possumus: Vtrū enunvero

Quarta  
 pars appen-  
 dices habet  
 82. ossa 44.

Appendicū  
 eorū re-  
 collectio.

Corollari-  
 um.

Vtero ge-  
 rens ossa  
 332.

\* 7. de hist.  
 animal. c. 4  
 post med.

Vtero ge-  
 rens vique  
 ad ossa  
 4016.

Cõtra Ga-  
 lenū de ap-  
 pendicū  
 numero.  
 De appen-  
 dicum vsu  
 eorū Ga-  
 lenum.

\* 11. de vt.  
 par. cap. 18  
 post med.



de appendicum vſu nonihl hoc loco tangendū à nobis fore, operepretiū iudicauimus. Quamuis enim multiplex assignari queat: hincq; in varijs appendicib<sup>9</sup> diuerſus: Veſalius tamen anatomico- rum nō iniuria princeps Galeum de prædicto vſu reprehendit: .a. nullum interea vſum ipſe in prima editione definiens: quamquam in recognita ſua ſecunda editione duos, veluti pertranſen- nam, anapes innuiſſe apparet: quorū ſecundus in iam iam primo loco dicendum incidit, primus verò nullus momenti eſſe nobis videtur: propter commodam ſcilicet eam articulationem, quæ craſſam, ſed nō prorsū ſolidā offis ſedem requireret. Quamobrem & nō nulli poſt eum fuerunt, qui duplicem appendicū vſum poſuerunt. Quorū primus generalior<sup>9</sup> eſt, vt ex ea cōiunctione per lynchondroſim facta, prodire poſſint ligamēta, quæ articulos circūligant, cooperiuntq; & firmiter roborant. Ad hunc vertebrarum, ſuorumq; proceſſuum appendices reduuntur, vbi ligamentis etiam, ſine articulis inuicem connectuntur. Quem vſum ex ipſo etiā Galeno quo ad articulos colligare poſſumus, ſic ſecundo de vſu partium teſtante. .b. [Quin etiā ligamenta quedam membranoſa, valida, in appendicum locis orientia coniungunt, & cōſtringunt, circūple- ſtentia totam articulationē in orbem, &c.] Generalior inquit hic vſus eſt, cum omnib<sup>9</sup> in tertia, & quarta ſceleti parte relatis appendicib<sup>9</sup> congruat, omnibuſq; alijs, quæ in ſecunda parte vni, excepi ſcapulæ baſis, ilijq; ac coxendicis appendicib<sup>9</sup>, exceptiſq; primæ partis auditorio tympa- no, ac ſtulo: quorū vſus poſtea declarabitur. Secundus verò vſus eſt ab illis poſitus, vt inde alia quedam ligamenta oriatur, quæ maſculorum capita, & principia ſæpè pte. Eit autem vſus hic longè particularior: ilij propnè dicti offis appendici cōgruens, è qua tubū motorū primus, .a. & ſextus, .b. femoriſq; primus, .y. & ſecundus .d. originem ſumit, coxendicūq; etiā appēdici con- ueniens, à qua tibiam quoq; mouentiū tertius, .a. quartuſq;, .z. & quintus, .a. ac femoris motorū quintus .b. exoritur. \* Ad hunc vſum reducere poſſumus baſis ſcapulæ appendices, è quibus moto- riam mouentium ſecundus maſculus exoritur. Nāſcuntur autem & ex ſpīng appendicib<sup>9</sup> liga- menta ſpinam totam colligātia. Sed hæc prima carnea ſunt, nō ligamentoſa: velut etiā ex ilij ap- pendice obliqui abdominis aſcendens maſculus .a. originem ſumpſit. De ſtyloidis autem vſu longior infra .a. ſermo habēdus eſt. Nos autē alios adhūc quatuor vſus adiuuamus. Varij enim ſunt pro varijs quoq; articulationibus, ipſarumq; appendicū diuerſitate. Quorū primus erit, ne nouementum, quod in articulo ſit, totū cōmuniatur offi, atq; ipſi etiā medullæ. Ideoq; non vnum os eſt; ſed aliud propē articulo adnāſcitur, intermedia charulaginē coaleſcens. Secundus eſt, ne ex attritione in motibus facta, oſſa nimium ſiccetur: (quamquā hic vſus ſecundus ad iam prædictū primū reduci poteſt, ſcilicet ne nouementū vni parti factū alteri cōmunicetur. Ad hos duos reduci poteſt anuli auditorij appendix: eūm præcipue vicinus ille ſit, mādibulæ inferioris dearticulationi cōtinuū ferē in motibus, tūm loquendo, tūm magis, in mādendo, ac morden- do plurimū laboranti. Tertius vſus eſt, quoniā fractioni pars illa extrema parata, faciliſq; nō eſt, quæmadmodū foret, ſi vnicū, integrūq; os totū eſſet: præſertim verò infantiliſ ipſis. Adeo vt abſq; illa fractione, luxatione, artus, charilaginearū appendicū ratione cōgloberetur: vnum nonnulli appendicū vſum minimè negligendū eſſe, ob hanc plicabilitatē, conglobationeq; in- fantis poſuerunt, præſertimq; in vtero. Sed abuſum potiū hunc dicemus, non verū à natura in- tentum vſum. Quartus deniq; vſus assignari poſſet in dentibus, ſi appendices in primis illis con- ceſſerimus, propter ſubſtantię diuerſitatē. Etenim in exterioribus, quoniā incidere, contētere, ac molire debebant, in denſiſſimum, durifiſſimumq; os terminari neceſſe fuerat. Intūs autem eos ſentire magis opus erat, vt gustabilū differentes qualitates cognoſcerent, recipereq; necruos, venas, & artus. Idcirco nō adeo durā illā dennū ſubſtantia intūs mandibularū ſoſſulas contentā, eſſe cōgruabat. Durius verò eū molliore eſſe vel coaleſcere prorsū nequeunt, vel per interme- diam ſubſtantiam, vt per charilaginē quandā, ideoq; per ſynchondroſim coniuncta ſunt, priūſ, quam illa etiam charilago in oſſeam ſubſtantia dureſcens cōuerteretur. Inde igitur patet, qd ap- pendices quæſitā habuiſſe primos dentes, nō adeo abſurdū eſt, quin veriſimiſſimū ſit. Cum præ- cipue prompti ſolidioris ſubſtantię ſeparationē cōſpiciamus, & apparentē quandā oſſium ſub- ſtantiarū diuerſitatē. Non aliam quidē noui emergentē, vt aliqui aunt, dentem: niſi enim quæ abſciſſā iam appendice radix illa nuncupata remanens educatur, vel alium non emergere dentē, vel oblique à latere conſpeximus, quod experte, & doctæq; mulieres minimè ignorant. Perbellē igitur ſic de duro, & mollium cōiunctione dicebat Galenus. .c. [Ob diſcremen verū partū in oſſibus, cōpoſitiones quoq; in ſquamofiſ oſſibus fuiſſe memorauimus. d. atq; etiā artuum capita, quæ vtiq; epiphyſis, & condyloſ appellat, vbi eandem cauſam exiterunt. Vbi enim os medullā habet, eius ſubſtus vtriq; caput, inſtar operculi cuiuſdam vt plurimū videas adnāſci.] E quibus Galeni verbis ( ſi exquisitè perpendes ) rationem habes, quare diuerſiorū oſſium cōiunctio quedā per mediam aliquā naturā, & nō vnum os eſt, præcipueq; appendicū vnā cū ſuis oſſibus conſtru- cto, quibus ſcilicet adnāſcuntur. Eſt enim ratio propter oſſium diuerſitatē, ſeu diſcremen: quia ſcilicet vnum durius eſt, alterū verò mollius. Perbellē inquit locutus eſt, quō ad hoc, quamquam

Applicā  
vſus quā  
a. lib. 1. c. 3  
poſt prin.

b. cap. 15.  
vſus ſi-  
ntm.

a. 1. & 2.  
tab. 2.  
B. 1. tab.  
p. 9. tab. p  
y. 9. tab.  
p. 10. tab.  
K.  
J. 10. tab.  
Z.

1. 10. tab.  
6.  
Z. 10. tab.  
P.

a. 11. tab.  
p. 12. 5.  
b. 12. 6.  
13. tab. 2.  
\* 1. tab. 6.  
R. 8. tab.  
L.  
a. 4. tab.  
π.

a. Cap. 1.  
cō. 7. ver-  
ſus ſinē.

cap. 10  
c. 15. de vſ.  
pſi. cap. 18.  
circo prim.  
d. lib. c. iuf.  
de cap. vlt.

non rectè (vt paulò ante iam diximus) duriores esse in alijs ossibus appèdices dicens, nisi in dentibus appèdices admiserimus. In quibus verè durior substantia est, nò ob id solù, quia incidere, còterere, & molire cibos interdum quoq; durissimos debebat (veluti prædictum est) quinimò velut arma quædam tenaciter interdum mordere, ac tenere; sed etià vt nervulos, venaq;, & artenas, membranulamq; è nervulis (vt credimus) intertextam in sua officio còprehenisa hæc omnia defenderet, operculumq; illis quodammodo ferret. Quod si ea capita ossium, epiphyfes, & condylos pro eodem suspensum in præallegato loco Galenus: Alibi .e. tamen inter hæc tria nomina differentiam assignans; reprehendendus non est. Cum (vt patet) ex aliorum opinione ea nomina confundens libro de vsu partiu vndecimo .f. præallegato locutus fuerit. Sed de his, alijsq; multis nominibus inferius sermo fiet. Integrum verò vnicuiq; fuerit, Galeni vsium hic tanquàm septimò subiungere, vt opercula scilicet medullæ in medullofis sint. Ostendimq;, qui est Vesalij, primus paulò ante iam à nobis relatus; opercula enim esse, ac dicere, ab absurdo nò est: vt quæ lesione in articulis facta priùs recipiant, etià si duriora nò sint. Quinimò teneriora, spongiosioraq; fuisse oportuit: vt sibi adnascente chartilaginea promptius incruassent, quæ vtriusq; ossibus necessaria est; chartilaginea igitur crassa munitæ appèdices còmoda opercula sunt. Verum enimverò cum Galenus quædam esse ossa grandia, medullosa, & amplius concava posuerit: deinceps autem duodecim huiusmodi ossa enumerauerit, quibus quidem appèdices adnasci subiunxit: vt scilicet còtente in cavitatibus medullæ opercula sint, quemadmodum ex vndecimo de vsu partiu .g. deducimus: Ambigere quispiam hic non temerè posset, quoniam vltra ea prænarrata duodecim, maxilla etià inferior est, quam è numero medulloforum ossium iam iam supposuerat: An igitur appendicem ipsa quoq; habeat, vel aliud quodpià appendicis vicem supplens? Ad hæc igitur dubitationem euestigio respondet Galenus, sic dicens.

Contra dictionis solutio. e. lib. 1. de motu muscul. cap. 9. Contra Vesalij lib. 1. cap. 3. f. cap. 12. circa prin. septimus & octauus appendicium vsus. g. cap. 18.

TEXTVS SEPTIMVS.

10 *Τίσι δὲ ἐστὶν, μέγιστος μὲν ἔχει, πλείους δ' ἐν ἔξει, ἀλλὰ τῶν περὶ τὸν ἀντὶ, τὸ μὲν κάτω, κατὰ τὸν ἄνω ἔχειται; τὸ δ' ἐν δύο ἀπορρέουσιν ἔχει, τὰς μὲν κεραιὰς, τὰς δὲ ἀγκύλας μίαν.*

11 Maxilla verò inferior medullosa est, sed appendicis expertis: ex eius autem extremis partibus, quæ infra quidem est, per symphyisim vnitur, quæ autem supra, duos processus habet, alterum quidem coronen, alterum verò ceruicem tantum.

COMMENTVM SEPTIMVM.

Cur inferior maxilla sine appèdibus, in infra capè.

CCC æquiguitatis proposite solutionem, quòd scilicet appendicè inferiorè maxilla constituitur, Rationemq; subiunxit, ex duplici interim oste constare inferiorè maxillam saltem in infantibus, supponens (De qua tamen proprio eius capite vberius .b.) Ad eò vt quælibet pars eius, scilicet dextra, & sinistra duas habeat extremitates. Vnde si appèdices habitura fuisset, omnia quatuor obtinisset: Duas in quâ pro quolibet mandibulè parte, singulas vtrinq;. Quinimò si exquisitis còtempnari velimus, sex habere debuisset: cum superius extremum duplex sit: Tres igitur vtrinq;. Minimè tamen illas obtinuit: quoniam ex eius (scilicet mandibulæ) extremis partibus, quæ infra est (scilicet circa mentu extensa vtrinvsq; ossis mandibulè pars) per symphyisim, hoc est, verà coalescentiã vnitur. Quæ de re opus nò fuit operculo, seu appèdice talem vniõnem impediente potius, quã adiuuante: vna enim pars alterius operculum facta sibi inuicem est. Suprà verò (q. d. extremitas superior, quæ ad tẽ pora tendit, vtrinvsq; scilicet ossis mandibulæ) duos processus habet, in quos desinit, abq; appendicib; coronen videlicet, quæ in acutè tendit, & ceruicè, quæ in capitulū propriū terminatur. Ideoq; appendicibus illæ quoq; superiores extremitates minimè indiguerunt, ipso etiã Galeno fusiùs hæc de vsu partiu libro vndecimo .i. declarante. Sunt enim huiusmodi processus adeò durissimi, quemadmodum & ipsa quoq; mandibulæ substantia durissima est: vt appendicè vsum, vicemq; suppleuerint. Et interim sententiæ, quamuis (veluti prædictu est \*) nò iuste, Galenus innixus est, quòd scilicet operculi medullæ gratiã factè suæ appèdices, quas duriores suis ossibus, quib; adnascuntur, esse existimans, duntaxat de descendere còclufit. Duritiæ verò inferioris maxillæ, fororumq; processu si finalem causam esse ait nuditatem. Nisi enim ex propria sua substantiã patenti difficultatè esset adeptus os illud, faciliè vtriq; prominens adeò, ac nudum expositu còtunderetur, ac còprimeretur. Nec duritiæ tantum causã appendicib; minimè indiguissè mandibulã inferiorè, ex Galeni dogmate, dicemus: sed etiam quia minima est ipsius interna cavitatis, sinusq;, ac pauca etiã medulla. Sed antequã ad nostrã sententiã perueniamus, Aduertendū quidè circa præsentem Galeni contextum est: quòd dictio [tantum] Græcè [μίαν] quæ cum dictione [ceruicem]

Cur superiores partes sine appèdibus. i. cap. 18. versus finè. Ratio z. q. com. p. g. cedent.

coniungitur, dicendo [*δυσκίνητος*] latine [ceruicem tantum] non sic intelligitur, vt caput excluderet: quasi vellet, quod in ceruicem tantum scilicet sine capite, definit. Etenim præter ceruicem, caput etiã est, quod cum offis temporis ampla cavitare dearticulatur. Quinimodò ceruix dei nõ debet, nisi caput ei adnascitur, sine quo corone potius diceretur, quorum definitiones infra dicemus, & per hæc verba [Ceruices, tenues sunt ossis processus. Earum extremitas, quod crassius, & orbiculatũ est, caput nominatur. Quam verò in mucrone processus definit, nõ ceruix, sed corone nuncupatur.] Excessus igitur dictio, vel ad verbũ [habet] referenda est, hoc modo. [Quæ autẽ supra, duos processus tantum habet, alterũ quidem coronam, alterũ verò ceruicem.] Sicq; excludat alios processus, quia duo tantum sunt, excludatq; omnem appendicem. Cùm processus tantum habeat. Vel si ad libri proxima dictionẽ referas [ceruicem] quia cũ ceruice necessariò caput intelligitur, ideo excludit appendicẽ omnem: sic intelligendũ, quod habet ceruicẽ tantum, scilicet ceruicẽ cum suo capite tantum q. d. sine vlla appendice, quia caput illud è ceruice procedit, nõ ei adnascitur. Sed elucidata Galeni sententia, nostrã ostendamus. Etenim ad propositũ dubiũ scilicet cur inferior maxilla medullofa existens, & cõcaua, appendebat? tamen destituta est? Respondetur alios cõtemplari appendicũ vsus, postquã ille, quem Galenus posuit simpliciter verus nõ est. Alij enim vsus, quos vt venores approbavimus, necessarij minime hic fuerunt. Imprimis enim satus fuit, quod ab offe ligamenta oriantur, vt quæ duriora esse debebant, quò quasi nuda existentia exterioribus aptius resisterent: Idcirco appendicẽ nõ minime indigerunt. Mufculus quoq; maxillæ articulus mouentes in ipsam inferuntur, non ab ea originẽ habent. Quoniam enim parus, & carneo principio nõ nulli musculari ab ipsa inferiore maxilla oriuntur, vt. a. secundũ ossis hyoidis pars vno mento. b. secunda quoq; cõiugato musculari parvorum labri mouentiu. Illa scilicet quæ à mento exterioris inferus labrum dorsum trahit. Item. y. sepium, & d. octauus mufculus linguæ à lateribus inferioris maxillæ vterq; enatus, atq; etiam a. nonus ex omenti regione principiu sumens: præter hos quoq; z. mufculus ille, qui buccas vtrinq; cooperit: tametsi plurimam à superiore, non nihil tamen ab inferiore etiã maxilla p̄ne ipsi obtinent. Quomus inquam prætacti parui mufculi numero quidẽ (vt patet) nouem ab ipsa maxilla inferioris offe oriuntur: principiu tamen carneũ habent, sine ligamenti quemadmodũ in multis alijs ab offe nascensibus mufculis contingit: Idcirco cartilagineo illo ligamento minime indigentes, ipsi etiã appendicibus minime egerunt. Et hæc pro duobus vsibus, quos nonnulli ex recentiorib; nõ in se tẽ affiguntur. Clarus verò, ac facilius proposito dubio satisfaciemus, si nostros appendicem quatuor alios vsus perpendamus. A p̄dicibus enim destituta fuit inferior maxilla: quoniam frustra nil facit vnquã Natura. Durissimũ verò eũ sit, ac breue inferioris maxillẽ os, neq; fiat in eius articulo talis, tantaq; attritio, qualis, quantaq; in brachij, siue eraris manuũq; ac pedũ articulis fieri solet, vt inde ossa vehementer exiccari debeant. Neq; fractiois periculũ iuxta articulum immineret. Cũ enim eius motus violentus non sit, proculdubio sequitur, vt primus, secundusq;, & tertius vsus à nobis positi vacent. Sæ enim fuit, præ articuli defensione, peculiarem illã cartilagineã interpositam à Natura in eius articulatione (vtera propria durtiem) fuisse: vt in magnis, vehementibusq; eius motibus violentiam excepiat, ac moderetur. Quartus deniq; vsus dentibus proprius erat. Hic autẽ totam inferioris maxillẽ substantiã durissimam esse, propter nuditatem, eõdecens fuit. Quod si septimũ, & octauũ ex Galeno etiã & Vesalio vsus appendicũ ad miserimus, maxillẽ inferiori nõ conuenire eõpertissimũ erit. Maxillam igitur inferiorem appendicis expertem esse oportuit: processus tamen duos habuisse, necessariũ, ob dicendas capite proprio. k. rationes, fuit: generatimq; processũ vnũ vsus cõmento nostro sequenti declarabimus. Quoniam verò appendix Græcẽ dicitur epiphysis: processus verò ab eadẽ Gente apophysis nuncupatur: Idco apophysin, & epiphysin definire aggreditur, differentiam inter vtraq; intereã declarans.

TEXTVS OCTAVVS.

Differt enim apophysis ab epiphysi. Quoniam epiphysis est alterius offis ad alterum vnio: Apophysis autem totius offis pars est.

COMMENTVM OCTAVVM.

Epiphysin Græcẽ, latine multifariam dicitur appendix, adnascens, annexus, applantatio, additamentũ, & similia. Quidam sit epiphysis, siue appendix antea tetigimus: m. quoniam verò ipse vsus, atq; etiã numerus, vberimẽ pertraximus. Sed eius definitionẽ clarus nunc elucidat.

lib. 1. 1.  
 k. os. 15.  
 Epiphysin prima.  
 Cur sine ap p̄dicibus, sc̄ntia os fuit.  
 Quò ad du os primos vsus.  
 a. 4. muf. tab. x.  
 2. tab. 4.  
 3. tab. B.  
 B. 4. tab. 17.  
 y. tab. 15.  
 fig. 24. C.  
 25.  
 d. ibidẽ.  
 1. ibidẽ x.  
 z. 4. muf. tab. M.  
 Quò ad a- hior qua- tuor vsus.  
 De qua in- frã cap. 11. com. a. post med.  
 f. infra 107.  
 1. m. 15.  
 1. m. 15.  
 1. m. 15.  
 1. m. 15.  
 m. com. 6.



Ideoq; nō temere offium dissectio nōnquā dici potest. Vulgares quiddā [anatomien sicca] nuncupare eō sineerunt. At nos Galeni titulū obferuātes, librū hunc [de ossibus] perpetuō incēbimus. Quoniā verō statim ab initio, f. Galenus idē hic ait, nota medico eēde debere ossa omnia, tūm singula per se, qualia nam sint, tūm quā inuicē structurā habeāt. Dicitū autē generatim qualia nam sint, singula per se: Reliquū est igitur, vt quā inuicē structurā habeant, perno faciamus; quāsi modus sit, & quotuplex, quo quidem ossa componuntur: Ea propter statim subdit.

[L. 1.]

TEXTVS DECIMVS.

Εἰς δὲ τὴν ἀρχὴν τῆς ἀνατομίας ἀνατίθεται ἀπὸ τοῦ γένους, ἡ μὲν ἄρτιος καὶ ἄρτιος, ἡ δὲ ἄρτιος καὶ ἀρτιος. Ἔξω δὲ ἰσχυρῶν, καὶ ἰσχυρῶν ἀπὸ τοῦ εἴους. Τὴ μὲν δὲ εἰς στήθεα εἶναι γενεῖα, ἡ δὲ εὐρυτέρως ἰσχυρῶν εἶναι φωνὰν. ἀρτιώτατα δὲ ἰσχυρῶν τῶν ἰσχυρῶν, τῶν γενεῶν, εἶναι καὶ τὰ σπασμωδία, ἡ δὲ ἐξαρθρῶτα τὰ ἀρτιώτατα μὲν ἀλλήλους, ἀλλ' ἢ φύσει καὶ ὅσα κατακρῖται συνήθειοι πύρρα, εἶναι μὲν, ἀλλ' ἢ φύσει. Τὰ ἀρτιώτατα δὲ καὶ ἰσχυρῶν τῶν σπασμωδίων τῶν ἰσχυρῶν τῶν γενεῶν, ἄρτιος ἰσχυρῶν ἀπὸ τοῦ εἴους, ἡ μὲν ἀρτιώτατα εὐρυτέρως, ἀλλ' ἢ τῶν ἀρτιώτατων, καὶ τὰ ἀλλήλους τὰ ἀρτιώτατα εἶναι μὲν, ἀλλ' ἢ φύσει.

Modus autem constructionis ipsorum generū duplex est. Alter quidem per articulum, Alter verō per symphyisim: sunt autem & vtriq; species, ac differetiae plures. Articulus igitur naturalis ossium [structura est]: symphyisim verō naturalis ossium vnio: vtriq; autē definitioni dīctio hęc [Naturalis] indita est. Quandoquidē quæ partim, vel omnino sunt laxata inuicē cohęrent: fractaq; superinducto callo, vniuntur quidem, sed non per Naturam. Hippocrates autē athenis etiam ex cohęrentibus ossibus extremam partem, articulum frequenter nuncupat, non quidem qualificūq; contingēt, sed eam, quæ orbiculata est, ac in proximū cauius inseritur.

COMMENTVM DECIMVM.

**N**E marmoreq; ligneq; statuę vias homo eōparetur, motū sibi, vt animali quam maxime propriū amittens, nō vno ex osse, ac ex pluribus cōponi atq; articulari necessarium fuit: quāquā vt vno cunctis aliquod vtiatur, presertim rectus stans: variatim cōponi sunt eōpositionis, & articulationis formę, iuxta varias quidem eōponendi causas, & vsus. Quinq; enim causas ponit Galenus; i. ob quas ossa inuicē eōponuntur, neq; vno fuit continuū os. [Prima est gratiā motus, vt in digitis, carpis, cubitis, humeris, comis, genibus, astragalis, pedibus, costis, spondyliis, &c. (vt summatim dixerim) in omnibus dearticulationibus.] Dixit autem dearticulationibus, tanquam elarioribus. Etenim in coarticulationibus motus quoq; læpius est, tamen obiectus, difficilior; in his, velut in illis cuiusdā tenuissimus est. Idcirco & alias inquit. a. generalis dēfinitio [Potrō articulatio ossium est eōpositio propter motum voluntarium eōparatā.] Secunda eōpositio nis causa est, vt peripiratus, silingiosorū scilicet excrementorū, quæ per ossium poros in halitum dissolui nequiverint. Quemadmodū in capitis suturis antea. x. in eō membrarū sic ait. Tertia causa est, gratiā transitus cuiusdā substantię, vt de ipsdē suturis presertim dicitur quoq; fuerat. y. ad vasorū quorundā transitus, quæ partim extrā, partim intrō feruntur. Sic ad quarundam tenuium membranarū, seu vinculorū transitum à crādia meningē ortorū propter pericranij generationē. Quarta causa est, partū discrimen, vt de suturis squamosis quoq; alibi Galenus idē ostendit. z. atq; etiā de ossibus maxillā fapserō eōponētib; i. z. & de appendiciū suis cum ossibus connectione. b. declarauit. Durissimum enim os cum molli coalescere nō potest: Ideoq; distincta cum remanserint; compositione indiguerunt. Quinta demum causa eōpositionis est, distopathia, hoc est, dissiliis passio: Ne scilicet nocumētā vnā pari factū alteri cōmunicetur: vt de futuris quoq; aliquando presertim, i. atq; etiā de manatū presertim; carpi, & metacarpi ossibus. Ossū igitur eōpositio, seu structura quinq; ob has causas, siue vsus facta est: d. omnes autē rursus ad bimembrē diuisionē reducuntur, hoc modo. Quia ossa vel propter motū eōponuntur, vel propter quietē. Prima autē causa est propter motū, hęcq; dicitur generatim articulus, siue articulus: cuius species sūt dearticulatio, Gręcē diarthrosis, & coarticulatio, Gręcē synarthrosis, vt paulō post videbimus. z. Reliquæ verō quatuor causę potius propter quietē sunt, vel nullum omnino [quæntum ad has causas attinet] motū includentes. Ad hanc igitur bimembrē diuisionē reducere presertim textus verba facillimē possemus (vt scilicet omnis ossium eōpositio sit vel propter motū, vel propter quietē articulusq; sic propter motū, symphyisim verō propter quietē.) Nisi Galenus aduerteretur articulū hoc librō largiū capiens: vt nō modo ea, quæ motū habent, siue manifestū, siue obscurū: sed quæ nullū quoq; motū eōnt, continere quemad modū postea ostendemus. \* Quamvis autē nō ita diuisionē bimembrē hoc loco declarare possimus: Est tamen sic extrahemus. Ossā cohęnguntur, eōponunturq; vel propter motum (vt dearticulationes

an. 1. 1. 1.

an. 1. 1. 1.

an. 1. 1. 1.

Quinq; eōpositionis cause.

an. 1. 1. 1.

an. 1. 1. 1.

an. 1. 1. 1.

an. 1. 1. 1.

an. 1. 1. 1.

an. 1. 1. 1.

omnes, & quæ ad coartulationem species) vel propter quietem (vt quædam alie coartulationis species, ac symphyſis quoq; ipſa.) Sed hæc omnia ſigillatim infra declarabimus. Galeni vero diſtinctio impræſentatâ poſita abſq; nulla difficultate bimebris eſt; ſcilicet qd vel eſt per articulum, vel per ſymphyſim. Quid aut ſit articulus, atq; ſymphyſis, definiunt Galenus. Quas definitiones tamen clariffimas ab eo ſcriptas, vt expoſitione minimè indigeant, babeamus: In ſpecierum tamen enarratione illas nos exquiritus euicidabimus. Nunc vero adnotandum eſt (vt paulò priùs iam tetigimus) articuli nomine largiùs uſum hic Galenum, quâ non nulli ex recentioribus ipſum reprehendentes, putant. Ad eò vt nò modò eorù offium cõpoſitione eòs præhendat, quæ motum euidentem habent, velut ea ſpecies eſt, quæ diarthroſis appellatur: ſed et quæ obſcuri, vel nullum motù aduñt. Diciturq; ſecundò ſpectè ea cõpoſitio ſynarthroſis. Ita enim & ſecundò in librum de articulis cõmentario, ſ. de ſuperioris maxillæ cum capite cõpoſitione loquens; quæ nullum motù habet, neq; maniſeſtum, neq; quantumuis obſcuri, ſuper verbo Hippocratis dicentis [Cõnexa enim capiti eſt, nò dearticulata] inquit, qd nonnulli expoſitores ibi, [ *συνάρθρωσις* ] hoc eſt [coarticulata eſt] legunt, Alij, verò habent eo modo, quo nos paulò ante legimus [ *συνάρθρωσις* ] id eſt [connexa] ſubdit; ſtatim Galenus legi poſſe [ *συνάρθρωσις* ] ſicq; maxillam ſuperiorem capiti coarticulatã eſſe [ Propter qd coarticulationem (Græcè ſynarthroſim) quoq; offium cõmiſſionem naturalem eſſe uult, quæ exiguâ, & obſcurã aliquid, aliquid uerò nullò ortinò motum præſeferant; ſicut dearticulatione (Græcè aparthroſim, ſiue diarthroſim) eam cõiunſtionem naturalem offium uocat, quæ euidentem motù habent. ] Ecce igitur quomodo nò ſolum apud Galenum, ſed apud ipſum quoq; Hippocratem (ſi alterã literã admiferimus) ſynarthroſis etiã dici poteſt, de illa offium cõmiſſura, ſeu cõpoſitione, quæ nullò motù aduñt, neq; propter motum cõiunſctã inter ſe ſunt, ſed propter quietem. Idcirco Galenus idè hic in definitione articuli, nullã de motu mentione faciens, niſi dicens, qd eſt naturalis offium ſtructura: largiùs articuli nomen ſumptiſſe inſinuauit. Quamobrem mirò nò eſt, ſi nò modò in libro ſecundò de cõpoſitione medicamentorù ſecundò loca, g. ſuturã ipſam, ſynarthroſim uocat, caput dicens ſi xta ſynciput, propter laxitatem *συνάρθρωσις* id eſt coarticulationis, ſecundò coronalem ſuturã faciliè frigeneri, &c. Sed libro eſt nam de uſu partiũ nono, h. coarticulis capitis offia ſuturã ait, per hæc uerba de capite loquens [ Simul & ſuturas, quas uocant, uariè coarticulatã ] Græcè [ *συνάρθρωσις* ]. Inde igitur mirum quoq; ad eò nò eſt, ſi Introductorij author ſi, propter quietem, ſeu ſtabilitatẽ, factam eſſe ſynarthroſim, ſeu coarticulationem, definiit. Id quod ſi nò de omni, de aliqua tamen coarticulatione uerum eſt. Quamobrem tamen Galenus hic *συνάρθρωσις* definit per motum obſcurum, & difficultẽ, nulla penitus factã mentione de quiete, aut quando nullum motum habet, forte ſe quia textus ( vt opinor ) imancus eſt: Nihilominus tamen in ſequentiũ \* ſtatim ſuam exponit intentione, ſynarthroſeos ſpecies etiã eſſe adiungens, ſi turã, gomphoſim, & harmoniam. In quibus propter quietem, & nò propter motum offia inuicem cõnexa, cõpoſitã ſunt; ad eam quidem ſynarthroſim hæc ſpecies referens, quæ nullum motum habet. Haud enim de tanto uero uſq; ad eò diſtendendũ eſt, vt in tam paucis uerbis ſtatim ſibi cõtradixiſſe credamus: Quemadmodum aũdacter, ac temere nonnulli Galeni haud ſecũs atq; cuiuſlibet rudis idoteæ nò me n̄ floccipendentes, deſidentiq; ipſum reprehendunt: Cũ tamen euſdem Galeni uerba nò n̄ hic modò pro ueritatis elucidaſione, ſed in aphoriſmorũ quoq; interpretatione cõſideranda ſint, quũ ſic nobis teſtatum reliquit, \* ſi per Hippocratis uerbis [ Quiuicq; calui ſunt, ijs magnæ uarietis nò ſunt, &c. Quando in yri ſapientis libro ſermo inuenitur aliquis maniſeſtẽ habens mendaciam, nò ſine ratione legentes cõtingit dubitare, & priũ quidẽ ſibi ipſis diſſidere, quaſi neq; illa, quæ ſunt maniſeſta noicentibus, deinde ſuſpicari, ne quod falſum fuerit interieſtum. ] Cur igitur ſibi potius ſi, quã Galeno mi n̄i me diſſidebant? aut ſi ſuſpicati non fuerint aliqui Galeni uerbis fuiſſe vel interieſtũ, vel fortè ablatum? Quann̄ enim ſæpenuerò perſeclatũ ſit Galeni firmas poſitũs, quam homines diſſecãtis anatomen reprehendere: Haud quaquã tamen ob id ad eò impudenter eius theoremata: in quibus ſolo ingenio, iudicio, ac doctrina opus fuerat ( Quibus quidem nò medicus modò; ſed philoſophis ſerẽ omnibus etiã ipſum antocellere, cõperuſſimã ſane mentis hominibus eſt) deridere, ac nullo habito ueterũ, præcipueq; noſtræ medicinæ luminis reſpectu, perſeclatã fronte, cõdemnare debemus. Quorũ nihilominus aduerſariorũ ueritas inde patet quoniam à ſe inuicẽ omnes hi diſerepant, vt quia ueritate quidẽ omnino remoti ſunt. Verum nanq; ſibi omni ex parte (Philoſopho teſte. &) atteſtatur, conſonatq;. Nullam uerò cõtradictionem in Galeni monumẽtis inueniſſent, ſi (vt diximus) ſynarthroſim ſumptiſſent cũ obſcuro, difficultiq; interdum motu, interdumq; ſine uilo: primèq; ſynarthroſeos (quæ cũ obſcuro difficultiq; motu eſt) ſpecies eſſe, enarthroſim, arthroſiam, & ganglymonia ſecundæ uerò (quæ ſine uilo motu eſt) alias ſpecies eſſe, ſuturam, gomphoſiam, & harmoniã, cognouiſſent. Sic enim & ueterum monumẽtis Galenus determinare uoluit. At quæ cõtradictio eſt, ſi Galenus in proemiõ ſynarthroſim definiit cum obſcuro, difficultiq; motu ſubintelligens (vt diximus) niſi addatur cum nullo etiã interdum

Articuli nomen quid?

Quod alius ſynarthroſim nomen ſ. com. 1.

g. cap. ſec. 3. de med. h. c. 1. poſt med. &amp; uide ſiſt hæc cõm. 1. h. cap. 11. in princ. \* Tex. ſeq. Galeni tra. mancus. \* Tex. 27. 28. 29. &amp; 30. huius proximij. Galeni de ſenio.

\* Aphor. 41. com. in princ. Galeni cõ. 1. lebandi cõmentaria.

L. 7. ualco. rã cap. 20.

interdum motu. Deinceps verò capite duodecimo pectoris ossa per synarthrosim iunctæ copu-  
 lari dixerit; quæ per harmoniâ synarthrosicos speciem coarticulari credebat. Pauloq; infra de co-  
 starum cû pectoris ossibus nexu loquens, ita scripserit [ Quârû motus exiguus ad eò est, vt synar-  
 throsis appellari queat. ] Non ne videtes, quomodo exigui motu synarthrosi attribuens, defini-  
 noni in præmio proposita respondet? Sic etiâ inuenietis capite decimosextimo brachialis ossâ  
 cuncta inter se per synarthrosim cõstringi, dicentem. Ac rursus capite duodeuicesimo post bra-  
 chialis ossa cum brachialis ossibus per synarthrosim alligari, veluti & tibiæ surâ capite vigesimo  
 primo, triâq; demùm tarsî ossicula cum inferiore scaphoidis parte, capite vigesimo tertio, per sym-  
 narthrosim cõnecti scribentem. Quæ igitur cõtradictio est, si cum occulto, diffusili; motu con-  
 structa hæc sunt iuxta synarthrosicos definitionem in præmio. A. proposita? Dicunt ad versarij?  
 Non reducunt prædictæ constructiones ad futura, neq; gomphosim, neq; harmoniâ. Respon-  
 deo non esse illas tres species scilicet enarthrosim, arthrodiâ, & ginglymon eis iuxta synarthrosicos;  
 quæ nullum in se motum includit; sicuti sunt hæc iam iam prædictæ: Sed alterius, quæ obicurarum,  
 diffusilem; motum habet. Sex enim esse synarthrosicos species, postea declarabimus; videlicet  
 huius enarthrosim, arthrodiâ, & ginglymon. Illius verò futuram, gomphosim, & harmoniam:  
 Sed dices Galenum in aliquo dictorum minus rectè locutû esse. Etenim pectoris ossa per synar-  
 throsim iunctæ copulari ait: cû tamen excepto primo, reliqua inter se per symphyiam coaluerint.  
 Respondemus primò dicentes propositum nõ esse nostrum, cuncta Galeni monumenta defen-  
 dere. (Multa enim vel à nobis taxada remanent) sed hanc solam synarthrosicos definitionem eluc-  
 dare, ac tueri, qd scilicet nullum aliquando motum in ea esse, veteres conclusissent: Ad eò vt non  
 tanta sit Galeni ruditas, qui synarthrosi definita per occultû, diffusilem; motum; species tandè  
 eius subiunxerit, futuram, gomphosim, & harmoniâ: quæ nullum habeant motum: dcincepsq;  
 iterum aliquas enarret species capitibus iam antea prenotatis, quæ neq; ad futura, neq; ad gom-  
 phosim, neq; ad harmoniâ referantur. Duas enim synarthroses intellexit, quarû altera eum mo-  
 tu (veluti prædictû sæpè est) difficili, & obscuro. Altera verò sine motu est, variâq; ambarû spe-  
 cies esse voluit; perinde ac paulò ante iam iam declarauimus, & procedente sermone cuncta, quæ  
 prædiximus, ipsius etiâ ex Galeni verbis elucidabimus. Sat enim superq; hoc loco fuerit, preno-  
 tasse, quòd arthron, siue articulus hic largius capitur, vt scilicet non modo motum, sed quietem  
 quoq; interdum cõcludat: eorum scilicet quæ se iunctim absq; coalescentia cõtangunt. Excusa-  
 bimus tamen secundò Galenum, sterna ossa per harmoniâ cõstrui existimantè, vt inde ad synar-  
 throsim reduceret, quamuis per synchronrosim potius vniantur. Præterea nunc articulû intel-  
 ligimus, in quo ad minus duo ossa ad cõpositionem cõcurrunt. Quiniamò interdum etiâ ( licet  
 impropriè, vt videbimus. .a. ) tria, Non sicut Hippocrates nonnunquã accepit, pro capite ossis,  
 quòd in alterius cauum ingreditur. Vt ex Galeni interpretatione liquet. Hippocrates enim libri  
 de fracturis cõmentario secundo. .a. sic inquit [ Articulum reponere facile iam est. ] Galenusq; in  
 cõmento sic statim subdit [ Ex huiusmodi eius loquutionibus induci nõnulli articulum vocatè  
 eum dicunt, caput ossium, quæ in sinus dearticulatur; vt totum id, quòd ex duobus cõstat, quâ  
 ossium capita, quæ in porrectionibus, & inflexionibus mouentur, inter se cõnectuntur, dearti-  
 culationem ipsorum vero vtrotumq; ossium, extremum alterius, quod sese inserit, articulum  
 alterius verò sinum, quos infertum excipit, coryleum ( acetabulumue ) & Glenem ( hoc est pup-  
 illam, siue oculum ) ab eodè appellari asserunt. ] Ecce igitur quomodo ex aliorû opinione apud  
 Hippocratem capi articulum pro ingredientis ossis capite declarat, yllisso; nomina hæc elisionè  
 q. d. exceptionem habere, insinuat. Sic enim verba illa vltima traduximus [ Ἀλλὰ γὰρ τὸν ἰὸν  
 ἄρτερον τὸν ἰσθμὸν ἔχει ] latine [ Sed hæc nomina elisionem habere ] scilicet asserunt. Intelli-  
 go elisionem, id est exceptionè q. d. hanc quæstionem de nominibus reiiciendam esse. Vel potius  
 exceptionè habere aiunt. Quandoq; enim capitur articulus pro ipsâ iuncturâ, siue articulatione  
 ad minus duorum ossium. Sic γόμφη pro parua cauitate, non pro omni: sicut & acetabulum, seu  
 κόρυς pro magna tantum. Interdum verò pro alia re capiuntur. Idcirco in huiusmodi nominû  
 rationibus, tempus cõterendi nõ est. Quauis autem ex aliorû opinione articulo pro ingredien-  
 tis ossis capite in diarthrosi capi apud Hippocratem Galenus in præallegato loco dixerit: Deinceps  
 tamen ( vt patet ) cõmentò tertij libri eiusdem de fracturis, .a. super Hippocratis verbis his  
 [ Nam femoris articulus pro magnitudine, quâ Brachij expeditior est. ] in cõmento Galenus nõ  
 esse aliorum, sed ex propria intentione, ait. [ Idcirco merito hic Hippocrates intes se iuncturam  
 ossium articulum appellans, non eius ossis esse inquit, quòd eminentiâ alterius suscipit, sed eius,  
 quòd in alterius sinum insertû firmatur. ] Idemq; paulò postenus voluit, quim Hippocrates di-  
 cebat [ At brachij articulus & magnus est, & sinus plures habet. ] Galenus in cõmento articulum  
 pro capite illius, quòd inferunt, exponit dicens [ Maius esse inquit caput brachij, &c. ] Pauloq;  
 inferiùs .p. articulû apud Hippocratè eo textu sumendû inquit, vel pro ipsâ dearticulatione, seu  
 iuncturâ: vel pro sine, seu capite brachij: sicq; pro vtroq; capi posse, apud ipsûm etiâ Hippocratè  
 insinuat.

I. vt. sex. se-  
 quenti pa-  
 rebit.  
 Aduer-  
 siorum ra-  
 tio.  
 Respon-  
 sio.

Obiectio.

Respon-  
 sio prima.

Articulus  
 quid.

¶ 8. § anas.  
 adm. cap.  
 ante med.  
 n. infra  
 com. 16.  
 n. tex. 12.

§ 5. r. d. 2º  
 § 6. r. d. 2º  
 com. 16. 2º  
 § 7. r. d. 2º  
 § 8. r. d. 2º

Expositio  
 prima.

o. tex. &  
 com. 12.

§ 1. r. d. 2º  
 § 2. r. d. 2º  
 § 3. r. d. 2º

¶ 1. com. 14.

infinuat. Sed alijs omiffis locis, ea duntaxat verba cōfidemus, quæ in principio primi cōmentarij de articulis, q. super Hippocratis textu dicentis. [Humeri aut articulū vno modo prolabi, in alam videlicet, noui.] Galenus inquit [Dearticulatione interic cōiunctorū offiū appellare articulum solere, nō finum, qui alterius offis caput in se excipit, sed ipsū, quod inferitur, caput in superiore libro dicitū à nobis iam est.] In superiore libro, intellige, in libro de fracturis, qui librū hunc de articulis præcedit (vt aliam offendemus) prædictus autē locus (vt ad propiū reuertamur) hic præfens Galeni cōtextus respondet, in quo nō ex aliorū voluntate, ac relatione; sed simpliciter ex proprio iudicio articulū apud Hippocratē sumi pro capite offis cauū alterius in g rediēte determinat. Nec semper sic ab Hippocrate intelligi significat, addens dictionē [παλλήκις] latinē [frequenter]. Sed hæc de articuli nomine apud Hippocratē intantū hoc loco dicta sunt; vt quisq; sciat nos aliter articulum hoc libro intelligere, scilicet pro ipsa articulatione, seu duorum offium iunctura, vel structura, siue cōpositione. Quinimodū vsq; adeo largē, vt eam quoq; cōpositionē includat, quæ motum nō ædat. Adeo vt ἄρθρον sumi hoc in loco dixerimus παρά τὸ ἄρθρον, quod est ἄρθρον, id est cōgruo; quoniā scilicet ossa inuicem aptentur, cōgruantēq; inter se, nō vsantur, vt coalescant: sicq; nō solū quæ cum motu sunt, sed quæ per futura, harmoniamq; & gomphosiam aptari, cōgruerēt; cum dicantur, per articulū quoq; cōponi dici possunt. Itaq; vt quæ diximus exquisitius elucidentur, primas articuli species, siue differentias cū Galeno perpendamus.

TEXTVS VNDECIMVS.

Ἄρθρα δὲ τῶ μὲν ἄρθρον εἶναι ἐστὶ διακρίσεισσι, καὶ συνάρθρωσι. ἀλλήλων δὲ διακρίσεισσι τῶ τῆς κινήσεως ποσῶ. ἢ μὲν γὰρ διακρίσεισσι εἶναι ἐστὶ σύνταξις ἢ τῶν πρὸς ἄλληλα κινήσων ἕχθησιν. ἢ δὲ συνάρθρωσι εἶναι μὲν καὶ ἀπὸ τῶν κινήσων εἶναι. ἢ μὲν ἰσχυρὰ τῶν κινήσων, ἀδὲ μὲν ἄλλω, ἀλλ' ἀμυδρότεροι, καὶ διακρίσεισσι ἕχθησιν. ἔτι δὲ ἢ διακρίσεισσι εἶναι, ἢ κινήσων, ἢ κινήσων ἐκείνων, ἀσχυρῶς εἶναι.

Articuli autem differentia: duæ sunt: Diarthrosis videlicet, ac synarthrosis. Eaq; inuicē pro motus quātitate diferentem recipiunt. Diarthrosis enim offium structura est euidentem motum inuicem habētium. Synarthrosis autem ipsa quoq; offium cōpositio est, sed quæ nec euidentem, nec; magnum, at obscurum, difficilemq; motum habent. Quod autem nullū discrimen sit, siue offium structuram, siue cōpositionem, siue cōgruentiam dixeris, omninō peripicuum est.

COMMENTVM VNDECIMVM.



VOMODO articuli nomen hic capiatur, vberimē in cōmento præcedenti prædictū iam est. Reliquū igitur est, vt primas eius species, siue differentias perpendamus: quæ sunt. Diarthrosis, latinē dearticulatio, & synarthrosis, latinē verō coarticulatio dicta. Est ergo diarthrosis (quam etiam ἀρθρωσις, hoc est, latinē abarticulationē Hippocrates aliquando \* vocat, nonnumquā verō προάρθρωσις, s. q. d. adarticulationē) Naturalis offium structura, quorū motus magnus, validusq; & euidentis est: (semper enim dicto [Naturalis] velut in genere prædictum fuit, ita & in qualibet specie subintelligēda est) synarthrosis verō, coarticulatioque, naturalis est offium cōpositio, siue structura, quæ neq; magnū, seu validū, neq; manifestū: sed obscurū, difficilemq; habent motum. Dixit autem ibi σύνταξις, hoc est, structura: Hic autem εἶθησιν, latinē cōpositio, vt in his nominibus nullam esse, quodam proposito spectat, differentiam innueret, quod in sine textus tandem enucleat, nullū etiam cum ipsa ἰσχυρῶς, hoc est, cōgruentia discrimen esse adiungēs, vt nil referat quoduis horum prædicatōrū proferas. Dixit etiā in prima definitione, q̄ euidentē motum habent: cui opponit in secunda definitione, q̄ nō euidentē, sed obscurum eum habent. In qua tamen secunda definitione addit, q̄ nō magnum, sed difficile ē eius ossa motum habent, innuens per hæc addendū per oppositū in prima, q̄ magno, ac fœchi motu prædita sint. Præterea inquit synarthrosim esse offium structurā, siue cōpositionē, quæ non magnum, sed obscurū, difficilemq; habent motū: sicq; motum omninō supponit: Minimē interum recordatus de altera synarthrosios, coarticulationis siue differentia, quæ nullum penitus motum habet, vel potius fortasse mancus textus est, vt cōmento diximus præcedēti. Haud quaquā tamen dicēdum ob id est, nullū esse talem synarthrosim. Cū alibi cum ponat Galenus s. (prouit in cōmento etiā præcedēte demonstrauimus) vltra q̄ hic statim tres subiungat. n. synarthrosios differentias, in quibus nullus à Natura cōstitutus motus est, videlicet futurā, gomphosiam, & harmoniam, vel ergo in definitione synarthrosios subintelligendū, supplendūq; est, q̄ scilicet interdum nullū motum eius ossa obtinuerunt (vt Galeni per semetipsum interpretemur) vel potius determinandū est, q̄ de prauatis, mancus est textus hic est, sicq; legendus [Synarthrosios offium quoq; cōpositio est, quæ neq; magnū, neq; manifestū, sed vel obscurū, difficilemq; vel nullum habent

\* Lib. 1. de art. com. l. 2. lib. 3. tex. 37. Lib. 3. cōm. de tex. 37.

s. Vt s. de art. com. l. 2. u. Vt infra tex. 18.



habent motum] sic igitur additis verbis illis [vel nullum] Græcè [ἀνορθωτός] cōpleta, & classifica-  
 ma Galeni sententia est. Quemadmodum verò in articuli nomine neq; motus, neq; quies, quan-  
 tum ad nominis inquam prædictam etymologiã spectat, includitur: Ita neq; in diarthroseos, aut  
 synarthroseos nomenclationibus, vel euidens, vel obscurus motus; aut quies exprimitur. Haud  
 temerè tamen primi impostores diarthrosim appellaverunt, ubi euidens motus est, laxaq; articu-  
 latio vsq; adeo est, vt plurimum plicari, flectiq; , & extendi possit. In qua quidem flexione, quæ  
 prius seise quasi osculabantur, inuicemq; coibant ossa, plurimùm distent, separaturq; , & à proprio  
 situ, quem extendo articulo obtinuerant, pemitentur. Id quod præpositio illa [ἀνά] præferet.  
 Quæ quidem in cōpositione, præter alia significata, nonnunquã leparatione significat: quemad-  
 modum in dictione [ἀφάρσις] apud ipsam quoq; Hippocrate, & Galenum præferet. Quam di-  
 arthrosim in interpres in libro de fracturis secundo. x. diuiminatione latinè traduxit. Nò ob aliud,  
 nisi, quia (velut dictum est) [ἀνά] significat prædictam distinctionem, separationemq; : Quam  
 adhuc magis aliud Hippocratis nomen. γ. ἀφάρσις, id est abarticulatio, præferet, ab alia præ-  
 positione [ἀπὸ] latinè [ab] separationis, motusq; vim recipiens. Quemadmodum verò in flexione  
 separantur quodammodo, situmq; mutant articulationis ossa: Ita deinceps in extensione rursus  
 ad propriũ articuli sitũ accedunt. Haecq; ratione absurdũ nõ est cum Hippocrate. α. ἀφάρσις  
 quosq; hoc est, abarticulatione appellare. Quoniã scilicet in extensione ad articuli propriũ situm  
 accedit. Quæ verò adeo sibi inuicè coherent, firmiterq; aligantur, vt neq; flecti, vel admodum  
 occulte, ac difficulter queant, ea per synarthrosim q. d. per coarticulationem construi dicuntur:  
 quia dictio [σύν] latinè [cum] societate, atq; cōiunctione significat. Verum enimverò quòum Ga-  
 lenus inquit, pro motus quantitate, Græcè [τὸ τὰς ἀνορθωτοσὺν] synarthrosim à diarthrosi differ-  
 re, nõ omnes synarthroseos species cum diarthrosi cōparasse, intelligendum est. Nisi eas tantum  
 quæ aliquo modo puta in motu cũ diarthrosi conuenient. Etenim (vt videbimus \*) synarthrosi  
 quatenus cum motu est, licet obscuro, & difficili, tres habet species: sicuti & ipsa etiã diarthrosi  
 (& in his aliquo modo cōueniunt) quæ species sunt, εnarthrosi, arthrodiã, & ginglymos. Quan-  
 tenus verò synarthrosi obuiq; vltio motu est, tres alias species ab his distinctas habet scilicet sutu-  
 ram, harmoniã, & gomphosim, atq; in his tribus speciebus cum diarthrosi minimè congruit. Di-  
 cendum ergo potius pro his tribus alijs speciebus foret, quã diarthrosi synarthrosi differet [pro  
 motu] siue [secundum motum] quia diarthrosi cũ motu est: Hæc verò absq; vltio naturali motu  
 existunt. Itaq; cum synarthrosi: quoad tres alias species, cum diarthrosi cōueniunt scilicet quoad  
 enarthrosim, arthrodiã, & ginglymon: Inter ea verò differentie querantur, quæ aliquo modo  
 cōueniunt. Idcirco ne aliquis crederet, quod enarthrosi, arthrodiã, & ginglymos eadè penitus sit  
 re, sicuti in nomine cōueniunt, tanquam species synarthrosos, sicuti & diarthrosos: propterea  
 differentia declarat, dicens: eas ad inuicè pro motus quantitate differre. Etenim enarthrosi, quæ  
 species est diarthroseos, motu habet magnũ, validumq; , & manifestũ. Enarthrosi verò, quæ est  
 synarthroseos, motum habet occultũ, difficilemq; . Sic etiã de arthrodiã, & ginglymo determi-  
 nandũ. Idem verò licet nomen sit specierũ vtriusq; , quatenus in articulationis modo cōueniunt;  
 Haud tamen interim obstat, quod pro motus quãtitate differentes, hæc ad diarthrosim, illæ verò ad  
 synarthrosim referantur. Nullum verò discrimen esse subdit hic halenus ( pro articuloũ omniũ,  
 ac per hoc diarthrosos, & synarthrosos cōmuniſſimo genere) dixisse [offium structuram] siue  
 [offium cōpositionem] siue [offium coherentiam] vt v. g. quòum prius de articulo dictum est, quod  
 naturalis est offium cōpositio, Græcè σύνθεσις, dicere possumus [est naturalis offium structura]  
 Græcè σύνθεσις, vel quod est naturalis offium coherentia, Græcè ἁρμοσία. Ad differentia semper ipsius  
 symphyseos, quæ est naturalis offium coalitio, seu vera vnio, Græcè ἑνωσις. Eodem igitur modo  
 in diarthroseos definitione, ac ipsius etiam synarthroseos, dicere possumus, quod scilicet est cōpositio,  
 siue structura, seu coherencia, &c. Sed melius quidem agemus si ad differentias, seu species  
 subalternas descendamus, carũq; definitiones perpendamus, vt ea, quæ prædicta iam sunt, accu-  
 ratius intelligamus. Modò prius hic obiter annotemus, quod quicunq; articulum Græcè ἄρθρον ad  
 motum duntaxat retulerunt, futurã, gomphosimq; , & harmoniã excludentes, alter hi etymon  
 totũ ἀρθρον intellexerunt scilicet παρά τὸ ἀρσ, quod est, eleuo, seu tollo: siue quoniã quiescente præ-  
 locato offe, postlocatũ eleuetur, tollatur, ac moueatur, siue quoniã ἰσὸ τῶν βαρεῖμῶν, hoc  
 est, ab his articulis portamur, ac mouemur: vt etymologiarum author enucleauit.

Diarthro-  
sis vnde di-  
ctur.

Diaphysis.  
x. Tex. &  
com. 37.

y. 1. de art.  
E. & 3. 37.  
Apathro-  
sis.

z. 3. de art.  
tex. 37.  
Proarthro-  
sis.

Synarthro-  
sis vnde di-  
ctur.

\* Com. seq.  
vsq; ad 174.

αὐτὸ ἴδιον

αὐτοῦ ἴδιον

TEXTVS DVODECIMVS.

11 Ἐἶδη δὲ ἐν τῆσὶν μὲν διαρθρώσεσσι τρία, καλεῖται ἀπὸ τῶν παλαιῶν ἰατρῶν, τὸ μὲν ἐνάρθρωσις, τὸ δὲ ἀρθρώδις, τὸ δὲ  
 12 γόγγυλιμος. τὰς αὖτε τὸ ἐν ἁρμόσει ἰσχύματα τῆσὶν παλαιῶν ἰατρῶν τὸ πάσι τῶσδε, τὸ δὲ ἐνarthrosi, καὶ τῶ  
 13 ἀρθρώδι, καὶ τῶ γόγγυλιμοσὶ ἀλλόθεν συμβάλλουσιν, ἵνα πρὸς τῶσδε, καὶ τὸ ἀρθρώδι, καὶ τῶ γόγγυλιμοσὶ  
 14 ἵνα ἐν ἁρμόσει, καὶ παρ' ἐκείνου γόγγυλιμος, καὶ ἰδίως ἴσους ἵσους, ἵσυμα πᾶσι, ἵνα παρὶ διδασκαλίῃ, ἀπὸ  
 15 τῶσδε ἵνα καμῖον παράγουσιν.

E Sunt

Sunt autem species diarthrosos quidem tres: vocantur a recentioribus medicis, hæc quidem enarthrosi, hæc autem arthrodis, alia verò ginglymos. Hęc igitur dicta nomina veteribus medicis non admodum consueta fuerunt. Verbum autem enarthrosi hæc, & aduerbia arthrodis, & ginglymoides inuicem committi: præter hæc etiã, hæc nomina arthrodis, & ginglymoides ab illis scripta deprehendimus. Quamobrem maxime forsitan absurdum fuerit, si ad euidentiorem doctrinam nomina constringamus: ab his, quæ iam posita sunt, deriuantes.

COMMENTVM DVODECIMVM



**R**IPLEX quidẽ hæc species nõ diarthrosos tantum, sed ipsius etiã synarthrosos (prout antea ostendimus \*) est, quiquã pro motus quantitate differunt. Quamobrẽ ubi textus Galeni habet [ *τὴν αἰὲν διαφρασίαν* ] addendum videtur [ *καὶ σπασμωδικῶς* ] hoc est [ diarthrosos, & synarthrosos ] tuncq; omnis questio cessaret. Idemq; si altere litera correxerimus, legẽtes hoc modo [ *αἰὲν ἢ ἢ τῶν διαφρασίαν τῆν* ] q. d. [ species autẽ

amborum differentiã tres sunt ] simul autem corrigẽda venire eiusdem seruis iusta, quum dicit [ *τὴν δὲ τῆν αἰὲν διαφρασίαν* ] vt vel dictio [ *σπασμωδικῶς* ] expungatur, vel addatur [ *καὶ σπασμωδικῶς* ]. Adeo vt totus trium specierum sermo sub vtroq; genere intelligatur (vt omnino concedere est) scilicet sub diarthrosi, & synarthrosi. Definitiones enim tam enarthrosos, quam arthrodis, ac ginglymi nil habent diarthrosi proprium, quod etiã synarthrosi nõ conueniat, vt clariss postea declarabimus. s. Melior autem coorrectio, solaq; sufficiens efficit, quã infra dicemus, alijs remanentibus intactis, legendo scilicet [ *τῆν δὲ σπασμωδικῶς ἢ ἢ ἢ ἢ καὶ ἢ ἢ ἢ ἢ* ] Quod si textum coorrecte notis (quãquã & magis pium, & facilius id ipsum est) ad bonã formam, verumq; sensum reduci facillimẽ ad hæc potest, subdõdo postea; Quum specialiter tamen de ipsa synarthrosi scientia ab eo est, his verbis. b. [ Ipsius autem synarthrosos tres quoq; species sunt ] q. d. synarthrosos quoq; (præter dictas tres cõmunes species, quatenus aliquẽ motũ habet, scilicet enarthrosi, arthrodis, & ginglymon) tres quoq; alie species sibi propnæ sunt (quate nõs videlicet cõmune vltimo motu existit) scilicet futura, harmonia, & gomphosis. Quod autem tres illas species scilicet enarthrosim, arthrodis, & ginglymon, cõmuniter definiat Galenus, tam, scilicet vt sunt species diarthrosos, quam synarthrosos: ex eo cõprobatur, quoniã & si nã. Ium exemplũ primẽ & secundẽ species scilicet enarthrosos, & arthrodis apposuerit: Tertie tamen scilicet ginglymi exempla subdit duos: Quorum alterũ est vertebrarũ: In quibus apud nos cõsecutus, difficilisq; motus est (in vna inquit, aut fortãsẽ dũabus tantum articulationibus, quãquã totius sping, quãumõ solius cervicis, aut dorsũ, aut lumborũ, vel magnæ alicuius partis motus, euidentiõssim, valĩ dulq; e f.) Sic igitur ginglymos hic, vt triũ solummodõ vertebrarũ articulationẽ ipsum Galeni, synarthrosos quẽdã species existit. Alterum verõ exemplũ est ginglymi in humeri cum cubito deã articulatione. In qua quidem euidentiõssimus motus, ac facillimus apparet. Idcirco et diarthrosos species est. Quod si quĩpiam cõtendere vult, quamlibet vertebrarum articulationẽ eandẽntẽ habere motum, licet cum alijs adiunctã, & sic ad diarthrosim reducendã: Maxime in hoc (quãuis quadrare nobis ne queat) altercabitur, nõq; tempus frustra cõteremus: dummodõ sic nobis (vt diximus) capiendi veniã præbeant: singulas inquit articulationes per se capiẽdo: Tria verõ nomina hæc specierũ scilicet enarthrosi, arthrodis, & ginglymonã medicis, qui nõ multo tempore ante Galeni scũla vixerunt (quos recentiores vocat, quãquã nobis veteres existant) vltius patã fuisse Galenus idẽ subdit. Prafic autẽ illis longẽ ante Galeni scũla scribentibus, vt Hippocrati, alijsq; veteribus medicis nõ fuisse admodũ consueta. Verũ pro primẽ speciei nomine scilicet pro enarthrosi vocata (latine dicere possemus in articulationẽ) verbo potius utebantur, scilicet [ *σπασμωδικῶς* ] q. d. latine [ inarticulari ] siue potius, quia Grecis præteritum est [ inarticulatum esse ] ac si diceremus [ in articulationi ] siue [ in articulatione ] esse [ *σπασμωδικῶς* ] ac si diceremus arthrodis, & ginglymoides, siue articulatione, & cardinaliter inuicẽ cõmitti, utebãtur, vel nominibus *σπασμωδικῶς*, & *σπασμωδικῶς* quãsi diceremus articulare, & cardinalẽ. His ergo verbis, cuiusvis modi, aut tẽponis, siue aduerbijs, vel possessiuis quibusdã nominibus utebantur magis veteres medici, quã nõmĩnibus enarthrosi, arthrodis, & ginglymo. Velut enim inquit Aristoteles. c. Galenusq; etiã in præfenti textũ nomina interdum ad euidentiorem doctrinã fingere oportere præteritum est. Alijs videlicet, quã imposita sunt [ inquit Galenus ] primã a verbo *σπασμωδικῶς*, vnde *σπασμωδικῶς*, & ab aduerbijs *σπασμωδικῶς*, & *σπασμωδικῶς*, & à nominibus demũ possessiuis, *σπασμωδικῶς*, & *σπασμωδικῶς*. At ne aduerbio quidem solõ, pro tertã specie scilicet ginglymoides, aut nomine ginglymoides vñ sunt veteres: sed verbo etiã aliquandõ d. scilicet *σπασμωδικῶς* q. d. cardinalatẽ sunt. Non temerẽ autẽ Galenus inquit veteribus medicis [ *σπασμωδικῶς* ] hoc est nomina hæc [ non admodum consueta ] vbi duo peribrendã sunt scilicet

\* Com. 10. & 11.

\* Tex. 16.

a. Com. 13. & 14.

\* Com. 17.

b. Tex. 17. huius.

Obiectio.

Responsio.

c. In præfatione in cap. de relatione post principia.

d. Vt 3. de artic. tex. 34.

(medicis)

[iudicis] & [non admodum] quonia aliquando, licet raro, potiusq; apud philosophos, viurpationem aliquid horum nominum inueniri contingit: quemadmodum apud Aristotelem libro de anima tertio. e. de ginglymo, seu maui dicere, ginglymo perlegimus. Nominem autem in *ginglymo* vsus est ipse etiam Hippocrates, s. quod interpret ibi non ineptè vertit latinè cardinamentum. ¶ Verùm enim uerò prius, quam ad huiusmodi prædictarum definitiones enucleandas accedamus, operæpretium esse duximus, pro articuloꝝ omnia, & suarumq; primarij specierum (de quibus in præcedenti textu tractatum est, diarthroscos inquit, & synarthroscos, atq; aliarum deinceps sequentium specierum, de quibus in præsentem contextu loqui iam acceptè scilicet enarthroscos, arthroscos, & ginglymi) exquisitè cognitione, ossium imprimis numerum cõsidera sse: in quibus articulus aliquis sit: Deinde articuloꝝ quoq; ipsõrum inter ea ossa factorum, numerum: ac demùm tertio eorũ duntaxat articuloꝝ, qui ad diarthrosim, atq; seorsum aliorum, qui ad synarthrosim pertinent, numerum perpendisse, quò facillimè nõ intelligamus modò singulos articulos, sed memoriæ quoq; omnes mãdare queamus. Cõsideratis ergo cunctis ossibus iuxta primum, & cõmunem in natu maioribus numerũ, vt scilicet sint omnia trecenta & quinque; (penitendeã supra declaratum iam à nobis est, g. per primã cõclusionem) Remotisq; deinceps centũ, & decem, & nouẽ: in quibus nulla est propter motum, siue ad motum pertinens articulatio: Sed vel futura, vel harmonia, siue gomphosis (quæ ad synarthrosim sine motu pertinent) vel etiã aliqua per symphyisim, speciatim; per se, vel per synneurosim, aut per synchondrosim, aut deniq; per sissarocõsim vniõ facta. Remotis inquam ijs, restant quidem ossa, quæ articulantur, vel in quibus articulatio propter motum fit, numero centũ & octoginta sex. Sed videamus prius ossium numerũ, quæ vel coarticulata, vel vnita motum nõ habent, vel saltem propter motum coniuncta nõ sunt, numero quidem centum & vndeiciginti. Et vt ordinè ab imo proposito obseruemus, in quatuor iterum partes nostrũ secleron distinguiamus. In prima igitur parte huiusmodi ossa decem esse numero sexaginta, videlicet capitis ossa quinque: vt frontis os vnũ: syncipitis autem duo: quartumq; sphenoides nuacupatum, ac demùm quintũ, quod spongoides, siue cribrosum appellamus, idemq; inter capitis ossa octauũ cõputare solemus. Hęc igitur quinque; capitis ossa propter motum coarticulantur minimè, sed propter quietem, videlicet futura, vel harmonia: Reliqua verò tria capitis ossa propter motum dearticulantur: vt duo temporum ossa cum inferiore maxilla, & os occipitis cum prima ceruicis vertebra. Prætercã maxillæ superioris ossa sunt duodecim, quæ nulli aliõ motus gratiã committuntur, sed futura, vel harmonia inter sese inuicem coarticulantur: vltra quæ, sunt dentes duo & triginta, qui per gomphosim cũ maxillis coarticulantur, minimè verò propter motũ: aliãq; ratione (vt videbimus. b.) per synneurosim, siue sissarocõsim vniuntur. Adhuc sunt alia ossa vocati hyoidis, siue hypõstoidis ossicula vt plunimum vndecim, quæ inter se inuicè per synchondrosim vniuntur: sicq; per symphyisim propter quietem, neq; vliõ pacto propter motũ articulantur. Quoniam enim à proprijs musculis moueantur, propter motum præcipuè ipsius lingue, ac laryngis, quas per alios musculos cõmunes hęc ossa mouent: Nihilominus tamen articulationem inter se nullã habent, quæ vel ad enarthrosim, vel arthrodam, siue ginglymum reduci queat. Sed ne ad futuram quidem, vel harmoniã, vel gomphosim referri potest: vniõnem igitur siue symphyisim habent per synneurosim, aut si maui per synchondrosim, quia p chartilagĩn ea ligamenta quedã vnita inuicè sunt. Quinimò interdũ vsq; adẽ sine intermediã subtilitã coalescunt, vt ossiculoꝝ numerus diminuat, & nouem, vel etiã septem, & interdũ pauciora etiam sint. Itaq; propter quietem talis ossiculoꝝ vniõ facta est, ne in linguæ, aut laryngis motu abinuiçè dissidentur. Sed de his aliã vberius: Nostrum ergo prosequamur propositũ. Hęc prædicta ossa minimè propter motũ cõposita sunt, sed vel propter quietem coarticulata, vel potius vnita sunt: Hęcõq; per synneurosim, siue synchondrosim, quæ omnia si benè cõnumeres, sine articulo ossa sunt sexaginta in prima parte. Reliqua verò decem remanent propter motũ articulata: scilicet os occipitis, duoq; ossa temporũ, & maxilla inferior, quæ sunt quatuor: quibus adde sex auditorij meatus ossicula, tria videlicet vtrinq;. Articulantur enim inter se malleus cum incudẽ, incusq; cum deltoide vtrobiq;, vt tria ossa duos habeat articulos vtrinq;. Sunt igitur propter motum articulata ossa in prima parte decem. In secunda verò parte propter quietem in ossa cõiunguntur nouẽ, videlicet coccygis ossa quatuor, quæ per synchondrosim inuicè, & cum ossẽ sacro coalescunt: Suntq; etiã ossis sacri nuacupati particularia ossa quoq; inuicè in vnũ apertè coalescentia. Primum enim iussidẽ sacri os cum vltima lumboꝝ vertebra iam articulat: alia verò quinque; inuicè (vt diximus) per symphyisim coaluerũt. Pectus autẽ ossa quatuor inter se propter quietem synchondrosi cõstruantur: singula tamen cũ costis propter motũ (vt videbimus) coarticulantur. Dempis igitur illis nouẽ ossibus, reliqua secundæ partis quinquaginta octo propter motum articulata sunt. In tertia deinceps parte, quæ brachiorũ est, propter quietem colligantur ossa vnginti quatuor, videlicet scissamina ossicula in manib; ipsũ existitã. Reliqua verò, quæ sunt numero sexaginta, propter motũ articulantur (vt videbimus) Quarta demũ pars ossa propter

e. Tex. 155.  
f. Primo de fracturis  
tex. 10.

g. Com. 5.

Ossium nu  
merus, quæ  
sunt ppter  
motũ 186.  
Ossium nu  
merus, quæ  
sunt ppter  
quietẽ 139.  
Primo pars  
ossis 60. g.  
ppter quietem  
139.

h. Infrã  
com. 1.

Propter  
motũ ossa  
decẽ in pri  
ma parte.  
Secunda  
pars.

Propter  
quietem 3.

Propter  
motũ 18.

Tertia pars  
Propter

quietẽ 34.

Propter  
motũ 60.

Quarta  
pars 139.

ppter quia  
sem 26.  
ppter mo-  
tum 18.

quietem habet duntaxat viginti sex, videlicet sesamina simuliter in pedib<sup>9</sup> viginti quatuor, duasq;  
in genibus patellas. Articulus enim firmantia potius hæc sunt, quã mouentia, quibus alia super  
his mouentur. Reliqua verò propter articulata ossa numero sunt quinquaginta & octo. Omnia  
igitur hucusq; prenarrata ossa, quæquidẽ propter quietẽ vel coartculata, vel interdũ etiã coale-  
scentia, neq; motum per se desiderantia, sunt numero centũ, & vnde viginti: Nonnulla inquam  
ex his per futuram: Aliaq; per harmoniã: Nonnullaq; etiã per gomphosiam coartculata: vt in pri-  
ma parte quamplurima sunt: Aliaq; etiã per se coalescentia sunt, vt sacri ossis ossa. Nõnulla verò  
per synneurosin synchondrosine, vt ossa hyoidis: Aliaq; clariùs p synchondrosim: vt ossa coe-  
cygis: Aliaq; verò demũ sunt, quæ articulos firmando tendombus coalescentia adiuuant, nõ  
autem cum aliquo articulantur, vt sesamina sunt, patellæq;. Reliqua verò propter motũ vberius  
perpendenda remanent: cum in proposito præsentũ textu de articulis sermo nobis sit. Erant autẽ  
per futurã nõnulla propria capitis ossa: per harmoniã verò quedã maxillæ superioris: per gom-  
phosiam autem ipsi dentes. His igitur præostensis reliquum est, vt ossa cuncta pernoscamus, quæ  
propter motũ articulantur, numero centũ octoginta sex. Inter quæ articulationes sunt trecentę  
& septem: interdumq; (vt videbimus) trecentę & quinq;. Quarũ præterea articulationũ omnium,  
centum triginta septem sunt diarthroses propter validam, manifestissimamq; motũ factę: inrer  
ossa (vt patet) centum quadraginta septem: A liæ verò omnes residuæ numero centum se præ-  
ginta, sunt synarthroses, propter obscurũ, difficilemq; motum cõposiõẽ: inter ossa quidẽ centũ  
& tria. Quas profectò cunctas articulationes particulam locis proprijs elucidabimus: quæ scilicet  
per enarthrosim, .i. siue arthrodiam, .i. & ginglymon .i. fiunt, enucleantes. Nunc verò ge-  
neratim sic declaremus: Totum videlicet sceleton (vt hucusq; secimus) in quatuor partes distin-  
guendo. In prima igitur parte articuli sunt octo, inter ossa vndecim: videlicet maxillæ inferioris  
cum duobus tẽporum ossibus articuli duo, (alter videlicet vtrinq;) inter ossa (vt patet) tria. Præ-  
terea auditus ossiculorum articuli quatuor, inter ossa quidẽ sex. Item ossis occipitis cum prima  
ceruicis vertebra, articuli etiam duo, alter in dextra, alter verò in sinistra parte, inrer ossa quoq;  
duo. Quatuor autem horum diarthroses sunt. Alij verò quatuor, synarthroses, atq; hæc in prima  
quidẽ sceleti parte. Necessẽ autẽ fuit hic primam vertebra, quæ ad secundam partẽ spectat,  
adiungere, vt articulationes cõpleri possent. Sunt autem duo mandibulæ inferioris articuli cum  
ossibus tẽporum: alijq; duo occipitis cum prima vertebra, diarthroses, quoniã propter magnam,  
fatigã; euidẽtẽ motũ facti sunt. Ossiculorũ verò auditus articuli quatuor insensibilem, exiguãq;  
habent motum, ideoq; ad synarthrosim referendi veniunt. In secunda verò parte articuli centũ  
& vndecim, vel interdum centum & nouem, quãdò scilicet decima (vt videbimus) costã duplici  
articulo cũ sua decima vertebra nõ cõnectitur, sicuti priores: sed simplici, vt vndecima, & duo-  
decima. Sunt autem hi secundę partis articuli facti inter ossa quinquaginta quinq;. Sed qui nam  
sint, perpedamus. Secundę vertebra cũ prima articuli quidẽ tres; alter scilicet vtrinq;, ac tertius  
ipsius secundę vertebra cũ anteriore parte primę vertebra, inter ossa tantũ duo. Sed nos  
vnum in totius numeri conclusiõẽ cõputabimus, quia prima vertebra iam antea in prima parte  
numerata est. Amplius cuiuslibet vertebra sequentis primã, vsq; ad os sacrum sunt articuli duo:  
Alter scilicet in dextris, alter verò in sinistris. Cum igitur sint vertebra illę viginti tres, addito sa-  
cri ossis primo, erunt ossa viginti quatuor. Inter quæ tamen interstitia sunt viginti tria, in quib<sup>9</sup>  
articulationes fiunt. Erunt ergo horum articuli quadraginta sex, inter ossa duntaxat viginti qua-  
tuor. Quodlibet enim vertebra interstitiũ duas recipit articulationes. At in ossium calculo ge-  
nerali viginti tria duntaxat ossa statuemus, quia secundã vertebra paulõ iam antea numeravi-  
mus. Item vertebraũ dorsũ, cum costis vt plurimũ sunt articuli quadraginta quatuor: hoc videli-  
cet modo. Nam costę decem superiores duplici cõartantur articulo: Altero quidẽ cum verte-  
bra corpore, altero autem cum suo laterali processu: vndecima verò, & duodecima costę simplici  
articulo, cũ vertebra duntaxat corpore annectuntur. Sic ergo decẽ primę costę articulos faciunt  
viginti: duo verò sunt alij vndecimę, & duodecimę. Itaq; sunt omnes hi viginti duo. Totidẽ ve-  
rò sunt in altera parte: Igitur sunt omnes quadraginta quatuor vt plurimũ. Sæpius enim vidi-  
mus decimã quoq; costam duplici cõiunctam articulo, sicuti & nouẽ præcedentes. Quamvis Ves-  
salius rarò vident decimã duplici articulo cõnecti. Si verò simplex hic fuerit: tunc duntaxat qua-  
draginta duo simal erant. Sed quouis modo fiant, inter ossa cõstant numero triginta sex: videli-  
cet viginti quatuor costarum, & duodecim vertebraũ. Quamquam in ossium, quæ articulos ha-  
bent, generali numero duntaxat viginti quatuor ossa numerabimus: costarũ videlicet: Quia verte-  
bra iam prenarratę sunt. Præter hos alij quatuor articuli sunt iugulorũ cũ pectoris ossi primo,  
& scapulari: Duo inquam cum primo pectoris osse, alijq; duo cum his scapulari processibus, qui  
summi humeri, Græcè *Acipion*, nuncupantur. Suntq; hi quatuor articuli inter ossa quinq; scilicet  
duo iugula, duasq; scapulas, & primũ pectoris os. Dentq; in hac eadẽ secunda parte alij qua-  
tuordecim articuli costarũ veterũ cum tribus pectoris ossibus. Quamvis enim \* prima costã cum

Offium nu-  
merus pp-  
ter motum  
articulato-  
rũ, & arti-  
culorũ quo-  
que nume-  
rus.  
Diarthro-  
ses 137.  
Synarthro-  
ses 170.  
l. com. 13.  
k. com. 14.  
l. com. 16.  
Prima pars  
Artũ inter  
ossa 21.

Diarthro-  
ses quatuor  
Synarthro-  
ses quatuor  
Secunda  
pars artũ,  
ossa 11.

\* Vide infra  
com. 14. &  
p. 12. cõb. 3.

primo sterni offe maxima ex parte coalescat: Nihilominus tamen cum motus gratia coniungantur, inter articulos numerasse nobis placuit. Adeo vt fiant hi articuli inter offa decem & septem, videlicet quatuordecim costas veras, legitimasq; & tria pectoris offa. Verum nos omnia offa aggregandum & inter quæ articuli secundæ partis fiunt, duo tantum hic offa numerabimus scilicet secundam & tertiam pectoris. Nam primum os, & costas omnes iam antea numerauimus. Itaq; si adamusim annumerare velis, omnes predictos huius secundæ partis articulos, vt plurimum centum & vndecim inuenies, ad minus verò centū & nouem: inter offa quidē quinquaginta quinque. Cum hac autem parte nō articulantur offa illiū: quæ scilicet offi sacro adnascuntur: Idcirco ab hoc numero desunt. Quod si decimam costam sim pliciter articulatam cum vertebræ duntaxat corpore offenderis, tunc huius secundæ partis articulos esse cōcludes centū & nouē, inter offa tamen eadē quinquaginta quinque. Horum verò articuloꝝ nōnulli ad diarthrosim referuntur; numero quadraginta nouē: alij verò sexaginta duo ad synarthrosim pertinent. Etenim a tres secundæ vertebræ cum prima: Itemq; duodecim vertebrarū dorū cum costis, alij quadraginta quatuor iugulorum quoq; cum pectoris offe primo, alij duo articuli, qui sunt simul iuncti articuli quadraginta nouem; inter offa (vt patet) quadraginta tantum, ad diarthrosim reducuntur: quā quā aliqui ad enarthrosim specialiter, aliqui verò ad arthrodia (vt videbimus) .m. referendū sunt. Quadraginta tantum diximus, quāuis sint quadraginta & vnum: quia primā vertebrā in prima parte computauimus. Reliqui verò secundæ huius partis articuli sexaginta duo, puta vertebrarum, excepta prima, cūctarum aliarum viginti trium, vsq; ad offis sacri primum os, quæ sunt offa viginti quatuor, inter ipsorum corpora adiuuicē fiunt articuli quadraginta sex: præterea iugulorū cum scapularum acromijs, alij duo; costarūq; verarum cum tribus pectoris offibus, alij quatuordecim, qui sunt omnes predicti articuli sexaginta duo, inter offa quidem quadraginta quinque, ad synarthrosim pertinent: speciatim verò aliqui horum ad enarthrosim, aliqui verò ad arthrodia; alijq; ratione quadam ad ginglymon quodammodo spectant, vt postea quam species has definirimus ostendemus. .n. Omnes igitur huius secundæ partis articuli prædicti iam sunt numero centum & vndecim, inter offa quinquaginta quinque. Quāuis enim synarthroses inter offa sint quadraginta quinque; fieri dixerimus, quæ cū predictis quadraginta tantum, in quibus fiunt diarthroses, essent octoginta quinque. Nihilominus tamen aliqua replicantur, quæ ibi præfacta iam fuerant, præter quindecim scilicet quinque; vltimas ceruicis vertebrae, & alias quinque; lumborum cum primo sacri offis ossiculo, quæ sunt vndecim: duo quoq; scapularū acromia, & secundū, tertiamq; pectoris offa. Quāuis igitur secundæ huius partis synarthroses inter offa fiant quadraginta quinque, noua tamen offa in diarthrosi nō cōputata erunt duntaxat quindecim. Adeo vt benè penēs numerauerimus, secundæ partis offa, in quibus omnes articulationes fiunt, quinquaginta quinque; determinantes, omniūsim autem hic primam vertebram, vt diximus quam paulo ante in prima parte numerauimus. Item duo offa sacro annexa dimisimus, quia cum offibus secundæ partis nō articulantur, sed per synchondrosim coalescunt. Ideo nō amplius quinquaginta & octo, sed quinquaginta & quinque; diximus. Vertebrarū autē articulos ad synarthrosim reduximus ( præter primam cum secunda, & cum capite articulos) licet enim eorum omnium, vel multorū motus eusdētissimus, fallacissimq; sit: Adeo vt penēs ipsum quoq; Galenum, recentiorēq; Anatomistam nō temere ad diarthrosim reducatur: .n. Nihilominus tamen quia quilibet per se sumpta articulatio ( siue ad enarthrosim, siue ad arthrodiam, seu ginglymon referatur) difficillima, & obscura est: vt nullus vnquam demonstrare queat (velut in brachiorū, & crurum diarthrosibus) cuius nam vertebræ, aut particularis vertebrarum articuli motus ille sit: Nisi q̄ plures videmus articulos insimul moueri. Propter eā (vt antea quoq; tetigimus. p.) ad synarthrosim singulos vertebrarū articulos per se sumptos referre, nobis placuit. Sed ternam sceleti partem cōtemplemur, quæ est a scapulis ad extremas vsq; manus, articulos habens nonaginta quatuor, inter offa quidem noua, nec in precedenti parte numerata sexaginta, videlicet imprimis (dextra tantum parte cōsiderata, vt per eam sinistra quoq; intelligatur) humeri cum scapula, vnum; humeri cum cubito, vnum; humeri cum radio, vnum; vniq; cum radio, duos: Alterum scilicet supra, iuxta vniq; articulum: Alterum verò infra, propè carpum: Radij cum primo, & secundo offe brachialis, seu carpi, duos; vniq; cum brachialis offe tertio, vnum: Primi offis pollicis cū quito brachialis offe, vni; post brachialis offium cum primis quatuor digitorum offibus, quatuor. Offium digitorum inter se, decem. Sunt igitur huiusq; articuli viginti tres, inter offa viginti septē, omnes vt videbimus, ad diarthrosim relati: Totidem verò sunt in altero brachio, sic igitur erunt diarthroses quadraginta sex: quamquā speciatim nōnulli horum ad enarthrosim, nōnulli verò ad ginglymon pertinent. Præter hos autē & alij viginti quatuor articuli sunt, ad synarthrosim referendū, inter offa duodecim: videlicet offiū brachialis inter se, vndecim: hoc modo primi offis brachialis cū secundo, quinto, sexto, & septimo eiusdem. Adeo vt quatuor sint hæ articulationes. Item secundi cum tertio, & septimo, & sic alia: duæ sunt: præterea alia: quoq; duæ sunt tertij cum quarto, & octauo. Demum alia: tres sunt scilicet

Diarthroses 49. offa 40.

m. com. 13. & 14. Synarthroses 62. offa 25.

n. com. 13. 14. & 15.

o. vide infra 67. com. 1.

p. com. præfati post princ. Tertia pars art. 94. offa 60. Diarthroses 46.

Synarthroses 48.

32  
 scilicet quinti cum sexto, & sexti cum septimo, & septimi cū octauro. Sunt ergo omnes prædictæ articulationes ossium brachialis inter se vndecim, præter quas sunt & scilicet septem ossiū brachialis cum ossibus postbrachialis, videlicet primi ossis postbrachialis, quod indicem respicit, cū sexto brachialis osse, & quinto: sicq; duæ sunt articulationes. Præterea secundū ossis postbrachialis cū septimo, & obscure cū sexto brachialis, & sic alię duę sunt: veluti & alię duę tertij ossis postbrachialis cū octauro, & obscure cū septimo brachialis. Tandem vna est quarti ossis postbrachialis (quod scilicet auricularem digitum respicit) cum octauro brachialis: Adde vt septem huiusmodi postbrachialis cum brachialis articulationes sint. Deinde sex sunt postbrachialis ossium inter se. Etenim postbrachialis ossa quatuor sunt, ideoq; tria habent interualia, tresq; inde articulationes inter se, in parte superiore, tres verò etiam in parte inferiore. Igitur sex sunt. Qui cōiuncti cum vndecim prædictis ossium brachialis inter se articulis, & cū septem alijs ossium postbrachialis cū brachialis ossiculis, erūt omnes hi articuli ad synarthrosim (vt diximus) relati, viginti quatuor, inter ossa numero duodecim. Totidem verò cū sint in altero brachio, erūt omnes hę tertij partis synarthroses quadraginta & octo, sed omnes simul tertij partis articulos perpendamus. Hi ergo viginti quatuor, cū alijs prædictis viginti tribus ad diarthrosim spectatibus cōiuncti articuli sunt quadraginta septem, Inter ossa (vt patet) triginta nouem. Sed quoniam in altero latere, puta sinistro, sunt alij quadraginta septem similes articuli: Omnes igitur erunt insimul vtriusq; brachij pro tertia parte articuli synarthroses, & diarthroses, nonaginta quatuor: Inter ossa quidē, secundum prædictum numerum, septuaginta octo. Verum quia nonnulla sunt ossa, quę replentur, vt quę cum vno ossis per diarthrosim, cum alio per synarthrosim cōnectuntur: Ideo remouit huiusmodi ossium replicationes, restant solū ossa huiusmodi tertij partis sexaginta duo, videlicet scapula in altero latere vna, humerus vnus: radius vnus: vna vna: brachialis ossa octo: postbrachialisq; quatuor: quę sunt hucusq; sexdecim, additisq; deinceps digitorū ossibus quindocim, sicut omnia triginta, & vna. Totidem ergo cū in altero brachio sint. Reliquū est, vt omnia brachiorū ossa cum scapulis sint duo supra sexaginta. Nos verò circa principia huius tertij partis duntaxat sexaginta ossa, nō sexaginta duo posuimus. Vnde hæc igitur diuersitas: Respondeo quod cū scapulis ossa tertij partis sunt sexaginta duo. Sed quoniam igitur scapulae in secunda parte præparatae fuerant idcirco ea duntaxat tangendo, quę noua sunt, nec amplius (vt ibi diximus) in præcedenti parte numerata, remanebunt ossa tertij partis duntaxat sexaginta, in quib; articuli tam p̄ diarthrosim, quam per synarthrosim sunt. Quarta demū sceleris pars est, quę ab illis ossibus exorditur, quę sacro cōmittuntur ad pedes vsq;, articulos habens nonaginta quatuor, inter ossa quoq; sexaginta: videlicet (in altero prius erure nobis cōsiderantibus) coxendicis ossis cum femore articulum vnū: præterea femoris cū tibia, duos. Duplici enim enarthrosi potius, quā simplici ginglymo articulari cum femore tibiā decernimus (quamquā absurdum nō est, alia ratione, impropterea interim largęq; ginglymon quarto modo appellare): ad latera enim, & in gyrū in genu articulo tibia (quāuis occulte) mouetur: Quicquid nonnulli sapientes Anatomeici in oppositu scripserint: Minime interea animaduertentes & ubiq; cū iura articulationes, quę aliter frustra factę fuissent, & tendonū tibiā mouentū insertiones, ac illius præcipuē musculi situm, qui sub poplite occultatur, tibiā nō extorsim (vt aiunt nonnulli) sed introrsum, si recte perpendens, retrahens: vt pedem versus alteram tibiā reuoluat: quò vnū ambas tibiā, validiusq; firmari pedibus faciat. Enarthrosis ergo duplex est: sicut duo femoris capita in duos tibię sinus ingrediētia sunt, quę tamen in motu recte extensionis, flexionisq;, diarthrosicos species est: validissimum enim maximumq;, & euidentissimus motus ille est. In flexione verò laterali, & obliqua satis obscure, paruūq;, & difficilis motus inest. Adde vt nisi a femoris etiā musculis, ossibusq;, & articulis aduacetur, vix expleri, ac perfici posset. Huius itaq; obliqui motus ratione, ad synarthrosim refertur. Præter hos autem articulos, habet quarta hæc pars surę cum tibia duos, tali cum tibia, vnū: tali cum sura, vnū: tali cū calcē duos: tali cum scaphoide, vnū: scaphoidis cū tribus ossibus tarī, tres: calcis cum quarto osse tarī vocato cyboide, vnū: præterea omnī tarī ossium inter se, tres: quod ossū omnū cū quatuor ossibus tarī articulos octo, videlicet hoc modo, primi ossis pedij, quod pollicis respondet, cum primo osse tarī, vnū: Præterea secundi ossis pedij cū secundo, primo, & tertio osse tarī, tres. Adhuc tertij ossis pedij cum tertio osse tarī, vnū: Deinde quarti ossis pedij, cum quarto, & tertio oss: tarī, duos: Deniq; quinti ossis pedij cum quarto osse tarī vnū: Sunt ergo omnes hi pedij cum tarī articuli octo. Præter quos, ad hęc sunt articuli ossium pedij cum primis ossibus digitorū numero quinque: Item ossium pedij inter se articuli sunt alij octo. Quatuor enim eūm sunt ossium pedij interualia, quatuor quoq; erunt articuli supra, & alij quatuor infra (medijs interim partibus abiuuicem distantibus) sicq; sunt articuli octo. Deniq; quatuor digitorum pedis inter se, alij sunt articuli nouem: videlicet inter ossa prima, & secunda quatuor digitorum, sunt quatuor: Inter secunda, & tertiā eandē, alij quatuor articuli sunt. Et quia pollex pedis duobus tantum ossibus cōstat: propterea inter primū, & secundū os eius vnus tantum articulus est. Itaq;

Dubium.  
 Responso.

Quarta  
 part. art. 104  
 oss. 60.

Ginglymi  
 modos vi-  
 de infra  
 com. 16.  
 Cōtra Ve-  
 sulum.

in digitorum ossibus (vt dictum est) nomen articuli sunt. Omnesq; predictos articulos exquisitè connumerando, quadraginta septem esse alterius cruris inuenimus. Fòidem verbò eum sint in altero crure, reicit vt vtriusq; cruris, ac p hoc quartæ skeleti partis articulos esse nonaginta quatuor, còpertissimum sit. Inter ossa (vt patet) sexaginta, videlicet coxendicis vnum, femoris vnum; tibie vnum; suræ vnum; tali vnum; calcis vnum, scaphoidis vnum, tarso quatuor, pedij quinque; hæc digitorum quoc; pedis quatuordecim; vt sint omnia hæc ossa triginta, totidemq; in altero crure. Idcirco sunt omnia vtriusq; cruris ossa sexaginta. Includuntur enim in hoc numero duo ossa iñu: quæ cum secunda parte nõ cõiungebantur, quia nullam faciunt cum illius ossibus articulatione; licet alia ratione ad tertiam partem antea reduxerimus. Horum verbò quartæ partis articuloꝝ numero nonaginta quatuor aliquid sunt ad diarthrosim reducendi, in numero scilicet triginta octo; inter ossa quidem quadraginta & octo, videlicet coxendicis cum femore, articulus vnus: femoris cum tibia, duo: tali cum tibia, vnus: tali cum sura, vnus: pedij ossium cum primis digitorum ossibus, quinque. Præterea ossium digitoru inter se, nouem: Qui sunt omnes alterius cruris articuli undecim uiginti. Totidem verbò in altero crure inuenimus. Cunctæ igitur vtriusq; cruris diarthroses sunt numero triginta octo. Ossa verbò in altero duntaxat crure (vt patet) uiginti quatuor sunt, videlicet coxendix, femur, tibia, sura, talus, quæ sunt quinque; Item quinque; ossa pedij, & quatuordecim deniq; ossa digitorum, quæ simul iuncta uiginti quatuor sunt. In utroq; igitur crure simul erunt ossa (in quibus diarthroses sunt) quadraginta & octo: ipsè autè diarthroses (vti diximus) triginta & octo sunt. Aliæ verbò articulationes numero quinquaginta sex, inter ossa uiginti & octo, sunt synarthroses: uidelicet suræ cum tibia, due; tali cum calcæ, due; tali cum scaphoide, vna: scaphoidis cum tribus ossibus tarso, tres: cyboideis ossis cum calcæ, vna: tarso ossiu inter se, articulationes tres: pedij ossium cum tarso quidè, octo; pedij ossium inter se, iteru aliq; octo. Quæ sunt omnes cõarticulationes, synarthrosè uel uiginti & octo. Totidè verbò in altero crure sunt: Idcirco vtriusq; cruris, quartæ partis synarthroses esse quinquaginta sex, concludemus: inter ossa (vt diximus) uiginti & octo; uidelicet suræ vnun, tibie vnun, tali vnun, calcis vnũ, scaphoidis vnã, quæ sunt quinque; præterea tria ossa tarso, & cyboideis, sunt alia quatuor, & pedij quinque; sunt simul iuncta quatuordecim in uno crure: totidemq; sunt in altero: sicq; sunt ossa omnia in quartâ hac parte p synarthrosim cõarticulata numero uiginti & octo. Verum (vt antea quoq; tetigimus) mirum nõ est, si quartæ partis articuloꝝ ossium numeru stiblagenariu excedant, quæ nunc dicta iam sunt: scilicet per diarthrosim quadraginta & octo, & per synarthrosim alia uiginti & octo: ut sic dictu esse omnia septuaginta sex. Et enim mltæ replicantur in synarthrosi, quæ præsertim erunt in diarthrosi, cum ossibus quibuslibet per diarthrosim, alijs verbò per synarthrosim eadem cõiungantur, articuleturq;. Repetita igitur tanquã diuersis modis articulata sunt, sura, tibia, talus, pedij, ossa quinque; quæ sunt in utroq; crure sexdecim. His ergo deceptis noua sunt in synarthrosi duntaxat duodecim, in altero scilicet crure sex, ut calx, scaphoides, cyboideis, aliaq; tria ossa tarso. Hæc igitur duodecim cum predictis in diarthrosi quadraginta & octo, sexagenariu numeru non excedunt: sed ipsum adæquant. Predictarum verbò diarthrosion, & synarthrosion propter motu stetarum species quæ nam scilicet sint: An enarthroses, siue arthroses, uel ginglymi, postenitè elucidabimus. 4. Colligendo igitur articulos primæ partis octo, secundæ partis centu & undecim, uel centum & nouem: tertie partis nonaginta quatuor, & quartæ demum partis alios nonaginta quatuor, iam esse (ut ab initio proposuimus) articulos omnes trecentos & septem, alios saltem trecentos & quinque; cõpertissimum erit. Ossa verbò inter quæ articulationes sunt primæ partis siue undecim: secundæ partis quinquaginta quinque; Tertie verbò sexaginta, Quartæq; demum alia sexaginta, omnia simul iuncta erunt (prout ab initio quoq; determinauimus) centu & octoginta sex. His igitur prepositis, ad Galeni cõtextum cõuertamur dicentes. Eorum, quæ per articulu mouentur, Quædam per diarthrosim articulantur, quæ sunt ossa quidem centu quadraginta septem; diarthroses verbò centum triginta septem. Quædam verbò per synarthrosim connectuntur, suntq; ossa centu & tria: synarthroses verbò centum septuaginta. Ad eò ut sint articuli omnes (perinde ac predictu iam est) trecenti & septem, uel interdum trecenti & quinque. Ossa verbò, inter quæ tales articuli sunt, numero apparent, propter multoru præscriptas replicationes, duocenta quinquaginta: uerius autè, exquisitè ulq; singula perpendendo, sint duntaxat centum octoginta sex: quæ omnia studiosis clarissima sient, quæ præscripta hucusq; sunt exquisitissime, & per cingnaq; mentè contemplantibus, memoriq; deinceps mandatis, pro quorum ingenio, & exercitatio-

ne minutim sic scribere decreuimus: Verum enim uerò si cuncta exactis adhuc,

arthroses specie rum definitiones, & exempla perpendamus, ab

enarthrosi prima ambarum specie exordientes, quæ

ad varios motus alijs articulationibus

prestantior est.

Ἐνάρθρωσις μὲν ἐστὶν ὅταν πρὸς κολλῆται, ἢ συνδεδεγμένῃ βάσει ἵκανοί ἔχῃ καὶ ἢ ἐκκαταβαίνοντα κερ-  
αῖλαι ὑπέροχοι.

Enarthrosis igitur est, quum excipiens cavitas profunditatem sufficientem habet: capitq;, quod  
in eam inferitur, prominens existat.

## COMMENTVM TERTIVMDECIMVM.

κεφάλῃ, & κεφάλῃ caput significat. Illud scilicet, quod in alterius ossis cavitate inferitur,  
articulaturq;. Enarthrosis, latine inarticulationis, exempla, pro faciliore doctrina, eodē ordine  
prosequemur, quo in precedenti cōmento, & ossiū, & articulationū prius generatim, deincepsq;,  
speciatim de articulatione, & coarticulationē, Græcē diarthroseon, & synarthroseon numerū  
enucleavimus: Ipsū videlicet scēleton in quatuor partes dividētes, ac sigillatim singularū partium  
enarthroses ostendentes. Nec aliter in arthrodiē, & ginglymi interpretatione procedemus.  
Quinimodō enarthrosim prius elucidabimus, quæ diarthroses species est, motu magno, mani-  
festoq;, & valenti p̄dita: deinde aliam enarthrosim, quæ synarthroses species est, motu in quā  
partio, difficiliq;, & obscuro innixa, demonstrabimus: tam utriusq; enarthroses, quā ossium  
cas cōstitutivum numerū apponentes. Enarthrosis igitur quæ, & quid sit, & quomodo fiat, tam  
apertē à Galeno in presentī textu definita est, ut nostra interpretatione minime indigeat. Num-  
erum verō nos supplicamus enarthroseon, & ossiū (ut promissimus) omnes ergo enarthroses tam  
cum manifesto, quā cum occulto motu sunt nonaginta & sex: inter ossa cētum & vndeuginti  
v. g. ab ea enarthrosi exordientes, quæ cum magno, validoq;, ac manifesto motu sit, dicamus, q̄  
eiusmodi articulationes sunt quadraginta sex, inter ossa sexaginta septem. In prima si quidē parte  
sunt enarthroses duntaxat quatuor, inter ossa quinq;: videlicet capitis, hoc est, ossis occipiti  
cum prima vertebra, duæ: inter ossa quoq; duo. Item in inferioris mandibulæ cū duobus tēporum  
ossibus aliæ duæ, inter ossa tria: supponendo interim mandibulæ os vñū, simplexq;, nō duplex  
esse. Sic igitur in prima parte sunt inarticulationes (quas enarthroses cum manifesto motu dici-  
mus, quatuor, inter ossa quinq;: scilicet os occipitis, & primæ vertebræ. Itemq; duo temporum  
ossa, vñūq; demū inferioris maxillæ. In secūda parte nulla eiusmodi enarthrosis est. (Nisi velis  
duos iugulorū cum primo sterni osse ad enarthrosim reducere: Nobis tamen magis placuit inter  
arthrodias cōnumerasse.) Quāvis enim prima vertebra cui enarticulatur occiput; secūde sce-  
leti partis sit: ipsius tamen articulū, ratione ingredientis, suscepiq; capitis, p̄cedente cōmento  
in prima parte numeravimus. Sæ ergo & hic obseravimus. In tertia igitur parte alias enarthroses  
inquiramus, in qua viginti sex inueniemus, inter ossa quidē triginta sex: videlicet humeri cū  
scapula, enarthrosis vna est: humeri cum radio, vna: (in vno prius brachio tantum intelligimus)  
cubiti cū radio supra, infraq;, duæ. Quāquā alia ratione hæ duæ ad ginglymon reduci queunt,  
quatenus scilicet radius supra quidē à cubito recipitur: in frā verō e contra, radius cubitū recipit.  
Quemadmodum cōtrā de humeri articulatione cum cubito dici possit: quod scilicet duæ veluti  
quedā enarthroses sunt, dum cubitus suscipit humerū, & ab eo suscipitur. Sed quia vera gingly-  
mos illa, verāq; vnica articulatio est, ea in quā, quæ inter humerū, & cubitum sit: idcirco ad gin-  
glymi sermone ipsam referavimus, vñcā dūtaxat ibi numeratū. Ἔ. Has verō vñæ cū radio  
tanquā duas enarthroses hic supponentes: cum duæ in duobus locis articulationes sint. Sed alias  
prosequamur enarthroses: videlicet radij cū brachialis ossibus primo, & secūdo inarticulationes  
duæ sunt: cubiti cū brachialis osse tertio, vna: primi ossis pollicis cum quinto brachialis osse, vna:  
Secūdo ossis pollicis cum primo eiusdem pollicis osse, vna: Demū postbrachialis ossium cum  
primis quatuor digitorum ossibus inarticulationes, siue enarthroses quatuor. Sunt igitur alterius  
brachij enarthroses tredecim. Totidē verō sunt in altero brachio. Itaq; omnes tertie partis erunt  
inarticulationes viginti sex: Inter ossa (ut diximus) triginta sex, quæ scilicet sunt in vno brachio  
scapula, humerus, vna, radius, quæ sunt quatuor: Item primum, secundum, & tertium, & quintū  
os brachialis, quæ sunt alia quatuor. Adhuc primum & secundum os pollicis: sicq; sunt decem.  
Vltra sunt quatuor brachialis, & alia quatuor digitorū prima ossa: sicq; omnia sunt vnus brachij  
ossa inarticulata propter motū manifestū, duodeuiginti. Totidēq; in altero brachio. Qua de re  
tertie partis ossa inarticulata sunt triginta sex. In quarta demū parte sunt enarthroses sexdecim,  
inter ossa viginti sex: videlicet coxendicis cum femore, vna: femoris cum tibia, duæ. (Duas enim  
enarthroses posuimus cōmento etiā precedente. Præsertim quia tuberculum illud in medio duo-  
rum sinuum tibie emergens, propter validissimū pontis ligamentū, factū est, quod femur ipsū  
cum

Enarthro-  
sis quid.

Enarthro-  
sis cū mani-  
festo motu  
46. ossa 67.  
Prima pars  
Enarthro-  
sis quatuor  
ossa 5.

Secūda  
pars.  
Nihil.

Tertia pars  
Enarthro-  
sis 26. ossa  
36.

4. Com. 21.

Quarta  
pars.  
Enarthro-  
sis 26. ossa  
36.



cum tibia cōstringit: nō q̄ duorum femoris processū intermediū spatium articulatione repleat: quemadmodū in cubito videmus, & secundis, ac tertijs quatuor digitorum dearticulatio: in quibus verē simplex motus est: sicut verē gangly. nos illorum dearticulatio existit. Tibiꝯ verō cum femore articulatione si ganglymo factam esse cōtenderis, largē quiddē, & improprie potius talem fieri dicendum est propter id, quod iam iam predictū est. Vtraq̄ simplex eius motus non est, quia in latera quoq̄, & in gyrum, quāquā per aliam articulationē cum sura scilicet ipsius tibiæ factā synarthrosim obicurus, ac difficilis huiusmodi lateralis motus esse cōsentit te interim aliqua genu articuloꝝ laxitate.) At alias videamus in articulatione: præter dictas igitur sunt pedis ossū cum primis digitorum ossibus enarthroses quinque. Si bene igitur cōnuerſos, erunt quartę huius partis enarthroses, siue articulationes cum euidenti motu in altero crure octo. Totidē verō in altero crure sunt. Igitur omnes erunt sexdecim, inter ossa viginti sex: quę sunt, coxendicis, femoris, tibię quę sunt tria. Item quinque ossa pedis, & quinque ossa digitorū prima: sunt ergo in vno crure tredecim. Totidē verō sunt in altero crure. Itaq̄ sunt omnia quartę partis ossa, in quibus enarthroses manifestę sunt viginti sex. Colligendo igitur enarthroses primę partis quatuor, tertię partis viginti sex (in secunda enim deesse prædiximus) & quartę decimū sexdecim: erunt omnes totius scilicet, quę sunt cum manifesto, validoq̄ motu, vt diarthrosicos species dicatur, enarthroses quadraginta sex: inter ossa (vt patet) primę partis quinque; tertię partis triginta sex, & quartę viginti sex: vt sint omnia sexaginta septem. Tempus autē verō est, vt alias enarthroses consideremus, quę cum difficili occultoq̄ motu sunt, ac per hoc ad synarthrosim referantur: sunt igitur & hæc quiddē enarthroses numero quinquaginta, inter ossa quinquaginta duo. At particulatim eodē ordine in singulis quatuor scilicet partibus eas perpendamus, Numerumq̄, prius partium, deinceps verō totius colligamus. In prima igitur parte sunt enarthroses tantū duę, inter ossa quatuor: quę scilicet sunt in auditorio tympano inter malleum vocatū ossiculū, & in eodem. In vtraq̄ igitur aure sunt duę enarthroses, & ossa quatuor. In secunda parte sunt enarthroses viginti quatuor, inter ossa duo & viginti, v.g. sex costarū verarū, seu legitimarū (scilicet secundę, tertię, quartę, quintę, sextę, & septimę) cum item, seu tribus peſionis ossibus, in articulatione duodecim: videlicet sex in alterutra parte (quę quā Galenus, qui largius arthrodes nomen accēpit, ad arthrodes hos articulos reduxisse apparet.) At nos veras enarthroses esse determinamus: quia ossium apertam, altamq̄ cavitatē cōspicimus, & costarū insertas extremitates: Quę cavitates ita distributę sunt: videlicet ea, in quam secunda costa inseritur, in medio primi, & in eundē ossis peſionis in scilicet. Quę verō tertiā, quartā, quintā, sextāq̄ costas recipiunt cavitates in secundi ossis substantiā factę sunt. Quę demū septimā costā suscipiunt, in medio secundi, ac tertijs ossis sterni in scilicet. Præter has autem & alię duodecim sunt scilicet sex vtrinq̄: inter lumborum vertebrae inter se in usum, & cum duodecimā thoracis, atq̄ ossē etiam sacro. Sunt igitur secundę partis enarthroses viginti quatuor, inter ossa viginti duo, scilicet costas vtrinq̄; sex, quę sunt duodecim (præter primas, vtrinq̄, vna) ac tria peſionis ossa (in eate in quā prouidit.) Itemq̄ vertebrae thoracis duodecim, & lumborū quinq̄; ac ossis lateri primi. In tertia parte sunt in articulatione sexdecim, inter ossa etiā sexdecim: videlicet brachialis quorundam ossium inter se, vt primi cum secundo, quinto, sexto, & septimo: quę sunt in articulatione quatuor: præterea secundi ossis eundē brachialis cum septimo, vna. Item terti cum octauo, vna: & demū quinti cum sexto, vna: sunt ergo hæc omnes enarthroses septem: vtra est postbrachialis ossis, quod index respōdet, cum sexto brachialis, vna. Itaq̄ sunt octo: Totidē verō sunt in altero brachio: Ideoq̄ sunt sexdecim, inter ossa similiter sexdecim: videlicet primum, secundum, tertium, quintum, sextum, septimum, & octauū brachialis, quę sunt septem: postbrachialisq̄; vnum: sunt omnia ossa in altera manu octo: Totidē verō sunt in altera: igitur omnia simul ossa tertię partis, in quibus enarthroses occultę sunt, sexdecim. In quarta demū parte sunt enarthroses octo, inter ossa verō decem: videlicet fibulę, seu fusi ossis cum tibiā, scilicet parte inferiore, vna: Tali cum scaphoide, vna: sicq̄ sunt duę: præterea tali cum calcę, duę. sunt igitur quatuor, inter ossa (vt patet) quinque. Totidē verō in altero crure sunt: igitur omnes octo existunt. Inter ossa decē videlicet fibulam, tibiam, talum, scaphoidē, & calcem, quę sunt in vna parte, quinque: totidēq̄; in alia, sicq̄; sunt decē. Colligendo igitur primę partis enarthroses duas, secundę viginti quatuor; tertię sexdecim; quartę demū octo. Erunt omnes eiusmodi enarthroses, quę scilicet cum occulto, ac difficili sunt motu, numero quinquaginta: Inter ossa quiddē (vt patet) quinquaginta duo scilicet primę partis ossa quatuor: secundę partis viginti duo: tertię sexdecim, & quartę decē. Coniungamus ergo enarthroses omnes, quę cum valido, manifestoq̄ motu, & quę cum occulto sunt, omnes procul dubio esse inueniemus nonaginta & duo: inter ossa centū & vndeaginta: sed hæc de enarthrosi, prima quiddē tam diarthrosicos, quam synarthrosicos, speciem, dicta sint.

si bene in  
vno crure  
sunt tredecim

Enarthroses cum occulto motu  
16 ossa 11.  
Prima pars  
Enarthroses  
ossa quatuor

Secunda  
pars  
Enarthroses  
ossa 22.  
Costa Galeni  
\* infra cap.  
11. ubi 3.

tertię partis  
Enarthroses  
ossa 16

Quarta  
pars  
Enarthroses  
ossa 10.

Epiloga.

## TEXTVS QVARTVSDĒCIMVS.

Ἀρθροδία δὲ εἶναι ἔστι καλύπτου ἐπιπέδου, καὶ ἡ κεφαλὴ τῆς ἰσοπέδου.

Arthrodiā verò est, quàm cauitas superficialis sit, caputq; depressum.

## COMMENTVM QVARTVM DĒCIMVM.



DEO quidem depressum capitulū, cauitaq; lenis, ac superficialis arthrodiæ inest; vt interdū difficile sit iudicare quod nam iubeat, quodue recipiat. Hæc verò duplex est. Quædam enim species est diarthroseos, cum motu magno, euidentiq;, ac facili: Quædam verò synarthroseos species est, cum difficili, occultoq; motu consistens, ac minimo: vtraque, igitur proprijs exemplis ostendamus: Ac primò eam, quæ

diarthroseos species est, motumq; euidentem, magnūq;, ac facilem habet. Huiusmodi verò arthrodiæ articulationes ( quæ in totum sunt quinquaginta & vna: inter ossa quadraginta quinque; ) in prima parte nō adfunt, nisi eę, quę occultū motū habent: de quibus postea loquemur. Ad secūdam itaq; accedamus partem. In qua sunt arthrodię quadraginta nouem, inter ossa quadraginta & vnum: videlicet primę ceruicis vertebreg cum secūda, duę: secūde vertebreg dentis et primā vertebra, vna: sicq; sunt tres: præterea iugulorum cum primo pectoris osse arthrodię quodẽ duę. Item costarū cum dorſi vertebrarum corporibus, arthrodię viginti quatuor: sicuti costę quoq; viginti quatuor sunt. Item costarū cum eardem vertebrarū lateralibus processibus alia: vigintē. Etenim decem costę superiores duplicē ( vt antea diximus ) ad vertebras articulationē habent: Alteram scilicet cū corporibus vertebrarū dorſi: Alteram verò cū lateralibus processibus earūdem. Duę autem vitimę costę scilicet vndecima, & duodecima, eam quę ad vertebrarū processū referunt, articulationem non habent. Decem igitur quomodo sint hæ articulationes in quolibet parte fient omnes viginti. Quod si decima quoq; costa simplicem ( aliarum duarum inferiorum in ista ) articulationem obtinuerit, quemadmodū sepe sic accidisse cōpertum nobis est sicuti rariū, quā duplici: tunc erunt hæ costarū cum lateralib; processibus articulationes arthrodię vnde viginti. Nos autem frequenter viginti cōsequimur. Cum alijs ergo, quæ ad vertebrarū corporā referuntur viginti quatuor, erunt omnes quadraginta quatuor, cū tribus verò primę, ac secūde ceruicis arthrodijs ab initio itatim dictis arthrodijs, alijsq; etiā prædictis duabus iugulorum cū pectoris osse primo articulationibus erunt omnes quadraginta nouē: inter ossa ( vltimū præstatum est ) quadraginta & vnu: videlicet ceruicis vertebres duas, iugulos duos, primūq; pectoris os, quę sunt quinque: Itaq; duodecim dorſi vertebres, costaq; decimū viginti quatuor, quę sunt omnia quadraginta ossa, & vnum. In tertia scēleti parte nulla huiusmodi arthrodiā cum euidentē, faciliq; motu existit: Quocirca ad quartā partem deveniamus. In qua duę maximę arthrodiæ sunt scilicet tali cum ossibus. In quolibet enim tuba vna est inter ossa duo: vt sunt in vtroq; simul etur arthrodiæ duę inter ossa quatuor. Sunt igitur omnes totus scēleti arthrodiæ cum manifesto, validoq; motu quinquaginta & vna: scilicet secūde partis quadraginta nouē, quartęq; partes duę, in prima verò, & tertia parte nulla est inter ossa omnia quadraginta quinque. Sed aliam arthrodiā perpendamus, sūtil; exemplis etiā elucidemus, quæ synarthroseos species est, cum occulto scilicet, difficiliq; motu. Sunt enim huiusmodi per totum scēleton arthrodiæ cētum duodeuiginti, inter ossa septuaginta septem. In prima enim parte sunt arthrodiæ tantūm duę, videlicet in alterutra aure, vna ossis in eadem referentis cum staphoidē: sunt igitur duę, inter ossa ( vt patet ) quatuor. In secūda verò parte sunt difficilis motus arthrodię triginta & octo, inter ossa duobus et viginti quinque: videlicet vertebreg cum omnium ceruicis, præter primam, atq; etiam thoracis iuncturam inter se numero arthrodię triginta & quatuor. Etenim excepta ceruicis prima, duodeuiginti vertebreg remanent: omnis quodẽ lumbosum vertebres, erunt omnia hæc ossa decem & octo: inter quę cum sint interualla decem & septem, in quibus articulationes sunt decem & septem quoq; arthrodię fient, si quidem simpliciter articulerent. Quoniam verò duę sunt in quolibet interuallo ascendentiū, descendentiūq; processū articulationes: laterū quatuor supra triginta erunt arthrodiæ; inter ossa quodẽ ( vt iam dictum est ) decē & octo. Quod autē alij huiusmodi articulationes vertebreg inter se ad aliā arthrodię speciem referant scilicet quæ cum manifesto, faciliq; motu, ac valido, existit: Minime nobis obstat, singulas per se vertebrarum articulationes perpendentibus. Quarum processū motum ab alijs distinctum nullus vnquam ostendere nobis poterit: quāquā plium vertebrarum articulationū motus euidentissimus est. Sed enim ab arthrodię quidẽ definitione recedent articulationes, quę inter lumborum vertebres existunt, quatenus longē apertior recipientis cauitas, & illius, quod inseritur capitulum manifestus est. Ea propter

Arthrodiā cum motu manifesto  
5 ossa 45  
Prima pars nihil hęc  
Secunda pars arthrodiā 45 ossa 41

Com. 12.  
Arthrodiā cum motu manifesto  
5 ossa 45  
Prima pars nihil hęc  
Secunda pars arthrodiā 45 ossa 41

Tertia pars nihil hęc  
Quarta pars arthrodiæ 2 ossa quatuor  
Arthrodiæ cum motu occulto 8 ossa 77  
Prima pars arthrodiæ 2 ossa 4  
Secunda pars arthrodiæ 3 ossa 45

Arthrodię

in precedente cōmento eas potius inter enarthroses cōputauimus : (Quoniam apud Galenum arthrodiē dicebde veniant, largiōs quide arthrodiē nomen, quæ Vēsalus accēperet, vībrantem.) Præterea ad huiusmodi arthrodiā pertinent primæ vtriusq; costę chartilagīnū cum primo pectōris ossē articulatione duæ ( tamēti ad symphyisim hæc sepe in mīorē reduci dēbent, dūni costę cum ossē sterni primo coalescunt ) Item iugulorū ad ipsā quidē acromia alie arthrodię duę. Sunt igitur secundę huius partis arthrodię obicūrū motum edentes huiusq; iam dicte numero triginta & octo, inter ossa ( vt patet ) duntaxat viginti quinq; scilicet vertebrae duodecimginti, & primū os ipsius vocati sterni, duog; acromia, seu scapulas: sicq; sunt vni supra viginti præter quæ sunt alia quatuor: scilicet duę primę costę, duog; iugula: omnia igitur sunt ossa viginti quinq;. In tertia parte sunt huiusmodi arthrodię triginta: inter ossa viginti duos: videlicet quorundam ossū brachialis inter se, vt secūdi cum tertio, tertij cū quarto, & septimi cū octauo, quæ sunt arthrodię tres: Item quatuor postbrachialis ossium inter se, alie sex: tres inquam supra, tresq; alie infra. Item postbrachialis ossis illius, quod indies preponitur, cū quinto brachialis ossē articulo vni: quæ sunt huiusq; decem: præterea postbrachialis ossis illius, quod medio digito respondet, eam septimo, ac sexto brachialis ossē, alie duę: sicq; sunt duodecim: Item illius etiam postbrachialis ossis, quod anulari præfigitur, cū octauo, & septimo brachialis ossē, alie duę, vt sunt omnes predictę arthrodię quatuordecim, quibus tandem addas illius postbrachialis ossis, quod minimo digito respondet, cum octauo brachialis ossē arthrodiā vnam. Sunt igitur huius tertie partis arthrodiarū vno brachio quidēdecim. Totidē in vō in altero brachio existunt. Ideoq; simpliciter omnes tertie partis arthrodię erunt numero triginta: inter ossa ( vt prædictum quoq; est ) viginti duo, scilicet brachialis omnia, præter primū, quæ sunt septem, & quatuor postbrachialis: vt sunt omnia in altero brachio videlicet: totidēq; in altero brachio. Ideoq; sunt omnia tertie partis ossa, in quibus arthrodię sunt, numero viginti duo. In quarta demum parte sunt huiusmodi arthrodię quadraginta & octo: inter ossa duntaxat viginti sex, videlicet sunt cū tibia in parte superiore, vni ossium pedij cum quatuor ossibus tarsi, arthrodię octo ( prout supra præfite sumus iam est. f. ) scilicet primi ossis pedij, quod pollicis respondet, cum primo ossē tarsi: Item secundū ossis pedij cum secundo, primo, & tertio ossibus tarsi: præterea tertij ossis pedij cum tertio ossē tarsi, quæ sunt huiusq; arthrodię quinq;. Rursus quarti ossis pedij cū quarto, & tertio ossē tarsi, quæ sunt alie duę: octauaq; tandem quinti ossis pedij est cum quarto ossē tarsi: sunt igitur hæc omnes octo, cum precedente verō nouę. Quibus adde pedij ossium vni in altero brachio arthrodiā octo ( scilicet quatuor quidē supra, quatuorq; alias infra. Rursusq; ossis tarsi inter se, tres: sunt igitur huiusq; arthrodię viginti: præter quas sunt scaphoidis cum tribus ossibus tarsi, alie tres: ac demum cybois ossis cum calcē, vni: sicq; sunt omnes huiusmodi cum obicūro, difficultiq; motu arthrodię quærtę partis in altero crure viginti quatuor. Totidē verō sunt in altero crure: Igitur erunt omnes quadraginta octo. Inter ossa duntaxat viginti sex, videlicet pedij ( in altera inquam tibia ) quinq;, tarsi oīa quatuor, surę vnam; tibię vnam, scaphoidis vni, calcisq; tandem vnam: Quæ sunt simul iuncta tredecim: totidēq; in altera tibia. Erant igitur omnia quartę huius partis ossa, in quibus arthrodię occulte, quæ synarthroses species sunt, complentur, numero viginti sex. Colligentes ergo omnes huiusmodi arthrodiās in toto corpore inueniemus numero centum, & duodecimginti, videlicet primę partis duas: secundę triginta & octo, tertię triginta; quartę viginti quadraginta octo. Inter ossa septuaginta septem: scilicet primę partis quatuor, secundę viginti quinq; tertię viginti duo; quartęq; viginti sex. Quod si absolute de omnibus arthrodijs interrogēs: quot nam sint, viue manifestum, siue obicūrum motum edant. Ex ijs, quę præhærata iam sunt, repondebimus eas esse dicentes cunctas cētum sexaginta nouem, videlicet primas arthrodiās, quæ ad diarthrosim, ob manifestum motum, referuntur: cōmuniter quinquaginta & vnam; secundas verō, quæ scilicet ad synarthrosim pertinent, propter obicūrum, difficultatēq; vtrundem motum; centum duodecimginti: Itaq; sunt omnes simul iunctę arthrodię cētum & sexaginta & nouem. Inter ossa quidē omnia, in quibus sunt, cētum, & viginti duo, scilicet primarum arthrodiarum ossa quadraginta quinq; secundarum verō septuaginta septem. Sed enimerō quoniam tribus vsus est nōmīnib; Galenus in præsentī cōtextu, videlicet [ prominens, depressus, & caput ] superius verō duobus alijs vsus est: scilicet [ ceryx, & corone ] præterea duo alia sunt: scilicet [ cotyle, siue acetabulum, & glenē. ] Alta enim cauitas, cotyle Gręcę; latinē autem [ acetabulum ] lenis verō cauitas, glenē, latinē oculus, seu pupilla ab interpretibus nōnnullis nōnnumquam nuncupatur: Hęc autem vocabula, seu nomina septem non omnibus in articulis sunt nota sunt, præsertimq; tyronibus; ad quos ipse liberum hunc nōnnumquam dirigat: Ea propterea pro sequentis, necdū præscriptę doctrinę claritate, statim horum septem nominū significaciones describit, sic subdens.

TEXTVS QVINTVS DECIMVS

Καλι δὲ κρυφαίαι, καὶ ταπεινὰ κεφάλαια, ἢ τῶν ἀπὸ τῆς ἀφύπνου ἑστῶτος καὶ ἢ τῶν ἀπὸ τῆς ἀφύπνου ἑστῶτος, ἢ τῶν ἀπὸ τῆς ἀφύπνου ἑστῶτος. ἢ τῶν ἀπὸ τῆς ἀφύπνου ἑστῶτος. ἢ τῶν ἀπὸ τῆς ἀφύπνου ἑστῶτος.

Voco autem prominentes, & depressum caput, ad cervicis, quibus adnascitur: ut in quo referentur cervicis autem tenues ossium sunt procelus. Terminantur autem ut crassius, orbiculatumque; extremum, quod sane caput nominatur. Quoties verò in mucrone procelus finit, nõ data ceruix, sed corone nuncupatur. Nil autem distert, si coronam dixeris. Sed & cavitatum capitum exceptioniam, quæ præfandi est, cotyle nominatur (et hęc nomen id medicis omnibus vitatum) & superficialis autem, à nonnullis glene appellata est.

COMMENTVM QVINTVM DECIMVM

**Q**UANTVS **VAN** VIS caput, cervix, corone, cotyle, & glene, superciliag, procelus, apphysia sunt generalis tamen relectis nomine, ubi præsertim cum alijs articulatium proprijs designantur, prominentes verò, siue (vt alij interpretantur) oblongi, ac conitrario depresso sunt caput, siue capitulum appellat inquit, ad cervicis factis singulorũ relatione. Id quod bisariam intelligi potest, primo videlicet, qd si cervix oblonga sit, prominensq, oblongũ quoque, seu prominens ipsum caput in aliquem sinum inferi dicimus. Sin verò cervix brevissima, & minima, vel nulla fortassis evidens sit, depressum nos caput inferi determinamus. Est autem aperte oblonga cervix, & capitũ, crassius, & orbiculatum in rebus præcipue pæthib, videlicet in femoris parte superiore, qua cum coxæ digiti profundo sinu dearticulatur. Sic in inferioris maxillæ posterioribus processibus, quibus cũ temporis ossibus ea cõstruitur. Quemadmodum & in tale, qua parte in caput desinens cum scaphoide osse articulat. Depressum verò cervicem dicimus, ubi vel nulla, vel brevissima existit: quemadmodum in quasundã vertebrarum processib; apparet, quibus inter se articulatur. Secundę enim vertebrę superioribus capitibus, quę in primę vertebre superficialis sinus per arthrodia inseruntur, nulla cervix subsiecta designari potest. Adiar verò vertebrarũ processib; (siue superiorũ, vt in collo, ac doelo contingit, siue inferiorũ, vt in lumbibus pæth) capita suis densibus innaferunt. Quę tamen cervicis nõ brevis modo sunt: sed vsq; adeo vntem osiue, vt nil cas exquirat in pætre conentis, abesse determinationis: omnium tamen colli (excepit primis duab;) ac thoricis quoque (duodecima excepta) vertebrarũ superiores processus caput ex ceruce pronatũ habent. Quam in singulis ceruicib; anaducentes, si quide illas vertebra ex anteriore parte conspexeris: longiorem verò, ac euidemore cervicem habentis asfiores, descendentesque vertebrarũ lumborũ processus. Quam quide tam ex anteriore, quam ex posteriore parte perspicuens, facillimẽ cognoscet. Quod si labor aliquandũ ceruix est, qua caput, grossius tamen id ipsum, ac quodammodo orbiculatũ existit. Verum emiauerũ digne aduertendũ, hic est horum procelus, præcipueq; lumborũ cervicis plurimas esse manifeste longas: omnia tamen capitula satis depressa existens. Adeo vt verũ non sit, si ceruix oblonga est, caput quoque oblongũ necessariõ dicendum fore. Id quod in costis quoque cõfirmatur, duplex capitulũ super oblonga ceruice, depressũ: tamen singulis, posteriore in parte habentibus. Ex quo per arthrodia dearticulati, præstensum iana est: si nulli quoque, ceruicẽ caput, seu capitulum adnascatur (vt de secunda vertebrę superiorũ capitulis prædicamus, que cum primę vertebrę inferis, superficialib; cauatibus per arthrodia dearticulantur), quomodo capitulũ illud depressũ dici potest, ad ceruicẽ delatum? præsertim quia multa huiusmodi capitula sine ceruicibus inueniuntur: quisquam nulla sine capite, vel capiti simili dilatatione ceruix dici vnquã potest? Quam enim assignabimus cervicem in ipsis iugibus, siue ubi cũ scapula, siue ubi cum pectoris osse primo per arthrodia articulantur? Quomodo igitur ad ceruicem cõparantes depressum caput in illis dicemus? Id quod in pluribus quoque alijs ossibus conuicit, desinit; apparet: præcedens enim capitũ, seu uelud dicimus, occipitis processus, quibus cũ prima vertebrã dearticulatur, prominentia enim capita sunt, in illis nullis tamen cervicẽ adnascantur. Sed quã ceruicẽ in brachialis ac tarũ ossibus assignabis? Nec aliter de primo pollicis osse, vt inq; scilicet dicendũ arbitror, tam quã superius cum quinto brachialis osse, quam etiam inferius, ubi cũ secundo eiusdem pollicis osse per enarthrosim dearticulatur. Nullibi enim ceruicẽ designare ponimus. Idem verò de manus, ac pedis digitorũ ossibus omnibus dicendũ venit: ubi per manifestũ motus ginglymon inter se dearticulantur. Nullibi

Prominens. Depressio prima. Oblonga ceruix.

Depressa ceruix.

Obiectis. Longa ceruix, caput tamen depressum. Nulla ceruix caput tamen depressum.

Nulla ceruix caput tamen prominens.

enunsi ingredients capitis ceruicem designare potuimus. Sed neq; in calce ceruix vlla nota potest, qua scilicet parte posteriore in talibus cauitate inferiori. Quammodò neq; in anteriore scaphoidis regione, qua cum tribus tarsii ossibus, horumq; superficialibus cauitatibus per arthrodiam articuletur; præterea in femoris parte inferiore, vbi eum tibia ossis duplici enarthrosi (vt diximus a.) dearticulatur, nullam potens ceruicem indigitare. Nisi totum os femoris ceruicem appellas; quod contra ceruicis definitionem est, tenuit processum esse, cuius caput grossius, orbiculatumq; sit, declarantem; At scitur à sin fere mediocritate ad grossius, latiusq; versus prædictum caput tendit, nulliq; tenus processus ibi adest. Sed quare itrem ceruix in superiore tibiae parte, qua eam humo articuletur, & in eius leuam sinu per arthrodiam inferiori, assignari potest? Rursusq; in parte inferiore ipsius iuris; vbi in tibiae euadente cauitate per occultu motu enarthrosim in iertitur, atq; vbi etià eù tivo, per manifestu motu arthrodiam articuletur, quam poterit ceruicem indigitare? Nisi tibiae, & fere propinquas capiti partes, ceruices nuncupare velis. Quod cum nō falsissimū est; ceruix eam (vt in præfati iam est.) tenus osium processus est; Ille autē partes grossiores sūt, quam ossa mediū. Ad eò vt caput versus, in grossando potius os ipsum procedat, nullam interea tenuit processum emittens; Nullam quoq; ex humen suprema parte, ceruicem assignari posse, deinceps loco proprio declarabimus: scilicet caput tamen prominens est, oblongumq; Ad eò vt per enarthrosim cum cuiusdā scapulae cauitate articuletur. Deniq; in septem vtriusq; chartilaginū verumq; costarū cum pedoris ossibus per occultu motu enarthrosim facta coarticulatione, que pā descendā ceruix veniūt; Nisi totam chartilaginé velis ceruicē appellare; sed tunc vlti q; tenus osium processus nō est; Neq; capitū etiā de natio chartilaginis extrinsecati cōgruit; Ita; si multa sūt capita in articulis ipsi abiq; ceruice, quomodo prominētia, vel oblonga, siue depressa per oppositū diē ad ceruicē relata questū; præcitat igitur Galeni inuenis; si quide eius in hoc loco sententiā minimē cōprobamus; q; scilicet ad ceruicē rēferentes, oblongū, aut depressam caput, (nisi rarissimē) dicimus. Cū plurima ossa sint caput sine ceruicē habentia; illud tamen caput vel depressū (vt in arthrodia) vel prominētia, oblongumq; (vt in enarthrosim) existens; vltiq; ex iam iam prælibatis cōpertissimū est. Quāamō in his, quibus aliqua ceruix subesse apparet, vera non est istius expositio, quā à principio statim huius cōmēnti nos posuimus, videlicet quod si ceruix oblonga si t, oblongū quoq; sin ceruix depressa, depressū quoq; caput nuncupandū esset. Et enim huic caputū inferius, quod cum radio dearticulatur etiam per manifestu motu enarthrosim prominens est; ceruix tamen eius depressissima. Præter istō cōplicimus; in pedij ossibus quinq; præcipueq; illo, quod pollicis præfertur. Et in ipsius etiā posthæchialis ossibus quatuor, capitula sūt, que per manifestissimū motu enarthrosim cū primis digitorū ossibus dearticulatur. Ad eò vt oblonga, prominētiaq; capitula dicenda veniant ceruices tamē horū brevissimæ, & depressissimæ sūt. Quid igitur hic pro Galeni excusatione, verborūq; eius elucidatione dicendū est? An forte inconstitū quamprimum cōdennandus ipse veniūt An aliam obdis suōti verborū interpretationē subiungentibus potius (vt dicit, plurimq; magis est) excusandus; ac liberandus ab omnibus aduerlatu calūniis est? Ent igitur alia potius acceptanda expositio: quā scilicet inquit [ Voco autē prominens, siue oblongū, & depressū caput, ad ceruices, quibus adnascuntur, vtrumq; referens ] Ad ceruicē intelligendū, nō eo modo, quo diēb; prius est, scilicet si ceruix oblonga sit, vel depressa, quāto caput oblongū, vel depressū dicendū sit. Falsū enim esse id, præostensū iam quamplurimis exemplis est: sed ad ceruicē referens q; d. (si ceruix adest) oblongū, prominētiaq; caput dicimus, quod à ceruicē incipiens, oblongū prominētiaq; est q; d. multa à ceruicē procedens extra ad verticem vsq; protenditur. Quod verò extra ceruicem quamminimè protuberat, illud depressū est nuncupandū. Sic igitur & de humen capite inferiore profarendū, q; præfati ceruix brevissima est, ac per hoc depressissima; Nihilominus tamen à ceruico statim recedens, in oblongū, euidētiq; tuberculū extenditur, protuberatq;. Sic verò etiā de posthæchialis, ac pedij ossium inferius capitūb; determinandū. An quib; verò à ceruicē statim ossis protuberantia illa; ad eò vt vix euidens tumor fiat, depressū illud caput nominandū hresator minamus. At quid de his, que striatē desistuntur capitibus sentiendū? Correlatiua enim ambo ad ea existentia sūt esse debent. Ad id verò, quod nō est, nulla relatio fieri potest. Quomodo igitur ad ceruicem relatio fieri dicitur, vbi nulla ceruix adest? Respondētis; p;ro Galeni excusatione, dicentes, q; verè ad ceruicē referimus in omnibus his, in quibus iam ceruix adest. In quibus verò ceruix desideratur: In his quodammodo ad ceruicē relatus q; d. ad ipō ceruicis, hoc est, itaq; si ceruix ibi adest (cū hanc sūt finit, quando caput incipit) ab eo loco oblongū, vel depressū mensuratur: Maximè quia caput huic præcellit os, quod tamen si ceruix verè nō est, quodāmodo tamen a ceruice rationē habet. Sic præfctō Galeni medicoru hūmā defendere potuimus. Quod si tibi nostra respōsiō displicet; utiq; p;roculdubio fuerit eum (vt libet) in p;te cōdennare; Idipsum tamen intersā annotabimus; caput sine ceruice, nō propriū caput, sed tuberc; aut protuberationē, siue tuberculū, siue promi-

L. Gomar. & l. h. utom

vt ob. l. 1. q. 2. r. 1. d. 2. r. 2. d. 2. r. 3. d. 2. r. 4. d. 2. r. 5. d. 2. r. 6. d. 2. r. 7. d. 2. r. 8. d. 2. r. 9. d. 2. r. 10. d. 2. r. 11. d. 2. r. 12. d. 2. r. 13. d. 2. r. 14. d. 2. r. 15. d. 2. r. 16. d. 2. r. 17. d. 2. r. 18. d. 2. r. 19. d. 2. r. 20. d. 2. r. 21. d. 2. r. 22. d. 2. r. 23. d. 2. r. 24. d. 2. r. 25. d. 2. r. 26. d. 2. r. 27. d. 2. r. 28. d. 2. r. 29. d. 2. r. 30. d. 2. r. 31. d. 2. r. 32. d. 2. r. 33. d. 2. r. 34. d. 2. r. 35. d. 2. r. 36. d. 2. r. 37. d. 2. r. 38. d. 2. r. 39. d. 2. r. 40. d. 2. r. 41. d. 2. r. 42. d. 2. r. 43. d. 2. r. 44. d. 2. r. 45. d. 2. r. 46. d. 2. r. 47. d. 2. r. 48. d. 2. r. 49. d. 2. r. 50. d. 2. r. 51. d. 2. r. 52. d. 2. r. 53. d. 2. r. 54. d. 2. r. 55. d. 2. r. 56. d. 2. r. 57. d. 2. r. 58. d. 2. r. 59. d. 2. r. 60. d. 2. r. 61. d. 2. r. 62. d. 2. r. 63. d. 2. r. 64. d. 2. r. 65. d. 2. r. 66. d. 2. r. 67. d. 2. r. 68. d. 2. r. 69. d. 2. r. 70. d. 2. r. 71. d. 2. r. 72. d. 2. r. 73. d. 2. r. 74. d. 2. r. 75. d. 2. r. 76. d. 2. r. 77. d. 2. r. 78. d. 2. r. 79. d. 2. r. 80. d. 2. r. 81. d. 2. r. 82. d. 2. r. 83. d. 2. r. 84. d. 2. r. 85. d. 2. r. 86. d. 2. r. 87. d. 2. r. 88. d. 2. r. 89. d. 2. r. 90. d. 2. r. 91. d. 2. r. 92. d. 2. r. 93. d. 2. r. 94. d. 2. r. 95. d. 2. r. 96. d. 2. r. 97. d. 2. r. 98. d. 2. r. 99. d. 2. r. 100. d. 2.

Depressa ceruix ca put tamen oblongū.

Obiectio nis solutio.

Expositio secunda.

Obiectio nis solutio.

Expositio secunda.

Obiectio nis solutio.

Expositio secunda.

Obiectio nis solutio.

mentiam potius nominandū, aut gibbositate, seu cōuexitate: Quatenus uerō in ipsa articulatione alterū, quod inseritur, & penuriosē capitis nomen apud veteres obtinuit: Eapropter nos quoq; cum Galeno caput hoc in libro muncupabimus, siue oblongū, prominentius, siue depressum sit. Quamquā propiē magis loquendo, caput, Græcè κεφαλή, de oblongo; prominentiq; duntaxat ossis tubere, quod in κωνίω, hoc est, acetabulo inseritur, alibi Galenus intellexit: Depressum interea tuberculo, quod in τάλω, hoc est, oculū, siue pupillā ingreditur, non caput, seu capitulum, sed condylum appellans: Quamobrem sic dicebat [ Vocaturus est cōuexitas, & glene, & præterea coryle, cōuexitas autē, caput, & condylus: Tantū autē coryle, quam glene est profundior, quanto caput condylo est longius; utriusq; enim utriusq;, uelut cardini locū apponit Natura cōparauit, &c.] Ita & aliquando ꝑ Galenus idem condylus pro omni epite generatim sumit. Sicuti nōnūquā ꝑ ualidū etiā significatiōibꝫ usurpauit; perindeq; nosahī uerissime declarauimus: Nunc uerō ad textū præsentem cōuertamur. Quauis enim ad caput referri ceruicē, & eontrā, præteritū iam sit: Interdum tamen tenuis processus in latius, scilicet distensum, sinuūq; seu acetabulo constitutus ceruicē. Græcè κωνίω, & τάλω ab Anatomicis nuncupari solent: cuiusmodi scapule os, quā cū humero dearticulatur, ostendit. Quauis etiā rebus hic definit coronam, siue coronam Galenus: Minus tamen rectē hanc definitionē in sequentibus obseruat. Vbi nō solum ac in libro etiā de anatomicis administratiōibus quarto, d. occipitis ossis tubercula, scilicet primum uertebra dearticulatur coronam, siue coronam appellat. Dicitur autem τάλω, & κωνίω ꝑ ꝑ. & κωνίω n. g. latinē ceruicē; uel coronam. Verū cum reliqua omnia; que Galenus refert, ualidissima sint, unam duntaxat nomen interpretatiōe indigens elucidabimus: scilicet τάλω: Vnde dicitur, translatusq; tale nomen sic Clarum nanq; de κωνίω, hoc est, acetabulo diuulgaturā (acceptabulum alij proferunt, Græcèq; etiam κωνίω δύνω) & τάλω δύνω) quod ob mensuram genere transumptum est; quod in suis profundā cauitate recipit olei dragmas decem & octo; uini autē unciās duas, uel semissem, scilicet dragmas uiginti & mellisq; idemum dragmas uiginti septem. At glene apud Græcos duo ad propositum spectantia præferere: scilicet oculum, siue pupillā (unde nōnulli pupillā) Alij uerō ocularem sinum latine interpretantur) & suū ab apibus cōstruendum. Magis uerō mali ardet ab his utriusq; paruis (acetabuli respositi) canitibus, quā ab oculis, multoq; magis, quā à pupilla desumptā est: glene nomenclaturā. Nisi pupillæ nomine est intellexerimus cauitatem, que sub cornæ post rugosidē foramen existit a quosum humoreū sustinetis: Haud quaquā tamen interea uis cōstaret, quoniā in textū, secundū Balami interpretatiōem, dicitur [ab ocularis sinus similitudine] uerba enim hæc tam hie, quā in alijs quoq; pluribus similibus locis, præsertimq; in libris de uis partū, & nō Galeni, sed interpretū nuge sanie: Qui etiā aliquando d. pupillā latine interpretantur. Sunt autē & alia nomina articuloꝝ gratiā imposita, ut τάλω, & κωνίω, & κωνίω, & κωνίω; que latinis superollia; & claria dicuntur. Sic κωνίω, & que postorius cū Galeno etiā ipso declarabuntur. Sed e nimis uerō cūm tres esse tam diarthroseos, quā in arthrosee species prædictū sit: scilicet anarthrosi; arthrosidē; & ginglymon. Duas autē primas species iam enucleauerimus: Reliquum est, ut ad tertiam species; scilicet ginglymon definitionem cum Galeno accedamus, dum sic statim subdit: [ τάλω δύνω] & κωνίω δύνω] & κωνίω δύνω] & κωνίω δύνω]

a. Lib. 1. de motu musculorum cap. 9. post secundū. ꝑ. 11. de uis part. cap. 18. circa euasē ꝑ. 2. Lib. de uis part. natura sec. 14. & 15. Coronæ. a. Ista cap. 7. de uis part. cap. 8. circa prim. Cōtra Galenum. κωνίω uide dicit. τάλω uide dicit.

c. I. lib. 2. cap. 11. & 25. & hie infra c. 7. & alibi sæpē. d. de fractis com. 11. & 2. de motu muscul. cap. 9.

mentiam potius nominandū, aut gibbositate, seu cōuexitate: Quatenus uerō in ipsa articulatione alterū, quod inseritur, & penuriosē capitis nomen apud veteres obtinuit: Eapropter nos quoq; cum Galeno caput hoc in libro muncupabimus, siue oblongū, prominentius, siue depressum sit. Quamquā propiē magis loquendo, caput, Græcè κεφαλή, de oblongo; prominentiq; duntaxat ossis tubere, quod in κωνίω, hoc est, acetabulo inseritur, alibi Galenus intellexit: Depressum interea tuberculo, quod in τάλω, hoc est, oculū, siue pupillā ingreditur, non caput, seu capitulum, sed condylum appellans: Quamobrem sic dicebat [ Vocaturus est cōuexitas, & glene, & præterea coryle, cōuexitas autē, caput, & condylus: Tantū autē coryle, quam glene est profundior, quanto caput condylo est longius; utriusq; enim utriusq;, uelut cardini locū apponit Natura cōparauit, &c.] Ita & aliquando ꝑ Galenus idem condylus pro omni epite generatim sumit. Sicuti nōnūquā ꝑ ualidū etiā significatiōibꝫ usurpauit; perindeq; nosahī uerissime declarauimus: Nunc uerō ad textū præsentem cōuertamur. Quauis enim ad caput referri ceruicē, & eontrā, præteritū iam sit: Interdum tamen tenuis processus in latius, scilicet distensum, sinuūq; seu acetabulo constitutus ceruicē. Græcè κωνίω, & τάλω ab Anatomicis nuncupari solent: cuiusmodi scapule os, quā cū humero dearticulatur, ostendit. Quauis etiā rebus hic definit coronam, siue coronam Galenus: Minus tamen rectē hanc definitionē in sequentibus obseruat. Vbi nō solum ac in libro etiā de anatomicis administratiōibus quarto, d. occipitis ossis tubercula, scilicet primum uertebra dearticulatur coronam, siue coronam appellat. Dicitur autem τάλω, & κωνίω ꝑ ꝑ. & κωνίω n. g. latinē ceruicē; uel coronam. Verū cum reliqua omnia; que Galenus refert, ualidissima sint, unam duntaxat nomen interpretatiōe indigens elucidabimus: scilicet τάλω: Vnde dicitur, translatusq; tale nomen sic Clarum nanq; de κωνίω, hoc est, acetabulo diuulgaturā (acceptabulum alij proferunt, Græcèq; etiam κωνίω δύνω) & τάλω δύνω) quod ob mensuram genere transumptum est; quod in suis profundā cauitate recipit olei dragmas decem & octo; uini autē unciās duas, uel semissem, scilicet dragmas uiginti & mellisq; idemum dragmas uiginti septem. At glene apud Græcos duo ad propositum spectantia præferere: scilicet oculum, siue pupillā (unde nōnulli pupillā) Alij uerō ocularem sinum latine interpretantur) & suū ab apibus cōstruendum. Magis uerō mali ardet ab his utriusq; paruis (acetabuli respositi) canitibus, quā ab oculis, multoq; magis, quā à pupilla desumptā est: glene nomenclaturā. Nisi pupillæ nomine est intellexerimus cauitatem, que sub cornæ post rugosidē foramen existit a quosum humoreū sustinetis: Haud quaquā tamen interea uis cōstaret, quoniā in textū, secundū Balami interpretatiōem, dicitur [ab ocularis sinus similitudine] uerba enim hæc tam hie, quā in alijs quoq; pluribus similibus locis, præsertimq; in libris de uis partū, & nō Galeni, sed interpretū nuge sanie: Qui etiā aliquando d. pupillā latine interpretantur. Sunt autē & alia nomina articuloꝝ gratiā imposita, ut τάλω, & κωνίω, & κωνίω, & κωνίω; que latinis superollia; & claria dicuntur. Sic κωνίω, & que postorius cū Galeno etiā ipso declarabuntur. Sed e nimis uerō cūm tres esse tam diarthroseos, quā in arthrosee species prædictū sit: scilicet anarthrosi; arthrosidē; & ginglymon. Duas autē primas species iam enucleauerimus: Reliquum est, ut ad tertiam species; scilicet ginglymon definitionem cum Galeno accedamus, dum sic statim subdit: [ τάλω δύνω] & κωνίω δύνω] & κωνίω δύνω] & κωνίω δύνω]

TEXTVS SEXTVS DE CIMVS.

Tertia uerō diarthroseos species, quam ginglymon uocari dicebamus, ossibus sese inuicem ingrediendo cōstruetis, sic. Quemadmodum in uertebra, cubitiq; ad humerū de articulatione sic habet. Differentiaq; in his quatuor est. Nam in uertebis, media mutuū ingressum est utraq; circumstante; humerū uerō, cubitiq; inuicem faciunt. [ τάλω δύνω] & κωνίω δύνω] & κωνίω δύνω] & κωνίω δύνω]

COMMENTVM SEXTVM DE CIMVM.

**D**UPLEX EM Galenus hic ginglymon statuit: Alterā quidē largē, & quā si improprie sumpta, quæ inter uertebra accidit: Alterā uerō, quæ propriè in ginglymon dicenda uenit, inter humerū, cubitiq; proprie dictū cōtingens. Nos autē & aliam adiungentis, quæ tanquā propria quidē ginglymon est, Minus tamen proprie, quā ea, quæ inter humerū, cubitiq; sit: Estq; hæc que inter ipsum cubiti, & radiū, atq; etiā inter tibiam, & suram duplex facta articulatio cōtingit. Adduntq; nōnulli quartā, quā largissime, atq; impro-

Ginglymon quatuor.



improprijissime ginglymon appellare potuimus: vt quæ inter superiorũ vertebraũ descendentes cum ascendentibus inferiorũ proceffibus vtrinq; articulo facta est. Quas ob res quadrifariam dici ginglymos potest, scilicet primò proprijsimè: secundò minus propriè tertio largè, siue improprie: quarto; demùm largissimè, atq; improprijissimè. Nec indecens erit quinto modum ex Celio (vt videbitur) adiungere. Qua quidè preposita ginglymi distinctio, quã facillimè Galenũ ad aduerfantũ recentiorũ calumnias tuebitur. Ab omniũ igitur proprijsimũ, vcrissimũq; ginglymo a partibus exordientes, eam sic definiemus: videlicet qd est duorũ ossium mutua, simpliciq; articulo, qua seie inuicem mutua infortione (hõstiorũ caridinis instar) ingredientia cõponuntur, ad simplicissimũ quidè motum ordinata. Ad eò vt huius gibba, caputũ in illius ossis cauitate subintret: Illiusq; simul gibba, caputũ in huius cauitate inieratur. Sicq; simul, atq; vniũ articulatione vtrinq; recipiendo recipiatur. Quæ quidem proprijsima ginglymos nullibi manifestior est, quã in humeri cum cubito articulatione, constructioneq; deincepsq; in triginta sex digitorum tam manũ, quã pedum articulis: videlicet in quatuor digitorum vtriusq; manus, & pedis secundis, & tertijs, pollicis verò manus duntaxat tertio, pollicisq; demùm pedis sãtis inscundo, articulus apparet. Secũda ginglymi species, quæ tamen minus propriè talis dicenda venisset, ad simplicissimũ quidè motum ordinata. Ad eò vt huius caput in illius ossis cauitate inieratur, illiusq; alterus caput, alio quam uis articulo, in huius cauitate subintret. Sicq; simul vtrinq; suscipiendo, suscipiatur: In diuersis tamen partibus, diuersisq; etiã articulis. Hæc; si non ita, sicut predicta, proprijsimè propriè tamen, ob mutuũ duorũ ossium ingressum, simplicemq; motum, ginglymos, latinè cardo, siue cardinatus nuncupanda inter cubitũ, & radium, interq; iuram, & tibiam euidentissima est: supra enim propè cubiti articulo vna radium recipit: Infra verò propè carpi, ad hoc illa recipitur: sic verò etiã de tibia, & sura dicendũ. Supra enim tibia sura ingroditur: Infra verò e contra sura tibiã cauitate subintret. Quoniã verò duplex, & in distantibus partibus, nõ simplex articulo existit: propterea nos duas inter cubitũ, & radium, atq; eam quoq; in parte inferiori ipsius suræ, quã tibiã ingredientur, tres in quã has per se distinctas inter enarthroses, & aliam verò tanquã quartã, quæ in superiore tibiæ parte est, vbi tibiã a sura suscipi cõtingit, inter arthrodias connumeramus. Hanc eandem inter calcem cum talo cõtinuã obiciamus. Tertia autè ginglymi species est, largè atq; improprie talia nuncupata. Quatenus enim idem os suscipit, suscipiturq; ginglymos appellatur. Quatenus verò nõ duorum ossium mutuus ingressus est; sed trium: largè, atq; improprie potius dicenda talis venit. Sicq; magis, quã nõ simplex, neq; ad simplicem motũ ordinata articulo est; sed duplex, varijsq; motibus dotata: Sic igitur huiusmodi ginglymon definiemus: Quod scilicet trium ossium duplex articulo, in qua mediũ os suscipit, suscipiturq;. Suscipit inquam superius, ab inferosq; autem suscipitur (vt est in vertebra lumborũ) vel e contra: suscipit inferius, a superiore autè suscipitur (vt in vertebra collis, & thoracis apparet: præter primã collis, quæ vtrinq; suscipit, & thoracis duodecimã, quæ vtrinq; suscipitur) Ad eò vt nõ respectu cuiusq; vt in propriè dicta ginglymo, sed diuersorũ relatione suscipiat, suscipaturq;. Nec ad simplicem, sed vanũ quoq; motũ ordinata sit. Verũ nonnulli Galenũ huic arguunt, quoniã huiusmodi vertebrarũ articulationes ipse ginglymos nuncuparet: cum tamen nullo pacto verè ginglymi similitudinẽ quã trinum, nõ duorũ cõponi nõ quolibet existit: nõ secundò, quia nõ eiusdè respectu, sed diuersorũ, suscipit os, suscipiturq;, nõ demũ, tertio, quoniã nõ simplicem, sed duplicem, vanũq; motũ habet. Minime interea aduerfantũ aduerfantũ Galenũ ex aliorũ medicorũ, atq; interdũ quorũ, ex veterũ ossiãtudine locuti est: vt ex præcedentiõs eluci facillimè potest. Itaq; si Hippocrates medicorũ Phebus, & qd vertebra ginglymo cõstruẽt, cardinaque sunt, scripsit, Græcè [γινγλιμοειδης,] cur Galenũ veteri scripta, præcipueq; Hippocratis decreta celebrant, ginglymon in vertebra ponere non licuit: [Cardinatus enim eius vertebra inquit Hippocrates] (Galenomet ipso exponente .h.) propterea qd cum proceffibus quatuor habeat, duas alteras sibi bus suis vnaqueq; excipit: duobusq; suis in alteris cauitates inieratur: non scõsusq; in cardinationibus sit. Quod si improprie ginglymon appellari addideris; id ipsum est, quod querimus, & iam iam propoliumus. Sed caucore predictorũ aduerfantũ quorũdam potius interpretatione respiciamus, ginglymon inter vertebra alio modo ponentũ: vt quartã ginglymi speciem adiungere opus sit, improprijissime tamen, ac largissimè sumptã: videlicet de lateralis? vtrinq; positã vertebrarũ duarum nexibus intelligendũ: quoniã scilicet due sint articulationes, vna in dextris, altera verò in sinistris. Ad eò vt sic desinant huiusmodi ginglymon, qd scilicet duorũ vtriusq; facta articulo sit; nec mutuus ingressus, sed in vtraq; parte eiusdem speciei articulo: puta vel per enarthrosin, vt in duabus occipitiõ; cũ prima vertebra cartilaginosaibus, alijsq; ad lumborũ nexibus cum prima etiã sacri ossis parte pectantibus: vel per arthrodia, vt in reliquarũ quidẽ vertebrarũ ceteris in quã; dorsiq; inter se nexibus patet. Neq; simplicem, sed aliquando diuersũ

Ginglymi prima species.

ad 1111 & vtriusq; ginglymi

et 1111 & vtriusq; ginglymi

et 1111 & vtriusq; ginglymi

et 1111 & vtriusq; ginglymi

e. Suprà com. 1. j.

f. Com. 14.

g. Obliquo

h. Ibidẽ in fine com. mentũ.

i. Tex. 11.

k. Lib. 1. de art. ox. j. 4.

h. Ibidẽ in fine com. mentũ.

l. Ibidẽ in fine com. mentũ.

m. Ibidẽ in fine com. mentũ.

n. Ibidẽ in fine com. mentũ.

43  
 motum habens. Verum quæ in huiusmodi duplici nexu ginglymi, siue cardinationis ratio reperitur? Si quidè neq; suscipit, suscipiturq; simul idem os, sed duntaxat vel suscipitur, vel suscipitur neq; si simplicem motû simpliciter habet. Quæ ambo de ginglymi essentia existunt? Melius igitur omninò fuerit Hippocratis ginglymon in vertebra cum Galeno inter tria ossa intelligere. Ad eò vt aliquod, puta intermediu os sit, quod eodem simul tẽpore suscipiat, suscipiaturq;. Sicq; nonnullam ginglymationis, cardinationis siue ratione cõprehendat: quãquã (vt diximus) improprie, ac largè. Cùm nõ inter duo, sed inter tria ossa sit, nec mutuu ille congressus ad inuicem, sed circumstantiũ supra, infraq;, ossi um respectu existat: Neq; demũ simplicè motũ habeat. Quartã igitur cardinis, ginglymiue speciem a veterũ mente alie nam prorsus esse decernimus. Quãuis enim Celsus i. maxillè inferioris rotundiora capitula in eo sinu, quã iuxta foramen auris est, cardinis modo fieri, quasi quoniam ginglymi speciem innuens dixerit: Haud quaquã tamen (si exquirẽt perpendamus) cardinis rationem eo modo cõsiderauit, quo nos intelligimus: vt vnã scilicet recipiat, recipiaturq;, neq; ob id, qd in duabus partibus, scilicet dextra, & sinistra recipitur: sed quoniam veluti postes cardinibus, diuersis in locis, duobusq; saltem (superius inquam, inferioribq;) firmatq; hũc, & illũ mouentur, ipsãq; ianuam, portamque claudunt, aperientq;. Sic etiã & inferior maxilla duobus in locis, duobus quoq; cardinibus, scilicet in dextra, & sinistra parte, fixa in eodẽ, permanentq; existens, hũc, atq; illũ mouetur, atq; os ipsum aperit, clauditq;. Quia etiã ratione ginglymon, siue ginglymon (vtrũq; enim dici potest) sumptisse in tertio de anima Aristotelem, \* nos alibi vberem ostendimus. \* E quibus predictis omnibus liquet, qd cũ vertebrae ginglymos sit, vt intermediũ os suscipiat, simulq; suscipiatur (suscipiat inquam intermedia vertebra superiorem, ab inferiore autẽ suscipiatur, vt in lumborũ vertebrae constitutu est: vt econtra inferiorẽ suscipiat, à superiore verò suscipiatur, vt in vertebrae coxiceis omnibus, præter primam, & thoracis quoq; cunctis, præter duodecimã, cõsperimus) nõ bene Balauius interpretatus Galeni cõtextum est, dicens [ Nam in vertebra media in vtrãq; supra, infraq; appositam subit ] vbi Græcus contextus habet [ *ἡ δὲ μέση τῶν ὀστέων, ἡ δὲ πρὸς τὴν ἀριστερὰν ἑκατέρωθεν ὀστέων.* ] Vitra enim qd falsum esset, quod secundum illius translationem dicit: etiam veri, proprieq; dicit ginglymi ratio, quã querit, destruitur, si in vtrãq; subit, quasi ab vtrãq; suscipiatur: vt vertebra duntaxat thoracis duodecima existit: sicq; nec omnibus, nisi vni duntaxat vertebrae, cõueniret. Rectius igitur dictiones [ *ἡ ἀριστερὰν ὀστέων* ] latine [ mutuu ingressum facientibus ] vertentibus est, quam vt ille interpretatur [ vtrãq; supra, infraq; appositam subit ] *ἀριστερὰν* enim i verbo *ἑκατέρωθεν* mutuu ingressum, mutuu insertionẽ, siue retributionẽ latinis præferret. Quomodo autẽ, & quam recipiat siue superiõre, siue inferiorẽ, aut à qua recipiatur hæc intermedia vertebra, Galenus hic enucleare nõ curauit, tanquã infra, & quib; de vertebra loquetur, sufficienter declarauerit. Tempestiuũ verò est, vt nos, iuxta ordinem in alijs quoq; obseruatu, ginglymi species, tam scilicet quæ cum manifesto motu, quã quæ cõ occulto existunt, suis exemplis (vt in alijs quoq; obseruauimus) elucidemus. Ab ea interim exorsi, quæ manifestũ est motum, ac ad diarthrodium refertur: per quatuor quoq; sceler partes, clarioris doctrine gratiã discurretes: & enim verò cum in prima, & secunda parte nulla huiusmodi proprie, multoq; minus propriissimè dista ginglymos sit, nullaq; etiã largè, siue improprie talis nũcupata, vt species est tertia (Quartã enim, magisq; quintã negligimus, & prorsus à ginglymorum natura deletã, vt à veterum quoq; anatomizantium intentione diuersimã vtrãq; determinamus.) Ad tertia igitur sceler partem accedamus. In qua propriissimè, ac veri siue ginglymi (de quibus hoc in loco principalitèr intendimus) numero sunt viginti: Inter ossa quidem triginta duo, videlicet humeri, cuius cubiti ginglymos vnã: Quatuor digitorũ manus secundi, & tertij articuli ginglymi octo; tresq; pollicis articulus tertius, qui est cardinatio vnã. Sunt igitur hucusq; ginglymi decẽ: Inter ossa sexdecim, videlicet humeri, cubiti quoq; (quæ sunt duo) Item quatuor digitorũ, præter pollicem (primã) secundã, & tertã ossicula, quæ sunt numero duodecim, cũ duobus verò predictis erunt quatuordecim: Demumq; duo pollicis, scilicet secundũ, & tertiu. Sunt igitur omnia huiusmodi ossa, in quibus manifestũ motus cardinationis sunt, numero sexdecim. Atq; hæc in vno duntaxat brachio. Totidem verò ginglymi, ossaq; in altero brachio sunt. Itaq; omnes propriissimè, verissimèq; secundæ partis ginglymi sunt viginti, inter ossa (vt prædiximus) triginta duo. De cubiti autẽ ginglymo cũ radio, quoniam separatè articulationes duæ sunt: ideo cõ inter e narthroses à nobis cõputatas esse, in declaratione secundæ ginglymorũ speciei predictũ iam iam est. In quarta demum parte sunt ginglymi etiã alie viginti, videlicet tibiæ cõ talo, vnã; quatuor digitorũ secundæ, & tertæ articulationis ginglymi sunt octo; pollicisq; demum pedis secundus articulus, qui ginglymos vnã est. Omnes igitur predictæ sunt decem. Totidem verò sunt in altero crure. Igitur erunt omnes quartæ partis ginglymi numero viginti: inter ossa quidè similiter (vt in tertia parte) triginta duo, videlicet tibiã, talumq;, & quatuordecim ossa digitorũ, quæ sunt omnia sexdecim. Totidem verò cũ sint in altero crure: sunt igitur omnia ossa hæc triginta duo. Colligendo igitur

l. lib. 8. c. 2.  
 post primo.

\* Tex. 19.  
 \* In 2. art.  
 med. com.  
 not. 70.

Cõtra Balauium.

l. Cap. 7. f. 8. 2.

Ginglymi cũ cubiti motu.

Prima pars & secunda nil habent.

Tertia pars ginglymi 20. ossa 31.

Quarta pars ginglymi 20. ossa 31.



tertiæ partis ginglymos propriissimè dictas viginti, quartæq; partis alias viginti: Erunt omnes, quæ interim ad diarthrosim vt euidentiissimè motû edentes, referuntur, quadraginta: inter ossa (vt patet) sexaginta quatuor, scilicet tertie partis triginta duo, & alterius partis alia triginta duo, vt sint omnia sexaginta quatuor ginglymos gignentia suis nexibus, quadraginta. Verùm ad ginglymos, quæ synarthroicos species est, pertransimus: quæquâ nisi ex Hippocrate (vt prædictû est) Galenus vertebrarû improprie, largeq; dictâ ginglymon interposuisset, Nos hic nõ solum pro prima: sed pro secunda etiâ, & tertâ, sæcè pedem fisteremus, dicentes omnè iustissimam, propriissimamq; secundæ, & quartæ partis ginglymon ad diarthrosim referri, nullamq; huiusmodi esse synarthroicos specie m. Cum nulla ginglymos ibi talis sit, quæ motû obsecurum habeat. Quoniâ verò (vt diximus) improprias Galenus interseruit: Idcirco omiſſa prima parte, in qua ginglymos nulla est: In secûda parte improprias ginglymos esse dicimus numero quadraginta quatuor, videlicet vtrobîq; hoc est, in dextro, & sinistro latere viginti duas. Etenim cum ex viginti quatuor vertebriſ solæ viginti duæ huiusmodi tertie specièi ginglymon obtulerint ( prima enim vertebra vtinam: suscipit: duodecima verò thoracis vertebra vtinam: suscipitur: capropter duæ hæc talem ginglymon ignorant: quæ quidè est, vt idè os suscipiat, suscipiaturq;: nisi quartâ pro his ginglymorû speciem admiserimus.) Restant quidè intermedie vertebre viginti duæ, quæ ad superius, & inferius os tanquam suscipiens, & susceptû simul, cõparant queunt. Itaq; cõpertissimû est viginti duas quoq; ginglymos fieri. Quoniâ verò duplex vertebrarû inuicem sic coherentiu articulatio est: Altera quidem in dextra parte: Altera verò in sinistra. Totiè enim in sinistra quoq; suscipit, suscipiturq;: quotiè in dextra: Igitur omnes erunt ginglymoides huiusmodi articulationes quadraginta quatuor: Inter ossa quidè (vt patet) viginti quinq;: videlicet viginti quatuor vertebriſ, & vnum sacri ossis primû officulû. Quamuis enim viginti duas esse vertebriſ tantum, quæ talem ginglymon experiantur, prædixerimus: Quia tamen talis articulatio superius os, atq; inferius etiam respicit: Cum ab vno suscipiatur, alterû verò suscipiat id quod intermediû amborum est. Idcirco nõ solum vertebriſ omnes concurrere nõcessum est, sed ipsam etiam sacri ossis principium, tanquâ extremi articulationi prædictarû terajini. Sed enim verò nos huiusmodi articulationes propriè magis arthrodias esse (quam improprie ginglymû dicantur) aduertentes, ad arthrodias reduximus, & in arthrodiarû occulto motu prædiximus albo cõnumerauimus: A præter secundæ vertebre cœruicis ginglymon, quæ partim euidenti motû habet: quatenus scilicet cum prima vertebra annectitur, partim verò obsecurum: quatenus tertie cõarticulat. Nos igitur nẽ rem cõsultam relinquamus, inter occulti motus ginglymos nunc recensuimus. Tuum verò fuerit, inter manifesti motus ginglymos potius (si libuerit) annumerare. Modò semel tantum de ea tâquam de vna ginglymo memineris. Duas tamen intereâ arthrodias esse verius determinans: quarum superior ad manifesti motus, inferior verò ad occulti motus: arthrodiam reducenda venit. In tertia dein parte ginglymos inuenimus propriissimè dictas duntaxat duas: scilicet vnam in altera manu. Estq; sexti brachialis ossis cõ septimo eiusdè facta simplex articulatio: vna igitur in altera manu est, inter ossa (vt patet) duor: suntq; in vtraq; manu ginglymi duor ossa verò quatuor. In quarta autè parte nulla huiusmodi verissima ginglymos inuenitur, nisi ea, quam secundæ specièi ginglymorû posuimus: duplici quoq; articulo, licet ad simplici motum, ordinatam. In qua tamen mutus duorum offium cõgressus est. Sunt igitur huiusmodi ginglymi quartæ partis quatuor: videlicet tali cum osse calcis in vtroq; pede: duæ. In anteriore enim sede calx talum suscipit: in posteriore autem, a talo calx suscipitur. Verùm qua duplex articulatio per enarthrosim est, necq; verissima ginglymos dicitur: sed secûdi duntaxat minùs propriè dicti modi: Eapropter nos antè inter enarthroses cõnumerauimus. m. Præterea & altera est vtrobîq; tibiæ ossis cum sura ginglymos etiâ secûdi modi, siue manû dicere secundè a nobis declarate specièi: Quoniâ verò duplici articulo in distantibus quoq; partibus facte mutus ille ingressus est: Idcirco superiorem articulû ad arthrodiam: Inferiorem verò ad enarthrosim reduximus, & pro duobus articulis numerauimus: vt in declaratione quoq; secundè specièi ginglymi supra iâ videre potes. n. Si tamen inter ginglymos cõnumerare tibi placuerit: scito in hac quarta parte quatuor esse ginglymos: inter ossa quidè octo, videlicet talum, calcem, tibiãq; & sura in altero crure: totidemq; in altero. Igitur sunt ossa octo. Colligetes igitur omnes occulti motum edentes ginglymos, tam scilicet primi, quàm secûdi, & tertij modi, hoc est, tam verissimas, propriissimâq; quàm nudiùs proprias, aut etiam improprias, largeq; tales nuncupatas: inueniemus omnes esse quinquaginta, scilicet secundè partis quadraginta quatuor, easq; tertij modi. Tertie partis duæ, atq; has propriissimas, primûq; modi: Quartèq; demùm partis quatuor: hasq; secûdi modi: Inter ossa omnes triginta septem, videlicet secûde partis ossa viginti quinq;: tertie partis, quatuor: Quartèq; partis, octo. Sunt igitur omnia ad occultè mouentes ginglymos pertentia ossa triginta septem. Verissimè autem ginglymi occultum motum habentes sunt duntaxat duæ: quas in tertia parte narrauimus. Quod si omnium ginglymorû, siue propriissimorû, siue minùs

Ginglymi cõ obsecuro motu.

Prima pars non habet. Secunda pars singl. 44. ossa 17.

l. Superiõ com. 4.

Tertis pars ginglym. 2. ossa 1.

Quarta pars ginglym. 4. ossa 4.

Quinta pars ginglym. 3. ossa 3.

Sexta pars ginglym. 2. ossa 2.



11 Sutura quidem cōpositio confusis rebus affimilis est: vt in capitis ossibus habetur. Explana-  
 12 rem ipsam volentes nonnulli quidem ferraticam structurā esse definiunt: nonnulli verò in  
 13 vnguem cōmīsuram, patefacientes (vt arbitror) atq; in memoriam nobis reuocātes illi quidem  
 14 ferrarum inter sese mutuū congressum; quoties alterius gibbositates in alterius propinquā finis  
 15 cōterario occursum mutuū cōgrediuntur: Nī verò rerū in vnguem dictarū cōmīsurā. Fit autē hec  
 16 gibbositatibus vnguis figurā representātib; in finis ad suscipiendū idoneos introentibus.

COMMENTVM DECIMVM OCTAVVM.

17 **V** O D futura synarthrosos, coarticulationisue species sit: Galenus etiā (velut antea  
 18 iam diximus .x.) libro de vsu partū nono apertē nos docuit, sic scribens .f. [ simul quid-  
 19 em os capitis efficiens cauerosum, simul & vocatis futuris vanē coarticulatū ] Græcē  
 20 [ *συνάρθρωσις* ] Quāquam paulo post diarthrosim vocat [ latinē dearticulationē duci-  
 21 mus ] per hec verba [ totam figuram dearticulationis, siue diarthrosos efficit duabus ferris, &c. ]  
 22 Sed omnino deprauatū esse iiteram opusor, legendūq; ibidem [ synarthrosos ] idest coarticu-  
 23 lationis, nō diarthrosos, veluti paulo ante rectius dixerat: & secundo etiā de cōpositione medi-  
 24 camentorum *κερά τέρη, &c.* per hæc verba [ At verò regio capitis iuxta sinciput, propter laxitatē  
 25 synarthrosos, coarticulationisue, iuxta coronalem futurā, &c. ] Sunt autē in capite, maxillæ;  
 26 superiori cōmuniter, .x. cōmunitē viginti quinque, \* prout infra loco proprio de futuris lo-  
 27 cuturi ostendemus, .x. cōmunitē in quā, vt harmonias etiā cōprehendamus, quæ nonnunquam  
 28 futuræ nomine (vt postea videbimus .x.) intelliguntur: propriē autem sumptę futurę, de quibus  
 29 impresentiarū: vt scilicet ab harmonia distinguntur, numero decem sunt. Quarum tamen qua-  
 30 tuor integrę futurę sunt: sex verò in quibusdam partibus harmonię futurę iuxta hæc habent: quæquā plius  
 31 ad futuram, quam ad harmoniā pertinent. Integrę igitur futurę quatuor maximē autē, frequen-  
 32 tiusq; tres sunt, quæ capitis etiā proprię dicendę veniunt: scilicet coronalis vocatā, & sagittalis,  
 33 fræc recta, & lambdoides. Quartaq; demū ( licet alijs minus ) ea, quæ nonnisi fracto, apertōq;  
 34 craneo intus euidens est, sphenoidis intrinsecos anium alis quā similitudinem procedit; à frontis, &  
 35 octauo etiā ossibus distinguens ordinē septima inferius \* à nobis statuenda. Quam Galenus vt  
 36 partem quandam cōmunis futurę supponit: quæ scilicet à tēpore ad aliud tēpus per medias oculo-  
 37 rum cauitates p̄transit. Hæc igitur quatuor integrę vocauimus futuras, quoniam secundū mag-  
 38 nam sui partem, vel septis etiā secundū totū, futurarū veram cōpagem obseruant: lambdoidē  
 39 intereā, p̄ter additamenta nuncupatā capientes, cum additamenta illa potius harmonia quadā  
 40 cōnectantur. Alæ verò sex sunt ( vt diximus ) effatu dignam harmoniæ cōmīssionem habentes.  
 41 Quarum quædā capitis, maxillę; superioris cōmunes sunt: videlicet imprimis ea, quæ ab exte-  
 42 riore oculi angulo exordiens, per intermediam oculorum cauitatem ad alterius oculi exteriorem  
 43 quoq; angulum vsq; peruenit, quinimō à tempore ad tempus recta quadam linea procedit, eos  
 44 frontis ab ossibus maxillæ superioris primo, secundo, tertio, & quarto, ac sexto, secundū Velsāli  
 45 ducto quinto, atq; ipso etiā sphenoidē vtrinque distinguens. Idcirco & ossiū capitis, & maxillæ  
 46 superioris cōmunitē futura dicitur. Quæ autem vera sunt capitis ossa, & quæ maxillæ superonis,  
 47 & quot etiā vtraq; sunt, loco proprio deinceps declarabuntur. .y. Alia verò capiti etiā, maxil-  
 48 lę; superioris cōmunitē futura est, quæ totum ipsū os sphenoides circumscribit, à temporibus  
 49 ad tēpora vtrinque; deorsum, sursumq; procedens, ac prædictū cuneiforme os à temporū ossibus,  
 50 ac fronte, nec nō à primis, & quaris, atq; etiā Galeni quintis, Velsāli verò sextis maxillæ superio-  
 51 rioris ossibus, ipsōq; demū occipite fecernens. P̄ter hæc autem duas futuras, aliæ rursus duæ  
 52 sunt: altera videlicet vtrinque, .i. primū superioris maxillæ os circumterminans: illudq; à quarto  
 53 offe, ad secundam prædictā vtrinque; terminata separans. Deniq; duæ alię sunt in ossibus iugalibus:  
 54 quæ scilicet primū maxillę superioris os à tēporis offe vtrobiq; distinguunt, ideoq; capiti etiam,  
 55 maxillę; superiori, sicut primę duę paulo ante dictę, cōmunes. Prædictę igitur omnes sex sunt,  
 56 atq; cum alijs quatuor capiti proprijs, decem ( inter omnia, vt patet, maxillę superioris, nedum  
 57 capitis ossa, quæ numero sunt viginti. ) Quæ ( vt diximus ) vel secundū totū, vel secundū max-  
 58 ximam partem futurę rationem seruant, nullamq; vel quamminimā harmonię missionē habent.  
 59 Quāuis diuerrificari admodū soleant ( vt postea Galenus etiā testabitur .x. ) velut in quibusdam  
 60 crancis cōtingit, q̄ futurę magis, aut harmoniæ hæc, vel illę partes babeant. Vtrā aliam p̄terterā  
 61 fortuitur diuerrificat. Triplici enim forma variē cōstruēt esse apparent: vel enim instar lace-  
 62 rarum vestium varias formas representantia ossium frustula cōsuntur: vnde nomen futuræ im-  
 63 positum est. Sic enim ipse etiā Galenus alibi testatur .x. [ Quin & vestimentis ex pluribus lacris  
 64 pannis confusis cōpositionem hanc cōparans, haudquaquā aberraueris: vnde & veteres ( vt ego  
 65 arbitror ) futuras ipsas appellauerunt. Quod nomen adhuc vsq; diē retinetur. ] At sepe magis lim-  
 66 borum, quam lacerarū vestium futuris affimulantur. Limbum appello fasciam illam alterius sepe

r. Com. 10.  
& 11.  
f. Cap. 1.  
post mod.

Galenus lo-  
cus.

t. Cap. 1.  
sec. 3.

Synœurum  
nomen.  
\* Vide cap.  
1. com. 1. in  
fine.

u. Cap. 1.  
com. 1. & sic  
quonibus  
vsq; ad se-  
cundum, &  
cap. 3. com.  
1. a. & s. &  
vltimo.

x. Cap. 1.  
& 3.

Integrę fu-  
turę qua-  
tuor, quę  
\* Cap. 1.  
com. 4.

Sunt cō-  
mūne lex,  
quæ.

y. Cap. 1.  
com. 1. & 7.

& cap. 3. 2.  
totum.

x. Cap. 3.  
text. 1.

a. y. de v. p.  
c. 1. vlt. in  
fine.

coloris, maiorisq; pretij, quæ vestium, præcipueq; muliebrũ extremitates circumquaq; ambiens est. In qua quidem nõ secundũ veterem modõ, at secundũ nostrum quoq; morem, panis vnus flosculi, & veluti quedã coronã in alterius sibi proportionatos sinus mutuis ingressibus satis apostitè consuevit. Atq; huiusmodi res, & nomine iustitiarum forma exterius potius apparet. Vel instar duarum ferrarum sese mutuõ recipientium cõstruuntur: quõ scilicet inter sese contrariõ occurfũ cõgrediuntur, vt dentate alterius partes in alterius sinus, intermediasq; spatia inferantur. Neq; id in exterioribus adõ conspicitur, sicut intus, dum os ab offe separatur. Cũ vtrinq; os, quod per suturas cõstruitur, & dentes, & foveas insimul habeat. Dentelq; huius in illius foveas; sicut econtra illius dentes in huius alueolos, quasi ginglymorũ imitatione quadam subeant. [ Sic certè & fibrũ lignarij ( Galenus etiam subdit. b. ) crebris clauiculis plerunq; instrumenta quedã cõpingentes, illorũ cõpagem, ac coagmentatione solutu efficiunt difficillimam. ] Qui etiam per mutuam amborũ asserim ingressum, talem faciunt, siue arcarum, siue lecturam fortim similit, & aspectu pulcherrimam constructionem. Vel demũ instar vnguium, præcipueq; in externibus, gibbã quedã partes in alterius ossis sinus, quibus apte excipi possunt, inuicè cõgrediuntur. [ Ossium enim, quæ ad suturas generatione ( Galenus idem ait. c. ) adaptantur; vtrunq; cõninentiam habet, & cavitatẽ non vna terie, sed situ alternantes: Est autem eminentia, gibbositatũ figura quidem vnguib; digitorũ potissimũ assimilis: cavitatẽ verõ sedes est huiusmodi figuræ cõmenturata. ] Sed de suturis intantũ hoc loco dictũ iam sit. Inferius enim plura de his dictũ sumus. Nunc igitur ad secundas synarthroses sine motu existentis speciei definitionem, ipsi scilicet harmonias nuncupate: sic cum Galeno dõcentes,

b. Vbi supra

c. Ibidem

TEXTVS VNDE VIGESIMVS.

*Ἡ δὲ ἁρμονία συνάρθρωσις ἐστὶ κατὰ γραμμὴν ἀπλὴν, ἔχει δὲ ὅταν πρὸς ἄλληλην, καὶ τὰς τῆς ἀνω ἰσχυρῆς ὀδὸν ἔχει, καὶ τὰς τῆς ἰσχυρῆς, πρὸς ταύτην.*

Harmonia verõ synarthrosis est per simplicem lineam. Habent autem sic adiuuicem nõnulla maxillæ superioris, & quedam etiam capitis ossa inter se coniuncta.

COMMENTVM DECIMVNQVVM.

**D**CCCE harmoniæ genus, scilicet synarthrosim, dicit enim qd harmonia synarthrosis est sed eã intellige, quæ sine motu coarticulatio facta est, hoc est, propter quiete (vt verissime iam antea. a. declarauimus. Harmonia igitur quedã synarthrosis, coarticulatioe est per simplicem lineam, extra omnem extuberantiam, ac sinus (quæ proprie scilicet talis est) citraq; omnem densq; alperitatis mutuũ ingressum cõmissa: quanquam vix talem inuenire secundũ totũ quimus, at secundũ maximã sui partem. Quod si aliqua interit in coniunctione alperitas: eaquam minima est, & vix effatu digna: hincq; fortassis & harmonia passim inter suturas cõnumerari, suturãq; appellari cõsuevit. Sunt igitur harmonie duodecim: quoniam additis ipsius lambdoideis additamentis vtrinq; scilicet positis: erunt omnes quatuordecim. Itaq; imprimis sunt squamosa: agglutinationes ossium temporũ cũ ossibus synceipitis, duse: quæ lepidoides, idest squamosa suturas appellant: quæ ossiũ capitis sunt, siue suturæ, siue harmonie nuncupentur: præter has & tertia est, quæ octauũ capitis ossiculi, ab offe frontis illud separans, circumseribit ordine sexta capitis sutura posteriũ enarranda. Deinceps aliæ tres sunt, quæ nasi ossicula & à se inuicem, & à quartis maxillæ superioris ossibus distingui faciunt. Habemus ergo hucusq; harmonias declaratas sex. Ultra quas, & alias duas habemus, scilicet alteram vtrinq; in oculi cavitatibus: quæ secundũ os circueit, à tertio, & quarto maxillæ superioris offe illud distinguens; sicq; sunt octo. Item duæ aliæ sunt in ipsẽdem oculorũ cavitatibus tertia ossa à quartis fecerentes: sunt igitur hucusq; decem. Vnde decima verõ fuerit, quæ in maxillam inferiorẽ redẽ per medium distinguit, quarta interim ossa à se inuicè separans. Duodecimãq; demũ ea est, quæ iuxta Galeni ordine quinta, circa palatũ, interiorãq; nasi foramina existentia, ossicula à quartis ossibus maxillæ superioris, segregat. Sunt ergo prædictæ omnes harmonie duodecim. Quibus si lambdoideis additamenta cõnumeret: erunt quidẽ cunctæ quatuordecim. Verè autẽ in integrũ sunt duodecim, vocatæ etiã suturæ. Quamobrem capitis, maxillæq; superioris proprie, cõmunitatẽ; diuẽ suturæ sunt viginti duæ, præter quas, tres addere possumus cultriformes os (vt videbimus. c. ) circumseribentes, sicq; erunt viginti quinq;. Sed de his vberius infra. a. Sat verõ superõ, fuerit nunc addere, qd tam suturæ prædictæ decẽ, quæ harmonie duodecim prægnatæ vtrinq; per se inter ossa sunt viginti: videbunt prædictæ decẽ suturæ inter ossa viginti: similiterq; harmonie quatuordecim (si lambdoideis etiam additamenta adiungas) inter eadem ossa viginti sunt: scilicet capitis octo, & maxillæ

d. Com. 10. 11. 22. & 37.

Harmonie quot. & quæ.

Cap. 7. com. 4.

Cap. 3. com. 4. & 5. Cap. 2. & 3.



## TEXTVS VIGESIMVS PRIMVS.

Ἐπὶ δὲ πρὸς διαφορὰν ἀνάστη τὰς κατὰ τὸ ἄρθρον ἵσταται, ἰσχυρὸς ἢ ἰσχυρὸς καὶ τὰς συμφορὰς ἰσχυρὰς  
 ἴσται δὲ καὶ τὰς τῶν δύο μὴ αἰ πρώτης διαφορὰς τὰ μὴ γὰρ ἀλλήλους, τὰ δὲ δι' ἄλλων συμφορὰς ἀλλήλους μὴ τὰ  
 χροῦνται, καὶ μαλακώτερα, δι' ἄλλων δὲ τὰ ξηρότερα, καὶ σικκώτερα. πρώτης δὲ ἀνάστη, τῆς δι' ἄλλων συμφορὰς  
 τῆς ἰσχυρῆς ἢ πάσης διαφορᾶς, ἵσταται δ' ἄνωθεν ἢ ἐπὶ σαλευσὶ τῶ μίκτης Βαλλομένη τῶν πρώτων χροῦσιν, καὶ  
 ἴσται συζυγίᾳ μὴ τῆς διὰ χροῦν συμφορᾶς, συνίσταται δὲ τῶν διὰ γούρου, συσταται δὲ τῶν δι' ἰσχυρῶν.

i Sed quoniam differentias omnium, quæ ad articulum pertinent, declarauimus: de symphyſi  
 quosq; deinceps differendū est. Sunt autē & huius duæ quidē primæ differentiæ. Namq; alia inter ic  
 inuicē. Alia verò aliorū interuentu cōnascuntur. Inter se inuicē quædā, quæ fungosiora, mollioraq;  
 sunt. Aliorū verò interuentu, sicciora, densioraq;. Huius autē aliorū interuentu coalescentiæ  
 tres sunt omnes differentię. Nomina verò ipsarū antiqua nō sunt. Volenti tamen his recentiorū  
 vti, vocare licet synchondrosim quidē, eam, quæ per chartilaginē fit, coalescentiā: synneurosim  
 verò, eam, quæ per neruum; sylvarcosim autem, eam, quæ per carnem.

## COMMENTVM VIGESIMVM PRIMVM.

¶ **Q**uemadmodum in articulis contactus duntaxat ossium (tametsi naturalis iam) fit, com-  
 positioq; (contactus inquit chartilagine duntaxat in crustatorū extremorū, in his, quæ  
 propter motum: absq; illa verò in futura, gomphosiq;, & harmonia.) Ita in symphyſi,  
 hoc est, coalescentia, substantiarum cōiunctio, veraq; vniū secundum naturā, refutatur.

Symphyſis  
duplex.

Diuisio.

Idco quantum ad ipsam speciem, propter quietem à natura constituta hæc fuit. Quæ iterum vniū,  
 symphyſi siue, seu coalescentia duplex est; altera quidem per se; altera verò per accidens, quæ per  
 aliud facta. Hęcq; prima symphyſeos diuisio in primas eius differentias est. Quamobrè Galenus  
 ait, qd primæ symphyſeos differentias duæ sunt: quasi dicat, prima diuisio in primas differentias  
 hæc est. Namq; alia ossa inter se inuicē conascuntur: hæc q; per symphyſim simpliciter, ac per  
 se conasci dicuntur, omnis interin articulationis expertia, immo illi prorsus re, & ratione op-  
 posita. Alia verò non per se inuicem, nec immediatē, sed aliorū (ne intelligas ossium, sed aliorū  
 corporum, siue aliarū substantiarū, puta chartilaginis, vel nerui, seu carnis) interuentu, cona-  
 scuntur. Atq; hæc ex accidenti, seu per accidens, & nō per se vniū, ac per symphyſim coalescere,  
 neq; vnum verè fieri dicuntur. Ideoq; horum nonnulla duæcis rationibus vniū, & articulari di-  
 centur: propter motū enim articulan nequeunt, nisi aliquo modo firmentur. Dicimus autē  
 primam hanc diuisiōnem, primāq; eius differentias esse: quoniam secunda diuisio, siue relictis subdi-  
 uisio erit inter ea, quæ per accidens, & per alterius corporis inuuentū coalescunt: videlicet qd  
 vel per chartilaginis, vel nerui, aut carnis interuentū vniuntur, siue coalescere dicuntur. Qua de  
 re secunda primæ diuisiōnis species subdivisa, tres iterū species siue differentias secundas habere  
 determinabitur. Sed de huiusmodi subdivisiōne, postenus sermo fiet. Nunc autem primā diuisi-  
 onem elucidemus: præsertimq; primā eius speciem, scilicet quæ nam sint ea ossa, quæ per verā,  
 & simpliciter, ac per se dictam symphyſim coalescunt, absq; vilius substantię interuentū? Sunt  
 enim hæc quæcunq; fungosiora, spongiosioraq; ab inuito fuerant, præsertim circa ipsorū extremita-  
 tes: quæ inuicē contangi, ac deinceps vniū, & coalescere debeant: Ideoq; mollia, & conglu-  
 tinabilia esse opus fuit. Ab inuito inquit fungosa, spongiosaq;, & mollia erant: vnde ad coalescenti-  
 am, veramq; vniōnem paratissima fuerunt. Temporis autem progressu durescere, ac solidiora  
 eadem euadere, absurdum nō est. Qui nimis sepe sumē cōtingit circa generationē eorū ossium,  
 quæ ita coalescere necessum erat, per intermediā aliquam chartilaginé vniōnem fieri: deinceps  
 verò eadem chartilagine in os prorsus degenerant, absq; alterius substantię interuentū vniūta re-  
 manuisse. Id quod in capitis ossibus embryonis nō infrequenter vidimus: occipitis inquam os, &  
 frontis per modū distincta, & per chartilaginis interuentū vniū. Sic & vertebrae (vt antea s. di-  
 ximus) in duo, vel tria ossa diuisas, nec nō & os, quod sacro ossi cōiungitur, & chartilaginis inter-  
 cessione prius hæc omnia vniū, deinceps verò paulatim indurata, & in os degenerant chartila-  
 gine, in vniū os lingula conuerti cōpertissimū habemus: & iam nati cuiuslibet infantis bregma,  
 sinciputæ mollissimū exiitens, dein verò vnius, auctuorū annorū etate superueniente, durissi-  
 mum, verissimūq; os totum euadens, certissimū nobis testimonium perhibet. Sed ne ob id quidē  
 ossa in vniū coalescerent, quia scilicet molliora, fungosioraq; existunt (quod ad materialē causam  
 spectat) nisi finis aliquis à natura intensus esset: vt puta maior robur, maiorq; firmitas. Quem-  
 admodum v. g. secundum, tertium, quartū, & sextum pectoris ossa inuicem vsq; adeo  
 coaluerunt: vt nō amplius quinq;, sed vniū duntaxat esse determinauerimus. Quo etiā modo de

Subdiuisio.

Symphyſis  
per se quæ

E. Com. 6.

fieri ossis partibus dicere possumus: ut non quinque, vel sex: at vni duntaxat os esse proferendum: nisi omnium tam veteri, quam recentiorum mos esset quinque, aut sex ossa numerare (dico quinque, aut sex: etenim os sacrum, & si maxima ex parte sex ex ossibus, sępnumerò tamẽ ex quinque: cõstat.) Sic etiã pro Galeno dicendũ de inferioris maxillę partibus, quę in medio coaluerunt: vnitatę; per symphytum fuerunt, antequã infans nasceretur. Quas tamen ante ipsius etiã embryonis generandi cõplementum per synchondrosim coniungi vidimus. Quam igitur duo erant. Quam vero coaluerunt, vnitatę; per symphytum sunt, non amplius duo: sed vni os proferendũ est. Quid enim sibi vult vnitati, nisi ad vnum reducatur? in verũ scilicet, durissimumq; os cõuerfa illa intermedia, chartilagineaq; substantia. Id quod in chartilagine: quę ossa, suaq; appendices intercedit, sic nõ accedit: Nisi fortassis rarissime: propterea enim tẽporis diuturnitate in caduẽnibus appendices à suis ossibus separari maxima ex parte videntur; quoniã in exquisitã ossis substantiã intermedia illa chartilago minime, in ipsis etiã senibus, degenerat. Exquisitam dico, licet ossis nõnunquam appareat. Quamobrem citius ea corumpitur, cõsumiturq;. Quia consumpta, & corrupta, & in terram conuerfa, quamprimum ab ossibus appendices segregari contingit. Non igitur per se absq; alterius substantię interuentu per symphytum vni cum suis ossibus appendices, dicere congruũ est, ob extremorũ nimiam duritiẽ, siccitatẽq;. Nisi fortassis aliquando eueniat intermedia illam chartilaginẽ totam in exquisitam ossis substantiã degenerare. Tunc enim verẽ coalescere, atq; vni abiq; medio diceremus. Sed ne illorũ quidem calumnia placet, dicentũ, quia in principio intermedia chartilago fuit, ideo nõ per se vnitã esse dicẽda sunt. Eo enim tẽpore, quo chartilago interueniebat, per synchondrosim ea ossa vni, proferendũ erat: postquam verò intercedens chartilago in os exquisitẽ degenerauit: per se vni, coalescereq; omnino determinandũ est. Nisi differentis perpendere in locutionis modo velis: videlicet inter vni, coalescereq;, & vnitã, seu coalita esse: quasi per chartilaginẽ vni, dum sunt in fieri: tãdem verò per se vnitã esse, in factõ esse determinemus. At hæc lophi scis dimittantur. Nos verò incrimãdã alterã symphyseos speciem accedamus: quę scilicet per accidens, & largẽ; quasiq; improprie symphysis, vniq; nuncupatur. Haud enim ex duobus ossibus verẽ vni cõtinuũ fit: sed aliquis in medio substantię interuentus in vnam quasi cõtinuam, indiuisibilem; non verò continuam, quoniam nõ verẽ contiguam substantiam nexio fit (quãuis mediã hæc substantia vtriq; extremo contigua verẽ sit) instar glutinis, aut luti, seu funis. Triplici enim hoc modo in vni coniungi, atq; alligari ossa Galenus idẽ alibi perbellẽ scripsit. g. Instar glutinis (inquã) chartilaginẽ interuenit: ideoq; per synchondrosim. Instar luti, vt quando carnis intercessione cõiunguntur: ideoq; per fissurã colli. Instar deniq; funis, quoties neruus, ligamẽtusue interuenit: ideoq; per syncurosim. Triã enim hæc nomina à sui tẽporis rectoribus anatomicis Galenus imposta esse inquit scilicet synchondrosim, syneurosim, & fissurã colli. Quia enim Græcẽ *σύνδρον* idẽ est, quod latine chartilago, inde venit *σύνδρον* q. d. chartilaginiosũ, siue chartilaginicitas. Præpositio verò [*σύν*] latine [cum] quandam vnionẽ, cõiunctiõnẽq; præfert. Quapropter *σύνδρον* dicitur, hoc est, cõchartilaginiosũ; quasi per intermediã chartilaginẽ factã quorũdam vnio. Ita quia Græcẽ [*σύνδρον*] quoc; neru? dicitur: inde *σύνδρον* q. d. neruatiõ: additi; præpositiõnẽ [*σύνδρον*] q. d. conneruatiõ, hoc est; per neruum intermediũ factã cõiunctiõ. Demum *σύνδρον* carnẽ nobis indigitat, vnde *σύνδρον* q. d. carnatiõ: addita quoq; præpositiõnẽ, *σύνδρον* dicitur: q. d. latine cõcarnatiõ, conneruatiõ, & conernatiõ apud latinos in vsu non sunt: Idcirco Græcis potius nominibus vti solẽmus: quę sunt synchondrosis, syneurosis, & fissurã colli. At singulas huiusmodi species apud suos exẽmõs elucidemus. Imprimis igitur synchondrosis est: quoties chartilaginẽ interuenit quãpiam vnio fit: vt ossa pãbis glutinantur anteriorũ, atq; etiã posteriorũ. Anteriũ quidem sibi inuicẽ, posteriũ verò, vbi vocata etiã illũ ossa cũ sacro cõiunguntur. Et quorũdam pectoris ossa: vt primũ cum secũdo, & sextũ cõ septimo vt plurimum cõiunguntur. Et ossa puerorũ cum suis appendicibus: licet temporis progressu, videlicet in natu grandioribus intermedia illa appendicũ, suorumq; ossium chartilago paulatim in ossẽm quãdam naturam degeneret: vt prius quę chartilago erat simpliciter dictã, deinceps sensim durãscens, chartilago fiat ossa: Dein verò os chartilaginẽũ: ac deniq; os simpliciter dictũ intermedium euadat. Vertebrarũ quoq; omnũ, sterniq;, ossis illũ, & interdũ ipsius quoq; maxillę inferioris, nedũ occipitis, frontũq;, & ossis sacri diuisiones in puerulis, infantibusue (prout antea nos vberissime declarauimus. h.) intermedia quãdam chartilagine compactę sunt. In quibus omnibus prædictis vnio factã est procul dubio propter quietẽ, quietiq; duntaxat inheret. Verũ enim verò alia quoq; per synchondrosim ossa vniuntur. Quę licet hæc ratione, quieta inter se adherẽant: Alia tamen cõiunctiõnẽ ratione, quę scilicet per articulum fit (siue per synarthrosim, siue per diarthrosim) mouentur, & ad motũ spectant: vt septem legitime costę cũ sterno: vertebreq; omnes, præsertim in anteriore, anterioreque parte inter se, præter primã cum secũda. Item osticula hyoidis

Contra Realid.

Symphyta per accidens.

g. J. anas. adm. c. vi. dno vtr. medium.

Synchondroses exempla prima.

h. Com. 1. in declaratione quæ de cõiunctiõnis.





in iuce coeuntibus, &c.] & hæc de tendonibus. Quorū generatio, an talis sit quædammodū Galenus definiuit: an alio modo prout Galenus increpans Vesalius nō infert arguit, præsentis nō est speculationis. Sat enim superq̄, nunc fit ipsos tendones à propriè dictis nervis, quanvis nomine interdum edueniant, diuersos esse; multoq̄; magis ligamenta: De quibus paulò post hæc idē Galenus subdit [ Albū autē, & exangue, & solidū, expensq̄; cōcauitatis eūm sit ligamentū similitur nervos: propter pleniq̄; impertis neruū esse putatis ] imponit. Verū nō est nati ex cerebro, vel spinali medulla: sed ex ossib⁹ ad ossa trāsit, neruūq̄; dūmus multo, & penitus insensibile est, & mouere aliquid nō potest. ] Cōmuniter igitur, ac largè tam ipsi tendones, quā ligamenta, nerui nomine donata, præsertimq̄; apud vulgares, sunt. Propriè autē, ac verè nerui nō sunt, nisi qui ex cerebro, vel spinali medulla ortuū duxerint; prout sexcentis quoq̄; alijs in locis Galenus etiam ipse testatur. *J. Quā* verò dixit, ab antiquis vocari nervos, qui tendones sunt. Antiquos intellige, post Hippocratē. Hippocrates enim ipse in minime cōsultit: sed proprijs suis nominib⁹ singula hæc determinauit: veluti perbellè Galenus etiā ipse alibi testatur, sic scribens. *m.* [ Si igitur nominare ita vis, quædammodū Hippocrates, *m.* id quod sensim, & inopi exhibet, neruū, aut tenorē (Græcè *τῆν*) vitriq̄; enim nominib⁹ ille idē vocat. Quod verò idē nū vaeat, copulā, ligamētumue. In quod muscularis definit, tendonē. Si autē eōs iudicare appellationē visis scit pleni⁹, qui post Hippocratē fuerunt: voca (silliber) nervos omniū. modo triplici differētia linguas: vt sensitiuos, & voluntarios eos voces, qui ē cæcū, & doria), medulla exoriantur. copulanuos, ligamētalese eos, qui sensū carent, & tertio loco eos flatuos, qui ex muscularis in neruū abeuntib⁹ producūt. ] Sed hæc pro declaranda synyngosia dicta tantum habentis sunt, quò intellexerimus non per intermedium propriè dictū, neruū, nisi fortassis duntaxat in dentibus, sed per ligamentum, quod neruū quoq̄; (vti iam iam prædictum est) non veteres modo post Hippocratē, sed recentiores etiam omnes, præcipueq̄; vulgares appellant. Propriè igitur magis *συνυγγωνισ*, q. d. colligationem, siue copulationem, quam synneurosin dicere possemus, *συνυγγωνισ* enim Græcè, nobis copulam, siue ligamentum, aut vinculum significat: vnde conuinculationem, quoq̄; nominare licet. Verūm quia in nominum disquisitione numerum conuinculationis superponendum est; Eapropter

TEXTVS VIGESIMVS TERTIVS.

Ἐπὶ τῶν τῶν ἰσχυροτέρων τῶν ἐπιπέδων, καὶ τῶν ἐπιπέδων τῶν ἰσχυροτέρων ἰσχυρῶν ἰσχυρῶν ἰσχυρῶν ἀπὸ τοῦ κρανίου, καὶ τῶν ἰσχυροτέρων τῶν ἐπιπέδων ἰσχυρῶν.

Post hanc nominum institutionē, tempestituū est iam de singulis per se ossibus loqui, à cranio exordientes ( sic enim os capitis nuncupant. )

COMMENTVM VIGESIMVM TERTIVM.

Condecens est, eūm de ossib⁹ locuturi simus, vt à cranio (iuxta Hippocratē etiā dogmata \*) principij sumētes ad pedes vsq̄; procedamus. Cranion verò Græcè (latine tamē caluā, siue caluariā) vocant, nomine à similitudine imposito: quoniā .i. cranos galca nobis præfēret. Illi igitur similitudo hoc os est. Sic enim Galenus interdū ait. *o.* [ Ipsi rursus crasq̄; tegumētū est os, extrinsecus circūdatum, quod sanè cranion etiā appellant: q̄; quali cranos quoddā, idest galca suspēnseat, &c. ] Alibiq̄; iterū. *p.* [ At quoniā cerebrū ipsūm sepe sorti muniri, erat necesse: ob eamq̄; causā natura nō curā volū, quomodo partes ad ventriculū attinentes, huius custodiā cōcredidit: sed velut cranos quoddā, hoc est, galcam os, ipsi ante eutē circumposuit, &c. ] At enim verò alijs quoq̄; nominib⁹ appellare Græci cranion id eōs iueverūt: quæ nos hic breuitatis causā omittimus, tanquā minimè necessaria, Galeni nomine duntaxat eōtentū, atq̄; idipsum perpetuò obseruātes: vt semper. *i.* *κράνιον* Græcè, latine verò caluā, siue caluariā nuncupemus. Hæc autem prout Galeni prozēnio generatim de ossibus loquētis (qualia nam sunt, & quā inuicē structurā habeant) dictā hæctenus sunt. Occasio enim præceptis ad particulare ossium sermonē nos impellit. Ab ipso igitur cranio (veluti prædictū iam iam est) exordiamur ipsūmq̄; ac partes quoq̄; singulas, per se prius, qualia nā sint, deinceps verò quā inuicē structurā habeant speciatim perpendimus: triplicè prius totius scēleti figurā, quæ huiusq̄; scēpti iam sunt, apprimè vtilem, proponentes: Nōnullasq̄; deinceps particularis adentes, vt ossiū numerus secundū omnes quatuor partes ( prout antea scēleton distinguimus, vt prius innoteat, cōfusa quadā doctrina, distinctius tamen in singulis capitibus per particulares figuras, variis, quoniam opus fuerit, repetitas elucidātes: vbi opus inq̄; fuerit, repetens, ne ad quos multarū chartarū resolutionib⁹ ( vt ab alijs hucusq̄; obseruatus est ) & labor, & eōs iudicē miferis legētib⁹ temerè, atq̄; impie inducatur. Quauis autē multi caractères in huiusmodi figuris designati sint, multaq̄; literæ, ac numeri alias quidē in sequētibus peribrandi: Impresertiarū tamen eos duntaxat perpendemus, qui ad ostendendū ossium numerum, scilicet trecentarū, & quinq̄; , necessariò cōseruant: videlicet primæ partis septuaginta ossium: secundæ partis sexaginta septem, tertiq̄; partis octoginta quatuor, Quartæq̄; demū partis aliorū totidē octoginta quatuor. Tredecim igitur sequentes figuras perpendito, omniūq̄; ossiū numerū pernosces, a prima scēleti parte exordiens: præsertim verò in tribus primis figuris sese exercere candidat: Quibus scēleti, vel ossiū copia deest, prius quā ad huius libri lectionē accesserint.

L. VI. c. meth. c. c. c. pnc. 7. de loc. aff. c. 2. I sine 1. 3. motu mus fe. cap. 2. & 3. & 4. p. 2. m. 1. de decret. Hip. pcc. & p. 1. ar. 2. u. vide 3. de art. tex. & com. 3. p.

\* 6. epid. cōmēntario 6. AX. 1. 5. o. 8. de v. p. cap. 2. p. 2. de v. p. cap. 1. post medium.

FIG. PRIMA.



PROEMIUM.  
FIG. SECVNDA.



H : FIG.



Hæc sunt quidem totius sceleti figuræ tres, aliæ enim decem sibi sequenti conspiciuntur. Quibus osium numerum, si non exquisita, consusa tamen quadam cognitione, designare possumus: à prima parte exordientes, hoc modo.

Prima pars ossa habet septuaginta (vt diximus) videlicet ossa Capitis propria octo, Maxillæ superioris duodecim, Inferioris vnam, Auditus officula sex. Dentes triginta duo: Hyoidesq; tandem ossa vndecim.

Capitis os primum est os frontis, quod patet fig. 1. 2. 3. littera B.

Ossa sincipitis duo fig. 2. 3. lit. A.

Os occipitis fig. 2. 3. lit. 7.

Duo temporis ossa fig. 2. 3. 4.

Septimum os sphenoides fig. 2. 3. E. secundum quãdam extremitatem superiorem. Maxima verò eius pars fig. 4. lit. 11. & fig. 7. lit. o. o. o.

Ossaui os dictum ethmoides, & spongioses fig. 4. lit. A. B. A.

Maxilla superioris primum fig. 2. 3. lit. F. & fig. 6. lit. Q. Q. Q. quod maiorem oculi angulum complet.

Secundum os eiusdem fig. 6. lit. n. quod minori oculi angulo affidet.

Tertium os eiusdem fig. 6. lit. p. secundo succedens in minori quoq; oculi angulo.

Quartum os eiusdem fig. 6. lit. S. S. quod minorem oculi angulum complet, omnibusq; dentibus originem præbens.

Quintum os ibidem lit. q. Nasum vnam cum suo pari construens.

Sextum deniq; os patet fig. 7. lit. II. extremâ palati partem intus ad nasi foramina cum suo pari, coniungere cõplens. Sub prædictis n. sex omnibus alterius partis coniugè intelligimus. Ad eò vt sint prædicta maxillæ superioris ossa numero duodecim. Quod verò nonnulli è recentioribus tanquã septimũ addiderũt, an sphenoidis, an potius octaui ossis pars sit: vel à prædictis omnib; distinctũ, loco deinceps proprio disputabimus. Nunc verò locus eius demonstraretur per fig. 7. lit. 3. & 4.

Os maxillæ inferioris in fig. 1. 2. 3. patet lit. G. ad figura etiam sexta lit. I.

Auditus officula tria manifestissima sunt fig. 2. lit. q. m. & fig. etiam quinta: quæ rursus in fine huius præsentij declarabuntur.

Dentes in figuris 1. 2. 3. 6. & 7. liquẽnt.

Os demum hyoides patet fig. 8. & 9. quod infra in huius libri calce declarabimus.

Dicta verò sunt hæc quò ad primã sceleti partem. Ad secundã accedamus. In qua ossa sunt 67. videlicet scapulæ duæ, iugulaq; duo, vertebrae 24. sacri ossis ossa sex: coccygis 4. costæ 24. & duo ilium ossa: quæ scilicet sacro committuntur, triaq; tandem pectoris ossa.

Scapulæ duæ fig. 1. 2. 3. lit. R.

Ossa iugulorum fig. 1. 2. 3. lit. Q.

Vertebrae cum ossè sacro, & coccyge patent in 1. 2. & 3. fig. lit. L. k. l. M. N. Ab I. enim vsq; ad k. cervicis septem vertebrae sunt. Ab ipso verò k. vsq; ad l. thoracis duodecim vertebrae signantur. A littera demum l. vsq; ad M. quinque lumborum vertebrae notantur. Ab ipso autem M. vsq; ad N. os sacrum ostenditur: cuius ossa sex sunt. Ab N. tandem ad finem vsq;, os coccygis insequitur, in quatuor (vt patet) ossa distinctum.

Costæ viginti quatuor: vtrinque scilicet duodecim: numerus designatur in 1. 2. & 3. figura numeris 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. supernè deorsum descendendo.

Duo quoq; ilium ossa: quæ scilicet ossi sacro committuntur, in prima, & secunda figura, littera e. notantur. In tertia autem figura lit. o. demonstrantur.

Triaq; demum pectoris ossa in 1. 2. 3. fig. lit. o. designantur. Quamvis enim multè ob costarũ articulationes, distinctiones appareant: vsq; adeò tamen in natu maioribus coaluerũt: vt magna ex parte tria distincta ossa remanserint: sed hæc pro secunda parte.

Tertia demum pars ossa (vt diximus) habet octoginta quatuor, videlicet humerũ, cubitũ, radiũ, octo brachialis, quatuorq; postbrachialis, quindecim digitorum, duodecimq; deniq; scissamina: vt sint in alterutra parte quadraginta duo. In vtroq; brachio 84.

Humerus fig. 1. 2. 3. lit. S. patet.

Radius fig. 1. 2. 3. lit. X.

Vna, siue cubitus, ibidem lit. Y.

Brachiale fig. 1. 2. 3. lit. Z. Z.

Postbrachiale ibidem lit. F.

Manus digiti ibidem lit. A. A.

Scissamina duodecim sunt, videlicet primũ extremo lateri sc; penultimo accubens articulationis octaui ossis brachialis, ad postbrachialis extremũ os, quo parvus digitus sustinetur. Quod quidem decima, & vndecima figura indiguntur littera N. Nonũ carpis os id ex Galeno. v. infra. f. nuncupabimus,

Prima pars.

Secunda pars.

Secunda pars.

Tertia pars.

r. de v. par. lib. 2. c. 12. l. Cap. 17. com. 4.

7.9. miff.  
fab. A.  
10. 9.  
u. 7. tab. na.  
1. 2. 3.  
x. 4. tab. H.  
78 tab. A.  
finit om.  
ner.

pabimus, Tendoni carpi tertio *T*. annexum. Secundū verò, & tertiu, duo sunt in anteriore sede secundi pollicis articuli consistentia: quæ in vtraq; etiã figura, lit. T. ostendit tribus tendinibus innata scilicet musculi quartidecimi, quintidecimi, & decimi sexti *M*. In quorū medio tertij musculi tendo *X*. securus incedit. Alia verò sunt quidē octo, ad primos aliorū quatuor digitorū articulos bina pertinentia. Quæ dici possent, quartū, quintū, sextū, septimū, octauū, nonum, decimumq; & vndecimum. In decima duntaxat figura, litera V. pernotantur, tendonibus octo musculorū à postbrachialis ossibus pronatorū *Y*. adhærentia. Duodecimi deniq; sesamoides officulum, vnicū in anteriore tertij pollicis articuli sede prepositū inuenitur: Y litera in eadem quoq; decima figura designatū tertij musculi tendoni propè insertionem inhærens. Duodecim inquam hæc sesamina, in inuene præsertim sicco, & ossuoso non infrequenter conspiciuntur numeramus: quoniam nos inuicē præsertim in secundis, & tertijs quatuor digitorū articulis nonnulla etiã sesamina interdum reperiri: quæ cum potius chartilaginea, moleq; quamminima sint, ac per hoc rariùs apparentia. Eapropter in nostrum hunc catalogum annumerare nõ curauimus. His enim additis non duodecim, sed viginti in qualibet manu sesamina numerarentur. Sed hæc de tertia parte: ad quartam accedamus.

Quarta  
pars.

Quarta pars ossa idem habet octoginta quatuor, videlicet femur, tibiã, surã, patellã, talam, calcē, scaphoides, cyboides, tria reliqua tarsi ossa, pedij verò quinq; digitorū quatuordecim, ac tandem sesamina duodecim quæ sunt omnia in vno crure 44. totidemq; in altero: sicq; sunt 84.

Femur fig. 1. 2. 3. lit. A. notatur;

Tibiã fig. 1. 2. 3. lit. B.

Sura ibidem 7. 8. 9. lit. C.

Patella ibidem x.

Talam ibidem xi. & fig. 12. 13. lit. F.

Calcaneus fig. 2. 3. lit. a. & fig. 12. 13. A.

Nauicularos fig. 1. 2. 3. lit. b. & fig. 12. 13. lit. B.

Cyboides fig. 1. 2. 3. lit. g. & fig. 13. numero 4.

Reliqua tria ossa tarsi ibidem lit. d. e. f. & fig. 13. numero 1. 2. 3.

Pedij ossa quinq; ibidem lit. h. & h. circumscribuntur, & fig. 12. & 13. per se patent.

Digitorū ossa quatuordecim ibidem i. & i. literis ostenduntur fig. etiã 12. & 13. per se sequent.

Sesamina remanent in senibus præcipue apparentia duodecim: primum videlicet, quod pedij

ossis parauū digitum sustinetis cū cyboide osse articulationi subest octauū pedem motuum inu-

scali *X*. tendoni *Y* annexū. Id ipsum verò in secōda, & tertia figura litera R. notatur. Fig. autē in

12. lit. u. Secundū verò est, quod in secundo pollicis intermedio apparet figuræ duodecimæ stel-

la *Y*. designatum, quod secūdi digitorū pedis musculi *M*. tendini *N*. colligatur. Reliqua verò de-

cem sūt in primis quinq; pedis digitorū articulis bina singulis substrata: Quorum præcipua, ma-

ioraq; sunt duo, quæ primo pollicis articulo subiunguntur literis *V*. & *W*. figura duodecima

connotata ad tertij decimi *A*. musculi tendonem pertinentia. Verum neq; hic nos

latet, præter hæc duodecim, alia quedam à nonnullis addita, quæ rarissimè

apparent: cum vix duodecim hæc omnibus, nisi senibus ( præter qua-

tuor, tria videlicet pollicis, & vnum articulationis cyboidis,

quodã primū posuimus) inueniantur. Sed de quarta

denum parte hætenus dictum sit. Cuncta

verò claris proprijs capitibus ostenduntur.

ostenduntur.

ostenduntur.

ostenduntur.

ostenduntur.

ostenduntur.

ostenduntur.

ostenduntur.

ostenduntur.

ostenduntur.

ostenduntur.

ostenduntur.

ostenduntur.

ostenduntur.

ostenduntur.

ostenduntur.

ostenduntur.

ostenduntur.

ostenduntur.

ostenduntur.

ostenduntur.



Ex his figuris fat est nunc ossium numerus, suis cum nominibus, generali, & fusius; quoad cognitionem, indigebat. Nonnulla enim duntaxat obiter hic, pro intelligentia primi capitis enucleandi, tangenda essent, quoad ossa capitis, quae ad primam partem spectant: circa figuram quartam, quintam, sextamque, & septimam. Quinimodo circa primam quoque, secundamque, & tertiam. Sed o uonia quae ad has tres vniuersales figuris, pro nostro proposito, spectant, itemque quae ad quartam, sextamque, & septimam pertinent, infra in fine commenti sexti capitis primi declaratur sumus, vna cum his figuris quatuor in fine commenti tertij eiusdem primi capitis designadis: Eapropter fat superius; fuerit duntaxat quae ad quintam figuram spectant, impresentiarum suis characteribus annotare. Sunt enim ibi officula tria varijs positionibus eorum descripta. Primum scilicet, quem recetiores malleum nuncupant, literis I. M. & N. per se insignitur. Secundum vero, quae incidit eidem appellarunt, litera Q. notatur. Cumque sub malleo incus declinata sit: tunc malleus litera P. signatur. Tertium vero a nobis inuentum, & apud Graecos, nomine determinatum officulum est: quod semper litera R. ostenditur. S. autem minimum quenda ipsius mallei motorem musculum praesert. Sed haec de quinta figura. Reliquos locis proprijs, vbi necessitas occurrit enucleabuntur. Sed antequam ad capitis ossa pertransierimus, structure ossium omnium figuram facilius candidatorum memorie gratia subiungamus iuxta Galeni veteribus desumptum morem, & a recentiorum interea calumnijs defensum, hoc modo.





Ἐπὶ τῶν τῶν κεφαλῆς ὄσων κεφάλαιον. 4.

De ossibus capitis. Caput primum.

In quo nō solum de capitis ossibus, sed etiā de proprijs, cōmunibusq; eiusdem futuris, nec nō de naturalibus, ac non naturalibus, deprauatisq; ipsius figuris ( pro quarum diuersitate, futuræ quoq; variantur, figuræq; , ac numerus ossium diuersificatur ) Demumq; de ipsis etiā singulorū ossium capitis naturalibus figuris, terminationibusq; , ac substantijs pertractatur.

TEXTVS PRIMVS.

Ἐστὶν μὲν ἴδη τῶν πρῶτον, ὅτι ἐν κρατίῳ ἐπιπέδεται τὸ τῶν κεφαλῆς ὄσων, ἕτεροι μὲν ὀστέων κατ' ἄκρην, ὅσων δὲ ἴσων ἄκρην, καὶ τῶν ἄκρην τὸ ἴσον ἴσων ὀστέων κατ' ἄκρην ὀστέων πρῶτον, ἕτεροι δὲ ἐν πλάτῃ, καὶ πρῶτον γὰρ, ὅτι παρὰ τὸ σχῆμα τῆς κεφαλῆς, ὅτι θέλει ἄκρην ὑπεκαλλεῖσθαι, καὶ τὸ ἄκρην, ὅτι γὰρ τὸ ἴσον ὄσων ἄκρην σχῆμα πρῶτον μάλιστα πρῶτον, ἕτεροι δὲ τὸ καλλίμω ὄσων.

Dictum quidem & antea iam est, tum quod capitis os cranion appellatur, tum quod in eo futuræ quædam sunt. Quot autem hæ sint, & quæ, Qualisq; singularum forma, dictum quidem prius nondum est: dicetur autem in hoc. Primumq; pro capitis figuræ harum posituram, numerumq; variari. Est enim naturalis huius figura oblongæ potissimum sphaeræ affinis. Alterū verū est, quod phoxon, acuminatumque nuncupatur.

COMMENTVM PRIMVM.

**V** O'D os capitis cranion appelletur, & quare sic dicatur, cōmento statim præcedenti: proximijs scilicet vltimo, præstatū iam est. Quod etiam in eo futuræ sint, præsumptū quoq; in textu, cū cōmento nostro decimo octauo, & decimo nono fito. In quibus quædam locis enarrare, ac sufficienter elucidare illas distulimus: vt ex proposito magis impresentiarum cōpleremus. Ab ipsarum igitur futurarū vltis exordiamur, quos nouem esse tetigimus: a. ex Galeno quidem octo vanjs in locis collectos: Notū; adhuc nonū adiuu gemus. Imprimis enim quinq; vltis ab ipso Galeno didicimus libro de vsu partū nono. b. Quorum primus est ad transpirationem fuliginosorū excrementorū, quæ per ossium poros in halitum sensui-ocultum: dissolui nequieant, prout verè iam antea declarauerat: c. Notū; supra, scōdam cōpositionis ossium casum, ex ipsius etiā Galeni dogmate, posuimus. d. Vnā enim nature, ex maximis, præcipuisq; curis ea est, vt nutrimentū excrementa ex omnibus corporis partibus purget. Idq; potissimum si priiceps, quomodo cerebrum, hæc fuerit. Quod cerebrum principalissimū, ac dignissimum, verèq; omnium in toto corpore membrorū nobilissimū esse, nō Galenus modo, ex Platonis dogmate, vnicū rationalis animæ sedem ponens: sed nos etiā, nō vt vnicam, sed præcipuam, nobilioremq; animæ sedem; vt in quo nobilissimas exerceat operationes cōprobamus: prout alias vberrimè declarauimus. e. Aliq; ratione, præter nobilitatem, excrementorū exquississima expurgatione indigentem determinamus, propter vitalium spiritus cōtemperatū, attenuationemq; dñi in animales cōuertitur, ac purificationem: prout necessarios esse ad ingenium, prudentiamq; philosophus etiā edocuit. f. Ob eam igitur causam, quæ alijs etiā partibus omnibus, præsertimq; principibus cōmunis est scilicet excrementorū proprii nutrimentū expurgationem, poris, meatibusq; sensibilibus etiā, nōdum his, qui in carne sensum effugere solent, cranion indiguit: rarāq; & penetrabilē substantia. Quinimodō & magis, ob priuata superfluorū effumationē, quæ sibi a situ ipso accidit, largiore indiget euacuatione. Nam partibus omnibus corporis caput velut textum quoddam calidæ domi est superpositum, aptiusq; veluti caminus: Quod sit, vt omnia, quæ a partibus subiectis sursum effertur, fuliginosa, & vaporosa excrementa caput excipiat. Nisi igitur largā hæc expurgationem nacta sint, accruantur ibi excrementa. Quæ quidē accurata primū instar oneris caput ipsum grauant: Secūdo nutrimentū transit ad ipsum cerebrum, vias præoccupando, atq; obturando, prohibent: Tertio (quod peius est) deficientē optimo nutrimento, quod penetrare ad ipsum cerebrū nequieunt, cogetur huiusmodi excrementis, veluti cfluentis natrui. Quartōq; demū (quod pessimū est) collecta hæc excrementa ibi cōpntescunt: acrioraq; & calidiora reddita quā plurimos sequissimos, periculosissimosq; morbos, perennēq; dolores ad mortē vsq; exsuscitant. Ne quid igitur huiusmodi accideret, largiore (vni diuinas) cerebrum indigebat euacuatione: fuliginosorū inquam, vaporosorumq; excrementorum suo impetu in sublime potentū, per superiora: limosorū verō, & aquosorū sua grauitate deorsum

tendentium, per inferiora. His ergo tanquam crassioribus per palatū (vt videbimus. g.) & naris expurgandi meatus natura preparauit. At quoniam cerebrum ipsū, septo forti muniri erat necessesse: ob eamq; causam natura nō eū soli, quomodo partes ad ventriculū attinent, huiusmodi custodiam cōcedidit; Sed velut crassius quoddā, idēst galeam, os ipsi ante cutem circumposuit. Non solum nō copiosiore reliquis partibus euacuationem, sed ne mediocrem quidē erat habituram ( precipuos; sūliginososq; vaporosorumq; superiora naturaliter patentū excrementorū) nisi multas ipsi transpirationes cōparasset. Simul quidem os capitis efficiens cauertorium; sicut & futuris, quas vocant, variē coarctauit. Primus igitur suturarū vīsus hic est. Secundus vērō, vt per eas crassa menyūx ossi capitis alligetur. Tertius vt vasa alia quidem int̄o, alia autem extra exciderint. Quartus, vt per eas tenuium quarundā crassioris membranę cerebrum conueniens fibrarum, seu inaus dicere vīculorū transitū extrorsū fiat, ad pericranij generationem. Qui quidem tres iam dicti vīsus, scilicet secundus, tertiusq; & quartus, pro tertia cōpositionis ossium causā, & iam a nobis supra infimul ex Galeni monumentis, declarati sunt. *b.* Quę causa est grātia transitus siue fibrarum, vāneulorumq; aut membranarū (tam propter duriores, crassioriq; membranę cū ossibus capitis alligationem, quam propter pericranij generationem) siue vālorū, propter partium int̄iūscerā, aut extrinsecā nutritionem, vīuificationemq; & caloris cōseruationem: quę per venas, & arterias ex plentur. Quintus deniq; suturarū vīsus a Galeno in eodē loco declaratus est, vt si quando percussum ruptum fuerit (multos enim eiusmodi solent accidere) ne per totum sup̄urę eius progrediantur, sed inhibeantur illis, & cessent: vbi & (sicut quodam ipsam os suturā tenuitū cessat. ac (vt pancionibus, sed tamen claris loquamur) ne nocuentium vni parti sicut altera cōmunicetur. Idcirco ossium numerus factus est, eorumq; per suturas cōstructio. Nos autem huic quinto vīsum antea quoq; .i. vt quinq; cōpositionis ossium causam ex Galeno etiam p̄diximus: quę dicebatur dispathia. Rursusq; infra. *k.* de apēchēma quinto suturarū ossiū capitis modo loquimur, nō nihil vberius enucleabimus. Sed enumerō his quinq; vīsus adhuc sextum adiungamus, ex ipsius etiam Galeni monumentis, eiusdem libri de vīu partium volumine vñdecimo. *i.* regestum. Quem nos vt quartam ossium cōpositionis causam superioris quoq; narrauimus. *m.* vocauimus, partium discrimen. Etenim quia ossa quedam spongiosiora, leuiora; esse oportebat, quedā vērō duriora, & densiora (vt infra cum Galeno, & Hippocrate vberius elucidabimus. *n.*) Durum vērō, densiusq; cum molli, & raro appositē eōsūscere, coalescereq; non potest. Idcirco per suturam, siue harmoniā cōpōni necessarium sunt. Septimus autem has succedit suturarū vīsus, ex ipso etiam Galeno selectus, libro quoq; de vīu partū vñcto, *a.* videlicet vt corpus cerebrū ventriculis incumbētibus, ipsorumq; eū ventriculorū suspensio, eleuatioq; fiat, ac per hoc defensio ventriculorum, ne ab illis incumbētibus partibus cōprimantur. Vt particulatim coronalis anteriorū ventriculorum: Recta vērō modis, seu tertiū ventriculi, meatusq; illius, qui ad vīsum penetrauit ventriculū. Deniq; lambdoides suturę posterioris huius quarti ventriculi accumbentia corpora eleuat, suspenditq; & a cōpressionē liberat. Dum crassior membrana, extimūm cerebrū inuolucrū p̄dictis corporibus, siue p̄se, siue p̄ce equiores membranam, aut per venas, & arterias, quoniam per hęc omnia, colligatur. Quę propter per suturas deinde suspensū cū ossibus alligata (vt scōdus vīsus erat) ac per hoc suspēsa (vt nunc etiam dicimus, septimumq; vīsum ponimus) ventriculos ipsos in sublime tollit, ab omniq; cōpressionē, ac decidētia in semetipsa, vendicat, defenditq;. Quos omniō cōprimi, grauari, ac artēari contugisset, nisi crassior hęc membrana, in his capitis partibus; hocq; etiam modo fuisse locata. Neq; enim quemadmodum corū ventriculi propter corporis ipsius duritiem, nunquam cōprimuntur, nullo ad id extremo egentes p̄sidio: Ita qui in cerebro sunt ad eō molli ab omni cōpressionē, absq; vīso extremo auxilio, immunes esse poterant. Qui quidem p̄dictus septimus vīsus apud rectam maximam (Galeno etiam erudite. *g.*) est, propter crassioris membranę dupli- cationem, eū tenuis membrana suis cum vasis omnibus, ac per hęc eū cerebri substantia colligantur. Minor vērō apud lambdoidem; quāuis duplicatio crassioris membranę, suturę nō sic respondeat, vt illi ē regione subiecta sit (vt manus recte protulit idem Galenus. *q.*) propinquas tamen inferius duplicatio suturę est. Idcirco; ad suspensionem validior hęc, quam coronalis. Cum in hac nulla euidentē membranę duplicatio in profundā cerebri substantiā vni cum tenuis, suisq; vasis penetrans sit, quemadmodum in duabus p̄dictis; directē quidem sub recta, proximē vērō sub lambdoide. Suspendit tamen sibi colligatas subiectas partes tantēta p̄dicta duplicatio nem minimē (nisi in medio vbi recta coheret) continet. Octauus tandem suturarū vīsus ex Galeni quoq; monumentis electus est, libro videlicet methodi medendi tertodecimo. *r.* Vt medicamen- torum vires, precipuos; per coronalem int̄o, ad alterandū cerebrū, penetrare queant. Quamobrem ad noiscendum locum applicationis remediōrum, siue refrigerantū, siue resoluētū, sutu- rarum situs admodum confert, vt perbellē alibi eū p̄monuit Galenus. *f.* sic scribens [A] vt verō regio capitis iuxta sinciput, propter laxitatem coarctulationis iuxta coronale suturā, & qd ossiū

g. infra  
con. 7.vīu scūm  
dat.h. Com. 10.  
circa prin.  
in prom.  
mo.i. libidē.  
k. Com. 7.  
post med.l. Cap. 18.  
in princ. &  
cap. 19.  
m. Prognij  
com. 10.  
n. Tex. &  
com. 70.o. Cap. 70.  
p. 1.  
q. 1.  
r. 1.  
s. 1.  
t. 1.  
u. 1.  
v. 1.  
w. 1.  
x. 1.  
y. 1.  
z. 1.aa. 1.  
bb. 1.cc. 1.  
dd. 1.ee. 1.  
ff. 1.gg. 1.  
hh. 1.ii. 1.  
jj. 1.kk. 1.  
ll. 1.mm. 1.  
nn. 1.oo. 1.  
pp. 1.qq. 1.  
rr. 1.

tenuitatem, & raritatem facillè tum caliditatem, tum frigiditatem omnium, quæ adhibentur, pharmacorum interò distribuit. Quare siue refrigerare oporteat, ex caliditate ardorem, siue caliditate frigiditatem, aptissimus est capitis iuxta fynciput locus.] Octò igitur futurarum vltus prædicti iam ex Galeni monumentis collecti sunt. Non omnes tamen cuiuslibet futuræ: sed primi quidè quatuor vltus sunt superiorum duntaxat futurarum: scilicet coronalis, rectæq; & lambdoïdis, ipsarumq; etiam amborum squamosarum. Quintus verò & sextus omnium tam harum, quam aliarum quoq; futurarum, quinimò & ipsarum quoq; harmoniarum, atq; etiã gomphosum, cõclauationumq; cõmunes sunt. Septimus autem vltus duntaxat trium, scilicet coronalis, rectæq; & lambdoïdis. Præcipuè verò ipsius rectæ, cõmunis est. Octauus deniq; nõ modò his tribus, licet magis his, quã alijs, præsertimq; coronali, sed squamosis etiam, atq; alijs, quæ in temporibus, ac facie sunt, oculisq; ac palato: siue futuris, siue harmonijs, cõmunis est: quæ harmoniæ iam sub futuræ generatim capto vocabulo comprehenditur: quanquã propriissimè dictæ futuræ sint duntaxat tres: scilicet coronalis, rectæq; & lambdoïdis. Prædictis autem octò futurarum vltus nonum quoq; adiungemus à nemine quidè ante nos hucusq; perpen sum, primo tamen vltus quodammodo oppositum. Ille namq; erat propter fuliginosorũ, vaporosorũq; tenuium excrementorũ ad superiora tendentium, transpirationemq; petentũ reuoluntionem, hic verò nõ superiorũ (vt ille) futurarum, sed inferiorum vltus est: propter expurgationem, translocationemq; aquosorum, limosorũq; suo pondere deorsum tendentium excrementorum (vt vberius postea declarabimus.) Sunt autè ad hunc vltum factæ futuræ, præsertim sexta, & septimã inferius elucidandæ: .x. Itẽq; maxillæ superioris illæ, quæ in oculorum cavitatibus secundis, & tertio vocatum maxillæ superioris ossa circũscribunt. Quorum tamen superiores partes ad secundã cõmunem inferius quoq; declarandam .x. pertineant. Inferiorq; pars cõmunis primæ cuneiformæ os circumferentis, ac lambdoïdis tandem additamenta: de quo quidem excrementorum crassiorum euacuandi modo distinctiõs infra pertractabimus. .y. Sed hæc de futurarũ vltibus. Quot autè, qualesq; sint, distinctiõnem restat. Cum dicat huc Galenus pro capitis figura futurarum positurã, numerũq; variari: prout ex Hippocratis dogmate alibi etiam declarauit. .z. Vt igitur hæc exquisitè pernouerimus, ventatèq; deinceps inueneramus, vniuersas capitis figuras ex Hippocratis, Galeniq; monumentis perpendamus: E quibus & futurarũ in figura etiam ipsarum propria, situq; & numero diuersitates ipsẽm auctores effinxerunt. Triplex igitur capitis figura est, quædam videlicet naturalis: quædam verò deprauata, & dicta Græcè *επιεστ*, latine acuminata, quæ nõ naturalis est. Quædam deniq; præternaturalis, nõstrosaq; & naturalem prorsus opposita: quã Galenus (vt videbimus. .a.) & acuminatam quoq; vocat, sed impossibilem inuentu nõ temerè existimauit. [Naturalis igitur figura (inquit alibi Galenus. .b.) capitiue propria est. Veluti si excogitares spheram exactè rotundam ex ciera cõstructam paulatim vtrinq; depressam. In hac enim necesse est, vt posteriores, priorese partes plus gibbæ fiant, quam spheræ cõueniat. Quæ verò vtrinq; consistunt, magis rectæ.] In qua naturalis figuræ definitione, duo consideranda veniunt. Primum, q̄ rotunda est. Secundum, q̄ rotunditas illa vtrinq; cõpressã est. Adcõ vt nõ temerè impræsentiarum à Galeno dicatur, q̄ ad oblongæ spheræ similitudinẽ structa sit. Rotunda enim est, & spherica [Quonã vndiq; sibi ipsi simillimum est, quod rotundũ est, atq; orbiculare (Galeno etiam ipso nõnunquã cõprobante. .c.) ob idq; omnium figurarum ad patiendum est difficillimum, omniumq; etiam est capacissimũ, earum, quæ æqualem habent dimensionem. Est autem cõmodum id haudquaquã cõtemnendũ vasis, meatibus, ventriculis, omnibusq; demũ, quæ ad continendum substantias quãdam fuerint cõparata. Quandoquidem horum omnium ea sunt præstantissima, quæ minima corporis mole plurimum cõtinere queant.] Cur igitur spherica, rotundaue facta sit, ex prædictis Galeni verbus liquet. Cur autem oblonga, eaq; spherã vtrinq; leuiter cõpressa sit, Galenus etiam ipse alibi docet, sic scribens. .d. [Cum enim retrò cerebellũ (addesq; tu, & spinalis medullæ principiu) Ante verò ad oculos, ac nares apophyses, processusue positi sint: iure optimo caput naturale prelonge spheræ fuit.] Haudquaquã tamen adcõ oblongæ figuræ (vt de macrocephalis Hippocrates scripsit, .e. naturaliter esse debet. [A principio siquidem (inquit ipse) lex in causã fuit, vt tam longis capitibus essent (qui scilicet macrocephali vocabantur: Cum nulla aliã gens sit, quæ similia capita habeat.) Nunc autem natura ipsã cõsuetudine cõspirauit. Si quidem generosissimum apud eos putatur, caput habere quimaximè longum: consuetudinis autem hoc imitũ fuit. Quũ recens infans natus est, caput eius adhuc tenerum, ac molle existens quamcelerrimè cõstringunt manibus, coaptantq; cognunt in longitudinem augeri: quin & vinculis cõnectunt, ac aptis instrumẽtis colligunt, quò rotunditas capitis prohibeatur, ac longitudo augeatur. Ea consuetudo tãtum effecit: vt cuiusmodi natura capiti existeret. Tẽporis verò progressu natura quoq; tales .pduxit, vt nõ esset necesse cõsuetudine priore cogere, &c.] Paulòq; inferius subdit. [Nunc autem nõ nascuntur ita magnis (hoc est, longis capitibus, quemadmodũ prius: Cũ cõsuetudo nõ amplius duret, per incuriã hominũ intercepta.) Sed de macrocephalis hic obiter dictum sit,

Quod p̄dicitur nõ omnium futurarũ singuli sunt.

Vltus nonum.

amb.

cap. 17.

cap. 17.

cap. 17.

cap. 17.

cap. 17.

cap. 17.

cap. 17.

cap. 17.

cap. 17.

cap. 17.

cap. 17.

cap. 17.

cap. 17.

cap. 17.

cap. 17.

cap. 17.

cap. 17.

cap. 17.

cap. 17.

cap. 17.

cap. 17.

cap. 17.

cap. 17.

cap. 17.

cap. 17.

cap. 17.

cap. 17.

cap. 17.

cap. 17.

cap. 17.

cap. 17.

cap. 17.

cap. 17.

cap. 17.

cap. 17.

cap. 17.

cap. 17.

cap. 17.

cap. 17.

cap. 17.

cap. 17.

cap. 17.

cap. 17.

cap. 17.

cap. 17.

cap. 17.

cap. 17.

cap. 17.

cap. 17.

cap. 17.

cap. 17.

cap. 17.

cap. 17.

cap. 17.

cap. 17.

cap. 17.

cap. 17.

cap. 17.

cap. 17.

cap. 17.

cap. 17.

cap. 17.

cap. 17.

cap. 17.

cap. 17.

cap. 17.

qui oblongum quidem caput habent cum duabus eminentijs: in fronte altera, altera verò in occipite, vt naturalis figura est: sed tamen nimis oblongum caput, nimumq; protuberantes eminentias ex praua consuetudine in naturam conuersa, obtinuerunt. Nostrum verò propòsitum cum sit, ex figurarum capitij diuersitate (iuxta Hippocratis à Galeno celebratam existimationem) futurarum quoq; numerum, situmq; , & figuram, diuersa hæc tria (veluti rursum ex harum trium diuersitate, ossium etiam numerus, ac figura verè diuersificantur) pro Galeni verborum intelligentia, concludere, ac tyronibus propalare: Idcirco ad naturalem figuram reuertamur, eiusq; prius futuras cum Galeno contemplemur, deincept ad alias migrabimus.

## TEXTVS SECVNDVS.

Τὸ μὲν δὲ κεφάλαιον, ἔστι τὸ σφαιρὸν, καὶ ἡ τεκταμένη παραπέταται ἀπὸ τοῦ σφαιροειδῆς εἰς τὸ σφαιρὸν ἐν αὐτῷ κεφάλαιον. καὶ τὸ γὰρ ἐπιπέδον, καὶ τὸ δὲ σφαιρὸν παραπέταται ἀπὸ τοῦ σφαιροειδῆς εἰς τὸ σφαιρὸν. τρίτον δ' ἄλλον σφαιρὸν εἶναι, καὶ τὸ μῆκος τοῦ κεφαλαίου ἀπὸ μῆκου τοῦ σφαιροειδῆς εἰς τὸ σφαιρὸν εἶναι, ἀποδείξαι δὲ οὐ δύναται. καὶ τὸ σφαιρὸν εἶναι, καὶ τὸ μῆκος τοῦ κεφαλαίου, καὶ τὸ σφαιρὸν εἶναι, ἀποδείξαι δὲ οὐ δύναται. καὶ τὸ σφαιρὸν εἶναι, καὶ τὸ μῆκος τοῦ κεφαλαίου, καὶ τὸ σφαιρὸν εἶναι, ἀποδείξαι δὲ οὐ δύναται. καὶ τὸ σφαιρὸν εἶναι, καὶ τὸ μῆκος τοῦ κεφαλαίου, καὶ τὸ σφαιρὸν εἶναι, ἀποδείξαι δὲ οὐ δύναται.

Quod igitur secundum naturam est, tum in anteriori, tum in posteriori, prominētius existens, tres habet vniuersas in seipso futuras: duas quidem transfueras (Quarum altera circa occiput, altera verò circa synepitum extenditur) Tertiã verò ab his aliã, secundum capitij longitudinẽ à posteriori medio, ad anteriori medium protensa. Nuncupant autẽ eam, quæ in anterioribus, coronalem: quandoquidẽ in hæc potissimum capitis parte coronæ circumponuntur: posteriorem verò, lambdoidẽ, quoniam vniuersa huius figura literæ lambdæ affimilatur. Ipsa verò futurarum figura H. literæ præcipue similis est. Suturae quidem naturalis figuratiõis cranij dictum habent modum.

## COMMENTVM SECVNDVM.

**R. E. S.** inquit futurus esse in capite, quod secundum naturam habetur: sic his duntaxat intellegens, quæ pro varijs capitum figuris diuersitate patij, ex ipso Hippocrate, expressimabatur. Haud enim simpliciter tres esse duntaxat futuras voluit: Falsissimum namq; (vti videbimus .f.) esset: sed quod tres sint, quæ varietatem recipere credidit. Aliarum enim omnes in omnibus caluarijs, omnibusq; earum figuris eadem sunt. Dicit autem hoc est, vniuersas: quoniam scilicet vniuersales hæc in omnibus, quarum nonnunquam transpositæ, sint: vel vniuersas .q. d. totas, siue totales, quoniam integræ in omnibus existant. Prima igitur est, quam Græce στεφανιαία, latinè coronalem veteres appellitarunt: quoniam in ea potissimum in capitis parte coronæ, hoc est coronæ, siue στεφανιαίας, quod est corollæ collocantur. Hæc enim est nomenclaturæ ratio à Galeno relata, & nõ ea, quæ à Andrapacis Introducitorij interpretis fua maneris adiunxit, dicens .g. [ à corona, cui affimilatur, stephaniciae glossam dicitur ] verba enim hæc ipsius interpretis, nõ Authoreis Introducitorij verba sunt. Si Authorem igitur ille interpretis, volebat, hanc debuit nominis rationem ex Galeno subdere, quam hic posuit. Cum præcipue Galeno liber ille ascribatur: adeo vt Galenũ pro Galenũ interpretatus fuisse. Mirandum verò magis de Syluano correctore, qui verba hæc adiuncta minimè aduertit. Quanquam absurda nõ est ea Andrapacis ratio, scilicet vt ideò coronalis futura dicitur, quia coronæ affimilatur. si cũ cõmuni sphenoides os circumscribente sutura cõiungatur, totum superne deorsum, versusq; in ferne sursum in cranij circueis. De qua quidem cõmuni habedus infra sermo est, .h. Quod si nõ cum illa, sed cũ septima à nobis nãsera futura .h. cõiungatur, coronã quoq; quadaatenus representabat. Quinimodõ exquisitiõs cuncta contemplanõ, quã septimã dicemus, eadem coronalis future pars est. Coronamq; tunc perbellè aduertes, quum frontis os vndiq; ab alijs omnibus separaueris. Verũ igitur dicere potuit pro se loquens Andrapacis. Quia tamen dissonus interpretis est, quoniam authoris mentem, ac verba nõ obseruat. Eapropter Andrapacis glossam dimittimus, ad secundã futurarum transcendentem, quam nõ rectam modo, sed sagittalem à sagittæ similitudine, & verualem, siue acutalem, aut virgalem, à veru, siue acus etiam, aut virgæ similitudine appellant, velut abj columnalem, ob suam quoq; rectitudinem (in hac enim cõstitutã sagittæ, veru, & acus, ac virgæ etiã similitudo) nuncupantur. Nos autem rectã dicere cõiungimus. Tercã demum esse futurã nuncupata lambdoides à lambdæ .A. literæ Græcæ omnibus cõpertissima similitudine sic dictã. Coronalis anteriorẽ partem occupat, frontis os a synepitum ossibus distinguens. Rectã mediã summãq; apicis partem ab anterioribus versus posteriõra, scilicet à coronali ad lambdoidẽ vsq; rectè intersecat, duo synepitum ossia à seinuicẽ separans. Quæ nihilominus interdum rectõ etiã tramite vltra progrediens,

predians, os quoq; frontis, interdum verò occipitis os, nonnunquam autem vtrunq; interfecat, frequentius verò, dum proprios limites excedit, à lambdoide per mediã frontem ad eam peruenit, quæ in medio superciliariorũ, nasi officula etiam abinuicem diuidit; vtrunq; harum interfecat, quæ per mediã oculorum sedem permeans cõmunium secundã definitur. *k.* Rarissimè enim in puerulis, infantibusue potius, aut nondum natis, occiput distinguere obseruauimus. Neq; ad totum in quadrimembris etiam embryonibus; sed parte duntaxat superiore. Quæ quidem distinctio potius ob imperfectam adhuc ossium generationem, quam ob futuram facta est. Quæ de causã p lynchondrosim vnitas ambas partes vidimus: quæ paulatim deinde magis, ac magis durefcente intermedia cartilagine, & in ossiam naturam conuersã vsuntur, vnamq; occipitis os constituit. Frequentissimè igitur à lambdoide ad coronale tantum, vel e contra non vltro progrediuntur, sed duntaxat fyncipitis ossã à fyncipium fecerens peruenit. Nullam interea differentia obseruans, siue in masculis, siue in mulieribus sit. Quicquid nonnulli quidè ineptè, ac vulgèriter dixerint, quia mulieribus propriam esse autumant eam, quæ frontis quoq; os per mediã diuidit. Non minus enim masculis, quin fortasse magis his, ob maiorem substantiæ raritatem, quam mulieribus aduenire huiusmodi diuisio (quanuis rarò, nonnunquã tamen) consuevit. Quemadmodum neq; vera est Aristotelis sententia. *l.* dicentis: virorũ futuras plures esse, quam feminarũ. Etenim equalis est vniuersũ futurarũ numerus: Nisi aliter ex accidẽtũ vel in masculino, vel in feminã contingat. Sed eniuerò magis falsa cõmuni determinatio videtur, dum scribit, Mari tres in summũ verticem ascendentes futuras in idem magna ex parte coeuntes; in figurè triangulè speciem. Haud enim in triangulè speciem coeunt: sed, veluti Galenus cũ Hippocrate inquit, in speciem literæ Græcæ H. vel si cũ quatuorissimè agglutinationibus cõtingas, quadrangulè potius formã vtrunq; referunt. Duo enim quadranguli sunt, abinuicem per rectã futurã distincti. Quid verò dicendum: quã idem philosophorũ non iniuria princeps, ac spiratibus aut feminarũ futurã vnica duntaxat esse, circulariter tamen, & in orbem cõuolutã? Nullam profectò vnquã hõminis siue masculi, siue femine caluariam se proprijs oculis cõspexisse præsert: sed ab alijs fortasse vel scriptis legisse, vel proprijs auribus hausisse. Quibus tamen minor, quã proprijs oculis; in re vti tam prompta, fides habenda sibi fuerat. Quemadmodũ etiam & in canũ caluaria obseruasse promptissimũ sibi fuerat, vt nõ modò has tres futuras, sed alias quoq; multas in illis aperte cõspexisset. Ex quo falsum esse quod ipse scripserat, aduertisset; quã sic dicebat. *m.* Alijs ossẽ continuo calua perficitur, vt canũ.] At nostrũ prosequamur propositũ. Tres igitur futuræ sunt, quæ super naturã capitis figura, speciem referunt literæ H. [Quod verò cõsentaneũ fuit (inquit Galenus) vnam quidem per mediũ capitis rectã, duas autem esse transuersas, nihil multis verbis nobis opus erit: cum enim caput velut sphæra quædam sit prolõnga, iure vnã quidẽ rectã per mediũ ipsius à posterioribus in anteriora est extensã: Duas autem transuersè hanc excipiunt; sitq; trium futurarũ figura H. literæ Græcæ similis. Nam cum secũdũ hanc figurã totum caput sit longius: atq; ad aures vtrunq; quasi cõpressũ: æquum fuit futurarũ numerũ esse inæqualem in longitudine, ac latitudine, alioqui falsò Hippocrates naturã assereret. *n.* ipsi: si ipsi iniqua; libus equalia tribueret. At nõ est ita. Quemadmodũ enim est iustissima: Ita quæ futura secundũ capitis longitudinẽ recta extenditur, vnam effecit, partibus, quæ vtrunq; ipsius sunt, dexteres scilicet, ac sinistras: Ita demũ latitudinem cõmoderatã habiturus. Transuersas autẽ duas numerò effecit: Alteram quidẽ posteriorem (vt antea quoq; diximus. *o.*) quã lambdoide appellamus. Alteram autem anteriorem, coronalem. Vt nos capitis, quod inter duas has futuras sit mediũ; ossibus vtriusq; partis mediæ futuræ sit equabile.] Hęc Galenus, circa cuius vltima verba aliquantulum obsecuro: Græcè [ὅτι τὸν ἄνω τὸ μεταδὲ τῆς ἄνω τῆς ἰσθμῆς τοῦ τοῦ κεφαλῆς τοῦ τοῦ μέγιστον ἰσθμῆς.] hoc est, [vt os capitis, &c.] notandũ est, quod bisariam intelligi possunt. Primò nõ aliud à Galeno intendi, quã quod remotis, per coronalẽ quidẽ frontis eminentia, per lambdoide verò occipitis extuberantia, quod reliquũ est inter has duas futuras mediũ ossis spatium equabile sit ambobus ossibus vtriusq; partis, scilicet dextro & sinistro simul iunctis, æqualiterq; sic quadratum sit, q. d. tantũ à coronali lambdoide distet, quanta à laterẽ ad laterũ distantia est. Id quod tamen, si ab altero temporis ossẽ alterũ temporis quoq; os, siue à squamosã agglutinatione ad squamosã mensurãdo intelligatur: falsum omninò est: longè maior enim distantia est à laterali hac futura ad futurã in alio latere sibi oppositam, quã sit à coronali ad lambdoide, interuallem. Sin verò secundũ capitis quandã veluti planitiem intelligatur, vt à locõ parũ supra temporalem musculũ, ad locũ propè alterius lateris temporalem: vnde præsumpti, ac deorsum inclinare os aptè paret, sic quidẽ, & si nõ exquisitè, apparenter tamen equabile videtur totũ id spatium alteri quidẽ interuallo, quod inter coronalẽ, & lambdoide existit. Alter verò eadem Galeni verba intelligere quisquis, & procul ubi melius, q. scilicet intermediũ os, siue ossis spatium, quod est inter duas futuras mediũ, videlicet inter coronalẽ, & lambdoide, æquale sit ossibus vtriusq; partis, separatim scilicet alteri eorũ ossium per se. Sæpi; si non exquisitè semper, secundũ latitudinẽ

k. Infã  
100.1.b. 107. q  
2. b. 1. 1000Cõtra Ari-  
stotelem.  
l. de part.  
c. 7. versus  
finem. de  
hist. c. 7. &  
3. eiusdem  
cap. 7. circa  
prin.  
Cõtra Ari-  
stotelem.  
c. Contra  
Gundem.c. Contra  
Gundem.  
m. 2. d. hist.  
animal. c. 7  
circa prin.  
\* 9. de v. p.  
c. 17. post  
prin.n. I. b. 1. de  
fig. 100. 1.  
c. 10.  
o. Com. præ-  
fati.Galeni lo-  
cus expo-  
situs.  
Expositio  
prima.c. 1. 100. 1.  
c. 100. 1.

tamen quandā, & faltem fecundū apparentiā aequalia funt, vt quadrata appareant. Trium igitur futurarū principalium, vteriorumq; numerus, figurāq;, ac fitus in capite naturali, propria; figura infignito dictū iam funt. In quorum diftributione iufliffimam aequalitatem naturā oftēdimus. Quas cum in tribus primis vnuerfalibus figuris, ac fexta etiam in proeminio pofitis aperiffimē confpici, vel fecundū totū, vel fecundū partem fingulę poffint, Nō efl, vt hic rursus eas repetamus. Saz enim, fuperq; fuerit proprijs characteribus, quibus figurę funt, eas indigitare.

Sutura coronalis in prima, fecundāq;, ac tertia, nec non & ipfa etiam fexta proemij figuris litera A. notatur.

Sutura lambdoides fig. 2. & 3. B. & fig. 6. a. c.

Sagittalis fig. 3. c.

De alijs autē futuris loquemur poftea. p. Reliquū efl, vt hanc naturę inffitūā in capite naturali obferuatā, in acuminatis quoq; capitibus obtemplemur. De quibus ftatim Galenus hęc fubdit.

p. Tex. & com. 1. & 6.

TEXTVS TERTIVS.

Αἱ δὲ τὰ ροφῆ κ' ἄλλα δι' ἀνάγκης, τὰ δὲ ὀπίσθια ἀπολλομένης ἕξωθεν, καὶ ἡ λαμβανόμενῃ ἡαρο σφαιρικῶτα, τὰς δὲ ἑμμετρούς, ἡ ἑραπῶα, καὶ ῥοφῆται καθ' ἑκάστην αὐτῶ τῶ σφαιρικῶτα ἡαρο σφῆρα τῶ. Τ. Γραμματικῶ παραπλήσει, ἀμφοτέρω δ' ἀπολλομένης ἡ ἕξωθεν, αἱ σφαιρικῶτα δύο ἡαρο πρὸς ἑαυτῶ ῥοφῆτα ἀλλήλων ῥοφῆται εἰς ἑμμετρούτα τῶ. Τ. Γραμματικῶ, τίεταιται δὲ, ἡ δὲ ἕλαρσία, κ' ἡ μῆτα μάλιστα τῶ ῥοφῆτα, ἡ δὲ ἑπῆτα τῶ πῶ ῥοφῆτα ὅτιοις πρὸς ῥοφῆτα, καθάτηρ εἰς τῶ ἄλλων ἀπῶτασ ῥοφῆτα δὲ δὲ γὰρ αὐτῶ διαρροῶαται. Μεταρροῶται δὲ αἱ ῥοφῆτα τῶ πῶ ἄλλων ῥοφῆτα σφαιρικῶτα.

Quę verò acuminatorū sunt futurę his modis cōstitutę sunt : posteriore nanq; eminentia dotata, iutura etiā lambdoides infigmul aboletur, anteriore autē, coronalis. Fitęq; per vtraq; futurarū futurarū figura T. literę similit. Ambabus autem aboletis eminentijs, geminę, quę feruantur, futurę ad rectos scinnicem angulos interfecant X. literę similitudinē referentes. Extēnditur enim, transfuerfa quidem, per medium potiffimū caput; Altera verò secundū longitudinem a posteriore in anterior, velut in cactis caluanijs omnibus, prolata. Semper enim hęc feruatur. Reliquę verò cum totius capitis figura vanantes intercidunt.

COMMENTVM TERTIVM.

RES duntaxat nonnaturales, deprauatāq; capitis figuras ponit hic Galenus, quas acuminatas Gręcē ροφῆ vocat. Quartam verò deprauatam quoq;, ac acuminatā se alibi .q. vocatam tanquā preternaturālē, ac penitus moniftram prætermisit. Dicuntur autem illę tres figurę acuminatę, seu fastigiatę, Gręcē (vt diximus) ροφῆ, q. d. acute. Cū verò naturalis capitis figura oblongę spherę similitudinē repręsentet: vbi due (veluti iam iam prædiximus .r.) eminentię, scilicet anterior, & posterior protuberant: Quę quorū quidem modis vitari, ac deprauari hanc cōtingit: vel enim vtraq; dependit eminentia, cecidatq;, tam scilicet ea, quę frontis, quā quę occipitis existit: sicq; exquistē rotunda est. Ad cō vt exquistā, perfectāq; spherā dici potius dēbeat, quam phoxos, siue acuminata, nisi per compressionem vtraq; eminentia iursum in vnam cōuertat vergat (quarū figura tertia in fine huius cōmenti posita demonstrabit) vel altera duntaxat eminentia deest, anterior scilicet, aut posterior, vti due sunt, quibus acuminatę nomen, & onicephali aptius congruit (quas prima, & secunda figura demonstrabit) vel quarto demūmodo vitatur: quū scilicet nō verāq; tantū eminentia, anterior inquam, & posterior euauuit (vt de prima deprauatā figurā prædictū iam est) sed etiā ficta est quędam earundem eminentiarū permutatio: vt quę in fronte, & occipite esse debebant, hęc in aurbus existāt: sicq; velut in figura naturali maior est a fronte ad occiput, quā ab aure ad aurbem longitudo: Ita econtrā hic maior sit ab aure in aurē intercapedo: quā a fronte ad occiput. (Hanc figurā quarta inferioris præfciert) Hęc autem, veluti & deprauatā huiusmodi prima acuminata dici propriē nō debet: Galenus tamē omnes quatuor has deprauatās figurās (vt viderimus) ροφῆ, hoc est, acuminatas, siue acutas (licet quantū ad primā, & quartam actinet, largiū) appellat. Theriften Homerus phoxos posuit caput habetēm: sed quānam acuminatā speciem ille habuerit, incertū est. Verūm enimvero singularū huiusmodi deprauatā figurarū iuturas ex Galeno etiam alibi fufius loquente contemplemur: futurarūq; earundem simul in singulari numero, fitūq;, ac formā determinemus. Non modō enim in proprię, naturaliq; figurę capitis futuris, earūq; numero, fitu, & forma: sed etiam in huiusmodi acuminatis, deprauatiq; capitibus iustiffimam esse naturā inueniemus. Quamobrem Galenus postis ita scriptū reliquit. [Maximū autem in naturę opombus æquitas speciem funt capiti fastigiatōrū, siue acuminatorū futurre,

p. 2. de v. p. cap. 17.

v. Com. 1. & 2. Figure deprauate quatuor.

f. 2. de v. p. cap. 17.

Tres enim sunt omnino ipsorum figure. Prima, quæ hoc loco tertiam Galenus numeravit ei plane est  
 contraria: quæ naturaliter sese habet. De qua haud ita pridem sumus locuti: quando scilicet caput  
 ambas amiserit eminentias: occipitis scilicet alteram, reliquam autem frontis. Æquale autem sit  
 vndequeque, & quasi perfecta sphaera. Duæ vero alie sunt figure: quarum altera quidem in fronte,  
 altera rursus in occipito nullam habet eminentiam. Ceterum capitis sphaerici, ac rotundi figura  
 X. litteræ similes, & duabus tantum futuris sese in duo interfecantibus: Altera quidem ab aure  
 vna ad alteram transierit, altera vero recta per mediū verticem ad frontem media extensa. Quem  
 admodum enim quum pars capitis altera exuperat, quam altera longior existens, equū sit, eam  
 partem, quæ longior est, plures habere futuras. Sic quādo pars vtraque est æquabilis: Numerum  
 enim futurarū ipsi æquabilem naturā dedit. Hæc igitur de primæ depravatæ, acuminatæ  
 figurarū futurarū dicta sunt. Et quibus & eandem futurarū numerus patet: quoniam scilicet  
 nō amplius tres, sed duæ tantum, hæc, ambe sunt rectæ. Adcō vt neq; coronalis, neq; lambdoïdes  
 futura in huiusmodi figura repantur. sicutq; earum restarū in medio capitis, non amplius circa  
 eminentias: Figuraq; X. Græcæ litteræ, vel croci similis euidens sit. Sed quæ de secunda acuminatæ  
 figuræ subiunxerit ibidem Galenus (quæ tamen in præsentī textu prima numeratur. Nihil  
 enim refert quocūq; proponamus) intelligi, per hæc verba [ In capite verò, quod in occipito  
 nullam habet eminentiam, futuræ quidē manent rectæ, & coronalis: perit autem lambdoïdes. Hæc  
 enim deperditæ eminentiæ erat propinqua: vnde ex duabus his futuris figura sit T. litteræ affimilis. ]  
 Hæc de secunda, hic autem prima, Galenus vbi de numeris futurarū, sicutq; earum, quæ reman-  
 serunt, ac etiam forma iam liquet. Deæ enim futuræ duntaxat remanent, proprio interim loco  
 dispositæ, non H. sed T. litteram referentes. [ Quemadmodū sanē & quum capitis eminentia in  
 fronte perierit, simul quidē & cū ipsa perit coronalis: Relinquitur verò sola recta cū lambdoïde.  
 Rursus etiā figura hæc cōpositionis similis T. litteræ efficitur. ] Iam & in hac ( quam Galenus im-  
 præsentiarum secundo loco posuit) numerus, sicutq; & cōpositionis figura futurarū liquet. Atq;  
 tres hæc sunt: quas hic Galenus posuit tanquam reprobiles: vt quas ab Hippocrate nō nunquam  
 visas existimauit. [ Quarta autem species (vt subdit) acuminati capitis cogitari quidē potest: sed  
 fieri nequit. Vt si caput ad vtranq; aurem efficeretur prominentius, quam in fronte, & occipito.  
 Quæ species si modo cōstare posset, haudquaquam sphaera hæc ei, quæ est secundæ naturæ diceretur  
 cōtraria: sed solum diceretur, qd longitudo tota in latitudine ei esset transfusata. Nunc autem  
 tanta à naturali digressio fieri non potest. Non enim acuminata a cōspici huiusmodi species, sed  
 monstruam esse, neq; posse vivere: cuius causā est perspicua, his saltē, qui diēta ante nō om-  
 nino negligenter audiuerunt. Cū enim retrō epencranis, id est cerebelli, ante verò ad oculos,  
 & nares apophyses posita sint: iure optimo caput naturale prælongæ sphaeræ sit affimile. Emi-  
 nentiæq; tam posterior, quam anterior, aut vtræq; simul possunt interdum amitti, Nō tamen cō  
 amissio hæc potest progredi, vt aliquid etiam de ipso cerebro simul deperdat. Quod certe om-  
 nino vix veniat, si ad aures duotenus eam, quæ secundum longitudinem est dimensionem supo-  
 rarit. At id quidem fieri nequit: proinde & capitis figura huiusmodi cōstare nō potest; ob eamq;  
 causā Hippocrates quatuor omnino figuras, & etiamq; futuras, quomodo paulo ante habere di-  
 ximus, alitruis, nusquam in suis cōmentariis quintæ capitis figuræ mentionem faciens. ] Hæc ex  
 Hippocratis sententia Galenus. Qui præternaturale, & verè nō acuminatā hanc vocat, impossi-  
 bilemque, vt inueniri possit, Hippocrateraq; nusquam in suis cōmentariis de huiusmodi figura me-  
 minisse. Adcō vt mirandum profectō de solertissimo Vesalio. s. sit, qui ab Hippocrate quoq; nu-  
 meratam hanc figuram, scripsit: locum enim desideramus, vbi de hac Hippocrates meminere  
 quemadmodū Galenus etiam desiderauit. Cōclinator. n. autem ait [ In Nano tamen quoddā mon-  
 struoso, ac alio huc quasi cōsimili, mensurauit maiorem distantiam fore à rēpore in tempus, quam  
 ab occipite in syncaup: vt hanc quartā videretur capitis figuram innaturale habere. ] Vgo etiam  
 Senensis, \* præter hos duos, quos Cōclinator se vidisse testatur, tertium se cōspexisse ait: sic dicens  
 [ Ego teitor me Bononiæ vidisse, & mensurasse in puero quatuor annorū ] Vesalius. x. quoq;  
 alios tres se vidisse refert, sic scribens. [ Quamuis interm Vnetiis puer multis partibus deorsum,  
 & admodū amens hac figura bodie cōspiciatur. Immo apud Bononienses mendicus obambulat,  
 cui caput quadratū, sed latius paulū, quam longius cōtingit. Præterea Genæ puellus annos natus  
 serē tres à mendica oluatum circumciatus est, & paulū post in nobilissima Belgarum Brabantia ab  
 hystrioiibus fuit propositus. Cuius caput in vtranq; latus protuberans duobus vitorū, capiti-  
 bus grandius est. ] Hæc igitur sex capita ab his doctoribus contra Galeni sententiam viā sunt: Nosq;  
 ceptimam Patavij, anno millesimo quingentesimo trigesimo quarto mendicū quendam annorū  
 treptur duodecimū, in Ecclesia Dni Antonij spemnumero cōspeximus, mensurauimusq;  
 tametsi à longe cōspicientibus quamprīmū latitudo longitudine maior apparebat. Monstruosus  
 tamen ille erat, imperfectissimusq;: oculos enim in medio faciei turpissimè positos habebat: verti-  
 cemq; acutū, vtræq; setis, quæ in fronte, & occipite maxima cōpressio facta sit. Manus vero  
 sine

Cōtra Ves-  
 salium.  
 1. lib. 2. c. 1.  
 u. differen-  
 tia 79. I. pe-  
 mo dolo-  
 rum.  
 Monstru-  
 sa capita.  
 \* In 1. art.  
 med. com.  
 36. in fine.  
 x. lib. 2. c. 1.  
 Vesalius.

1. lib. 2. c. 1.  
 u. differen-  
 tia 79. I. pe-  
 mo dolo-  
 rum.  
 Monstru-  
 sa capita.  
 \* In 1. art.  
 med. com.  
 36. in fine.  
 x. lib. 2. c. 1.  
 Vesalius.

Dubium  
Respon.

3. de hist.  
animal.  
cap. 1.

fine digitis, coelestis cuiusdam potius formam representantes illi erant. Quid igitur ad Galenū, qui nec esse posse, nec si monstruosē fortassis cōtingeret, viuere posse determinauit? Dicendum hercle pro Galeno est, quam rarissimē huiusmodi figurā apparere: Quod autem admodum rarō edingit, parū id obseruandum censet Aristoteles. 7. Nec rarissimē tantum dicimus inueniri sed etiam monstruosam, aut imperfectissimam esse determinamus: Quemadmodū ex eo, quem nos vidimus, alijq; a Conciliatore, ac Vesalio p̄gnarratis patet. Idcirco si quandoq; contingerit, vel nō uiuet, vel nō durūis saltem uiuet: neq; enim ad senectutem perueniet. Quod monstruosū ferē omnibus propriū est. Māleq; interium uiuet, imperfectūq; homo ille tali figurā caput insignitū habens ius in omnibus, p̄sertimq; animalibus operationibus erit, ac maxime circa principales rationis actiones, vt imaginationem, cogitationemq; ac memoriā. Quod si iustissimā esse in omnibus naturā affirmare ex Hippocratis, Galeniq; uerissimis monumētis uolūmus, talis figurę futurā ita dispoñi dicemus, vt ā latere in latus transuersum restā extēdat: propeq; tempora coronalis, & lambdoidee positā supra squamosos sint. Quemadmodū enim lateralis latitudo in longitudinem, longitudinē, ā posteriore parte anteriorū in latitudinē permutatę sunt: Itā & futurarū permutacionem factam esse uerissimile est. Aliter in sola hac inuinitum fuisse naturam, determinandum foret. Nisi, ueluti monstruosā capitis figurā p̄ter naturā directū regnū inueniā, quasi ex accidenti, est: Itā & monstruosam quoq; futurarū dispositionem extitisse uerūis cōstitimur. Quōd si (vt diximus) cōtingeret: futurarū huiusmodi figurę situs, numerusq; ac formaliter H. p̄similis, quemadmodū ipsius naturalis erat, situ tamen interea transposito fiet: Cum uerbō Galenus de quartę huius figurę futuris minimē meminisset. Eapropter duę squamosę futurę pro coronali & lambdoide quartā figurā hic p̄fēferet. At quid mirū est, si monstruosē & ex accidenti aliqua causa, vel altera, vel ambę eminentię cōprimantur, vel fortē latitudo in longitudinem ob uolūmā cōp̄ressionis transmutetur: futurę tamen interea p̄ naturalē more seruentur? Haud enim singula in monstris permutati necēssum est, ubi species cōseruatur. Nisi alterius generationis monstrorū sint, quę speciem cōmutarunt. Si enim in his naturam iustissimā querimus, monstra non essent. Hęc annotatę, ac superaddere uolūmus. Quoniā si ferē innumeras in diuersis cęmentis caluarias insperemus, p̄sertimq; in sacris edibus Diuę Loeię in quibus nostri magni xenodoehij cadauera omnia t̄mūntur: Nunquam tamen vel vnam ex huiusmodi capitū figuris inuenimus, quę scilicet exquisitę, ac penitus uel ambas, uel alterā ex eminentijs perdiderint. Quāuis enim sic esse primo intuitu in quibusdam apparet: Si tamen elicito nequisitā spheram uel hęc uellemus ( prout in multis experti sumus) aliquā saltem inferiore in parte eminentijs inuenimus. Sed poq; in afflicto caluarias vltimā illam, p̄ternaturalemq; omnino uocatam figuram insperasse licet. Quemadmodū neq; ex naturarū nōnaturalibus, siue p̄ternaturalibus dispositionibus uideisse uillam, quę uel T. uel permutatę H. referret, nobis permillum est. Tametsi multa interius uiderimus capita nō mortuorū modo, sed uiuorū quoq; altorā, uel vtranq; eminentiā longē minore, uelut aliquando etiā maiore habentia, quę secundū naturā sibi cōgrueret. De quibus quidem minoribus, maioribusq; eminentijs Galenus libro artis medicinalis secundo, 2. non de abatis, perditis uel illis in simpliciter insubritū corporū significationibus locutus est: fortē melius cōsiderans ibi, qđ huiusmodi nō naturales, p̄ternaturalesq; capitū figurę, magisq; huiusmodi deprauatę futurarū dispositiones, Hippocratis imaginatione potius, quā in rei ueritate inueniri queant. Nisi fortassis monstruosē interdū cōtingentem aliquā ille cōspexerit: unde uniuersalem postea propositionē fabricant. Sed cum de monstris pertractare nostra scientia nō intendat: Ad alia pertranseamus. Caput sine futuris aliquando uisum Aristoteles testis est. a. Quiniammō Herodotus in plateni clade inter perfica e adanera, eaput inuentum esse testatur, nullā prorsū cōmissurę sutelā habens. Aratus autē in libris de medicina seripis largius ait [Capita pleraq; hominibus citra futuras compacta sunt] Arrianus deniq; (Celsū referēte. b.) Æthiopū capita futuris nullis esse laxa prodidit. Quamobrē & Celsus quoq; quāuis nō uniuersaliter (vt Arnianus protulit) uerūis tamē particulariter locutus inquit. c. [Rarō caluaria solida sine futuris est: locus tamen æstiuos (vt Æthiopia regio est) sacilibus inuenitur] Nos autem domi nostrę caluaria quādam habemus, quę absq; futuris ab omnibus iudicata est. Verūm si exquisitis perpendamus, tametsi cōpactissimę sunt, ac ferē coalescentes: futurę tamen sunt. Cuiusmodi sensibus quidem nō pauca accedere uidimus. Quorū non vertebra modo inter se se coalescere: sed ipsas quoq; capitis ossū futurās concre scere cōpertum est. Non ad eō tamen, cum futurarū uestigia quedam, licet obscura, remaneant. Ita igitur in p̄dictis, siue Æthiopia, siue perfarum, aut cuiuslibet regionis hominū capitibus contingisse, etate in quā sensū, uitiāue decrepitate opinor. Nisi monstruosē prorsū aboletas fuisse futuras in ipsis etiam iuuenibus eueniret. Absq; futuris ergo, eandētib; intellige, multa capita uisā esse. [Quę apud Celsium. d. firmissima, atq; ā dolore tutissima sunt. Ex cęteris quō futurę pauiores sunt, eō capitis ualeudō cōmodior est.] Cuius tamen Celsi sententia, uita qđ Hippocrati aduersatur, dicenti \* [ Seniores autem

2. Ter. 11.  
& 16.

a. 1. de hist.  
animal. 7  
& 3. c. 1. de  
cap. 7.  
b. Lib. 1. de  
med. 13.  
c. 1. de ueris  
fictis  
d. lib. 1. c. 1.  
deca p̄inc.

Caput sine  
futuris an  
subritū.  
d. lib. 1. de  
med. 13.  
Celsi opin.  
\* lib. 1. de  
lo. 1. in boie  
p̄ p̄nc.



zudem capite sunt, qui plures futuras habent.) Rationi etiã, & experimentis cõtradicit. Rationi inquam. Etenim vniuersale est omnium partium axioma: salubriores videlicet seruari, quò perspirabiliores sunt, & siue communia, siue propria excrementa expurgant, securiore, minufq; ad ægritudine, præcipueq; febriles, paratæ. Retenta enim (vt prædicimus) primum futurarũ vsum declarantes) excrementa multis morbis obnoxiam partem reddunt, nedum ei pondus inferunt: prohibitoq; per obstructionem optimi nutrimenti transitu, eadem ipsa in vitiosissimum nutrimentum transeunt. At alter etiam caput sine futuris exiens patitur: quatenus scilicet alijs etiam futurarũ vibus priuatur. Magis interim, minusue, prout pauciores, pluresue futuras habeat. Si quidem igitur vera testatus est Celsus, recta quidẽ ratione nos de nature iniustitia conqueri possent. Vt quæ frustra futurarũ in capite cõstruxisset ad corporis nostri præiudicium. Vbi futurarum ratione penus, in salubriusq; viuereamus. Primus enim, omniumq; principalissimus futurarum vbiusest sanguinolentorũ vaporum exhalatio. Simpliciter igitur venior est Hippocratis, quã Celsi sententia. Parabolatim verò quoad exitus causas, siue alterantes, siue continententes, aut quomodolibet alter lædentes, caput sine subaris, tanquam densius, cõpactiusq; magis resistens, salubrius viuere dicitur. Eoq; salubrius, quò densius est, pauciores, futuras habet. Sicq; Celsum quodammodo excusare possumus. Quoad internas verò causas longè peius id se habet (vt prædictum est) salubrius autè tantò, quanto plures, hasq; lætiores futuras obtinuerit. Quodammodo inquam, nõ verè excusare Celsum possumus. Si enim spreta operationum perfectione, ad solam dispathiã natura intendisset, non ex carne, & ossibus, sed adamantinis quidem ex lapidibus, neq; pluribus suis, at vno conflurisset. Quod tanquam ab omni ratione alienum negligimus. At hæc de tribus futuris intantum dicta iam sunt. Quæ quidem (vt Galenus edocuit. e.) solè capitis futuræ sunt, numero ac situ iustè à natura cuiq; figurè distributæ q. d. solè sunt hæ tres, quæ in numero, & situ, pro varia capitum figura, siue naturali, siue nonnaturali, aut præter naturali etiam variantur. Adeò vt in tali varietate iustam ipsam naturam dixerimus. Quauis enim in ijs adhuc tribus rectam impresentiarum semper seruari Galenus dixerit. Ea tamen in tribus prædictis naturalibus figuris diversitatem, quoad magnitudinem recipit. Vel enim totam frõtem dissecat: vt in his, quæ probriam eminentia carent, vel occipit per medium diuidit, vt in ijs, quæ postero rem eminentiam præferunt. Vel deniq; vtrunq; os distinguit per medium secans ab occipite ad medium superiorum vsq; tota procedens: vt in alijs quidem figuris accidit, quæ vtrinq; eminentiam amiserunt. In illa verò deprauatarum quarta figura, quã nos præternaturalem vocauimus, non certè maiorem (vt in prædictis alijs tribus) longitudinem adipiscitur, quàm in naturali figura, sed tantum proprium situm commutat. Vt non amplius ab occipite in frontem, sed à tempore in tempus progrediatur.

Hippocratis sententia. Cõtra Celsum. \* Suprà com. 1.

e. p. de v. p. cap. 17. in fine.

Sed ne tempus frustra in huiusmodi siue nonnaturalibus, siue præternaturalibus figuris nunquam profectò visis contem-

mus, quatuor suas figuras hic subiungamus, vt in prædicis alijs tribus deinceps ad naturales reuertiquæamus.



Figura prima. Caput naturale, quod in frontem ab occipite progreditur. Figura secunda. Caput naturale, quod per medium diuiditur. Figura tertia. Caput naturale, quod ab occipite ad medium superiorum procedit. Figura quarta. Caput præternaturale, quod non rectam impresentiarum semper seruari Galenus dixerit.

Figura prima. Caput naturale, quod in frontem ab occipite progreditur. Figura secunda. Caput naturale, quod per medium diuiditur. Figura tertia. Caput naturale, quod ab occipite ad medium superiorum procedit. Figura quarta. Caput præternaturale, quod non rectam impresentiarum semper seruari Galenus dixerit.



23 Duae quoq; ab hac æquidistantes lineæ, per capitis longitudine, à posteriore in priorem par-  
 24 tem super aures feruntur. Sicut autem hæc, duobus inter se ossibus coherentibus, non per futuram,  
 25 sicuti quæ superius dicta sunt: Paullatim manq; in squamas æternuatum synchypitis os descendens  
 26 infernè ab aurbus ascendenti subiicitur: prætereaq; eas nonnulli nō futuram simpliciter appel-  
 27 larunt: sed vel squamosas futuras, vel squamosas agglutinationes. A nobis autē euidētioris do-  
 28 ctrinæ studio, hæc quæ iuxta aures sunt, squamosæ futuræ nuncupantur. Ita vt quinq; pectallares  
 29 capitis futuræ sint: lambdoïdes, coronalis, secundum longitudinem recta, ab hac æquidistantes  
 30 duæ, quæ in squamosis ossibus sunt.

## COMMENTVM QVARTVM.

31 **P**ORRO ossium oppositiones (inquit etiam alibi Galenus, f.) nō hē sole sunt (scilicet  
 32 quæ per coronalem, lambdoïdein, & rectā futurā sunt) sed nō nullæ ad huc aliq; sunt,  
 33 quas neq; Hippocrates, neq; alius cuius eorū, qui corporis naturam accuratè sciscunt  
 34 cōtemplati, futuras voluit appellare: sed quæ à media equidistant, & ad vtranq; aurē  
 35 cōstruæ secundum capitis longitudine feruntur, recte mihi videntur squamosæ agglutinationes  
 36 fuisse nominatæ: vtroq; scilicet applicatior ossium p̄ulatum in angustam quandam squamam, ac  
 37 minimè profundam quodammodo extenuatō: Tam autē eo quidem, quod superne descendit,  
 38 subiecto parte interna, eo autē quod infernè ascendit extrinsecus incumbente. Non enim vt in  
 39 futuris, ita etiā in his ossibus sese ingrediuntur. ] Hęc Galenus. In quibus squamosæ agglu-  
 40 tinationum modus ostenditur. Qui quidem est, vt inferiora temporū ossa squamosa, siue rectas  
 41 dixerimus, horum squamosæ synchypitis ossium squamis; veluti operimenta quædam, & propugna-  
 42 cula superimponuntur: At quoniam nō temerè ambigere quisquam hic posset. Primò quare per  
 43 squamas, & nō per propriè dictas ferratiles futuras, neq; per harmoniam hæc ossa cōponuntur?  
 44 Secundò etiā per squamas ita cōponi oportuit: quare infernū os superioris superequitat, nō  
 45 superius inferiori adiacet: prout docentibus fuisse videntur? Ob ea enim, quæ extrinsecus à superio-  
 46 ribus in caput incidere possunt, superius os inferiori, vt operimentū, præsignaculūq; superin-  
 47 poni decussit: sicq; cerebrū quoq; ipsum superius magis cōoperiret, & ab incidētibus omnibus  
 48 defenderet. Ad hanc igitur, quæ fieri posset, duplicem ob oppositionem respondemus cum Galeno,  
 49 dicentes ad vtranq; simul, qd ob maximam substantiæ ossium diuersitatem tum squamosa, nō per  
 50 ferratiliem futuram agglutinatione est, tum in ea squamam cōiunctione superior inferiori sup-  
 51 ponitur. Vt autē quod dicitur chuecētā, Galeni verba prius perpede; dei neq; verò quæ ob-  
 52 scurantur fortassis nonnullam habuerint, elucidabimus. [ Qui igitur ( inquit, g. ) cranij partem  
 53 superiorem, & ad latera, quæ etiā sua meningē est circumdata, partim quidē esse oportebat, & cau-  
 54 nosam: Reliquam verò omnem, & potissimum quæ temporū ossa huncupamus, duram esse; ac  
 55 densam: ob eam eandem squamosi horū ossium fines extiterūt. Eo quidem quod superne à capite  
 56 descendit intus obdigo, quò diu ha cū crassa meningē versaretur: A hō verò quod infernè ascen-  
 57 dit, durū velut propugnaculo quodā ipsi appositū. Omnia enim crassę meningis ad cranium vin-  
 58 cula in ipsius caveris interioris desinunt: prout si quæ ac os infernū, totum esset durum, ac  
 59 densum: haud quaquā potuissent vincula hæc in ipsum inferi: sicuti neq; in inferiorē eius partem  
 60 inferuntur. At illic quidē nullus erāt vinculo eūsi modi vltus. Vbi verò est vltus, parob? Iohibet  
 61 supernis, & obliquis, cōuenienter ibi laxum, & cauernosam exitit. At qui etiā eiusmodi ossi  
 62 durū, ac densū vni omnino nō poterant. ] Ecce igitur vtriusq; dubij resolutionem, in eandem  
 63 causam quæ est, substantiæ ossium in raritate, ac densitate: itemq; in mollitie, & duritie diuersitas:  
 64 vt sextus erat futurarū interā à nobis declaratus. h. vltus: quartaq; cōpositio ossium eandem  
 65 superius prænarata, i. quæ dicebatur partū discrimen. Quia enim synchypitis ossa laxiora, & ma-  
 66 tiora, nec nō cauernosiora esse oportebat, multiplicem ob rationem (vt videbimus, l.) primo vt  
 67 prompta fiat transpiratio: secundò vt præteritatem, ne grauiā, & ponderosior ossa illa sint: tertio  
 68 demum, vt in ipsa durioris membranę vincula inferantur. Temporū autē ossa densiora, duriora  
 69 raq; esse debent, Tum quia triplex hic prædictus raris vltus in illis dicit, Tum secundò quia  
 70 infernis posita cerebri humiditates recipiunt, extrementaq; à quibus facile corrumpi possent, si  
 71 rara, & mollia essent, atq; cauernosa: Tum tertio quia si ob clauitæ se porali musculo inf. al. p̄tā  
 72 tenuia esse oportuit, necessariò per durities sibi dispositā, hoc est difficilem passionē ad epta sunt.  
 73 Maximeq; demum quarto durissima esse oportet, pretiū fuit, præter auditorij organi in huiusmodi  
 74 ossibus positi de sensationem. Ad d. l. q. etiam & quinto ex Galeno, i. quia cadentibus, vel percussis  
 75 ad patiendū idoneus, ac promptus locus est: ideoq; duram esse ossium tēporū substantiā oportuit.  
 76 Quia inquit illa synchypitis rarissima, & laxissima, ac cauernosa; indeq; mollia: Hac verò scilicet  
 77 temporū ossa densissima, nec non durissima esse oportuit: Eapropter nō modo verò vni, coaly-  
 78 scerēq; nequibant inter se: At etiā neq; per ferratiles futuras sese inuicē recipere potuerūt. Durū  
 79 enim eū molli: Densumq; cū laxo, & raro nec vni, neq; appositè construi queant. Nisi eo mo-  
 80 do, quem sapientissima natura inuenit per squamosas agglutinationes. Verum est tamen, qd non

l. g. de v. p.  
cap. 11. in  
proc.

Dubij du-  
plex: q.  
- ad. l. 1. 1. 1. 1.

Responso  
ad vtranq;  
- ad. l. 1. 1. 1. 1.  
g. l. 1. 1. 1. 1.  
circa. mod.

- ad. l. 1. 1. 1. 1.  
- ad. l. 1. 1. 1. 1.

- ad. l. 1. 1. 1. 1.  
- ad. l. 1. 1. 1. 1.

l. Com. 1.  
h. ius.  
i. in proce-  
mio cō. r. o.  
Synchypitis  
ossa cur la-  
xiora.  
l. l. 1. 1. 1. 1.  
cō. r. 1. 1. 1. 1.  
p̄nc.

l. 1. de v. p.  
cap. 11. r. 1.  
ca. mod.

l. 1. de v. p.  
cap. 11. r. 1.  
ca. mod.

Cur in alij  
non sint  
squamosae  
agglutina-  
tiones.

omnis substantiarū ossium diuersitas ad squamosas huiusmodi conglutinationes faciendas cogit. Synici put enim fronte, atq; occipite mollius, rariūq; (vt videbimus) est. sicq; nonnulla maxilla superioris ossa, & appendices, suāq; ossa, quorū appendices sunt, a sequēte diuisione, & molliēte, siue raritate & densitate differunt. Haec quaequā iamēn ob id squamosae agglutinationibus componantur; Nisi maxima in illis diuersitas inuideret; quemadmodū inter syniciū & temporis ossa contigit. Locum interea perpendicularibus nobis lateralem, per quem nulla posset fumorū expurgatio fieri. Nisi vt facte lu nt, squamosae agglutinationes eissent. Dico autē facte lu nt, scilicet superioris syniciū ossis inferiori supposito. Illud enim quia cauernosū, ac rarū est, crassa membra longius adhaerere, cūq; illa cōuersari debet; vt quam per nonnulla uincula in suas cauernas recepta sibi alligare suspenderoq; ad se oportuit. Supponi ergo necessarium fuit. Temporū autem osses, quā durius, ac densius, congruenter illius opericulo, & propugnaculū esse debuerūt. Quā obre temporis ossis squamae illius quaeque imponitur, illamq; haec operit, ac ab extrinsecis occurrentibus defendit. Triplicem igitur ob rationem inferior os scilicet temporis superioris syniciū ossi superimponitur. Prima est, quoniam crassa membrana cerebrū inuoluens in syniciū cauernosion, & eleuatiore existenti alligatur, ab eoq; suspenditur. Vt igitur magis, ac longius crassa membra cū syniciū uelardetur, eiq; magis colligetur, suspendaturq; ; decentius fuit, syniciū ossis subiectū, intusq; magis extendi. Secundo quoniam os temporis durius multo est, densiusq; , ac per hoc fortius, & fractuosi eorumacius. Congruentius igitur erat, hoc syniciū, quam syniciū huic esse propugnaculū, ab extrinsecis uisūq; , occurrentibus, siue cōtudentibus, aut frangentibus, siue plagam inducentibus defendens. Haec duas rationes Galenus in praesumptis uerbis assignat. Nos autem ex eius quorū fundamentis tertiam adiuagemus, uidelicet vt primi quatuor futurarū uis preparati, in cōpescerit. Qui licet quatuor sint, & quatuor rationes ex his perficere possemus; ad vnam tamen breuitatis causa reduciuntur; scilicet vt fumosa, uaporosaq; , excrementa foras commode per has etiam futuras egrediantur, & in halitum sensū oculum digeratur; quorū uisus est recte sursum, ligamēta quorū; durioris membranae sic recte, atq; apposite foras exeant propter ipsius durie membranae colligationem, atq; etiam pericranii generationē, uisūq; demū, siue per se ingressura, siue foras egressura recte, cōmodeq; , pertinere queant. Alter enim uisū q; sursum longum iter pertrahit; periculū quoq; , fractionis in eo obliquo transitu facillimē incurrent. E quibus omnibus praestentis liquet, exo celo aberrasse Mundinū, aliosq; , eiusdem sententiae plurimos anatomicarum administrationū imperitissimos, qui duas has squamosas futuras, mensuras dum uocant, ad internas partes minime penetrātes esse existant. praeter id enim qd in allicentis, siue elixatis modo, sed in recentibus etiam caluarnis cōpertissimū est, naturam, si nō penetrarent, in huiusmodi suturarū constructione frustratoriam fuisse omnino affirmare, atq; eam vt irrationalem cōdemnare cōuictū fuit. Sed his perpetuo neglectis, ad propositū textum conuertimur. Quinque igitur peculiare capitis futuras esse Galenus concludit, scilicet lambdoidem, coronalem, & rectā, itenq; , duas squamosas iam iam declaratas. Quae quidem cōcūsiō (nisi pro Galenic exultatione de his, quae exterius apparent, duxerat locuta in esse, uerba, & nō inuēit interpretantes dixerimus) diuinita est. Septem enim peculiare ossium capitis futurae sunt, nō quinque; sed alie tamen duae, nisi frangatur, uel quoquo modo incidatur aperturae cranij, intusq; ipsū conspiciamus, uideri nequeunt. Sexta igitur, quam Galenus minime aduertit, ea est, quae octauū capitis spongiosū, cribrosū, & porū, quod illam partem dicendum ossiculū circumscindit; id ipsum a frontis ossē distinguit. Quatenus scilicet ad interiora pertinet, cerebrū tangens. Quā ratione inter capitis ossa numerari debet. Quāquam maius est hoc os, si exquiritis ipsūm uispendimus, quam apparet; quones uidelicet cū secundo, & tertio maxillae superioris ossis coalescit; uti saepe in vniū tria haec ossa per symphyliū coealita uisimus; vt nō temere secūdo, ac tertio ossa praedicta maxillae superioris partes esse octauū capitis ossis suspicari nonnullū fuerunt. extrinseca tamen superiōre lene, sed intus infractuosiū, cauernosū, & vtrūq; est. Tunc igitur maius octauū os foret, quam intus appareat, simpliciter tamen parū est, & reliquis septem capitis ossibus longū minus. At nos ad suturas reuertimur (De ossibus etiam posterius seruo dicit. 6.) Itaq; , sexta capitis ossium propria futura est, quae iam iam dicta est, octauū capitis os anteriorē, lateraliūq; partibus, quatenus ad interiora, cerebrūq; , pertinet, & cū cūctisq; ad forma Gagee literę \*, uel latine u. Quam ob causam nonnulli ex recentioribus haud temere hyoidē, siue hypoloidem futurā habere nonnegant. Pars autē posteriore claudat, terminatq; , idem os, quae scilicet cerebrū respicit, septima futura, de qua nos antea meminimus. A vt iphenoidis intrinsecos aut alis quā simillimos, processū a frons, & octauū enā ossib' distinguit. Quā a Galeno etiā, & a quā plurimis anapotes praesertim' minime processū inuenimus. Quoniam fortassis eā sub cōpūm intellexerint, quae a tempore ad aliud tempus p' mediū oculorū cauitate procedit. Cū illius portio quaedā in intusq; , cauitate oculorū fundo, seu radice superiorumq; uisusorū neruorū trāitu parauit, haec futura utriusq; sit. At quoniam praeter has porones, alie adhuc remanēt portuūculae, quae ad cōpūm

quodam  
ni. d. d. d. d.  
omniq;

in Supra  
com. i. h.  
i. u.

Cōtra Mē-  
dici, & c.  
fractū.  
Sicut i. u.

Cōtra Ga-  
lenum.

Sutura sex-  
ta.

g. Infra cō,  
e. & cap. 3.

Sutura sep-  
tima.

o. In proce-  
mio com.  
13.

Cur y. à cō-  
muni disti-  
guatur.

1. ſutura minime ptinent: præter id, q̄ tota hæc offiū capitis ppria, peculiarifq; eſt ſphenoides à  
 2. frõis offe, atq; etiã octauo nuper dicto officulo ſegregans. Propterea ipſa p̄ ſe cõſiderãda, in pec-  
 3. culariã ſuturarũ catalogũ annũmerare nobis oportet præcipuũ fore viſũ eſt. Veluti n. p̄ alterius cõmu-  
 4. nis, primũ. ſ. quẽ ſphenoides os circũſcribit, portione eſſe hæc maluit, q̄ ſecũdũ iã iã p̄dictẽ com-  
 5. munit. Nos autẽ, vbi p̄ ſe hæc cõtẽplari, & ſeptimã ab alijs diſtinctã enũmerare nõ permittuntur,  
 6. coronalis partẽ rectũs ponẽdã ſtatueremus, q̄ primũ, vel ſecũdũ cõmunis. Sed ne hæc qdẽ ſolũ,  
 7. vt cuiuſvis iã dicte, ſive cõmunis, ſive coronalis portione dimiſiſſi Galenus, verũ & ſextã quoq; iã  
 8. iã dictã ſuturã (vt paulo antiã diximus) minime aduertit, vel fortãſe neglexit euſdẽ cõmunis ſe-  
 9. cũdũ à Galeno narrãdẽ. q̄ partẽ eſſe exiſtimãſ: videlicet cã, quẽ in oculorũ cauitatib; ſecũdũ, ter-  
 10. tiã; maxillẽ ſuperioris offã vocatã à frontis offe diſtinguit. Vtrũ deceptus eſt q̄ hoc exiſtimãſ.  
 11. Alia. n. ſutura ea eſt hũc minime intũs reſpõdẽs; vt videre, fratris tertio & ſecũdo ſuperioris ma-  
 12. xillẽ officalis, cuius licet: Intermedia. n. cauitas quẽdã eſt, ſextã hæc à nobis vocatã ſuturã ab ea  
 13. cõmuni ſecũdã ſeparans. Adquẽ vt vbi duo hæc offacula ſpõgoides potius eſſe partes determinare  
 14. placuerit: ſic dicẽdũ veniret, q̄ parte, qua cerebrũ reſpicit, ithmoidesq; potius dicitur, p̄ ſextã ſu-  
 15. turã ab offe frõis ſeparatur: parte autẽ leni, quẽ ad oculorũ cauitate ptinet, ſecũdã ſutura cõmu-  
 16. ni ab eodẽ frõis offe diſtinguatur. Quãuis igitur hoc modo ſumptũ ſpõgoides os: vt. ſ. dictã etiã  
 17. duo offacula cõprehẽdens, cõmune caput, maxillẽq; ſuperioris os ſit (capiti inq; ob cãbrosũ partẽ,  
 18. quẽ cerebrũ tãgit: maxillẽ autẽ ſuperioris ob alias partes). Haudquã tamẽ ob id dicẽdũ eſt,  
 19. quẽ ſextã p̄dictã ſutura cõmunis quoq; iã. Cũ ipſũ os nõ totũ, ſed quatenus ad caput pertinet, cere-  
 20. brũq; reſpicit, ithmoidesq; nõcupatur, latine cãbrosũ, à frõis offe diſtinguat. Propria igitur ſextã  
 21. ſutura eſt, qua cãbrũ à frõte, quẽ ambo capitis offã ſunt, ſeparat. Septẽ igitur, vel ad minus ſex  
 22. propriẽ offiũ capitis ſuturę ſunt. Dico ppria, peculiãreſſe offiũ capitis: vt quẽ nullũ os maxillẽ  
 23. ſuperioris cõtingit, ſed offã dũtaxat capitis abinuicẽ ſecernunt. Octo. n. (vt videbimus) capitis  
 24. offã ſunt: videlicet frõis os vnũ, occipitis vnũ: ſyncipitiſq; duo, ac duo etiã tẽporũ: quẽ ſunt ſex,  
 25. quib; addẽs cunciforme, Gręcẽ ſphenoides nõcupatũ, atq; octauũ deniq; ithmoides: Quãuis  
 26. .n. idẽ quoq; ſpõgoides ſit: quatenus tamẽ ithmoides, nõ tanquã ſpõgoides capitis os eſt. Sutura  
 27. igitur lambdoes os occipitis à ſyncipitis, ac tẽporũ offib; diſtinguit. Quẽ omnia (vt patet) capitis  
 28. offã ſunt. Ita & coronalis ſutura frõis os ab offib; ſyncipitis diſtinguit: Rectãq; ſyncipitis offã à  
 29. ſeiniocẽ ſecernit. Præter hæc moſe ſuturę ſunt, quẽ tẽporũ offã ab offib; ſyncipitis, & ſphenoi-  
 30. de ſegregãt. Sextã ſutura hyoides dictã eſt, quẽ octauũ os ab offe frõis diſtinguit. Septimãq; de-  
 31. mũ trãuerſã eſt, quẽ ſphenoides os à frõis offe, atq; octauo etiã officulo ſeparat. E quib; omnib; ex-  
 32. actẽ penulitãſ cõp̄tentiſſimus eſt libri de locis in hominẽ. r. error, ſive Hippocrates, ſive quilibet  
 33. alius ſcripſerit: quũ in ita inquit [Capita ſuturas habet, alia tres, alia quatuor. Et quẽ qdẽ quatuor  
 34. habent, his ſunt vtrinq; iuxta aures: & tertia ab anteriore: Quarta à poſteriore capitis parte. Sic  
 35. quidẽ in capite, quod quatuor habet.] Vides igitur quomodo rectã omiſit. Quã tamẽ in nulla  
 36. quãuis deprauatã figura dependit. Sequitur tamẽ deinceps Hippocrates, p̄ hæc verba [In eo  
 37. verò, quod tres iuxta aures vtrinq; ſunt, & ab anteriore parte, terna, poſteriore verò parte iuxta  
 38. nulla eſt: velut in eo, quod quatuor habet.] In his nõ modo rectã, ſed lambdoidem quoq; omiſit,  
 39. quòd ſi vtaliquidõ in nõnaturali quãpiã figura p̄ditã reliquerat, iã & alias coronalẽ perdi poſſe  
 40. nouerat. Nulliſi tamẽ rectã. Sed hi quãdẽ apertiffimi errores. Veluti etiã quẽ ſuturas, huiusmodi  
 41. ſquamioſas agglutinationes vocant; Cũ tamẽ Galeniſ id nomen in his ab Hippocrateſ mente  
 42. alienũ determinauit, vel totũ eũ librũ, vel prædictã ſaltẽ verba Hippocrateſ germana non eſſe, in-  
 43. dubitũ ſunt. Nec audiẽdus etiã Celfus eſt: Dũ quatuor dũtaxat ſuturas numerãſ, coronalis oblit-  
 44. eſt, ſic ſcribẽſ. ſ. [Noq; .n. certus earũ numerus eſt: ſicut ne locus qdẽ. Perẽ autẽ duẽ ſuper aures  
 45. tẽporã ſuperioris capitis parte diſcẽdũt (ſunt)q; hæ, vt patet, ſquamioſas, quas paulo poſt deſcri-  
 46. rat] Tertia ad aures per verticẽ tendens occipitiũ à ſummo capite diſiucit. (Hęc autẽ eſt, quã  
 47. vocatur lambdoides). Quarta ab eodẽ vertice per medium caput ad frontem procedit (& hæc  
 48. rectã eſt.) Ea; modò ſub imo capillo deſinit, modò frontem ipſũ ſecans, inter ſuperelia fini-  
 49. tur, &c.] Ecce igitur quomodo coronalẽ penulitã quã nõ exiſtente omiſit. Verũ enim-  
 50. uerò huiusmodi falſis, diminutiũq; aliorũ quãmplurimũ ſe nẽptiſſis negligẽs: Ad cõmunionẽ ſu-  
 51. turarũ enucleationẽ cum Galeno permixtũ ſic ſcribente:

p. Lib. 1.  
 cap. 6.  
 q. Inſã cõ.  
 ſequenti.

Cõtra Hip-  
 pocrateſ at-  
 tribuit lo-  
 cum.  
 r. Poſt prin-  
 cipũ librũ.

Cõtra Cel-  
 ſũ.  
 ſ. lib. 8. c. 1.  
 circa prin-

TEXTVS QVINTVS.

Ἄλλα δὲ κατὰ τὴν τριάντην τὴν ἄνω τίνον, καὶ τὴν τὴν μίσην ἀμφοτέρων ἑστίν, ἢ τινος ἢ τῆς κεφαλῆς ἀποκρίματα,  
 τινος δὲ τῆς ἄνω τίνον ἵνα φατέ, ἵνα τὸν ἕτερον τῆς ἰδίας ἐκ τίνον, καὶ τὸ μὲν ἄλλο, ἐν τίντι μάλιστα τὸν  
 λείποντα ἴδῃ οὐ δύναι. Ἐπὶ κεφαλῆς τῆς λυμδοειδῆς φασὶν πὰ κατὰ τὴν τῆς ἀποκρίματα μὲν ἄλλο τὸν  
 τῆς κεφαλῆς, μεταδὲ τῆς ἀμφοτέρων ἑστίν κατῆρας, καὶ τῆς τῆς τῆς ἀποκρίματα ἀποκρίματα. Ἐπιτὴν δὲ  
 ἐκ τῆς κεφαλῆς, μεταδὲ τῆς κεφαλῆς ἵνα βραχίονα ἵνα βραχίονα ἵνα βραχίονα, ταῦτα μὴ ἴσως τῆς κεφαλῆς τῆς κεφαλῆς, καὶ  
 τῆς κεφαλῆς καὶ τῆς κεφαλῆς ἵνα ἀποκρίματα γὰρ κατῆρας ἐκ τῆς κεφαλῆς τῆς κεφαλῆς κατῆρας: ἵνα αὐτῶν  
 ἀποκρίματα τῶν κεφαλῆς ἵνα τῆς κεφαλῆς τῆς κεφαλῆς φασὶν, ἵνα ἵνα τῆς κεφαλῆς ἵνα ἀποκρίματα τῆς κεφαλῆς καὶ

<sup>13</sup> παραστάσις αὐτῆς τοῦ ἔργου ἄξιον, ἀρκούντων πρὸς τὰ τοῦ ὁπίσθου, ἵνα τοῖς ἐπιπέδοις συνάψουσιν τὸ περιεχόμενον  
<sup>14</sup> ἀπὸ τοῦ προηγουμένου ἰσάου διὰ τὸ, ὅτι καὶ τὰς οὐρὰς ἔχουσιν μεταξὺ τοῦ κεφαλῆ, καὶ τοῦ ἰσο γένους: ἕως δὲ τῶ  
<sup>15</sup> ἀστέρι ἐπὶ τὰ πέρατα τοῦ περιεχόμενου ἀναρτήσασθαι, καὶ τὴν οὐρὰν πρὸς τὸν κεφαλῆ ἵνα, ἵνα δὲ ἰσότητος κατὰ τὴν  
<sup>16</sup> πρὸς τὸν ἄσπερον, ὅτι ἐπὶ τὸν ἄσπερον ἵνα ἰσότητος τὸ σφαιροειδὲς εἶναι, καὶ ἵνα τὸ γὰρ ἵνα, ὅτι τὸ ἴδιον κατὰ  
<sup>17</sup> ἵσους. καὶ τὸ τὸ εἶναι τὸ περιεχόμενον ἵνα ἀπορῆσιν αὐτὰ τοῦ ἰσότητος εἶναι κατὰ τὸν ἄσπερον: ὅτι τὸ ἴδιον κατὰ  
<sup>18</sup> τὸν ἄσπερον ἵνα τὸν ἄσπερον ἀρῆσιν, καὶ τὸν ἄσπερον ἵνα κατὰ τὸν ἄσπερον ἵνα τὸν ἄσπερον ἵνα τὸν ἄσπερον  
<sup>19</sup> τὸν ἄσπερον ἵνα τὸν ἄσπερον ἀρῆσιν, καὶ τὸν ἄσπερον ἵνα τὸν ἄσπερον ἀρῆσιν, καὶ τὸν ἄσπερον ἵνα τὸν ἄσπερον ἀρῆσιν  
<sup>20</sup> τὸν ἄσπερον ἵνα τὸν ἄσπερον ἀρῆσιν, καὶ τὸν ἄσπερον ἵνα τὸν ἄσπερον ἀρῆσιν, καὶ τὸν ἄσπερον ἵνα τὸν ἄσπερον ἀρῆσιν.

<sup>21</sup> Aliæ verò dicit cōmunes tum superioris maxillæ, tum medio amborū ossi, quod nōnulli quiddē  
<sup>22</sup> capiti attribuunt: Nōnulli verò maxillæ superioris esse dicunt. Quare autem id sit forma, quan-  
<sup>23</sup> tumq; magnitudine, ac potissimum quo in loco positum sit, iam tibi recēse. Lambdois futuræ  
<sup>24</sup> laterū inferiores extremitates ad basim vsq; capitis protenduntur, per medium lapidoisū ossis,  
<sup>25</sup> & ad primā vertebræ dearticulationis descendentes. Hic autē linea quedā breuis transactāam ha-  
<sup>26</sup> bens positōne, eas cōiungit. Hanc ipsā mihi primū tum capitis, tum ad explicationem pro-  
<sup>27</sup> positi ossi cōmūnem intellige. Sursūm enīm vtrinq; ad caua temporū tendens, in idē cum co-  
<sup>28</sup> ronalis futuræ descendenti bus extremit. In eō rursus deorsū conseriā, & ad extrē-  
<sup>29</sup> mos dentes delata ad palatū vsq; procedit, intra seipsā os id cōprehensens, quod vndiq; a pre-  
<sup>30</sup> dicta futura terminatū, veluti quidam cuneus in capitis, maxillæq; superioris medio immitatur.  
<sup>31</sup> Quantū igitur huius futuræ sursūm ad coronalis finē fertur, cōmune id eū capite existit. Quan-  
<sup>32</sup> tum verò ex vtrōq; latere ad palatū superioris maxilla cōmune, ossis sphenoidis termi-  
<sup>33</sup> minus est. Sic enim clarior doctrinæ gratiā nuncupetur. Id os propeffus habet alij similes vtrā  
<sup>34</sup> cum corū vtrinq; cauitatibus. Altera autē capitis futura, quæ ipsiū a superiore maxilla diuidit,  
<sup>35</sup> ex cauis temporū principiū sumit. Vbi futura capitis, & ossi sphenoidis cōmūnis cum future corō-  
<sup>36</sup> nalis finibus in idē conuenire dista est. In eā autē ad oculorum sedes procedit; per eōs me-  
<sup>37</sup> dios tendones in medio superciliorū sibi ipsi cōiungitur.

COMMENTVM QVINTVM.



<sup>38</sup> DE O' quidē aperte ambas has futuras ossibus capitis, & maxillæ superioris cōmū-  
<sup>39</sup> nes describit hic Galenus, vnostrā nō indigēt elucidatione: Nāq; vt quisquē  
<sup>40</sup> has exquisitē, atq; adamāssim intelligere cupit: caluarīæ præ manibus intēret, dūm  
<sup>41</sup> Galeni verba legit, habeat, sigillatimq; in illa cunctia perpendat. Quod verò nobis  
<sup>42</sup> enucleandum restat, os illud est sphenoides a Græcis dictū, a cunei similitudine, qui

<sup>43</sup> apud eos οὐρὴ appellatur: vnde à lastis cuneiforme dicitur: quoniā scilicet veluti cuneus quidā  
<sup>44</sup> (vt in textu à Galeno prænotatū est) inter ossa capitis, maxillæq; superioris interpositū est, abin-  
<sup>45</sup> uicem hęc in seipsis focmens: quod etiā à multiplici forma polymorphon (vt videbimus. x. q. d.  
<sup>46</sup> multiforme a Græcis nuncupatur. Interdum verò etiā a Galeno .u. palati, siue secundū palatū  
<sup>47</sup> os, quoniā circa palatum, ac basim quoq; inferiore in parte firmatur. Id ipsiū os à nōnullis (Gal-  
<sup>48</sup> eno hic referente .x.) inter maxillæ superioris ossa numeratur. A nōnullis autē, & rectius mul-  
<sup>49</sup> tū, inter capitis ossa. Recētis inquam. Et enim ea capiti ascribenda ossa sunt, quæ uni; cerebrū  
<sup>50</sup> ipsū cōtingunt, recipient; vel secundū totū, vel secundū partē aliquam. Maxima verò sphen-  
<sup>51</sup> oidis pars intrā ad cerebrū respicit: Ideo nulli dubiū esse debet, inter capitis, & nō maxillæ  
<sup>52</sup> superioris ossa cōnumerandā. Sed nos ad primā cōmūnem futurā, quæ prædictū os cuneiforme  
<sup>53</sup> extrinsecus circūscribit, cōuertamur. Lineam igitur quidā transactāam esse ait Galenus, ad quā  
<sup>54</sup> lambdois futuræ extrema aditāmetā deorsū lata vtrinq; terminantur. Ad hanc quoq; linē  
<sup>55</sup> huiusmodi, quæ quāuis cōmūnis capitis, & sphenoidis futura vtrinq; definit, vel ab ea exor-  
<sup>56</sup> dium sumit. Hanc igitur ipsā (inquit Galenus) scilicet cōmūnem lineam mihi, hoc est, x. me,  
<sup>57</sup> primū tum capitis videlicet ossis eius quia occipitis, tum ad explicationem propositi ossis, hōc  
<sup>58</sup> est, sphenoidis (quod explicare iam proposuerat Galenus) cōmūnem intellige. Quomodo autē  
<sup>59</sup> vtrinq; ossibus cōmūnis linca, & ex ea oriens futura sit, ipsiūm, cuneiforme utrius futura circū-  
<sup>60</sup> scribat, vt inde plurius tum capitis tum maxillæ superioris ossibus, nō tum sphenoidis cōmūnis  
<sup>61</sup> sit: statim enucleare aggredior, dicens: [Sursūm enim vtrinq; ad caua temporū, &c.] Circa quā  
<sup>62</sup> tamen prædictā linca occipiti etiā, ac sphenoidi cōmūne, nota, quōd neq; ad harmoniā, neq; ad  
<sup>63</sup> futurā reduci debet, nisi ad symphysin, coalitūmque. Verē enim coalēscunt prius quidem in pue-  
<sup>64</sup> rulis per synchondrosū: quā per intermediā cartilaginē: deinceps in natū grandioribus, nō  
<sup>65</sup> solum ac in appendicibus cum suis ossibus cōtingere prædiximus: y. siccescente, paulatimq;  
<sup>66</sup> durrescente, & in ossē naturā vergente illa intermedia cartilagine, strepen uncorū linca bec latet,  
<sup>67</sup> acū vnū integrū os efficit: quod ex occipite, ac sphenoidē cōstaret. Vtrū siue per chlationem,  
<sup>68</sup> siue

1. In hōc cō-  
 2. sequenti ex  
 3. Introduct.  
 4. cap. 11.  
 5. u. i. de vlt.  
 6. p. cap. 19.  
 7. versu hōc,  
 8. & cap. 20.  
 9. circa princ.  
 10. Et ibidē  
 11. x. Et ibidē  
 12. quoc. cap.  
 13. 20. circa  
 14. princ.  
 15. Que sit ca-  
 16. pitis ossa.  
 17. Sutura pri-  
 18. ma cōmū-  
 19. nis.

y. Suprā  
 com. 6. et 8.  
 proxi.

siue ob diuturnā in sepulchris corruptionem, ita separari solent: quemadmodū ab ossibus appendices. Atq; idipsum à Galeno minime perpsum est. Prima igitur hæc futura cōmunis est ossibus occipitis, temporū, syncipitis, frontisq;, ac sphenoidi. Quæ septem capitū ossa sunt: Itemq; primis, quartis, & quintis, à Vesalio dictis sextis maxillæ superioris ossibus. Adeo vt tredecim his ossibus cōmunis dicenda veniat. Quod si quā nos posuimus inter peculiare capitis futuras septimam, ad hanc reducere, vt eius quandam partem cū Vesalio volueris, tunc omnibus octo capitū ossibus hæc futura cōmunis dicitur (cū & octauū quoq; os à sphenoidē septima futura fecerint) sexq; prædictis maxillæ superioris ossibus, scilicet duobus primis, duobusq; quartis, & duobus demiq; quintis. Quamobrem quatuordecim ossibus cōmunis dicenda tunc foret. Secunda autē futura communis est duodecim ossibus, videlicet sphenoidi, ac frontis. Quæ duo ambo capitū ossa sunt. Itemq; decem ossibus maxillæ superioris, vt nūq; scilicet quinq;, hoc est, primis, secundis, tertijs, quartis, atq; demū sextis. Quod si futurā septimā huius partem posuerimus, tūc addito octauo esse, tredecim cōmunis dicitur. Hæc igitur summam de nouem futuris dicta intantum sūt. Septem inquam capitū proprijs, duabusq; quorundā ossium capitū, maxillæq; superioris (vt præfensum iam est) cōmuniibus. Quibus si duas zygomaticas, iugalifus osses cōmunes quoq; adiungas: de quibus sequenti quidē capite sermo fiet: omnes capitū iaturæ, tam propriæ, quam cōmuniæ, tam veræ, quā largē dictæ futurse vndecim numero dicentur. Quemadmodū superioris maxillæ quatuordecim, vel ad minus vndecim dici possunt (vt videbimus\*) sicq; sint omnes simul (vt antea quoq; \* tetragonus) viginti quinq;, vel ad minus duæ supra viginti.

Quot ossibus cōmunis prima futura est.

217 meo \*

Secūda futura cōmunis.

Sunt zygomatici. \* Infra cap. 9. com. 9. \* Supra cō. 11. circa p. 110.

TEXTVS SEXTVS.

Καὶ δὲ καὶ τὸ αὐτὸν ὅπως ἔχεται, ἐξ ἧς γίνονται τὴν ἑκατὸν καλλὰ τὰ πάσης, καὶ τὸ σφαιροειδῆ, δύο μὲν καὶ τὸ τρίγωνον, καὶ τὸ ἑξάγωνον ἰσάριον, καὶ ἑστὶ τὸ μέγεθος ἑκάστης, ἅλλα δὲ δύο τὸ αὐτὸν ἔχοντες, ἢ καὶ ἑκάστης ἑξ. καὶ ἑκάστη ἐκ τούτων τὸ κατ' ἴσιν, καὶ ἑκάστη ἐξ ἑκάστης ἑξ. δὲ τὰ μὲν τὸ ἑξάγωνον, ἑκάστη δὲ ἀπὸ τριγώνου μὲ ἀπὸ τριγώνου τὴν λαμβάνουσα ἰσάριον, ἑκάστη δὲ ἀπὸ τετραγώνου, καὶ ἑκάστη ἀπὸ πενταγώνου, ἑκάστη δὲ ἀπὸ ἑξάγωνου ἢ ἑπτάγωνον τὴν λαμβάνουσα, ἑκάστη δὲ, ἢ καὶ τὴν τε καλλὰ, καὶ τὸ σφαιροειδῆ [ ἔστι δὲ τὸ μὲν τὸ ἑξάγωνον ἑξ., τριγώνον τριγώνον, καὶ δὲ τὰ αὐτὸ ἑξάγωνον ἑξάγωνον ] τὸ δὲ σφαιροειδῆ τὴν καλλὰ τὸ κατ' ἴσιν, ἑκάστη δὲ ἑξ. καὶ τὴν λαμβάνουσα ἰσάριον, ἅμα ταῖς ἀπὸ τριγώνου, καὶ τὴν ἑξάγωνον ἐπιζωγῶνται τὰς αὐτὰς. \* ἰσάριον δὲ ἐκ ἑκάστης τὸ μέγεθος ἢ τὴν καλλὰ ἑκάστης, τὸ καὶ τὸ ἑξάγωνον σφαιροειδῆ, καὶ δὲ τὸ μὲν τὸν ἑξ. ὅτι ἑκάστη καὶ ἑκάστη ἰσάριον, καὶ ἢ καὶ τὴν καλλὰ ἑκάστη τὴν αὐτὴν γίνονται.

115

116

117

118

119

\* Legerè Γραμματ.

His itaq; sic se habentibus, sex sunt, sphenoidē excepto, eundē totius capitis ossa: Duo quidē syncipitis, cōmuniē futuram eam habentia, quæ recta per longitudinem fertur. Alia verò duo sub his vnumquodq; videlicet ad suam autem. Quintamq; post hæc, os occipitis: ac sextū quod frontis est. Terminant autem syncipitis ossa posterius quidem futurse lambdoidis latera: anterius verò coronalis: Inferius squamosæ, superius autem quæ secundum longitudinem recta est. Quæ verò deinceps secundum vtranq; aurem, superius quidem squamosæ definiti, à posterioribus aurem laterum lambdoidis additamēta. Sed ab anterioribus futura capiti, ac sphenoidi cōmunis (sunt autem syncipitis ossa quadrilatera. Quæ verò nunc diximus trilatera) Quintum præterea capitis os, quod occipitis est, terminatur quidem à lambdoide futurse, suis cum addamentis, ac ea linea, quam hæc ipsa coniungere diximus. & Continet autem in scipio maximū omnium, quæ sunt in capite, foramen quod ad primā vertebram. Reliquum verò os, quod est frontis, tūc coronalis futurse, tūc capiti, maxillæq; superiori cōmuniē circumterminat.

COMMENTVM SEXTVM.



**S**IX inquit ossa capitis esse, præter sphenoides Aristoteles. n. numerū secutus: Alii .b. verò cō sphenoidē septem octauū interim ossiculū spongoidis, siue ithmoidis vocatū semper oblitus. Quod tamē quia cerebrū & ipsum tangit, cōtinetq;: ideo inter capitis ossa perpetuū numerandū, & nusquam dimittendū fuerat. Cum hoc igitur, ac sphenoidē, ipso quodq; inter ossa capitis duos procul omni cōnumerando, octo sint, non sex, aut septem. Quorum quidem per futuras facta circūscriptio, Inde q; magnitudo etiam, ac figura sic declaratur, veluti Galenus impresentiarū edocuit: quāquā in presenti textu sex duntaxat ossium per futuras circūscriptio nōn est. Sphenoides enim præcedētī textu per primam futursā cōmuniē circūscripti sūt: octauū (vt diximus) interea nullam faciens mentionem: eius circūscriptio per sextam, septimamq; à nobis positas futuras sit. Sed enim verò in frontis ossis circūscriptio addendum est, qd nō modò coronalis posterius, superiusq;, atq; cōmuniū secunda futurse anterius,

115

116

117

118

119

120

121

74  
rius, inferiusq;. Sed predictus etiam duabus, scilicet sexta, & septima interioribus, posterioribusq;, & inferioribus circūdefinitur. Galenus autem de his duabus futuris tanquam sibi incognitis nō meminit. Clarior verō locutus ipse est in synopsi, atq; temporū ossium descriptione. Idcirco in occipitis ossis determinatione, clarioris doctrinæ gratiā, addendum est, qd̄ lambdoide futura superioris, eiusdemq; additamentis inferioris, atq; anterioribus, & linea tandem ea, quā huiusmodi additamentis cōiungere, ac per symphyisim in natu maioribus vniri, coalescereq;, ac per hoc aboleri predictum, circūscribitur. Haudquaquam verō internum nos preterit ambiguum aliquando Galenum extitisse, atq; in eam potius (licet minus rectē) sententiam inclinasse (vt ex modo loquendi eius demum) qd̄ scilicet occipitis, frontisq;, & sphenoidis, palatiue ossis, nec nō & maxillæ superioris, inferiorisq; anterioris extremū recta per mediū futura diuidantur. Quæ tamen ob exactā, densamq; cōpositionem obscura sit: vt quom̄ sic ait. [Quæ verō secundū longitudinē in vtraq; maxillæ, futura, cōparata sunt, qd̄ corpus est geminū, dextris scilicet, ac sinistris. De cuius (scilicet geminitatis) vtilitate sēpenuoties admonuimus: obscura quæ est esse in ossibus durissimis: cuiusmodi est occipitis, frontis, palati, & extremæ maxillæ. Vnde opinor & controuersia de his inter anatomicos fuit. Cūm alij quidē carere futuris ea omnino existimarent; Alij autem ob cōpositionem densam, atq; exactam, futuras nō apparere. Si tamen dicitur coequerentur, aut exacerantur, eas tandem apparituras fuisse.] Extremæ, siue maius dicere summæ maxillæ qd̄ secundū Galenum in præsentī sermone intelligas os illud maxillæ superioris antænum, quod incisorios dentes duntaxat cōprehendit, quod quidem à Galeno in simijs aliquando obseruatum per se ab alijs distinctū, atq; vnicū, & simplex apparet; tale etiam in homine factū esse existimati est; vt postea videbitur. Nunc autem ad capitis ossa reuertamur: ob geminitatis igitur corporis rationem, in eam (vt diximus) sententiam vergere videtur, qd̄ scilicet occipitis, frontisq;, & sphenoidis ossa per mediū recta futura diuidantur: ob densitatē verō cōpositionis, ossiumq; prædictorū duritiem, obscura sit talis diuisio: certus tamen nō est, sed ambiguus esse quantū apparet. Quom̄ postea subdit. [Quæ etiam ita habent, siue predictæ ossium partes futuris reuera carent, siue propter exactam cōpositionem nō cōueniunt. Quod tamen ea dura esse, ac densa oporteat, apterē demonstrauimus, &c.] Nos autem, licet aliquæ esse infantibus horū ossium capitis diuisionem cōcesserimus: Eam tamen nō per futuras, aut harmonias factas esse, determinamus: sed per intermedia chartilaginē apparere. Atq; idipsum, quia nodum exquisitē coagulata ossa sunt, atq; indurata. Non quia natura diuisionem intendat, temporis igitur progressū (vt etiā in bregmate liquet) in os tota illa intermedia substantia cōuertitur. Sicq; vnicū, ac simplex quodlibet horū trium est, scilicet occiput, frontisq;, & sphenoides: sicuti etiā & inferior maxilla. Nisi quidōq;, & quidem rarissimē cōiungat recta futura frontem, ad superioriorū intermedium progressū, secare. Superior autem maxilla in homine perpetim gemina est, in dextrā, & sinistra diuisa, simpliciq; linea per harmoniam constructa (vt videbitur) octo igitur, non plura, neq; pauciora capitis ossa sunt. Quorū (vt magnitudinem quoq; perpendamus) duo exigua, inquit Aristoteles, g. scilicet reliquorū cōparatione, circa aures posita sunt, quæ nos temporū ossa nuncupamus. Sed Aristoteles sententia tunc vera esset: quando sex duntaxat capitis ossa numerauerimus. Additis autē duob⁹ alijs scilicet sphenoides, ac istiusmodi ossibus: omnium proculdubio minimū est sthmoides; post ipsum verō deinceps si lōgitudinem perpendimus duo temporū predicta ossa sunt; tertio loco sphenoides. Quod si ad pondus, vnicūq; magnitudinem attendimus, sphenoides adhuc maiora temporū ossa dicenda sunt. Quartum magnitudinis locum tenent frontis, & occiput. Omnia deniq; maxima sunt, amplissimaq; ossa synopsitis. Quæ eadem verticis, Græcōq; bregmatis ossa nuncupamus. At si singulorū figuras perpendamus. Synopsitis igitur, verticis ossa (vt rectē hic Galenus ait) quadrilatera sunt. Quorū quatuor laterū, quod anterior est, coronat; posterior verō lambdoide, superius recta: inferiorq; demum squamosa futura vtrinq; terminantur. Temporū autem ossa triū laterū esse inquit (quasiq; minus rectē). Sex enim anguli, vel quinque; magna ex parte in eis sunt; vel si aliter considerare velis, ad circulearem potius figuram referenda sunt; remotis scilicet quatuor processibus, quos commentose sequenti dicemus, eaq; etiā parte remota, que ad future lambdoideis extremū accedit ē regione mamillarū processū respiciens, ac superflua, nō ob aliud extensa, nisi vt ei quidem sinus, qui à cōmuni foramine incipit sexti paris neruorū cerebri foras exeuntis, qd̄ interne angularis venaq; maioris propaginis, & foralarij arterie maioris furcula in caluaria iubeantur; harū inquam duarum, scilicet venę, arterieq; sinus aruulium præberet. Satis enim appositē sub illa parte sinus habet exeuatur, atq; à mamillarū processū descendit. Semotis igitur ea sinus recipiente parte, siue maius dicere eo processū. Itemq; alijs quatuor processibus mamillarū inquam, styloideq;, & auditoriū etiā labyrintho, nec nō & Zygomaticis dimidiū cōstituentē processū, ad rotundā figurā quod remanet temporū ossis referri non ineptē potest. Ad quam & frontis quoq; os aptius, facilliq; aptius

Cōtra Galenum.

\* Comprocedenti.

Cōtra Galenum.

c. 12. v. 7. p. 11  
cap. 2. post  
prie.d. infra c. 3.  
com. 7.  
Cōtra Galenum.  
c. Cap. 3.  
& 1.f. Cōtra c. 3.  
v. c. 5. lib. 11.  
v. de p. 11.\* infra c. 3.  
Ossis occipitis magnitudo.  
p. 1. de hist. animal. c. 7  
post prie.  
Cōtra Aristotelem.

Ossis frontis fig.

Temporū figura.  
Cōtra Galenum.

Ossis frontis fig.



recentiores quosdā præcipuos Anatomicos reducit. Nos autē in hoc offe quatuor latera super-  
 ficientēns duntaxat, atq; extrinsecus cōsiderantes obseruauimus. Quorum primū est, quod tota  
 coronali sutura terminatur: secundū verō oppositū, quod secunda cōmuniū præscriptarū futu-  
 raru m à tempore ad tempus per mediam colorū cavitatē sepiatur. Tertiū verō, & quartū latera  
 (vtrinque scilicet vnum) sunt, quæ ab eis futuræ primæ cōmuniū portionibus terminantur, quibus  
 à squamoide, coronaliq; sutura, ad principiu vsq; secundæ futuræ cōmuniū iam iam diēte frontis id  
 os à sphenoidē distinguūt. At enīmerō semotis quidem alijs omnibus ossibus, sibi frontis os  
 in manu capientes, imprimis quodammodo circularē figuram inuenimus: vt scutella quædam  
 apparet ad bibendū, edendūq; idonea, vnica ferē linea, vnicaue latere circulari terminata, quæ  
 est ex coronali, septimāq; à nobis posita sutura cōmissa. Sicq; nisi propter oculos vtrinque cōpri-  
 meretur, dimidiā spheram exquisitē representaret. At quoniā inferiore in parte cōpressū, &  
 quasi applanatū est, & ob octauū officulū etiam apertū huiusmodi hemispherū est: Ideo si exqui-  
 sitius cuncta pendere voluerimus, duas coronalis futuræ partes esse inuenimus vnū laterū ter-  
 minantes circulare: Tertiam verō circuli partem per mediū ad hūc diuisā, vbi est octauū officu-  
 li spatū, duo alia (vtrinque scilicet vnum) habere latera. Sicq; tria esse cōpensemus. Alia verō tria  
 erunt, quæ cribrosū os circūterminant: Idcirco nō temere *σφαιροειδης*, hoc est, sex laterū esse  
 os frontis dicere possumus, præter duos processus, qui oculorum supercilia efformant. Quæ alia  
 quoq; latera si quispiam vocet, octoq; hinc latera inesse cōcludat, *σφαιροειδης* nuncupans, minime  
 reprehendendus veniret. Occipitis autē os septem lateribus, ac per hoc septem quoq; angulis  
 cōstat, nō quinque. Imprimis enim duo sunt ab ipsius futuræ lambdoideis crunibus terminata la-  
 tera, ad eam vsq; locū, vbi squamosæ futuræ vtrinque occurrunt: Duo item alia, quæ à lambdoideis  
 vocatis adduntis vsq; ad foramen ossium temporis, atq; occipitis cōmune, prope styloidem  
 processū, sub mammillari, vtrinque sepiuntur: Aliaq; deinceps duo sunt à dictis foraminib; ad lā-  
 neam vsq; occipiti, ac sphenoidi cōmuniū extēnsa, sicq; sex sunt. Septimū verō demū laterū est,  
 quod à prædicta linea terminatur. Septem igitur laterū, septangulū; occipitis os est: plurimūq;  
 angulorū obtusū, præter duos, qui à prædicta cōmuni linea tanguntur. Hi enim ad rectū quodam-  
 modo accedunt. At quid de sphenoidis ossis figura dicendum est? Responderemus id *σφαιροειδης*  
 Græcè, latinè autē multiforme nuncupari os id dicentes, quia multas, diuersasq; formas, ac figu-  
 ras, scilicet diuersas quidem partes habet, diuersosq; suarū partū vsus. In primis igitur quate-  
 nus ad totū os attinet, cunei vsū, ac formā representat, ossa quædā capitis à se invicem, & à ma-  
 xilla superiore: videlicet ossa temporū ab offe frontis vtrinque, & à primis etiā, quartisq; maxilla  
 superioris ossibus separans. Inde dicitur sphenoidis q. d. cunei forme. *σφαιροειδης* Græcè cuneum  
 nobis significat. Haud verō determinata est cuneorū figura, sed qualis est, quā replere (vt sic di-  
 xerim) incuneando debeat, cavitatis, siue interstīi, talis & ipsius cunei forma à fibris preparari,  
 atq; adaptari solet. Quod si tamen ipsius cunei formis ossis figurā cōspicimus, primo quidē intuitu  
 ad quadratū quodammodo pertinere videbitur. Exquisitius verō, atq; adamusimū singulas eius  
 partes perhibens, quamplurima in eo latera inuenies. Quæ tametsi vt lubet cōsideranti, plura,  
 paucioraue esse apparent: Nobis tamen *σφαιροειδης*, hoc est, viginti laterum, siue *σφαιροειδης*,  
 hoc est, viginti angulorū id os esse determinandū potius apparuit. Sunt enim in eo latera viginti  
 hoc modo. Imprimis in posteriore, exterioriq; parte vtrinque vnū: quæ scilicet cū tēporis ossibus  
 semicircularibus quibusdam lateribus cōiungitur. Inde verō duo vtrinque latera sunt. Quorū al-  
 terum deorsum versus palatū, alarū vespertilionū similes processus cōprehendens: alterū verō in  
 inferiore etiam, sicuti & prædictū, posterioriq; parte. Sed hoc quā cum auditorio tympano con-  
 struitur, ad lineā vsq; sphenoidi, & occipiti cōmuniū superius declaratā, perueniens est. Septi-  
 mum verō laterū est, quod prædicta cōmuni, coalescētē; interim linea terminatur. In superiore  
 autem, exterioriq; regione vtrinque vnum est: quæ scilicet ab offe temporis, suturæque coronali, &  
 squamosa cōiunctis exordians, deorsum quā aditēns circulariter, & quartæ circuli parti affinis,  
 ad locum vsq; perueniens est: vnde secunda sutura cōmuniū capiti, maxillaq; superiori (quæ scilicet  
 per mediū oculi cavitatem ad mediū superciliorū peruenit) principiu sumit. Deinceps verō  
 descendēdo deorsum, ad locū vsq;, vbi prope extremū, intimumq; dentem, quarū maxilla  
 superioris os cū pterygoidis, alatiue processus gibba parte nō cōstruitur modo, sed etiā coalescit,  
 tria vtrinque latera obieruabū, tresq; angulos. Quorū primū laterū est: dum sphenoidis cū primo  
 superioris maxilla ossē cōstruitur: amboq; sese inuicē cōtangunt. Secundū laterū est, vbi à præ-  
 dicto primo superna maxilla ossē deficiēt, abestq; sphenoides: vt apertum foramen: siue potius  
 quædā fissura in sui & quarti ossis maxilla superioris medio appareat: per quā non modō quarta  
 tenuioris fureuli neruorū tertij partis propago pertransit: quæ ad internam temporalis musculi  
 sedem cōtendit, sed etiā & quinti neruorū cerebri paris minor radix ad eundē quoq; tēporalem  
 musculū, aliūmq; intus in ore delitescētē distribuenda progreditur. Quinimō per eandē  
 fissuram pituita (vt videbimus *ib.*) ad nares, magisq; ad palatū expurganda descendit. Tertium

Occipitis  
 figura.  
 Cōm. Vb;  
 scilicet

Sphenoi-  
 ds figura

Jo. I. I. I.  
 am. I. I. I.

2. mo. d.  
 miud

et. I. I. I. I.

et. I. I. I. I.

et. I. I. I. I.

et. I. I. I. I.

et. I. I. I. I.

et. I. I. I. I.

et. I. I. I. I.

et. I. I. I. I.

et. I. I. I. I.

et. I. I. I. I.

et. I. I. I. I.

et. I. I. I. I.

deniq; sphenoidis in eadē anteriore, atq; exteriorē, inferiorēq; simul parte latus est deorsum ab ea scissura, foraminēq; sphenoidi insculpto. Quod ad recipiendam ē scissura pituitam, eamq; in palatū, narisue descendē paratū est, descendit, ad intīmū vīq; , genui nūmve decentē protendit. Quindecim igitur, si diligenter annumeraueris, sphenoidis ossis latera prædicta hucusq; iā sunt, exterius quidē abiq; caluarie fractura, vel ossis separatione, seu suturarū dissolutione conspicit̃.

Quemadmodū & alia quoq; duo sunt; quæ licet intus appareant : euidentiū tamen exterius determinantur : ea videlicet cōmuni sutura (quam secundo loco Galenus declarauit, .i. à tempore ad aliud tempus, per mediam oculorū cauitatem, pertranscūtē) propē minorem, exteriorēmae oculi angulū : vt robis; ab osse frontis separata. Sed præter hæc dicta (ronis apparentia latera decem & septem, alia quoq; tria sunt intus, & non nisi vel fractis, vel separatis quibusdam ossibus perspicua. Quorum primū est; quod septimā à nobis prænarata peculiari sutura ab osse frontis, octauoq; ossiculū ipsūm vsq; sphenoidē distinguente anteriore in parte conterminatur, duosq; de mūm in posteriore parte vtrinq; in processibus auium alarū quasi nullis super secundo, omniumq; sphenoidis foraminū maximo, secundq; neruorū cerebri cōiungationi decato ab infundibulū versis frontem, parte illarū alarum posteriore. Ecce igitur sphenoidis ossis latera vtrinq; ac per hoc vnuerſalem figurā *επιρροιαειδης*, hoc est, vnginti laterum. Quod si alatos vespertilionū instar processus nō simplices cōnumeraueris ( non hoc videri; secum, totum qui descendit, processum, cum gibba, concauaq; parte, ac alis pro vno capientes: ideoq; pro vno vtrinq; latere computauimus) in inq̃uā nō pro vno, sed pro duobus vtrinq; processibus capias (vt quidem sumunt) tunc non vnginti tantum, sed vnginti duo erunt sphenoidis latera. Quod verō ad eiusdem partes attinet, varias in eo formas inuenimus. Imprimis enim prædictos auium alis quasi nullimos processus videmus; quos nō temerē *σπινθηριδης* nuncupare etiā possumus, latēne abformes, addendo interim distinctionē [ intrinsecos ] siue [ superiores ] ad aliorum processuum *σπινθηριδης* extrinsecorū, inferiorūq; differentiam; quæ nō voluerū, auiumq; , sed vespertilionū q̃si similes sunt. Quod si totum sphenoidis dimidium, quod à latere, cōmuni sutura prima circumscriptum consideres : quantū scilicet ab eadem sutura deorsum tendente anteriū ad intīmū vīq; , decentē; posterius verō ad locum vīq; , sub tēporis ossis processus, qui Zygomatis, iugalisue ossis pars est, circumſcribitur, leonis brachiū cū toto humero, ac scapula representat; præterea in ea intēore parte, ad quam cerebrū infundibulum pituitam ē ventriculū sulcipiens descendit; glandulaq; ibi sita est, talis infundibuli basis, ac fundamētum, curioris equi venterisibus vīſitata sellam representat: illis præcipuē processibus percipis, qui alarum principia sunt, alioq; posterius ē regione illorum positū. Qui ambo ad hoc facti sunt, vt eis crassior membrana cerebrū inuoluens firmius, ac pertinacius adhæreat, cōnascaturq; , ac si ab eis originem duxerit: altius interim procedens, vt sub se adeni cooperendo cēdat. Quamobrem nonnulli non temerē *σπινθηριδης* q. d. scellulares, seu selliformes processus, præcipuē; priores nuncupant. Prius autem, postenūq; hic dicimus, non ad capitis positionem, sed ad alas quibus assimulantur, comparantes. Sed hæc ē sphenoidis ossis figura, lateribusq; dicta intantum sint. Ad octauū igitur os pertranscamus: cuius interior forma, quia cribro multiq; foraminibus prædicto colo similis est: Idcirco ab anatomicis *σπινθηριδης* q. d. cribrosa, seu cribro, aut colo similis dicta est: ipsūmq; os *σπινθηριδης*, hoc est, cribrosum, colatoriumue nuncupatur. *σπινθηριδης* enim Græcis, idem, quod nobis cribrū, siue colum refert, criste gallinacæ simulū vocat Sylius. Nos autem hic iuxta Galeni dogmata, prout in nostrā iuuenta consueuimus, huiusmodi os declarabimus; posterius verō nostram circa id sententiā aperientius, & [ Satius igitur fuisse (inquit Galenus, .i.) huiusmodi ossa nō magis *σπινθηριδης* ( hoc est, cribrosa ) quæ à spōgiæ similitudine *σπινθηριδης*, quod est, spongiosa, nuncupatis: quemadmodū Hippocrates ea cōparauit. Vna enim habet foramina spongiarū instar, neq; ea habet recta, vt cribra. Ipsa enim dura mening, quæ cerebrum cōtingit, instar cribri est perforata. Preposita autem ipsi ossa magis adhuc variē ( scilicet perforata sunt ) & quemadmodū spongie sunt meatibus, neq; ex directis libi ipsi respondētibus, neq; rectis planē existentibus omnibus : & quæquæ eorum nonnulli meatibus sunt eiusmodi, plurimi tamē sunt tortuosi, & anfractuosi, vt longus error, & circuitio lōga prius ei sit cōficienda, quod per eos ad cerebrum peruenarū est. ] Quamvis igitur interea in parte, quæ cerebrum os id tagit, membranamue ipsius inuoluerū, plurima sibi inuicem proxima foramina cribri similitudinem referant: Nihilominus tamen iuxta Galenum totā ossis substantia intēs eo modo, quo dictum est, spongiæ instar tortuosa, anfractuosaq; habet foramina, meatūq; ad exteriora penetrantes. Atq; idipsum si sic aliquando sit, nō sine summa optimi creatoris sapientia latētum est. Etenim [ qui a latusq; vterū organū sensorium ex omnibus solum ( vt idem ait. .i. ) intra cranion exiit, in ipsi videlicet cerebri anterioribus ventriculis, qui etiā vaporosum spiritum cōtinent: Idco oportebat cerebro operimentū quoddam eiusmodi esse circumactum, quod tum cōseruare ipsam posset, tūm transiūm ipsorū sensibiliū intēs nō impedire. Verūm si inperiturum non erat, tantū id rariū esse oportebat operimento auditus, quanto sensibile huius,

i. super res. procedenti.

Processus perigoides.

Brachium leonis. Sella.

Scellulares processus.

Ostium ossis forma.

k. Com. s. huius. l. s. de v. p. c. 3. in prin. & videtur e. s. in fine, & lib. v. c. 3 post med.

Curostium variè perforatū. in. libidem. p. 4.

quam auditus, crassior erat partium) quod fumalis quoddam euaporatio, vel non sine fumali euaporatio-  
 ne apud ipsum quoque Aristotelem, .s. est. Sed ne ob id quidem solum laxius esse, rariuq; os  
 illud, multuq; foraminibus peritū oportebat, quia scilicet odorabiles vapores aere crassiores re-  
 cipere cerebrū debebat: sed etiam quia per huiusmodi foramina (vt videbimus .s.) cerebri excre-  
 menta deorsum foras effluere opus erat, si nō semper, ac integre sanatis tēpore, saltem quoties  
 malē affectū cerebrū extiterit. .p. Ob aeris enim ingressum in inspiratione, fat erat foramina,  
 sed nō adeo laxa, seu rara fabricata esse. Sic igitur cū perforatū esset, sensibiliū vaporū transitū,  
 atq; excrementorū quoq;, nedūm aere, impediri nō contingeret. Triplex enim eiusmodi forami-  
 num vñs est. Primus quidem, ad inspirandum aerem, propter animaliuū spiritūū nutritionē.  
 Secundus verō propter ingressum odorabiliū vaporū ( Ambo igitur hi propter exterioris subsistē-  
 tię ingressū.) Tertius verō demū est, vt intus existētia quoddam cerebrū malē affectū excrementa  
 foras eiciantur. Tortuosa verō, & anfractuosa fieri (Galenū etiā docēte) oportere vñs fuit: si mi-  
 ne viribus integris aer frigidus inspirantibus nobis recta in cerebri vētriculos se se infuset. Sicq;  
 cerebri temperamentū alteret, corrumpatq;. Atq; hæc pro primo, secundoque, prædictorū vñsū,  
 qui ad recipiendū intrō, siue solum, siue cū fumalibus euaporationibus odorabilibus, aerem sunt.  
 Pro tertio enim vñsū (qui est ad euacuandū extra quęcunq; cerebrū malē affectū, præsertim in an-  
 terioribus partibus excrementa coaceruant) facta est etiam eiusmodi foramina, incertamq; tor-  
 tuositas: Ne repente, vel inuitis nobis, aut interdū comedentibus, aut quoduis honestū opus  
 agentibus, per nares ea excrementa, mucroresque destillent, vel acruatim decendant. Si quidē igitur  
 instar cribri recta foramina essent, hæc absurda cōtingerent, cū nil posset cribri retinere liquo-  
 rorum, quin citō pertrāsaret, ac defluat. Spongias verō aquam, seu vini, aut quodlibet, & quan-  
 tumuis fluidū in anfractuosis suis meandris cōseruare possunt: vt nihil vel manibus spongias ipsas  
 cōprimamus, aut violenter, puta labijs adhibitis, trahamus, fugamuscq; aut quouis modo à tergo  
 propellamus, nihil humoris à spongia foras educatur. Idcirco secundū nostrā voluntatem, quā  
 volumus, vel effundū, vehementerq; expirandū, ac per hoc spongiosa huiusmodi corpora cō-  
 primendo, & impellendo excrementa foras eruuntur. Inspirando autē, & ab exterioribus aerem  
 aliquo impetu trahendo, ipsos quoq; vapores odorabiles intrō facillimē trahimus. Veluti etiam  
 quū vel odorem intrō, vel excrementorū foras transitū nolumus, nō efflationem modo, vehe-  
 mentemq; expirationem, sed ipsam quantumuis leuem expirationē per nares, aut in inspiratione  
 quoq; retinere solemus, apertorū; potius ore inspiramus, expiramuscq;: ne inuitis nobis vel malus  
 odor ad cerebrū perueniat, vel excrementa turpiter foras decendant. Atq; id ipsum Galenus quoq;  
 innuit, mutuū quoddā sibi inuicem auxiliū præbere nisi uans. Prima enim operatio, quę respi-  
 ratio est, secundā, scilicet odorationem inspiratione adiuvat. Tertiam verō scilicet mucorū  
 expurgationem expiratione iuuat. Similiter secunda, quę est odoratio, inspirationi gratias refert,  
 docendo per odorem ipsam, putridū aerem, seu vapores, quos fugere debet: hunc a puro, & sa-  
 lubri, quem insēqui, amplectiq; debet, distinguendo. Tertia quoq; expirationi, primę; gratias  
 refert: quoniam expurgatione facta, promotior posita, faciliorq; ipsa expiratio fit, inspiratioq;  
 Quamobrem secundę etiā ipsa tertia confert, sicut tertię secunda profuerit: quatenus odoriferā  
 calcificandū cerebrū, vel ipsū roborandū, causa est oportuna purgationis, importunas interim  
 impediendū. Causaq; prius est, ne in cerebro talia coaceruentur excrementa. Iam igitur vides quō-  
 modo beneficijs retulando sibi inuicem tres huiusmodi cribrosi ossis vtilitates cōferunt. Verūm  
 de huiusmodi ossis cribrosi, spongiosę fabrica nuper iam à nobis, nulloq; ab alio, quem viderim,  
 inuenta; deq; excrementorū per nares expurgationē, veluti & de alia, quę per palatum fit,  
 vbenus infra sermone nostra ex sententia habituri sumus. .q. Nunc verō ad spongiosid, ostendū;  
 ossis latera conuertamur. Etenim interna parte, qua cerebrū respicit, cribrosūq; verē est, qua-  
 dilaterū existit, duo scilicet longiora: quę à dextris, & à sinistris sunt: duo verō breuiora, vt quę  
 ante, vel retrō existunt, latera possident. Ex alia autem parte, quę intus nares occultat, circula-  
 res quodammodo figuras vtantq; in spongijs hoc ipsum os præsefert: ibiq; potius spongiosum  
 dici potest. Exquisitis autem cōtemplandū, vtrinq; quadrilaterū, fortēq; laterū quoq; esse di-  
 cendū venit (vt vidēbimus, .s. quū per ad spongiosum vniuersam os cōparauerimus.) Sed hæc  
 de ossiū capitis numero, magnitudinēq;, ac figura hætenus dictū sunt: Præs quā verō ad eorū-  
 dem ossium propriā substantiam, ac processus cōuertamur, pro Galeni videlicet interpretatione,  
 quādam figuras hic apponere decreueramus, pro prædictorū omnium lucidiorē contemplatione,  
 ac intelligentia. Sed cum ex figuris quarta, sexta, & septimasquiminimō esse tribus etiā primis vni-  
 uersalibus in sine processu: quatuorq; alijs nō naturalibus in cōmento tertio huius aliquo modo  
 pateant: Idcirco ad illas reuertentes, dicemus quōd.

1. Sutura coronalis notatur 1. 2. 3. 6. fig. Itemq; 1. & 4. fig. nonnaturalium: quę sunt in cō-  
 mento tertio litera A.

2. Sagittalis fig. 3. c. & com. 3. fig. 1. 3. 4. B.

n. Lib. de  
 sensu, &  
 sentam.  
 o. infra  
 com. 8.  
 p. Vitæ de  
 cap. 1. 8. de  
 v. p. & vide  
 etiā cap. 7.  
 eiusdem.  
 Cribrosū  
 foraminū  
 vñs triplicē.  
 Cur fora-  
 mina tor-  
 tuosa ratio  
 duplex.

\* 3. de v. p.  
 cap. 5. & 7.  
 Tres fora-  
 minū vñs  
 quomodo  
 sibi inuicē  
 famulatur.

4. de v. p.  
 de ossibus  
 cap. 1. 1. 1.

q. Com. 8.  
 Spongiosid  
 ossis latera  
 1. 1. 1. 1. 1.  
 1. 1. 1. 1. 1.

r. Com. 8.  
 1. 1. 1. 1. 1.

1. 1. 1. 1. 1.  
 1. 1. 1. 1. 1.  
 1. 1. 1. 1. 1.



durus id sit. Prima tamen ratio fuit ab impositoribus primitiis intēta. Si enim ad petrę duritiem  
 primò intendisset, occupiti omnium durissimo lapidei nomen potius dedicaſſent, vti prædictum  
 iam est. Secundam partem temporis offis esse dicit, quæ ad mammillare, iugalemq; proceſſus pertinet  
 mediâ hanc partem ( licet exteriùs infima appareat ) intelligito, cuius anteriora cõmunem  
 prima futura, posteriora aut lambdoïdis additamētis determinatur. Tertiamq; tandē esse voluit,  
 totum id offis eiusmodi interuallū, quod iugale superiacet, ac à tēporalibus musculo occupatur.  
 Itaq; nõ secus ac offibus illis cõtingit: quæ sacro offi cõmittuntur, quòd scilicet tres eius diuerſe  
 partes tria quoq; diuerſa nomina obtinuerūt: Ita & offibus temporū cõuenit. Vt vna pars petrosā  
 appelletur, ea scilicet quæ ad temporalis offis basim inter lambdoïdis additamenta etiā, & com-  
 mune prædictâ futuram, interius tanquā cerebri basim portio pertinet: Inſenuſq; tamen, exte-  
 rius ſue styloïdē proceſſum in se, atq; auditoriū tympanū cõtinentes est: Secunda verò pars sit, quæ  
 tametiſ nomine caret: In se tamen mammillare proceſſum, iugalemq; exteriùs magis exiſtens cõ-  
 prehendit: Tertiãq; tandem pars exiſtat, quæ totius nomine appelletur, ac per hoc temporis os  
 nuncupetur: quãtum scilicet de eo offe à tēporali musculo cooperitur. Sic igitur hoc in loco Ga-  
 lenus huiusmodi temporis offa deſcribit, nullam interea mentionem faciens de huiusmodi offiū  
 raritate, vel denſitate, ſeu firmitate, aut infirmitate: quanquã de his locuturū quòdam hæc offa at-  
 tinet ita in ſex omnibus propoſitiue videtur. Nos autē quomodo in duritie, denſitate, ac fir-  
 mitudine ſe habeant temporum offa, ex Hippocrate, atq; ipſo etiã Galeno clariùs determinabi-  
 mus. Modò priùs vnum circa lapidoſi offis nomenclaturã annotemus. Etiam tametiſ velut dixi-  
 mus Galenus pro vna duntaxat trium partium offis temporis, lithoides, petrosamue deſignat:  
 Nihilominùs tamen Velalius ex veterum anatomicorū cõſuetudine, nõ primam modò partem:  
 at ſecundæ etiã partis portionem eam, quæ ad mammillarem proceſſum referatur, itemq; occupatus  
 quoq; inferiorem vtrinq; circa foramen dorfali medullę dicatum, ſub petrosi offis nomine com-  
 prehendēdum voluit. Tuum verò eſt vtrinq; petrosum os capere velis, dummodò intellectus  
 priùs Galenū ſtriſtus, pro tēporis duntaxat trium partium offis temporis, petrosi nomen vſurpaſſe, atq; interius  
 modum, quem primò ſumpſeris, perpetim, clarioris doctrinæ gratiã, obſerues. Quemadmodum  
 & nos faciemus, Galeni morē lithoides, petrosamue perpetuò ſiuentes. At enim erò de prædi-  
 ctoſum ſex offium ſubſtantia, & firmitate Hippocratem intelligamus: quãtũ ita poſteris ſcriptis  
 reliquit. y. [ Vniuerſi capitis os tenuiſſimū, ac debiliſſimū, quod eſt circa ſynciput, & carnem  
 pauciſſimam, ac tenuiſſimam hac parte os in ſeipſo habet: & cerebrū hac capitis parte plurimum  
 ſubeſt. Et qua hæc ita ſe habent: Ideò vbi vulnera, & tela æqualia ſunt magnitudine, & minorã;  
 & ſimiliter vulneratus quis ſit, & minus: os hæc capitis parte, & magis cõtunditur, & rumpitur,  
 & magis intrò cõtulum cõdit, & lethaliora, ac ad curandum, & effugiendū mortem, difficiliora  
 ſunt vulnera in hac parte, quã alibi in capite. Et vbi ſint æqualia vulnera, & ſimili modò vulne-  
 ratus quis ſit, & minus, maxime autē ex vulnere moriturus homo eſt, breuioſe tempore moritur,  
 qui hæc parte capitis vniùs habet, quam qui alia. Cerebrum enim & cuiuſlibet, & maxime iuxta  
 ſynciput ſentit mala: quæ & in carne, & in offe ſunt. Sub tenuiſſimo enim offe, ac modica carne  
 cerebrum eſt hac parte, & plurimum cerebrum ſub ſyncipute iacet. Cæterum ex leuiſſis offibus,  
 id quod circa tempora eſt, debiliſſimum eſt. Cõmiſſura enim eſt inferne maxillæ ac caluarie, &  
 motus in tēporibus ſurſum, ac deorsum, velut articuli: Et auditus propè ipſum eſt. Et vena per  
 tempora extenta eſt caua & forſus. Omni verò capitis offe robuſtus eſt os, quod poſt verticem  
 eſt, & quod eſt retrò aures robuſtus eſt, quã totū, quod in anteriore parte eſt, & carnem ample-  
 rent, ac profundiorē in ſeipſo hoc os habet. Et ſane ita ſe habentibus hiſ, ſi quis & vulneribus,  
 & telis omnibus æqualibus, ac ſimilibus, aut maioribus, equaliterq; ſit vulneratus, aut magis, hæc  
 capitis parte os minus rumpitur, & cõtunditur. Ac ſi ex vulnere alioquin moriturus homo eſt, ſi  
 in poſteriore capitis parte vulnus hæc habet, duntioſe durans tēpore morietur. In longiore enim tem-  
 pore os ſuppuratur, & deorsum ad cerebrū tranſfunditur: propter offis craſſitudinem, & paucius  
 etiã cerebrum hac parte ſubeſt. Et plures mortem effugiant plerunq; ex hiſ, qui poſteriore ca-  
 pitis parte vulnerati ſunt, quam qui anteriore. At verò quã ſedẽ telorum acutorū, ac leuiorū  
 ipſe per ſeipſas ſientes in offe abſq; ſiſſura, ruptioneue, & cõtatione, & introſione ſint ( ſunt  
 enim hæc ſimiliter & in anteriore, & in poſtioriore capitis parte ) ex his mors nõ cõtigit æqualitẽ,  
 & ſecundū iuſtitiam: neq; etiã ſi cõtigit. Sutura verò in vlcere ſi cõpareat, offe denudato, qua-  
 cunq; capitis parte vlcere ſiente, debiliſſimum os eſt, ad reſiſtendum vulnere, ac telo: ſi in ipsam  
 futuram telum inuehant. Et maxime omniū ſi telum in ſyncipute iuxta debiliſſimã capitis par-  
 tem inieſum fuerit: & futurę circa vulnus, ſi ita cõtingat, fuerint, & telū ipſas futuras cõtinent. ]  
 Hæc Hippocrates. Cuius verba longa volumus ferie in medium afferre. Vt multa quidē effatu  
 digna, ſicutiq; neceſſaria in illis pernotemus. Imprimis igitur aduertendū eſt, quòd, quãtũ tenuiſ-  
 ſimum, ac debiliſſimū omnium capitis offium eſſe voluit id, quod circa ſynciput eſt, Græcè ἀσθεν-  
 ῆστος, Ideò cõ ſecundū loquũ in debilitate obtinuiſſe ratione dignum, ac neceſſariò cõſeque-  
 ns,

Offis tem-  
poris par-  
tes tres.

Petrosum  
penis Ve-  
salium.

\* lib. 1. c. 7.  
vcr̄. h̄. 1. 1.

y. Lib. de  
vuln. cap-  
piti prim.  
Syncrips  
offis sub-  
stantia.

Occupiti  
offis sub-  
stantia.

Occupiti  
capiti inq;  
substantia.

Notum pe-  
num.

est, os ei proximum: videlicet tertiā temporis offium partem: quam totius nomen sibi retinuisse, prædictum est: vnde dicitur os temporis. Ita cum in duritie, robustioneq; primū locū obtinuerit, quod post verticem est: videlicet os, quod nos occipitis os vocamus: Idco secundū locum tenet in huiusmodi duritie, firmitateq;, ac robustione quod post aures est: videlicet prima iam præ-narrata pars offis temporis, quæ petrosā nuncupata est, maximeq; post aures introrsum, in sensuq;. Medium igitur locum inter has duas temporis partes, secunda possidebit, mamillarem, iugalemq; processum cōprehendens, præsertim verò circa mamillare, quæ post aures, occipitiq; cōiugua est. In eodem ordine frontis os esse dicitur, quod medium habere locum inter occupat, ac synciput, prædictum iam est. Iuxta Hippocratis igitur decreta hūc ordinem colligere possumus: videlicet quod omnium robustissimū occupat sit: secundo loco id temporis os, quod est post aures: videlicet prima iam dicta pars petrosā. Tertio loco succedit secundā temporis offis portio, mamillare processum, iugalemq;, cōprehendens: simulq; os frontis est. Quartum locū habebit os circa tempora in anteriore scilicet, superiorēq; parte, quæ à musculis temporalibus cooperitur: Estq; tertia pars offis temporum à Galeno in prædicto textu præscripta. Quinto demum loco est os syncipitis, iac bregmatici, maximeq; anteriorē, superiorēq; in parte circa suturas. Idipsum verò quantum à Galeno sic expressum nō sit: necessariò tamen, absq; cōtradictione, colligitur. Etenim cum tres expresserit ordines scilicet primum durissimū occupatis, vltimumq;, rarissimū syncipitis, ac medium ipsius frōtis: cum postea petrosam declarat, iam occipite, licet infirmus, vt Hippocrates tamen expressit, anterioribus alijs omnibus partibus durius esse subintelligit. Sicq; cum ante frōtis os ponatur, post occupat secundū locū obtinebit: tertium locū frōtis offi, ac mediæ temporis parti dimittens. Nec iniucias ire potuisset: immò tanquam cōpertissimū declarare omisit quod tertiā temporis pars, syncipiti proxima, si nō adeò vt præcedentes partes dura, nō equaliter tamen syncipiti mollis sit: vnde quartū ei locum præbere cōcedens est, vltimumq;, syncipitis offibus reperi-vari. Nō sic igitur increpādus venit Galenus, quin potius ex Hippocratis prædicto dogmate resciscendus, elucidandusq; à nobis est. Quemadmodū & ipse etiam Hippocrates Galeni dogmatibus enucleandus. Cum nil enim venerandus hic senex de frontis ossē meminert: quoniam imbecillimum esse synciput inquit: Durissimum verò quod occupatis: post quod primam temporis offis partem esse ait: quæ post aures est. Ad synciput autem magis accedere temporis partem iugalem, anterioremq; supponens, ac per hoc quartum, proximumq; locū syncipitis offibus obtinuisse: necessariò frontis os, vna cum media temporis offis parte, tertium habere locum, tāquam per se notum, omisit. Et hæc de primo notabili satis sunt. Secundū circa Hippocratis verba disingenter aduertendum est: quum ait tenuissimū os esse circa synciput, seu bregma: Falsum namq; id esse, cuius cōpertissimū est. Quamuis equm debilissimū (& hoc quia rarissimū) id os sit: Haud tamen tenuissimū est. Quin immò nec aliquo reliquorū offiū capitis tenuius dici vnquam potest. Quod enim tertiæ partis offium temporis est omnium tenuissimū esse, vbi deiquamatur: Nō tamen ob id omnium imbecillimū (vt prædictum iam iam est) id fuerit. Occupat quoq; syncipitis offibus multis in locis tenuius est. In ea præsertim parte, quæ à posterioribus cervicis musculis operitur (& Exceptis duabus, utriusq; scilicet vna, protuberationibus primā, ac secundū sinum venarū, arteriarumq;, vt videbimus, \* ad cerebrī nutritionem, animaliumq; spiritū generationem, nutritionemq; ascendentiū recipientibus, ac descendētibus, atq; etiam tertia quadam protuberatione per medium occupat oblonga, vt per eam offis robur, parte, quæ oculis carcamus, præsertim pro his, qui in supinum cadere nonnuquam cōsueverunt, adaugetur) Nichilominus tamē ea in parte, qua tenuius est, syncipitis offibus densius, robustiusq; est. Nisi igitur improprie, ac largius hæc apud Hippocratem tenue capiamus: vt scilicet idem sit, quod rari, & facile penetrabile, omnino eodemmodum veniret Hippocrates. Quemadmodū igitur aerem dicimus tenue, quia tonnes partes habet, rarumq; est, ac penetrabile (quanuis dimensio eius grossa, altaq; ab æthere in aqua, terramue sit) passibilisq; homines delicatos nuncupamus. Ita quadantenus de isto dicemus ossē: quod tenuissimū est, videlicet rarissimū inter alia capitis ossa (velut Galenus hic etiam Hippocratis interpretis ait) ac facilliter penetrabile, quanquā altum inreque, grossumq; rariens est. Indurium verò eius, quod dicimus, esse potest: quoniam de ossē loquens, quod est circa tempora Hippocrates nō ait, tenue illud esse: quia densius est, licet minime profundum: sed duntaxat inquit, quod est debilissimum. Synciput igitur rarissimū est, ac per hoc (& si quantum possibile fuit crassius factum dispartiam adeptum sit) reliquorum capitis offium cōparatione, imbecillimum.

[ Si enim natura (Galeno erudiente, x.) denium simul, ac tenue totum os superius fecisset, quæ sub sunt partes nihil plus ex ea cōstructione ad securitatem fuissent affecute. Cum ea, quæ valuerant id, intrò facile penetrare potuissent, propter viæ breuitatē. Sin verò crassum simul ac densum: oneri inisset toti animali. Quemadmodum si quis nūc capiti suo onus aliquod alligeret, petpetuoq; id gesseret. Reliquum igitur adhuc erat tertium: vt neq; tenue, neq; densum, sed crassum quiddam: rarum tamen, atq; caueriosum esset. Eo enim modo neq; grauatū erat, neq; viam in

Duritie or  
do secundū  
Hippocra-  
tem.

Galeni de  
scipio.

Notandum  
secundum.

\* Com. se-  
quē vers  
sicut in ser-  
mone de  
sinibus.

Tenue ap-  
ud Hippo-  
cratem lar-  
gias.

Si vide v. p.  
cap. 2.

cerebrum breuem vulnerantibus scilicet, erat daturum. Factum igitur tale est propter ea, quae nunc  
 sunt dicta, atque adeo ob transpirationem. Dura igitur ob causas rari, & caernosum syncipitis  
 os factum esse innuit. Prima est, ob transpirationem, quam vberius paulo prius .a. enarrauerat.  
 Noxi; iam antea, .b. non nihil de suturaru visu loquentes, tetigimus. Secunda vero causa  
 est, quam iam iam praediximus, scilicet propter leuitatem, ne superpondium quoddam graue, ac  
 molestum hominis capiti fuisset; siquidem grossum simul, ac densum os factum est: vel facilius  
 vulneranti ingressus, siquidem tenue fuisset, etiam si densum esset. Praeterea quia densitate pos-  
 ita, transpiratio quamprimum impeditur. Craissam igitur, ac raram simul appoissimam abin-  
 cauit huiusmodi ossi substantia natura. Quamobrem & Hippocrates metipso docente .c. carun-  
 culis quibusdam paruis, multis, similibus, humidisq; haec spongiosa similia ossa repleta sunt inte-  
 riore, exterioreq; squamis exceptis. Quae interim carunculae si digitis coerentur, in sanguinem  
 coeuntur. Atq; haec ipsa non nisi, vt citra namq; ponderis violentia ossa interim plana sint. At  
 praedictis duabus caernositatis causis tertia ex ipso etiam Galeno adiungemus, scilicet vt craissa  
 meningi per eas caernas cu cranio alligetur [Omnia enim (vt inquit .d.) craisse meningis ad cran-  
 ion vincula in ipsius caernulas internas desinunt. Proinde si aequae ac os infernum totum esset  
 durum, ac densum, haudquaqua potuissent vincula haec in ipsum inferri, sicut neq; in inferiorem  
 eius partem inferretur. At illic quidem nullus erat vinculorum euismodi vfus. Vbi vero est vfus,  
 partibus scilicet superis, & obliquis; coeuenienter ibi laxum, atq; caernosum extitit.] Intellegit  
 autem obliquis partes Galenus nou ossa temporum, sed eiusdem ossis syncipitis partes, quae non  
 recte superis in summa verticis planitie exsunt: sed ad latera versus tempora oblique declinant.  
 Paulo enim ante clarius idipsum insinauerat, temporu ossa interim durora, densioraq; esse ex-  
 primens, per haec verba. [Quia igitur cranij partem supernam, & ad latera, quae craissa meningi  
 est circumdata, raram quidem esse, oportebat, & caernosam: Reliqua vero omne, & possimum  
 quae temporum ossa nuncupamus, duram esse, ac densam: ob eam causam squamosi horu ossium,  
 fines extiterunt: eo quide, quod superne a capite descendit, intus condito; quo diutius cu craissa  
 meningi veraretur, propter causam quam mox subiicimus (est autem quam nos paulo ante dixi-  
 mus, vt scilicet diutius cum membrana veraretur) alio vero, quod inferne ascendit, duro velut  
 propugnaculo quoda ip si apposito.] Obliquas igitur partes & ad latera eius, ossis syncipitis par-  
 tes intellexit, quae cum in superioribus exstant prope verticem, veluti caninus, aut totu calida  
 domus, veluti & eminentiores quoq; partes, totius quidem corporis, nedu cerebri propria excre-  
 menta recipiant: Indeque, ob illoru transpirationem (vt diximus) caernosa esse, ac rara oportuit.  
 Ex qua quidem caernositate, ac raritate no modo capitis nimum pondus euitamus: sed etiam  
 ipsius craissae meningis maiorem, aptoremq; suspensionem, qua per futuras fiat, lucramur. Pre-  
 fertim cum alia ratione pars illa superior densitate, ac duritie multa no indigeret, in star latera-  
 lium ossium, posteriorumq;. Posterior enim capitis pars, quae ad occiput, cum ab oculis minime  
 custodiatur, no ita potest ab extrinsecis occurrentibus caeere, sicuti pars anterior: Idcirco den-  
 sius, validiusq; esse operis pretium fuit occiput: eoq; magis cum ad tertij ventriculi ad totius quide  
 corporis motiones principalissimi, & quibus plurimus spiritibus animalibus pleni, nec no & radicis  
 spinalis medullae propugnaculum esse debuerat. [Quae vero ad latera (inquit etiam Galenus .e.)  
 situm habet, praeter quam quod ea causis non adest, nobis etiam cadentibus, aut percussis, aut  
 quous alia ratione, saepe erant offendenda. Neq; enim quis facile in capitis vertice cecident, aut  
 ea parte plagae prompae acciperent: Reliqua vero ossa omnia tum occipitij, tum frontis, tum aut  
 plagas non raro excipiunt, & lapsibus frequenter offenduntur. Quoniam igitur illa quide (scilicet  
 ossa syncipitis) neq; similiter plagis erant obnoxia (praesertimq; ad ista instrumenta, quae a longe  
 percipiunt) euacuatioeque indigebant. Haec autem (scilicet occiput, temporaq;, & frons) plagas  
 saepenumero erant exceptae, vacuatioeque no indigebant (praecipueque) occiput, & tempora) no  
 immerito sane rara quidem illa, & caernosa: densa vero, ac dura haec (praesertimq;, vt diximus,  
 occiput) extiterunt.] Ex syncipitis autem ossibus adhuc imbecillior, rarioreq;, & tenuior ea pars  
 est: quae anterior ad coronalem suturam pertinet. Ea enim vna cum aliqua frontis parte no modo  
 nascentibus adhuc mollis est, & nondum in ossiam substantiam conuersa, verum & bimulus quoq;  
 puerulis, aut nonnunquam trimulis. A deo vt ea craffioris membranae non sinus, at suarum quoq;  
 nodum tenuioris subiectae meningis arteriolaru ratione siens pulsat, no solum tactu sentiatur:  
 sed etia visu aperte (vel Galeno comprobate) percipiatur: vt quum sic dicebat, f. [Nam capitis  
 quoq; os post omnia alia ossa cocere sic percipiu est, cum adeo tenue sit, atq; imbecillum circa  
 synciput: vt per ipsum in nuper in lucem aditis infantibus, cerebri agitationem, non solum tactu,  
 sed etia visu percipiamus.] Quoniam non recte ad cerebrum referat, si de ipsius simplici substantia  
 intellexerit, prout intellexit, praesertim libro de anatomicis ad ministracionibus nono, g. appa-  
 ret, quum sic videlicet aiebat [Cerebru vero du attollitur, & submittitur, ac cedit, & recedit pro  
 inanis loci, qui intermedium est, ratione.] Ac libro etiam de visu partium tertio decimo, sic scri-

a. Ibidem  
 cap. 7.  
 b. Com. 7.  
 breuis, &  
 com. tit. 4.  
 post princ.

c. Lib. de  
 visu. capi-  
 tis. circa  
 princ.

d. .a. de v. p.  
 c. 18. post  
 med. vide  
 supra c. 4.  
 post princ.

e. 11. de v. p.  
 c. 19. post  
 med.

Cetera Ve-  
 salium.  
 f. Lib. de  
 form. figur.  
 cap. 3. ver-  
 bus sine.  
 Circa Ga-  
 lenum.  
 g. Cap. 10  
 in fine.

h. Cap. 8. 10  
post mod.  
i. Cap. 13. 10  
ver' siol.

bens .b. [ Vt cum cerebrū pulset, ac moueatur, quāquā offe immobili continetur, &c. ] pauloq;  
infra [ Priuatim verò vtriq; quòd cerebrū quidē pulsabat, crassā menax tantum ab eo discessit,  
quòd ipsi, dum dilatatur, suscipiendo satis esset. ] Libroq; etiam sexto eiusdem, per hęc verba .b.  
[ Nam cerebrū fortē, quòd longē à pulmone absit, oblitus est: quòd semper mouetur, cum tamen  
nō habeat neq; venas arteriaas, neq; venoas arterias. ] Nō restē inquit Galenus ad cerebrū sub-  
stantiam huiusmodi perceptam maximē in puerulis pulsationē refert. Nisi cerebrū pro membro  
organico suspensimus: sicq; ratione sinus, membranarumq;, hoc est, sicutum arteriarum, talem  
fieri pulsationem admitterimus, verba eius, & nō mentē interpretātes: [ Rectius igitur illis adhe-  
sisse debuerat Galenus: qui quidē (vt libro de pulsū differentijs quarto reualit. k.) nec membra-  
nas censent, neq; cerebrū pulsare precipue: ceterum ad arterias hoc pertinere atq; per accidens  
ad illa. Nam attolli illa vna cū arterijs aunt, quas habent frequentes. ] Hęc enim vti or senten-  
tia est. Idcirco igitur & de vsu partū octauo. *Sic* semper pulsare tenuē membranā at, quoniā in seipsa  
arterias cōtinet. Quāuis interim nos minime preterit, cerebrū substantiā cōtractionis motu, ac  
dilatationis moueri, siue preternaturali vrgente causa (vt in epilepsia, vniuersaliūq; cōuulsio-  
nibus, & sternutamento) siue nō secundū naturā modò: sed etiam secundū voluntatē, arbi-  
triumq;, nostrum (vt de vniuersis processibus substantiā aliā vberimē à nobis ppositentiam est.)  
De qua quidē cōtractione locutū Galenū opinor, quā libro de instrumentis odoratus ait. *u.*  
[ Nec ei, scilicet cerebro, impossibile est, cum alia moueat, sibi motum quendam, cumq; exiguū  
prebere, modū in seipsam, modū ex seipso. Ita vt tam cōpressus sit, quā sitē contractus: sinus  
verò, quōd se ex omni parte dilatat. ] De contractionis inquam motu nō perpetuo: sed quōnē  
aliqua ex causa stimuletur, eo loco Galenū intellexisse opinor: quoniā de proprio motu animali  
loquitur: quem sicut alijs, ita & sibi ipsi cerebrū prebit, nō de pulsatione per systolē, & diastolē  
cōtinua, quam cum brachij, cordisq; & ceterarū partū pulsibus proportionale in membrana,  
eiusq; sinu sublimiore, cerebrum exterius, superiorq; inuoluentē tangimus, conspicimurq;. Nisi  
enim illa corde ipsa pulsandi facultas deflueret, neuiquā aliarū partū pulsū proportionaretur.  
Neq; cerebrū alijs partibus, ideoq; nec sibi ipsi pulsatoriū motum prebere potest. Cū facultas  
hęc nō cerebri, neq; alicuius alterius partis, sed cordis tātum, ex philosophorū omnium, medi-  
corumq;, nedūm ipsius Galeni perpetuo dogmate sit. Sed neq; ab arterijs in choriformi plexu in  
cerebri ventriculis, presertimq; anterioribus cōtento cerebri substantiā attolli, pulsāreq; veri-  
mile est, quicquid nōnulli asserant. Cū tenuissimæ, & vis oculis cōspicue ille arteriole sint, vt  
vix propriū ostendere pulsū queant, si liceret a pertos ventriculos vixente adhuc animali, per-  
spicere: tantū abest, vt tantam cerebri molem superpositā a tollere queant: ac maximē esse effata  
digna ventriculorum cavitatis interit. Verū de hoc aliās, obiter enim, & pertranscensā hoc loci  
dictū sit, eam pulsationem, quæ licet in omnibus perpetuò fiat, in infantū tamen bregmate om-  
nibus perspicua est, nec cerebri, nec ossis esse, neq; arteriarū in choriformi plexu acruatarum,  
quāuis illa perpetim proportioales: Neq; tandem ipsius membranæ per se, nisi per accedens  
videlicet ratione sinus tertij eleuatiore, arteriolarūq; (vt diximus) per ipsas membranas distri-  
butarum. Quamobrem dissecta in capitis vulneribus membrana, mirò nō est, si nullū in cerebri  
substantiā motū cōspiciamus: quem tamen euidentiore esse tunc oporteret, discooperta cerebri  
substantiā: siquidem per se illa moueretur. Nulloq; rursus pacto visibilis talis substantiæ cerebri  
motus, integrā existēte crassiore membrana, foret, propter cerebri ab ea exteriorē membrana di-  
stantiam, interuallūq; ac presertim de scite ipsius lunæ lumine, quāuis scilicet ob humiditatis  
diminutionem in seipsam cerebri substantiā desidet. Sed nostrū profiquam intentum, Hippo-  
craticūq; verba superius ad ducta, de ossū capitis diuersa substantiā cōtēnē ple mar: eaq; adamūssimū  
perpendamus: quū de sincipitis ossibus loquens, ait, tenuissimū, hoc est (vt exposuimus) ran-  
nissimum, imbecillissimū: hoc os esse circa sinciput: Idcirco ita te vulneris in hac parte, & in alijs  
facti paritate: Quinimò in ducto minori vulnere in hac parte, maius imminet periculum, mai-  
orq; curationis difficultas, ac demū si mortuus homo ex tali vulnere sit, breuis moritur,  
quam si in alijs capitis ossibus in ductū vulnus sit. Verū quod dicitur nō de omni ossū vulnere  
intelligendum est, nisi (vt ait) vbi à telo quouis ad hanc idoneo coactunditur, colliditurque os, aut  
rumpitur, funditur, aut intrò cōtusum cedit, residetq;. In tribus enim his solutionibus sincipitis  
ossa magis offenduntur, & ea, quæ anterius, magis, quam posteriora. Et demū quod imbeci-  
lius, rannūq;, aut tenuius est, magis, quā robustiora, densiora, & in simul grossiora. Quartus  
verò solutionis ossium modus, qui est incisio, abiq; fissura, rupturæ, & confusione, atq; intro-  
cessione, ita anterioribus, sicuti posterioribus accidit. Sed enim quò de quinto solutionis modo  
nil dixit Hippocrates: In quo scilicet osse promptius fiat, maiusque periculū in ducatur: an in an-  
teriore, seu posteriore, an superiore, vel laterali. Nostrum igitur licet supple, atq; ostendere  
quintum solutionis modū, quātum ex sui ratione est, durioribus, densioribusq;, ac robustioribus  
ossibus aduenire: Alia tamen ratione, quæ à partis figura sumitur, frontis ossi magis, ac secundū

k. Cap. 2.  
circa prin.

l. Cap. 2.  
vni' sine.  
Quomodo  
cerebrum  
pulsare di-  
citur, ac  
moueri.  
m. Cap. 4.  
circa prin.

Cōtra Ca-  
pulum Ste-  
phanū lib.  
3. cap. 4.

Nequid  
ternum.

Quinq; so-  
lutionis  
modi in  
capite.



fyncipiti accidere posse. Quas tamen cōclusiones de omnibus quinq; solutionū modis declaran  
 a nobis impossibile est: quoniam prius eorū terminos enucleamus, omnesq; modos sigillatim eluci  
 dauimus. Primus igitur modus ab Hippocrate post præsumptā verba definitus est Græcè δι  
 στήσις, seu *σῆσις*, latine ruptio, seu ruptura, & fissio, siue fissura à varijs interpretibus dicitur.  
 Qualis enim solutio cōtinui in reliquis ossibus *σπασμῶς*, nomine quidē omnibus ferè hominibus  
 (Galeno docente. *u.*) qui Græcè loqui norunt, trito, siue *σπασμῶς* nomine aliō nō plebi vsucapto,  
 sed medicis duntaxat peculiarī, latine autem fractio, siue fractura: talis quidem in ossibus capitis  
 (eodem Galeno teste. *o.*) *σπασμῶς*, & *σῆσις* nuncupatur. Simplex quoq; ruptura nō nunquā à Galē  
 no. *p.* vocatur, quoniam scilicet à retuso, grauiq; ac duro quopiam telo percussione facta, rimula  
 quædam in osse fit, absq; substantiæ ossis deperditione, aut à proprio loco transmutatione. Et hic  
 quidem primus solutionis cōtinui modus nō ita in posteriore ossis, duriorēq; fieri, quemadmodū  
 in fyncipite voluit Hippocrates. Adhuc modum *σπασμῶς*, hoc est, capillatio refertur. Secundus  
 verò modus est solutionis ossium capitis; quæ ab Hippocrate dicitur *λοισία* lingua per *σπασμῶς*,  
 & *σπασμῶς*, à Galeno. *q.* autem, alijsq; recentioribus Græcis per *σπασμῶς*, & *σπασμῶς*, latine autē con  
 tussio, seu collisio: quōm videlicet absq; vlla rima, ab aliquo graui etia, retusod; ac durissimo te  
 lo cōcauat os, & in seipsam egredit: siue secundū totam profunditatē vsq; ad interiorem menti  
 branam, vel secundū exteriorem duntaxat superficiem, vsq; ad cauernosam ossis partem; quam  
 secundā laminam nostri, Græci verò *σπασμῶς*. Quauis enim magna ex parte in carnosīs parubus  
 fiat collisio (inquit Galenus. *u.*) nō nunquam tamen & in ossibus capitis cōtingit. In pueris præ  
 fertim. Nam in seipsam cedit oportet quicquid colliditur: Hoc autem & molle fessè expulsiuū,  
 ac nō perfectè durum. Hanc igitur ob causam & fyncipitis ossa tanquā mollissima omnium, imbe  
 cillimaq; capitis ossium ad collisionem præsertim reliquis sunt, & anteriora posterioribus ob  
 eandem rationem: quāquā secundus hic modus caluariæ diuisio nō est (vt inquit Paulus. *f.*) cōq;  
 nec fracturā rectè dicens eusmodi affectionem. Verū potius est ossis caluæ interiorē partem  
 impulsio, aut inflexio, cauitatem, integræ caluæ cōtinuitate (saltem in exteriore intimaq; superfē  
 cie: intus enim in medio scilicet ossis aliquo modo cōtinuitas hæc necessariō soluitur) tantūm  
 efficiens, vt in plumbis, æncidise, aut argenteis etiā, & ex crudo corio confectis vasculis, si foris  
 percutiantur, illandantur, cōspiciere hæcet. Quasibres nō modò *σπασμῶς* scilicet collisio, cōtussio  
 eiusmodi affectio dici potest: sed etiā *σπασμῶς*, hoc est, illisio, siue intus cōtussio, vel impulsio Galē  
 ni dogmate \* vt plurimū dicēda est: quōm in capitis ossibus fit. Quia scilicet cauitas illa (quam  
 rei collisæ percussor impresserit) remanserit, apparensq; fuerit. [ Si verò nō solum introcesserit  
 capitis ossi: verum etiam ruptio aliqua in superfēcie exteriore fuerit adiuncta (subdit Galenus. *u.*)  
 tunc est ægrotudo composita, neq; in nomen aliquod inditū ab antiquis authoribus habemus: sed  
 potius est oratione explicanda, quā nominibus extremē Barbaris, quibus pleriq; iuuenes medici  
 vti cōsueuerunt. ] De hoc cōpositionis modo non meminit Hippocrates: at sub secundo potius  
 intellexit. Necessariō tamē quod finditur iuxta rimam quoq; colliditur apud Hippocratem: sed  
 non econtrā. Collisium enim esse potest absq; fissura: Tertius fracture modus ossium capitis est,  
 quæ *σπασμῶς*, & *σπασμῶς* ex Hippocrate nōcupari potest, latine à quibusdam introcessio, ab alijs  
 dicitur. Sed aptius ex vi nominis illisio dici deberet. Illiditur verò ossi à suo statu in interiorem  
 partem recedens, non integri, concuatumq;: vt in secundo modo dictū est: sed fissum, aut in  
 cisum: Abruptum enim inquit Hippocrates, fractumq; ab alio osse, quod in naturali statu seruā  
 tur, in interiorē partem secedit: sicq; necesse est, quod desidet, illiditur, secundū hunc in  
 modum etiā findatur. Dissert igitur terius hic modus à secundo: quoniam licet in vtroq; os introcē  
 dat: Nihilominus tamen in secundo nulla est fissura: præsertim intus in vtraq; ossis superfēcie. In  
 hoc autem tercio necessaria fissura est: ossis depressum vario modo fractū est, vt primi, & secundi  
 modi iustio quædā sit. Idcirco desidentur, retrocedentiq; ossis species plures, variatq; esse subdit  
 Hippocrates: Galenusq; *u.* duas ex sui temporis recentiorū medicorū placitas, proprijs nomi  
 nibus offendit. Quarum altera *σπασμῶς* Græcè dicitur, latine respondet appropinquo: quoniam  
 scilicet os vitiatū, effractūq; ad cerebri membranā descendens, ei appropinquat, innititurq;. Ab  
*σπασμῶς*, quod est, propē, & *σπασμῶς*, quod est corpus, q. d. propē corpus, scilicet membrana: Al  
 tera verò ab illis nōcupata est *σπασμῶς*, & *σπασμῶς*, q. d. latine testudinatio, seu cameratio. *σπασμῶς*  
 enim Græcis (vel eiusdem Galeni dogmate. *x.*) fornicatam, testudinatamue cauitatem præferunt.  
 In hoc igitur affectu, quod effractū fuit os, siue ab incidente, siue à cōtudente aliquo telo deor  
 sum prius cōpulsū est. At quoniam foris telum reuersum est, vnā cū ipso telo sursum reuersum  
 est, foratq; elati: adeo vt testudinis in stat non modò quæ effracta, elataq; sunt, ossa: sed ipsa etiā  
 crassior membrana ossibus, vel ossi (quoties vnūm duntaxat est) adherens eleuata in altum effor  
 mentur. Duo enim ad camarosum, non secus ac ad angrosom, requiruntur. Alterum quidem est  
 ambabus speciebus cōmune: videlicet effracti ossis cū membrana crassiore adherentia: Alterum  
 verò, in quo abnuce an differunt. In engysomate quidem, effracti ossis descensum permanent: in

Modus pri  
 Rhogon,  
 Chafis.  
 Capagmā.  
 Approm  
 ho, c. meth.  
 cap. i. circa  
 p. 11.  
 q. Lib. de  
 morb. caus.  
 is cap. i. c.  
 circa princ.  
 p. 6. meth.  
 cap. i. circa  
 princ.  
 Trachif  
 mos  
 secundes.  
 q. Lib. de  
 morb. caus.  
 c. 10. & c.  
 meth. c. 6.  
 Thalia.  
 Thalama.  
 t. q. m. p. h.  
 caute. c. 1.  
 Et lib. c.  
 cap. 10. c. 1.  
 h. h. h. h. h.

q. Lib. de  
 morb. caus.  
 is cap. i. c.  
 circa princ.  
 p. 6. meth.  
 cap. i. circa  
 princ.  
 Trachif  
 mos  
 secundes.  
 q. Lib. de  
 morb. caus.  
 c. 10. & c.  
 meth. c. 6.  
 Thalia.  
 Thalama.  
 t. q. m. p. h.  
 caute. c. 1.  
 Et lib. c.  
 cap. 10. c. 1.  
 h. h. h. h. h.

q. Lib. de  
 morb. caus.  
 is cap. i. c.  
 circa princ.  
 p. 6. meth.  
 cap. i. circa  
 princ.  
 Trachif  
 mos  
 secundes.  
 q. Lib. de  
 morb. caus.  
 c. 10. & c.  
 meth. c. 6.  
 Thalia.  
 Thalama.  
 t. q. m. p. h.  
 caute. c. 1.  
 Et lib. c.  
 cap. 10. c. 1.  
 h. h. h. h. h.

q. Lib. de  
 morb. caus.  
 is cap. i. c.  
 circa princ.  
 p. 6. meth.  
 cap. i. circa  
 princ.  
 Trachif  
 mos  
 secundes.  
 q. Lib. de  
 morb. caus.  
 c. 10. & c.  
 meth. c. 6.  
 Thalia.  
 Thalama.  
 t. q. m. p. h.  
 caute. c. 1.  
 Et lib. c.  
 cap. 10. c. 1.  
 h. h. h. h. h.

q. Lib. de  
 morb. caus.  
 is cap. i. c.  
 circa princ.  
 p. 6. meth.  
 cap. i. circa  
 princ.  
 Trachif  
 mos  
 secundes.  
 q. Lib. de  
 morb. caus.  
 c. 10. & c.  
 meth. c. 6.  
 Thalia.  
 Thalama.  
 t. q. m. p. h.  
 caute. c. 1.  
 Et lib. c.  
 cap. 10. c. 1.  
 h. h. h. h. h.

q. Lib. de  
 morb. caus.  
 is cap. i. c.  
 circa princ.  
 p. 6. meth.  
 cap. i. circa  
 princ.  
 Trachif  
 mos  
 secundes.  
 q. Lib. de  
 morb. caus.  
 c. 10. & c.  
 meth. c. 6.  
 Thalia.  
 Thalama.  
 t. q. m. p. h.  
 caute. c. 1.  
 Et lib. c.  
 cap. 10. c. 1.  
 h. h. h. h. h.

q. Lib. de  
 morb. caus.  
 is cap. i. c.  
 circa princ.  
 p. 6. meth.  
 cap. i. circa  
 princ.  
 Trachif  
 mos  
 secundes.  
 q. Lib. de  
 morb. caus.  
 c. 10. & c.  
 meth. c. 6.  
 Thalia.  
 Thalama.  
 t. q. m. p. h.  
 caute. c. 1.  
 Et lib. c.  
 cap. 10. c. 1.  
 h. h. h. h. h.

q. Lib. de  
 morb. caus.  
 is cap. i. c.  
 circa princ.  
 p. 6. meth.  
 cap. i. circa  
 princ.  
 Trachif  
 mos  
 secundes.  
 q. Lib. de  
 morb. caus.  
 c. 10. & c.  
 meth. c. 6.  
 Thalia.  
 Thalama.  
 t. q. m. p. h.  
 caute. c. 1.  
 Et lib. c.  
 cap. 10. c. 1.  
 h. h. h. h. h.

q. Lib. de  
 morb. caus.  
 is cap. i. c.  
 circa princ.  
 p. 6. meth.  
 cap. i. circa  
 princ.  
 Trachif  
 mos  
 secundes.  
 q. Lib. de  
 morb. caus.  
 c. 10. & c.  
 meth. c. 6.  
 Thalia.  
 Thalama.  
 t. q. m. p. h.  
 caute. c. 1.  
 Et lib. c.  
 cap. 10. c. 1.  
 h. h. h. h. h.

\* e. meth.  
cap. 6. ver-  
tut. mod.

y. Lib. 6.  
c. 10. post  
prin-  
cipium  
& cogno-  
ma quomo-  
do dicitur

Quartus.

x. e. meth.  
cap. 6.

a. Lib. de  
memb. cap.  
c. 11. post  
prin & lib.  
2. de fract.  
com. 2.

b. Vbi si-  
pra  
apocry-  
phus.

Verborum  
Hippocra-  
tis expo-  
siti prima

camaroli verò, eiusdem ossis compressi licet pœnis, mox tamen facta releuatio, reſtatioq;. Hinc igitur est, quòd Galenus de camaroli loquens, subdebat, \* quòd licet ubi effractum os à sanis ossifū partibus remouere tentamus, id magis à nobis recedit, membranq; magis innititur, quasi ab ea, cui iam alligatū est, attractū sit. Tertium quoq; nominatū huius tertij modi speciem adu-  
gemus, quam Paulus vocat. y. *in superioribus*, siue *in superioribus* q. d. latine depreſionē, ex preſionemq; [La multas enim (vt ait) partes caluarie effractio est: In qua profundius ossa deſcenderint, & cerebrū membranā cōtactu suo premant.] Diſſert igitur ab engyſonate cepheſima; quoniam licet in vitro; descendat os, membranq; alligatum adhæreat, innaturūq;: nihilominus tamen in eſpiciante plura sunt, nō vniū, quæ descendunt ossa, vt maior ossifū fractura sit. Nec ea tantummodò descen-  
dunt: sed etiā membranā violenter premunt: vt quæ a sanis quoq; ossifū partibus nō prorsus li-  
bera sint, sed illis adhæc, diuſa alia ex parte descendunt, alia tamen annexa sint. An engyſonate  
autem quod effractū, & à sanis partibus abruptum, separatūq; est, os illud membranā sequitur,  
introd; eodit, illi adhærens, ac propē remanens, suo potius pondere, quàm extremitate premens:  
Ad eò vt quamminima ipsū membranę moleſtia inferatur. Tertius igitur fracturarū modus hic est  
( cuius tres nominatas species enarrauimus engyſoma, camarosim, & cepheſima ) non iſcius atq;  
primus, & secundus in ſyncipitis ossibus magis, quàm in alijs itemq; in anteriore parte magis, quàm  
in posterioribus contingit, magisq;: & cō maior periculo ledunt: scilicet Hippocrates ( vt ad  
propositum nostrū conuertamur ) de ſyncipitis ossis loquens ait, quòd magis cōtunditur ( quòd  
secundum modum ) magisq; rumpitur, ſinditurue ( quòd primū attinet modum ) & magis intro  
cōtufum cedit ( quòd tertium iam iam dictū modum ). Alter verò de alijs duobus fracturæ modis  
dicendū, quos etiā hic elucidare ob docting perfectionem nō pigebit. Quartus igitur mo-  
dus est ab eodem Hippocrate nūcupans *ipſis*, quāsi dicat latine *ſerſes*, siue *deſſio*: a *Lineo*. x.  
velligium dicitur eorū, quibus inſuſta plaga est. Diciturq; *ipſis*, quod est [ incisio ] & *deſſio*,  
hoc est [ diſſectio ] Quartus ab aliquo acuto ( inquit Galenus, a. ) occurrunt, atq; abſcindite ſit.  
Omnis enim incisio, quomodocunq; fiat, siue perforatio, vel enſe, vel haſta, vel ſagitta, ſiut quouis  
alio telo velligiū, & ſedem in fracto, incisioſe ossis relinquit, quod illius incidentis, perforan-  
tisq; formam quodammodo representat, modò intenuſ os in membranā maxime deſcendat: Tunc  
enim tertius eſſet predict⁹ modus. Vocatur igitur *ſedes* ( inquit Hippocrates ) ubi ossis in ſuo ſta-  
tu manente, videre licet quā parte telum inſederit. Quòd si quodpiā ossis frustum vel ab enſe, vel  
à quouis alio incidente telo abſcindatur, & ab alijs ossibus omnino ſeparetur, huiusmodi quartū  
species quedam est, vocaturq; ( vt Paulus ait. b. ) à nonnullis *apocryphus*, quāsi dicat, *apocry-  
phus*, siue ab alicia facta incisio, vt a toto os abſcedat, penitusq; remoueat, licet membranā nō adhæ-  
reat, illamq; minimè cōprimat. Deriuatur autem nomen id à [ *apocryphus* ] dictione Græca nobis  
*apocryphus*, & ſecurim preſerente, & [ *apocryphus* ] quod est [ ab ] quāsi dicat ab alicia, vel ſecuri facta que-  
dam ossis ſeparatio. Vnde aſcuralis, siue aſcurator, vel ſi maior abſcisiō ( licet inuſitato voca-  
bulo ) dici etiā poſſet. Fieri autem poſſet *ſedes*, & per ſeipſam ſola, & interdū cum collifione, aut  
ſi ſiſura, ſeu rima, vel cum introceſſione, vel cum duobus aliorū modorū, vel alijs tribus omnibus.  
Sicq; de alijs quoq; dicendū modis, quod inuicem cōponi ſepe ſoleant. Quibus cōplicationibus  
nomina impoſita nō ſunt. De hoc igitur quarto modo per ſe, abſq; aliorū permiſſione, loqueba-  
tur Hippocrates in præſumptis verbis: quim ſic dicebat [ At verò quim ſedes telorū acutorū,  
ac leuiorū ipſe per ſeipſam ſientes in ossis abſq; ſiſura, rptioneue, & contuſione, & introceſſio-  
ne ſint ( ſiunt enim ſimiliter & anteriore, & in poſtioriore capitis parte ) ex ijs mors non contingit  
æqualiter, & ſecundū iuſtitiam: Neq; etiā ſi contingit. ] In quibus verbis quòd ad huc quartū  
fractionis modū, quandam ab alijs predictis tribus modis differentiam oſtendit. Illi enim tres mó-  
di ( veluti predictum eſt ) anteriore in parte magis, ſaciliuſq;, quàm in poſtioriore adueniunt: magis-  
q;, ac ſacilius per omnibus reliquis in ſyncipite. Neq; ſolū in ſyncipite, atq; anterioribus ſaci-  
lius, & magis ſiut ſed maior cum periculo mortis: & ſi mors futura eſt, citius in ſi anteriori-  
bus, pteſertimq; ſyncipitis ossibus, quàm in poſterioribus aduenit. Quartus autem modus fractu-  
ræ ſimiliter in poſterioribus, & prioribus accidit, ſimiliterq; dicitur in ſyncipite, atq; alijs ossibus.  
Sed prius quòd vltra progrediamur, vitima Hippocratis verba cōtemplemur, quim ſubdit [ Ex ijs  
mors nō contingit æqualiter, & ſecundū iuſtitiam: neq; etiā ſi contingit. ] Intellegimus enim ver-  
ba hæc, quod ex ijs ſcilicet deſeſſionibus, siue ſedibus, nō ſequitur mors æqualiter q. d. ſicut con-  
tingit in tribus predictis modis, in quouis ossis ſiant: hoc eſt, nō ſolent hi quarto modo vulnerati  
perire, ſicut qui tribus alijs predictis modis vulnerati ſiunt: Neq; ſi cōtingat, in his eſt ſecundū  
iuſtitiam, hoc eſt, vt in deſeſſionibus æquale periculū ſecundū æqualitatem vulneris adue-  
niat. Ex maiore enim vulnere in deſeſſione minus periculi contingit, quàm ex minore in alijs tribus fractu-  
rarum modis: ideòq; nō ſecundū proportionem, neq; ſecundū iuſtitiam diſtributuſ. In alijs ergo  
mors ſuperuenire ſolet, quæ nō ſequitur in deſeſſionibus. Neq; etiā ſi cōtingat, q. d. neq; in his  
æqualitas eſt, etiā ſi mors contingat. Tardius enim peribunt deſeſſionē in capite patientes homi-  
nes,

nes, si morituri ob vulnere magnitudinem sint, quam qui alios fracturaru modos predictos receperunt. Hanc autem esse Hippocratis verissimam sententiam arbitramur. Quod si no ad vulnerationum modos co parationem referre malueris, sed ad vulnerationu offiu diuersitate, q scilicet mors ex defensione no equaliter fiat in anterioribus, & posterioribus (quanuis in vteriq; veri talis vulneratio eque possit) Maiore enim cu periculo mortis, siq; moriturus tandem sit, citius ex inelisione, seu diuisione, seu fide in prioribus, citiusq; in syncope, qua in posterioribus contingit, ob eandem, quam tetigerat, rationem: quia scilicet plus cerebri, minusq; carnis in syncope, anterioribus; ossibus existit; posterioribus; os tardius suppuratur ob densitate, tardiusq; inde pus ad cerebri transuadit. Sic in qua interpretando veram inuenies Hippocratis sententiam: Sed nro quidem iudicio no ad ipsius proposita intentionem: cum ibi differentia inter quatuor hunc modu, & alios tres, se ostenderit preleserat. In huiusmodi autem sensu conuenient, minimoq; differrent eum tres etiã illi modi periculosiores ob predictas rationes existant. Sed quintu deniq; fractionis offiu capitis modu contempletur; qui ab Hippocrate nominatus proprie nomine non est: sed a nonnullis Græce (vt Paulus ait) *ἀρρηγμα*, quod est latine resonatio, siue ab echo responso nuncupatur. [Frangitur enim caluaria (Hippocrate metipso docente) sub vulnere alia parte, quam vbi plaga est, atq; os nudatu (quantum huc modus) quod infortuniu vbi accidit, nihil est quod iuuare possit: quonia vbi hoc malū sit, nulla via deprehendere licet homine id patiatur (scilicet in alia parte fracturam) aut qua parte caluarie] (scilicet talem patiatur fracturam) Erit autē que in alia vulnere opposita parte fractura contingit, rima, seu fissura à regraui, obtusiq; & durissima violenter cōtundente pronuens: Quam quidem fractionis modum Celsus perbellè cognouit etã dicens .x. [Soleo enim in euenire, vt altera parte fuerit ictus, & altera fiderit. Itaq; si grauior aliq; percussus est, si mala indita subleuata sunt, neq; ea parte, qua cutis difflisa est, rima reperitur: non in eodem modo est parte altera considerare nūm quis locus mollior sit; & tumeat, eumq; aperire: siquidem ibi fissum os reperitur. Nec tamen magno negotio cutis sanescit, etiã si fractura defecta sit.] Quemadmodū igitur in vitro (veluti etiam patiatur fracturam) ita in ossē capitis, seu vnius partis, non solum altera, sed cōtra sita finditur. Atq; id ipsum fortasse voluit Arabum princeps: vel salte in eius verbis concludi potest, quom sic scripsit. d. [Et si fuerit fissio parua in cute, que non opponitur nisi fracturæ vni ex numero fracturaru, aut fuerit aestima eruptam, & appareat fractura vna tantum: tunc accidit inde error magnus. Putatur enim, q non sit fractura nisi illa; & propter hoc oportet, vt cōsideretur dispositio fracturæ consideratione bona.] Casus autem huc, modusq; fracturæ quintus no modo veteri illorū, puta Hippocratis, Sorani, Celsiq; siculis vicius est: sed à recentioribus quoq; nominatim obseruatus. Vnde Gēntilis de Pulgino à fidedigno quodam hunc tēpore suo contigisse audiuit .x. Quinimodō Nicolaus Florentinus propriis oculis se se contempsisse tale quoq; casum testatur: sic ad eos, qui inueniunt ad iungens .f. [Et fortasse illi non viderunt hoc per experientiam. Ego autem vidi illud in filio Masi Flumaniolæ, qui cum percussus fuerit in dextro tēpore cum claua, graui confusione, & vniuerso habuerit in illo tēpore, & facta lectione conuenienti, in qua non repertum subsiderat in aliquo læsum. In vigesimo autem die impetuenit rigor, & secuta est febris. Tunc pater iussit imponi emplastru opipitale, & in die vigesimo tertio apparuit luesio in opposito tēpore, & mortificata est ibi caro: Et facta amotione illius carnis, repertu est cranium fractum: & tadem mortuus est. Et dico, q cōtingens est etiã; q frangatur cranū similitur in loco percussions, & in loco opposito ei.] Paulus .g. tamen predictis omnibus aduertitur, sic scribens. [Sunt qui his differētijs apechea addiderunt. Ea est a contrarietas parte facta caluarie fractura. Ad falluntur hi, quoniam nō fit in hominis caluarie, quemadmodū in vitreis quibusdā vasculis fieri illi docent. Illa siquidem vacua sunt: ideoq; id capiuntur: calua autem hominis vndiq; plena est, & alioquin foret. Et aliarū plurimū partium capitū istarū lapibus: quæ citra cutis contitui solutionem generant fissura, quæq; postea abscissis in ea facta, eodēq; ictu apparetur. In opposita ictus parte facta esse ipsi videntur.] Similitudo igitur, quam Soranus, alijq; faciunt, est, quonia quæle vas vitreū puta phialis nō infrequenter contingit, vt scilicet percussa vna parte, in opposita fractio pertranseat: tale etiã ipsi cranio accidat: vt puta cum in occipito fortis quedam percussio fiat, in fronte, vel e contra, aut forte in temporibus fissio respondeat: siq; in vno tēpore percutiat caput, alteru, vel frons, aut occiput findatur: vnde *ἀρρηγμα*, hoc est, resonatio, siue ab echo responso, fit. Dicitur enim *ἀρρηγμα* à præpositione [*ἀρρη*] latine [ab] & [*ρηγη*] latine [echo] siue resonatio, vnde à verbo [*ρηγη*] quod est resonare, verbale fit [*ἀρρηγμα*] latine etiã [resonatio] si igitur fit *ἀρρηγμα*, hoc est, ab alio facta resonatio, siue vt dicebamus, ab echo facta quedā resonsio q. d. abechoatio, siue abresonatio: sic enim propionibus declarare conatus sumus. Quemadmodū enim in vulgari echo contingit vt percussus tonos aer, à longè tamen resonet: ita in huiusmodi percussione eueniat: vt scilicet percussa nobis proxima vitreæ phialis, seu vitrei cuiuslibet vasis parte, prout etiã in arido quouis alicui, vel durissimo etiã lapide accidisse nō infrequenter etiã contempimus, quom aliquo

Refinitio  
secunda.Quimus.  
Hic quæstio  
ostendit. An  
vulnera  
perit alia  
respondeat.c. lib. 8. c. 4.  
post princ.d. quæta 4.  
n. d. 3. c. 1.  
circa med.  
lib. 8. c. 285c. in expo-  
sitione sup  
verbo An  
p. d. 3. c. 1.  
tra. 4. lum.  
2. c. 1. post  
princ.. d. 3. c. 1. s. 2  
c. 2. post  
princ.Cōtra  
dicitur.

percutiantur malleo, non percussa pars, sed alia quævis, vel etiam aliquando opposita frangatur  
 findaturque: Aut si percussa primitus rumpatur, simul tamen cum ea ipse vel alia, vel alie partes,  
 iuxta hanc, vel etiã remotæ findantur. Sed enim uerò non temerè Paulus ait, plurimũ ab his uasis  
 cranium differre. Primò (vt ipse inquit) quoniã ea uasa, quàm id ob percussione patiuntur, inania  
 sunt: cranium autè e crebro, cerebelloq; , ac alijs quoq; multis corporibus aduandis, puta uenis,  
 arterijs, neruisq; , ac membranis plenum est. Adeo vt qui percussus ibi fuerat internsecus ac op-  
 positam partè frangens, hic desit. Secundò quia vitrea substantia fragilis est, & imbecillis: Ideoq;  
 ad resonationè facilis: cranion uerò forte, validumq; est, & ad huiusmodi resonationè cõrtaax.  
 Quibus duabus rationibus tertii ex Galeno adiungas; uidelicet qd phiala, uasq; , alia vitrea con-  
 tinua sunt, ex vniã duntaxat, simpliciq; parte effecta: cranion uerò pluribus ex partibus cõpo-  
 situm est, ob quatuor supraposita. *h. iustuarum vsum:* scilicet vt nouem tũ vni parti factum  
 alteri minimè cõmunicet. Siquidem igitur vnum continuũ esse in cranio, possibile quoq;  
 idem casus foret. Ac quomodo id fieri potest, dum plura in eo sunt, non continua, sed coniuncta,  
 vt vno percussio, alterum findatur? Nos autem huiusmodi casum adhuc nõ vidimus: possibilem  
 tamen eo modo, quem declarabimus, arbitramur. Videlicet imprimis vt non in diuersis ossibus,  
 sed in eodem: inquit diuersis tamen, forteq; nonnunquã ad oppositis eiusdem ossis partibus id con-  
 tingat. Quemadmodũ v. g. si in dextra frontis parte ictus confertur, in sinistra eiuãde fissio fieri  
 potest: ex dextra scilicet impulsio eo ossè: interm uerò circa sinistra foriter cum synepite alligã-  
 to, indeq; plicato, ac fracto. Sic etiam cum synepitis os aliquas habeat partes eminentes, aliquas  
 inferiores, illas ad rectã, has ad squamosã vtrinq; futurã pertinentes: Itemq; nonnullas habeat  
 partes anteriores, aliquas verò posteriores: illas quidem ad coronalem, has verò ad lambdoidem  
 spectantes, quoties in vna parte ictus incidat, presertimq; in inferiore, aut posteriore, vel in pro-  
 ximã, vel in oppositã quoq; partem resonant, responsioq; ictus, & fissura velut ab echo fieri,  
 possibile est. Si igitur casum à Nicolao Florentino prænaratum à tempore ad tempus, hoc est à  
 dextra ossis frontis parte ad sinistraẽ è regione sibi respondentem, intelligo: quemadmodum in  
 arcibus contingere vidimus: cõpressa videlicet altera extrema parte, oppositam sibi, alterã extre-  
 mam frangi. Sic etiam & Hippocratem, Celsumq; , ac Soranum tales, tantq; nomis viros cum  
 Paulo, sicut, rationibus cõcluemus. Illi siquidem possibilem casum in duobus, forteq; etiam con-  
 trarijs eiuãde ossis partibus admiserunt. Paulus uerò de diuersis ossibus uerò arguit: Haud enim  
 rationes eius contra Hippocratem, Celsumq; , & Soranum valent. Quin immò nec si in diuersis  
 hi ossibus intellexissent. Quoniam enim plena caluaria sit: Haud tamen vsq; adeo plena, quin in-  
 ter cerebrium, & os membranarum trassiore ossi appentiam esset: dignũ interualliũ remaneat:  
 vt omnibus cõpertissimũ est. Fortitudo autè, soliditasq; , ac durities ossis ad talem siliq; ino-  
 dum potius adiuan: tantũ abest, vt impediãt: veluti de alere, durissimiq; lapidibus ex implũ  
 antea præbimus. Sutarũ deniq; vius quintus, ossiumq; , separatio, in diuersis ossibus fieri posse  
 abnegat, non in diuersis eiuãde ossis continui partibus. Interim uerò inficis minimè imbus,  
 rissimũ huiusmodi casum esse, possibilem, interdũ quoq; , vt factio in synepite ictu, plagiũ,  
 in frontem, aut occiput fissura pertranseat, vel e contra: Itidem vt ex occipite in frontè, vel e con-  
 tra. Rursusq; à tẽpore ad tempus. In his tamen caluarijs, quæ futuris omnino carcant: siue nullã  
 ab initio habuerint, siue per symphyria cõluerint, prout aliquas esse huiusmodi caluanis antea  
 iam senescentibus quibus idã retulimus. Verim in huiusmodi caluarijs, eadẽ ratione, qua Hip-  
 pocratem, suozq; , sequaces saluamus, fieri etiam posse (quæ scilicet ad eodẽ m, eontinuã quoq; o dẽ)  
 huiusmodi figuram determinamus. Sed enim uerò ratio à dũc, quã externis esse peruenit  
 prima fronte præferat, talis fracturæq; , modus uerò accidit. Fallen in aliquãdũ medicos extingit  
 (vt Paulus appositè etiam ait) cum in pluribus cranij partibus ictus factus sit: siue quia peruenit  
 ictus iteratim: siue quia semel percussus in lapidem alia, vel opposita parte ceciderit, vel alie  
 durissimæ substantiæ sibi contrapositæ obiciã factus sit, in deq; fissura in alia parte redeperit: citra  
 eius interea solutionem. Adeo vt medicus eam dũtaxat partè cõtemplatus in qua plagiũ, uelutiq;  
 solutio facta est, post multos autè dies, abscissũ in altera parte factũ, apertũ, vel incitũ, fissuram  
 inueniens in oide, ob predictam resonationem, aperturæ factum fuisse falso imaginetur, cum  
 tamen ab alio ictu facta (veluti predictũ quoq; , a nobis ante fuit. *h.*) sit: inuenimus vsus, secundus, ter-  
 tiusq; , & quartus erant, vt per eas vnos, art erigõ, & neruuli, vel lãtũ ingrediantur, vel fortis ex-  
 cidentur, crassioriq; , membranæ libere quedã, vinctulq; , egrèdiatur, propter illius suspensionem,  
 pericranijq; , generationem. His igitur factibus, uolent quodiam est in frontè ad anterioribus  
 incidente: v. g. in partem, quæ capillis nuda est, fieri potest, vt ob frontis ossis impulsione cõro-  
 nalis suturæ vehementior facta cõpactio aliquod è predictis uasis, ac vt nullis, & uinculis succere,  
 abrumpatq; , ac fortassis iuture etiã ipsius serratiles illi dentes, uagueliq; patiantur, cõruptan-  
 turq; , ob impulsione uerò etiam cõpressi. Ex quo paulatim facta ibi putrefactioq; , abiceffoq;

h. Com. 1.  
huiuscapit.

Determi-  
natio que-  
stionis.  
Conclusio  
prima.

4. 1. 1. 1.  
1. 1. 1. 1.

Verũ ca-  
Paulo con-  
clum.  
Ad Pauli  
rationes.  
Ad primũ.  
Ad secundũ.  
Ad tertium.

Conclusio  
secunda.  
1. 1. 1. 1.  
1. 1. 1. 1.

i. Suprà cõ.  
3. uerũ si-  
nem.  
Conclusio  
tertia.

Conclusio  
quarta.  
Com. 1.  
huiuscapit.  
prima.

quàm postea aperitur, offa patefit, præfens, quæ paffa est, fatara fissura ob resonantia, siue ap-  
 chema factam referens, medicis ipsis imponit. Cùm tamen ibi nulla sexpenero fractiois, seu  
 fissuræ species, ac per hoc neq; resonantia prædicta existat. Id em̃, in alijs futuris accedere potest,  
 percussis vel occipitis, vel fyncipitis ossibus. Verùm enim erò de his cõfrequentia fermones cõ-  
 cõti plus, quã propofueramus, locuti sumus. Alias enim ex propofito vbenor sermo fiet. Ad no-  
 strum igitur propofitũ Galeni contextũ reuertamur. Prius circa præfumpta Hippocratis verba  
 duntaxat annotates: quàm dicebat [At omni verò capitis offe roburatus est os, quod post verticem  
 est, &c.] nõ rectè Cornarius interpretatur [os verticis] minime aduertens maocam esse textum  
 Græcũ, legendũq; esse [ἀπὸ τῆς κορυφῆς] Desit enim dictio [ἀπὸ] quod significat [post] Ineptus  
 verò Caluus interpretatur, dicens [quod in summa fronte est, partes; posterioræ.] Itẽ quàm pau-  
 lò post Hippocrates dicebat [At verò quàm sedes telorũ acutorũ, ac leuorũ ipsẽ per se ipsas hie-  
 tes in offe abiq; fissura, & contusione, & introcessione, &c.] non [abiq; fissura] legit Cornarius,  
 sed [cum fissura] quod falsum, & præter Hippocratis mentẽ omnino est. Sed longè imperitius,  
 & ab omni Hippocratis sententia remotius Caluus omnia hæc verba transformat, præfertiũdũ,  
 dicens [nam ac ossa neruũ, &c.] Minime aduertens inter omnia Græcas dictiones [τῆς ὀστέας ἀπὸ τῆς  
 ἀπὸ] falsò scriptis esse, legendũq; [ἀπὸ τῆς κορυφῆς] id est sine, seu abiq; fissura, &c. Quæ quidem, veluti  
 & alia quamplurima rectius nouit Viduus. Sed hæc obiter intantum hic prænotata sũt. Galenus  
 igitur in præfenti textu ad aures vtrinq; posita ossa in tres distinxit partes: primãq; petrosam  
 appellauit. Cùm (vt diximus) petram tũm figura, tũm duritie simul representat. Verũm quare sic  
 asperum, & durũ huiusmodi os sit, enucleandũ adhuc restat. Quia enim nõ à musculosa tantũ  
 carne: sed à reliquis etiam capitis ossibus circumiacentibus, suisq; etiã partibus superioribus, dis-  
 sequebatur os istud, vt tutum omni ex parte maneret. Idẽ frustra durius frõte, fyncipitiũq; ossi-  
 bus, ac deniq; superiorib; quoq; proprijs partibus à natura fabricatũ esse vide retur. Nisi eide, qd  
 ob alias quidem causas durius fuisse operpretũm fuit. Imprimis enim, quia styloides præcessus  
 inde oriri necesse fuerat. ð. (processum prius cum Galeno supponimus, quãuis nos appendicem  
 potius antea nominarimus, denotãq; post hæc admittimus) qui processus, tametĩ, ne multis loci  
 sibi præoccupans, impedimentũ vicinis præberet, gracilis necessariò fuit. Durissimus tamen, va-  
 lidissimũq; esse tanto magis debuit: cum ab eo plures musculi, tũm inferioris mandibule septimũ,  
 & octauũ . . . (siue quartũ par dicere malueris) deorsũm eam trahentes, atq; os ipsum ære-  
 rientes: Tũm linguæ quintus, & sextus . . . (siue manus dicere tertã cõiugationem) linguã ipsã  
 versus interiora fursũm retrahentes: Tũm deniq; ossis hyoidis quintus, & sextus . . . (siue diximus  
 tertũ quoq; par) quorũ munus est prædictũ hyoides os fursũm nonniã, introsũmũq; con-  
 trahere, ac prohibere, ne in dextrũ, aut sinistrũ reculatur, sex inquam prædicti musculi siue ori-  
 gines principiũ duxerint, illiq; processũ implantentur, firmeturq;. Quinimò (quod manus  
 est) ipsum quoq; hypostyloides os et quoq; prædictũ styloidi processũ, siue per oblongũ officulum,  
 siue per teres ligamentũ annectat. Ex quo sequitur, qd hyoidi alligata corpora ab eodem quoq;  
 stylo quodammodo pendeant. Si quidẽ igitur styloides ille processus necessariò durissimus, va-  
 lidissimũq; ne à prædictis musculis dum ab eo trahendi inuicere fungũtur, abrumptur ab ea tem-  
 ponis ossis parte emerulus erat: cui dum sit, qd id etiam os durũ, & validũ, ac denũm esse oportet.  
 Ex molli enim, raroq; ac imbecilli substantia durũ, densũmũq; ac validũ omni processũm,  
 impossibile est. Quod si non processũm, sed appendicem ipsã styloides os nuncupare velimus  
 (veluti nobis magis ardeat, anteq; inter appendices libentius cõnumerari mus. m.) cui seuicidũ  
 appendicũ usum ascribamus: nõ minus hercle ratio prædicta militabit: vt sciicet os cui validũ-  
 mus styloides ad nascitur, validũ quoq; sit. Quod enim durũ, validũq; esse debet, ac multis me-  
 tribus, attractionibusq; resistens, in laxa substantia nasci, alligariq;, & annecti absurdissimũ  
 est. Quod autem in nouã potius sententiam inclinari mus, vt appendicẽ id styloides os nuncu-  
 penus, nõ processũm, seuicidũ; vt appendices primos duos prædictos . . . (siue esse) inde præfentem  
 succellit; quoniam ab initio cartilagineũ potius ligamentũ erat: dein de cartilago ossis: posteaq;  
 os cartilagineũ, magisq;, ac magis pomatum durẽscens, factũ est deniq;, vt in purũ, durũq;, os  
 degeneraret, separabile tamen interius per multos annos etiam ad iuuentutẽ vsq; per elaxatio-  
 nem existens. Id quod processibus nunquam, appendicibus verò, prius, quam durẽscente inter-  
 media cartilagine per symphyfiam coalescant, omnibus aduenit. Quod si, ante quã os euasent,  
 ac per hoc neq; processus, neq; appendicẽ nominandũ, tanquã ligamentũ potius cõtemplamus,  
 d ubio procul omni eiamã validissimũ esse oportuerit (veluti prædictũ iam est) & id quoq; vnde  
 oritur os, quod temporalis prima pars est, validissimũ, ac durissimũ fuisse, necessũm erit. A laxo  
 enim, raroq;, & inualido osse ligamentũ validissimũ, ac robustissimũ, durissimũq; nasci, im-  
 possibile est. Hæc igitur prima ratio sit, cur prima tẽporis ossis pars petrosa occupata, nõ solum  
 asperitate, prærupteq; rapis figura, sed etiam duritie petrã præferat. Secunda autem ratio assi-  
 gnari potest ex alia appendice, quã dicitur . . . Græci, nos verò auditoriũ meũ nuncupamus:

Noddum  
 quantum.  
 Cõtra Cor-  
 narium.  
 Cõtra Cal-  
 uum.

Cõtra Cor-  
 narium.  
 Cõtra Cal-  
 uum.

Obiectio.

Respon-  
 sio.  
 Quærit  
 pccati of-  
 ficia ratione  
 quinq;  
 l. vt hoc Ga-  
 lenus, & n.  
 de v. p. c. 4.  
 post p. inc.  
 Styloides  
 vlt.

4. 4. 1. 1. 1.  
 5. 1. 1. 1. 1.  
 6. 1. 1. 1. 1.  
 fig. 24  
 1. 1. 1.  
 7. 1. 1. 1.

2. 1. 1. 1.  
 3. 1. 1. 1.  
 4. 1. 1. 1.  
 5. 1. 1. 1.  
 6. 1. 1. 1.  
 7. 1. 1. 1.

n. In proce-  
 mio cõ. 6.  
 post me.  
 Quod sty-  
 loides est  
 46.

1. 1. 1. 1.  
 2. 1. 1. 1.  
 3. 1. 1. 1.  
 4. 1. 1. 1.

totum scilicet os intelligentes, quod in tenerioribus per elixationē separari potest, deinceps autē natu grandioribus, quāquā cum temporis petrosā parte coalescit: Anterioris tamen, interiorisq; linea quadam semper cōspicua notatū est, vt pręteritę duntionis vestigiū: quemadmodū in appēdicibus quoq; omnibus alijs (quanuis tardius, et iulius) cōtingit. Cū igitur prima hæc tēporis pars prædictū porum, meatuum auditoriū *περιχώρα* q. d. circumdāns, sive circumhabens, cōtinentur sit (appositē enim sic locutus est Galenus, cū in seipsā velut anulus margaritę cōtinet, cōprehendatur, seu amplectatur) non dubiū est propter tympani defensionem, eam ossis partem durā esse debere, ac validam? Non temerē igitur petrosā, lapideosque prima hæc pars, ob petrosā quadam duritiem, nūcupata est. Quod si petrosi nomen largius cum Velsio capiamus: vt scilicet mamillarem quoq; processum, occipitiq; (vt diximus) inferiōrē partem, circa magnū spināli medullę dicatū foramen, cōprehendat: tertiam quoq; tunc rationem addas: quoniam scilicet nō modō mamillaris ille processus, necessestariō etiā (vt videbimus) durissimus: sed duo quoq; illa capitula inferiōri orianda fuerant, quę cū primę vertebę particulas dehiscent, articulo quodē omniū totius corporis articulorū dignissimo, non temerē durissima esse debuērant: Idcirco & vnde oriuntur huiusmodi processus, capitulaue dura, os durū quoq; esse necessum est, particularem verō petrosā temporis partē mandibulę inferiorē dearte ulatur, nō minore ossis duritiem requirens. Quare etiam huiusmodi lithoides, petrosusque os durū extitisse opus fuit, cū inferioris positū sit: quęquidem pars ad basim spectat: quam superpositis duriorē esse, nullus vñquam ambigeret: præsertim si (vt prædictū iam est) largius petrosus os sumptierimus. Totā enim occupat pars inferioris basis quodam esse (vnde nōnulli basilarem eius inferiorem partem nūcupant) proinde duriorē esse totū lithoides cōoportuit. Quibus & quinto addamus, quę ex tali situ cerebri humiditates deorsum descendentes recipiens, nisi durissimū os sit, promptē ab illis humiditatibus putresceret. Sed hæc quidē pro duritiē lapideę causis. Asperū verō, præruptoq; rupis instar inæquale fuit: præcipue quidem, vt musculi in eam partem cōmodius, firmiusq; plurimū inferantur: vt in mamillares processus, antiquiores quidem, septimę conjugationis musculi caput annuere facientes inferantur: In occipitiis verō posteriorem, inferioremq; partem prima, secunda, tertiāq; & quarta musculorū ex parte abnuere facientiu cōiugationes: nec nō quinta etiā ad latera caput mouens, retrahensq; implantatur: supraq; hos musculi est ab ipso occupate ortū dicens, ad scapulę spinam inferus, tanquam ipsius scapulę motor secundus: qui ab aspero etiam ossisq; firmius inhaeret, cōmodus principū suscipit. Mamillaris autē processus, sic quidē dictus à muliebri mamillæ, siue à vaccini yberis papillarū similitudine, præter ea, quę dicta iam sunt, durus fieri debuit, tūm vt auditorio tympanū defenderet, securusq; à posteriori occurrētibus tæretur, tūm vt inferiorem quoq; suam cavitatē, in qua (vt videbimus) ob auditus fortissimē cōmoditatem aer includitur, tutus cooperiret: tūm, tertio, vt vnā cū auditorio tympano maxillę inferioris cūm ossis temporis articulo, illiusq; capitato processui postpositū prelidū sit. Ne quāquam violentis motibus sine mordendo, siue corpora dura comminuendo, a subiecta cavitare prolabatur: vnā inquam cum auditorio tympano huiusmodi vsū processus mamillaris habet, nō solus, vt nō rectē Galenus \* opinatus est, vt qui sub eo processus articulationem fieri, caputq; maxillę inferioris inferi scripsit. Minime interem aduertens, inter mamillare processum, & eum articulū, auditoriū interponi tympanū (vt postea videbimus &c.) cuius tympani processus quidā in sonori extensus nimiam oris apertionem, ac per hoc articulationis laxitatem, siue demq; luxationem impediens est. Quibus & quartam addas rationem duritiē mamillariū processū: quę est, quonid validæ, robustiq; illę partes esse debent: quarū ratione totus capitis motus inchnationes ob assiduo ibi musculis expletur. De altero autem processu tēporis partū processū, videbēt iugalis ossis dimidio nunc silere decreuimus, cū in sequenti capite de toto ipis iugali ossis determinandū vnā cum Galeno veniat. Reliquū est igitur, vt omnū capitis ossium substantiā cōplectimur: postquam dimitto iam ipsam Galenū hic inuenimus, qui de sex distinat ossibus capitis meminit, & ex ijs solum de quatuor ossium substantia expressit: Nil de sphenoidis etiā, ac spongiosę substantia determinans; temporūmq; ossia sub multiformiū nomina dimitteus. Nostri itaq; fuerit reliqua perficere: Sphenoidis igitur substantia dura est (inquit alibi Galenus. p.) ob tres quidem causas, quas ab ipsomet proprijs verbis loquētē intelligas, quāsi sic ait [Palati verō os (sic enim id aliquando vocat) velat cuneus quidam mediū inter caput, maxillamq; superiorem, incutabit: cōtinentis iam in sese meatū cerebri purgantū foramina: præterea autē & ad basim totius capitis subiaceti quemadmodū & ipsius pars ossi occipiti cōtinua, ob hæc igitur omnia densius, ac durum extitit. Fortassis autem vel propter vnū eorū quoduis, tūc iure extitit.] Tres inquam in huiusmodi sermone duritię causas assignat. Prima quarū est, quia vñ cuneus interpositū existit. Secunda quia meatū foraminā in sicie adnnet: adeō vt à superioribus humida excrementa recipiat. Tertiāq; densum est; quia ad basim subiacet. Fortassis autem propter vnā hāc causam quālibet. Melius verō est ob omnes tres, durū, ac densum factū fuisse id os affirmare. Singulis

Cur petrosi os alpe-  
tuo-

Mamilla-  
ris proces-  
sus substan-  
tia.

\* 11. d. v. p.  
c. 10. post  
med. & hic  
cap. 1.  
Cōtra Ga-  
lenum.  
o. Cap. 5.  
com. 1.  
Zygoma-  
tis substan-  
tia.

Sphenoidis  
substantia  
p. 11. d. v. p.  
c. 10. post  
med.

Duritijs  
caus.

igitur mox declarat: ordine tamen retrogrado, ab vltima exordians. [Quia enim ex his est, quæ ex basi capitis sunt, quæ sanè dura esse debebant: & quia ab extremis, quæ à locis superioribus proinanant, per ipsum prolapsuris, breui extabuisse, atq; com putruisse si laxum fuisset; ob eam causam duram, ac densam esse factum. Huc accedit etiam, quòd mediũ inter caput, ac maxillam superiorem est sitũ, eodq; validũ esse oportet.] Hęc de sphenoidis, cuneiformisue ossis substantia. [Ossium porro alis similitum productio ex ipso est facta, sedem simul, atq; operimentũ musculis; quæ in ore sunt, (scilicet delitecentes, maxillamq; inferiorem fursũ retrahentes, tertias, vtrã lias videbimus, conuagationis eorũ, quæ maxilla hanc mouent) à lateribus et tributa. In cauitatibus enim, quæ ab ipsis alis circumscribuntur, horum musculorũ capita sunt appensa.] Quæ autẽ de foraminibus cerebri expurgantibus inquit Galenus, tametsi à quam plurimis recentiorũ Anatomicorum reprobata nos in sequenti cõmento (Deo Optimo Maxio fauente) elucidando cõprobabimus. At quid demũ de ostiũ ossis substantia dicendũ restat? Respondeo id omnĩ capitis ossium imbecillitũ esse dicens: tũ tenuitatis, tũ quoq; foraminũ nõ cribri, sed spõgie quoq; instar quamplurimũ ratione. Magis enim apud fabricatẽ naturã preualuit supradictũ .q. triplex foraminũ vñs, tũ ad vitã, tũ ad vitæ comoditatẽ necessarius. Inspirationis inquit, odorisq;, & expurgationis, quã eiusmodi ossis dispathia: præsertim cùm huic alia ratione prouiderit: intus videlicet huiusmodi ossa abscondens: vbi & à frontis ossẽ: præsertimq; vt in pluribus arteriis, inferiũq; duplici, & à nasi ossiculis, atq; ab ipsis magis oculis custodiendis defenduntur. Nec interim descendens ad ea humiditas dispathiẽ plurimũ obesse potest, cùm foraminũ causã partim super illis, aut nihil immoretur: præcipueq; cùm (vt videbimus .r.) per nares expurgatio naturalis, & ordinaria non sit. Nisi quoniam cerebrum (vel Galeno metipso comprobante .f.) præter naturam affectum sit. Verũ enim quòd foraminum, quæ in singulis capitis ossibus existunt, sermone cõuertuntur, Galeni defectum suppletes: qui de illis impresentiarum loqui noluit, se in vasorum, nervorumq; dissectionibus tractaturum promittens, idcoq; sic dicens.

Pterygo-  
dũ proci-  
sũ vñs.

Oculũ of-  
fis substan-  
tia. Com-  
p. Coe-  
lecti.

Com. se-  
quas. vel  
l. 8. de v. p.  
c. p. verũ  
siccum.

Ἰπὲρ δὲ τῶν τραχέων τῆ κεφαλῆς, ἐν ταῖς ἑσθλίαις, καὶ τοῖς ἀσπασταῖς, ἐπιβόταις. καὶ ἀρ-  
θροῖς ἰσχυροῖς ἰσχυροῖς καὶ ἰσχυροῖς ἀσπασταῖς, ἢ ἀσπασταῖς, ἢ ἀσπασταῖς, ἢ ἀσπασταῖς, ἢ ἀσπασταῖς.

De capitis autem foraminibus, in vasorum, nervorumq; dissectionibus sermo habendus est. Illorum enim causa effecta sunt: prodeuntq; secũdũ quodlibet ipsorum, seu arteria, seu vena, seu neruus: vel ex his quedam, vel omnia.

## COMMENTVM OCTAVVM.




N vasorum (hoc est, venarũ, arteriarumq;) ac neruorũ dissectionibus habendũ esse, de ossium capitis foraminib; sermone aut. Sicq; proculdubio si quis impetẽ obseruauit. Vbiq; enim de nerui ascuius, aut venę, vel arterię adotomę ex quibus loquitur, vbiq; scilicet in cerebri ingredendo vt plurimũ ascendunt, vel ab eodẽ egrediendo maxima ex parte descendunt) ibi de foramine siue ingressũ, siue egressũ, vel etiam vtrũq; dicato meminĩt: tam in hęcio de neruorũ dissectione, quam in alio de venarũ, arteriarũq; anatome, atq; in libris deapũ, de partũ vsũ: præsertimq; octauo, nono, decimoq; ac decimo sexto. Fortassisq; non alitẽ obseruauit in libris de anatomicis administrationibus vñdecimo, duodecimoq;, ac tertio decimo. Quos quidem nos hodie cum alijs, à dimidio noni libri ad quintum decimum vsq; desideramus. In quibus quidem tribus libris, scilicet vñdecimo, duodecimoq;, ac tertio decimo (ipsumẽ Galeno referente .r.) de neruis, venisq;, & arterijs, eorũq; dissectionibus locutus est. Eorum tamen, quæ reperitẽur voluminũ loca de his pertractantia in mediũ afferre, quæcũq; occurrunt, in singulorũ foraminũ enaratione conabimur. Vt eorũ error comperissimus sit: quĩ nihil prius Galenũ in libello de neruorũ anatome scripsisse de huiusmodi foraminib; dicentes: vel eum deinde manũ esse, tanquã promissa minimẽ obseruanteĩ, vel illum libellum Galeni legitimũ non esse, concludunt. Itaq; nos ad capitis foramina (non in simijs cũ Galeno ab illis nonnãquã decepto, sed in homine) cõuertamar. Quorum vñs est, vt vel arteria, vel vena, seu neruus, siue ex his quedam, siue cuncta (vt Galenus hic ait) prodeant: siue (addamus nos) ex his nullum: sed vel aer, vel etiam excrementũ aliquod pertranseat: siue etiam cum aliquo ex his; vel cum duobus, aut etiam tribus præteritis omnibus prædictũ excrementũ egrediatũ. Imprimis igitur dicam; ossium capitis propriorũ foramina esse quorũ quidẽ vt plurimũ tringenta esse præter; Communia verò magna ex parte tredecim, ideoq; cum cõmunibus propria omnia vt plurimum esse numero quinquaginta. De quib; omnib; sigillatim loquemur, à sphenoidis, cuneiformisue

e. libello d  
libris  
proprij cap-  
põst præter-  
Cõm. l. 8. de  
v. p. c. p.  
vñs.  
Ossium capi-  
tis proprie-  
rum for-  
amina.

offis cribro exordientes. Cuius quædam foramina propria, simulq; cõmunia sunt quãtor & viginti, siue coniugationes vt plurimum duodecim. Nonnunquã enim vndeceim sunt, sicq; foramina viginti duo; interdum verò licet rariùs coniugationes decem, sicq; foramina viginti. Nos igitur in dextra parte numerantes, totidem in sinistra intelligemus, vel econtra (nil enim refert dextra, siue sinistra ad numerandũ asumere). Duodecim vero cum sint, tria prima ad oculorũ sedem, & caluarie cavitatem exordientia spectant: reliqua autem omnia deorsum magis inclinata vel in nares, aut fauces, vel in palatum ab interioribus etiam incipientia vergunt: præter decimũ, & duodecimũ, quæ ad cerebri loca minimè penetrant. Nos autem in offium capitis foraminum cõmunium numerũ posuimus tam incitoria, quam exeriora colligentes: præsertim quia decimum ad declarationem educationis excrementorũ maximè conducit. Primum itaq; foramen est in offe cunei formi exculptum, ad oculorũ sedem spectans. Ibi scilicet collocatũ (Galeno met erudicentem.) qua primum oculorũ regio orti incipit. Inde enim quidã visõnos principales eius nervos, quorũ gratiã pertusum tale foramen est, orti oculi videntur: tamen quõdam modò scõlos a secundo (vt videbimus) foramine principiũ sumunt: Quomobrem Galenus idem ait [ Tibi q; nervi hi, si inspexeris, veluti quẽdam oculorũ radices esse videbuntur ] orbiculare quidem id foramen est, præcipueq; exteriũs. Intus enim iuxta externũ, superiusque laras, sub æquis illis alarũ animum inftar sphenoidis processibus, qui sellæ posteriorẽ partem representant, acutũ, exiguũq; angulũ obtinuit: per quẽ arteriola quẽdam (quanuis nonnulli venã dicant) ex interioribus ad oculos pertranlit. Ad eũ vt duo hæc corpora per id foramen excidant (sicq; duplex eius vsus sit) visõnos inquam nervos, & arteriola. Idcirco tanta prosus latitudine non existit (quãquã sic Galeno placet) quanta nervus crassitudine existit. Non nil enim superat, quò arteriola iam dicta simul cũ nervo excidenti cedat. Nec secundo maius est, vt in secundi declaratione ostendemus: vt autem id, veluti & alia multa dicenda foramina quo quomodo audientibus, legentibusq; pateant, scilicet inuocentur primam hanc figuram hoc in loco proposuimus. In qua statim litera E. huiusmodi primum foramen præfereat: veluti secundam litera G. ubi ostendat.

Sphenoidis  
foramen  
primũ  
proprium.  
u. Lib. de  
nervorum  
differt. c. 1. 22

Vfus duo.  
Cõtra Ga-  
lenum.



Foramen  
secundũ  
enim  
sphenoidis  
proprium.  
x. Ibidem  
cap. 1.  
Figura.  
Magni-  
tudo.  
y. De v. p.  
cap. 2. post  
med.  
Cõtra Ga-  
lenum.

Est enim secundũ id foramen, quod secundæ nervorũ cerebri cõiugationi principaliter dictum est, longè profusũ, quam visõnorũ nervorum coniugatio est, dantiõ, ac minori. [ Quippè quam tenuissimũ os (inquit Galenus. x.) hanc ab illa distinguit, ac separat ] secundũ id foramen per hæc verba insinuans. Paulò minus toto orbiculare est. Parte enim elatiore in acutũ, longũq; & angustum definit angulum. Non modò autem totũ hoc foramen: sed quod humiliter in parte orbiculare dũtaxat est, priorẽ foramine longè maius est. Quanuis Galenus angustius id esse proferat, y. a simiarũ fortassis, aut cercopithecũ nõ benè mundis caluarijs delusus. In quibus tamen maius etiam id secundũ foramen primũ est: vix tamen euidens, sicut in homine, maior eius amplitudo existit. Quinimmodò cum ab æquis illis sellæ processibus aliquomodo cooperiatur, minus potius, nisi exquisitis perpendatur, apparet: Idcirco; Galenus crassiore (vt dicitur) minerua, palrumq; in hoc diligens, vel minus esse posuit; vel si angulũ quoq; superiorẽ cũ ipsius rotunditate



annumeremus, totū quoq; secundū, ad totū primū foramen cōparemus: tunc non adhuc minus, sed vel non maius, q. d. æquale: vel nō multo maius esse vultur. Sed enūmerō in hominis caluaria, de qua nos in præfentiariū loquimur, Galenus cōsiderasse exquisitū debuerat, dubio procul omni, euidentiſſimēq; longē maius, ampliūſq;, vel ſola rotunditate perſpecta, hoc foramen eſt, quā ſuerit primū. [Necceſſariō autem prælongum exiitit (inquit Galenus. x.) nō autem quomodo ſenſificorū, teres: quod duos nervos mutuo ſefe ſubſequentes, nō vnū erat cōtēturū.] Intelligit autem Galenus duos nervos, ſcilicet ſecūdi paris totum, & tertij paris portionem: Sed ne ob hos quidem duos nervos tantummodo magnū, ac adeo prælongum factum eſt id foramen: ſed etiam qua vena quædam, & arteria, nec nō & excrementa quædam per id tranſire oportuit. Imprimis igitur per ipſum tota ſecunda nervorū cerebri propago ad oculorū quatuor muſculos: videlicet primū, tertū, quartūq;, & ſextum, itemq; ad muſculū ſuperiorem palpebram attolentem, aperit emq;, propter motū diſtribuenda pertranſit. Secundō per idē foramen permeat tertij nervorū paris prima radix in duos diuidenda ſurculos: quorū alter ad frontē, frontiq; muſculum pertranſit, aliūq; ſuperiorem palpebram claudentem: Alter verò ad narium internā tunicam peruenit. Tertio per idem id ſecundū foramen ea nervorū portio egreditur: quā Veſalius ex veterum cōſuetudine tertij paris minorē quandā radicem nuncupavit cū verē tertio pari connumerans: Rectius autem octauū ex Falloppio nomenclandū quanti dūtaxat oculorū muſculi motuū. Quartō; per idem foramen tranſit ea tenuium nervorū cōiugatio, quæ iuxta Marini à Galeno ita. relata dogmata Veſalius in minorem quinti paris portionē appellauit, de ea ſimul cum pari quinto pertranſans. Rectius tamen quartū par à Falloppio nomenclatū ad ſecūdi oculorū muſculū duntaxat, gratiā motus illius percurrens. Quinto inſignis quidam ſpōralis arteriæ ramulus, poſtquam retiformem plexum cōformant, in oculum per idem foramen egreditur. Sextoq; demum per elationē huius foraminis ſedem (prædicta enim per humiliores deſcēdebant) quæ in acutum, oblongūq; angulum cōſtingitur, vena quædam iugularis externæ ſurculus diſta ſecundus: nō vt prædicta arteria extroſum, ſed cōtrā potius ab exterioribus introrū prinduram membranā diſtribuenda ingreditur. Sex ergo hi ſunt ſecūdi foraminis vſus. Quibus deniq; ſeptimum adiungemus: vt per hoc ſcilicet excrementorū ab inſundibulo, adeneq; in ſellæ ſphenoidis intervallo poſitis eſuſorum tranſitus, expurgatioq; fiat, eo modo, quo poſterius elucidabimus. Quem vſum primo foramini tanquā elationi, naturaliter, ac benē recto exiſtente cerebro, nō dedimus, illi tamen, vbi plurimū excrementa ſuperabundant, inſeſe, nō diſturbemur. Tertium ſphenoidis quoq; propriū foramen exiſti, quod litera H. in propoſita figura oſtēditur, Galeno quidem, vel proſius, vt ſimiarum, cerropitecorumq; caluaria pendenti incognitum, vel ſaltem nō exquisitē, præfertim quoad eius exitum, atq; vſum aliquandō perpenſum. Quoad exitū inquit. Etenim foramen ordine prædictis duobus ſuccedens (quod intendimus) illi tamen, præfertimq; ſecundo, longē minus, orbicularēq; interim, ac longiore itiuere per oſſis ſubſtantia in oculorū quoq; cauitate, inſtar duorum præcedentū egrediens idipſum eſt. Galenus autem huiusmodi foramen eſſe tertium, quod in oculorū ſedem terminetur, expreſſe negavit, ob id dicens. *b.* Naturam nervus ad ſuperiorem maxillā deſcendentibus ex minori tertij paris radice locum inueniſſe per ſecūdum præſcriptū foramen, vñ cum nervis oculorū muſculos mouentibus: ne videlicet multis foraminibus perforatū os ob tenuitatē leſionibus eſſe obnoxium; ſicq; opificis natura oſium ſecuritatē pro nihilo duxiſſet, cūm precipuē tertium aliud foramen ad magnum angulum ſeciſſet. Verūm pœce tanti viri dixerim, foramen illud, quoad magnū pertinet angulum, in alio oſſe, puta maxillæ ſuperioris ſecundo, in medio autē quarti, nedūm in medio angulorum, nō ad magnum pertinet oculum, aliud eſt, de quibus ambobus poſterior ſermo fiet, vbi de maxillæ ſuperioris oſſibus loquemur. c. primū, ac ſecundū foramina hæc declarantes. Non igitur in ſphenoidē foramen illud maioris anguli eſt, ſed ab hoc, quod intendimus plurimū diſtans. In oculorū igitur cauitate, humilior tamen, depreſſiūſq;, primis duobus, & ſub ipſis oculis pertranſiens eſt: Adeo vt, niſi quipiā vel ſtylo immiſſo exquisitē, ſummaq; cū diligentia perſpicere conſtare; terminū, exitumue minimē aduertat, Galeniūq; in hoc ſocius euadat. Quoad vſum verò huius foraminis, mirū nō eſt ſi Galenus ignorat; foraminis vſum quoq; neutiquam cognouit. Etenim factum eſt nō ob aliam cauſam, niſi vt ſecundæ eundem tertij nervorū paris priore craſſiori propagni viam cederet, quæ in temporalem muſculum, oculorū ſedem, narium internam membranā, ſaciēq; muſculos, ac anteriores ſuperiores dentes inſeritur, præterea vt per id non nihil excrementorū cerebri (vt videbimus) expurgetur. Tria igitur hæc diſta ſunt propria ſphenoidis foramina, quæ in oculi cauitate videntur. Quartum verò ſphenoidis propriū quoq; foramen eſt litera Q. inſignitū, huc tertio ſecūdi ordine ſuccedens, extra oculi tamen ſedem: oblongum quidem, ac veluti rotundū leuiter vtrinq; cōpreſſum, & vt à quibuſdā dicitur, ouale: quoniā oui ſi ſimilitudinē reſert. Duobus autem primis minus, ſed tertio maius. Quod tertij nervorū paris tertæ, maioriq; radicē, ac toto ſecūdam veteres Anatomicos quarto pari foras pro-

z. ibidem.

Vſus ſeptē.

a. Lib. de  
nervorum  
diſt. c. 6. d.  
in pnc.Tertū prop-  
riū quoq;Magni-  
do, & ſig-  
ra.b. s. de v. p.  
cap. i. poſt  
mediū, &  
ca. 3. verſus  
finem.  
Cōtra Gal-  
enium.c. Cap. 3.  
cōmō.Vſus du-  
plex.Quartum  
quoq; prin-  
cipium.  
Figura  
Magni-  
do.

Vfus qua-  
triplex.

grēfuris dicatum est. Secundū veteres inquam, quorum sententia infecutus est Vesalius, quāquā  
rectū cum Falloppio totum pro tertio pari numerandū ob dīctas ab eo rationes censēmus. Qui  
necū ad tēporales, masticatoriūq; musculos descendunt, ac intūs quoq; latefcentem; lterūq;  
ad faciem, labia, buccas, ganguias, dentesq; inferiores, ac palatum, & linguam, succēq; ad au-  
culog radiceū vsq; distribuēdi. Id ipsū igitur foramen est: quod Galenus intelligebat: quū de  
quarta neruorū tertij statim ab exortu permista cōiugatione loquēns, ait. d. [ Simulq; prætergre-  
ditur primū quidē crassā ipsā membrā, postea verō ipsū etiā capitis os, dande  
sursū ad oris palatū fecedit, &c. ] Non amplius enim id vellet tria præcedentia, in oculorū cau-  
tatem, sed in palatū rectē veluti quintum quoq; ac sextū dicenda foramina tendit. Per id autē  
foramen, quāquā aliquando venū quādā in caluanā ingrediatur ab interna iugulari originē  
habens: Galenus tamen artēriā etiā caroidis, sōporatūq; maiorem illam propaginē in cerebrū  
ascendere perperā ait (quam verē per sextū foramen progredi narrabimus) verba enim etiā hæc  
sunt, quæ paulō post subdit [ Commune autem est foramen; per quod tūm hæc neruorū portio  
deorsū fertur, tūm ipsius carotidis, sōporatūq; artēriæ reliquū ad cerebrū ascendit, ab vtroq;  
latere vna, &c. ] Verū est tamen, qd in Galeni manes inuidis est quicūq; nō Galeni; sed ty-  
pographi, scriptorūq; errorē fuisse, deprauatūq; esse, ac maneam literam nō aduertat: vbi quod  
illa cum aliq; interpositis in nostro codice deficientibus, ad sextum potius neruorū par, collu-  
māq; foramen, occipitis quidem, ac temporis ossis cōmune non referat. Id quod sequentia etiā  
verba cōprobant, quū subdit [ Quoniam igitur modo nerui isti per collum, ac thoracē, ad eas;  
quæ infra septimū transuerſum sunt partes, & quæ nam corū sit distributio, procedens oratio de-  
clarabit. &c. ] Quis autem nescit per collum, ac thoracē ad partes sublepto existentes nō tertū  
par, ac sextum descendere? Nec in re tam Galeno met ipſo (vt liquet) cōpertissima verendum de  
vera, legitimāq; ipsius sententiā est. Nec deest per id foramen excrementorū non nisi in palatū  
descendere. Hæc igitur de quatuor primis cuneiformis ossis proprijs foraminibus dictū iam sint.  
Per quæ quidem nerui pertransiunt. Per alia enim dicēda foramina præter decimū cōmune aus-  
lus neruus egreditur. Sed ea dein cept secundū ordinem prosequamur. Quintum igitur foramen  
quarto succedens est (quod litera R. in proposita quoq; figura notatū est), prædictis omnibus mus-  
cus, propeq; nihilominus orbiculare, (quanuis id simas, ac cœcospitecus ordine quartum id exis-  
tens tertio ferē duplo maior, oualeq; nō orbiculate sit) extrosū vtrinq; ad auditorij tympani  
latera tendit. Cuius foraminis circulū quamminima tēporis ossium portio sēpē numerō cōplet;  
illūq; quodammodo cōmune foramen dici potest. Cū in sphenoidē ossē totū exculptū magna  
ex parte nō sit: quāquā in prædictis animalibus ferē dimidiū foraminis os tēporis supplet. Huius  
portō vsus est secundū Vesaliū, vsus iugularis internæ venæ minori portio, quū a sōporatæ  
artēriæ societate separatur, viam ingressū præbeat. Falloppius autem solam artērię propaginem  
esse hæc ait, quæ ingreditur, crassā mēbrāq; pulſum præbens. Rectius verō dixerimus vtrinq;  
Id quod, posterius hunc fuisse laborem, quā nos melius potentibus iunioribus, acutioreq; vili  
prædictis, distinguendum omittimus. Id ipsū inter cæ perpendentibus, seduloq; annotantibus,  
qd vbi vena per id foramen nō ingreditur, sēpiusculē per quartum prædictū foramen ingredi  
conueit. Nec deest quēdā hinc excrementorū expurgatio. Sed quinq; his foraminibus persēctis,  
quæ in vtroq; latere sibi inuicem ordinatē succedunt, ad mediā regionē accedimus inter quarta  
verinq; posita foramina. Ibi enim tria vtrinq; inuenimus. Quorum primum est, quod nos cum  
prædictis numerādo sextum ordine statuimus, litera S. designatum. Atq; id ipsū magis, quam  
quantum cōmune & semper quidem, quantū ad cuneiforme os attinet, sinus potius, quam for-  
amen, vel rima nuncupandum venit: cooperiente tamen, atq; circulum perficiēte ossē temporis,  
propē auditorij tympanum foramen sit, rotundum quidē prius, sed non adhuc integrē clauso  
circulo; inter sphenoides os, & auditorij tympani extremum. Atq; vbi circulus minime cōcludi-  
tur: fissura quēdam, rimulauē aspera, & inæqualis hinc foraminē, inter prædictū tympanum, &  
cuneiforme os adiungitur: vt vtrinq; ossi cōmunis, tūm circulari foraminis portio, quā rimulūq;  
fissuræ dici possit. In homine loquimur, quanuis in simia fecūs se habeat. Per eam igitur partē,  
quæ orbicularis est, excavatūq; iem circularē quēdam sinum os sphenoides habet: sōpora his  
artēriæ maior radix ingreditur, ibiq; (vt postea videbimus) circū circa rete mirabile construit.  
Et per eam quoq; partē, magisq; per rimulam temporis ossi, & sphenoidi cōmune ē cerebrū,  
glandē, aut simias dicere ē pelui, seu lacuna, vel emboto deorsū in palatū pituita, pituitō-  
laue, seu aquosa, & cruda excrementa descendētia expurgantur: Aerq; tandē iursū, & ad mir-  
abile spiritū animalium rete, & ad cerebrū inspiratus ascendit. De qua quidē expurgatiōe,  
ac spiritū refrigeratiōe, & nutitiōe per inspiratum aerem factis, deinceps vberior sermo fiet.  
De hoc igitur nunc dicto sexto foramine Galenus fortē intelligebat: quū in labello de venarū,  
& artērarū dissectionib; ita scribebat. f. [ At omne quod ex carotidibus est reliquū sursū, & ad  
procedens penetrat in caluanā, inibiq; textū illud ad retis imaginē cōplicitum efformat, rectē

Cōtra Gal-  
lenum.

Galeni ex  
culatio, de-  
fensioq;

e. cap. 10.  
eiusdē libri

Quintū for-  
amen vt  
primum  
cōmune.  
Magni-  
udo, & u-  
ra q;

Vfus tri-  
plex.

Foramen  
sexto sēpē  
cōmune.  
Figura.

Vfus tri-  
plex.

f. Cap. 11.  
post princ.

Intelligas autem recta, nō quod propē cranium existit (tunc enim obliquē antorsum per foramen prius penetrans, quod osium temporum quartum poltea ponemus, in huiusmodi foramen sphenoidis cōmune sextum a scēdit) sed recta quidem per thoracem & collum. Sic enim & libro de v'su partium nono dicebat .g. [Reliquū autem omne, vt à principio fuit, recta per thoracē, & collum sublime ad caput fertur: Excipit quidē à micē, quæ ex parte est cranij portio, & foramine in sese aperto intrā caput, sine molestia deducit.] Septimū verō foramen sphenoidis propriū huiusmodi sexti foraminis, canalifue, siue sinus medietati subiacet, statim rectē sub trāuerſa rimula, quæ ab exteriori parte sinus in sphenoidē exculpti, siue rotunditatis foraminis sexti positi est. Paulō supra processū vespertilionū alis huiusmodi cauitatem. In hac figura, cū intus foramen sublit, designari, ostendiq; non potuit. Nisi enim occupitis, os à sphenoidē separetur, neq; hoc, neq; sequens ostendit foramen cōspici exquisitē, multoq; minus in figura depingi queant. In figura tamen processū cōmuniti vigesimitertij septima sub litera s. delineari potest. Sans angulum foramen id septimū est: vt posteriorē in sphenoidis parte, quæ scilicet principij sumit vix ingredi, nisi tenuis acus sit, queat. Oblongū tamen cuiusdam meatus instar antorsum protensum recta in narium cauitatem penetrat: Maus intērim, ampliūq; in anterioribus, nares versus euidens. Per quod foramen maioris soporariæ propaginis sursū ascendētis furculas ad nares exporrigitur, ac (vt videbimus) excrementorū a sexto foramine descendētū precipua in narium cauitate percolatio fit. Cū nono enim ipsius etiā sphenoidis dicendo foramine intus in vnum cōiungitur: quod ad solam pituitæ expurgationē deferuare, quōd de eo loquimur, ostendimus. Ostendit sub septimo introitū foramen est, propriū quoq; ipsius sphenoidis: raro tamen in altera parte intrō ad nares, siue osse penetrans: rariūq; in dextra, & sinistra simul. Magna enim ex parte ad ipsam ossis sphenoidis substantiā pro eius nutritione, spiritūūq; distributione, ad innati caloris cōseruationem, terminatur: minimē foras in aliam partē penetrans. Per id verō quomodocūq; sit socia quædā (siue vt Vesalius ait, vena, siue vt Falloppius, arteriola, siue vtriq; alterius, quam in quintum foramen antea penetrare iam diximus, ingreditur. Ideoq; ad nutritionē, innatq; caloris cōseruationē deferuare dicebamur). Ab his verō, quæ sibi iniicē omnia hancq; proxima sunt, ordinēq; sese cōsequētia, quadantēns diuertentes ad nonum sphenoidis, cōmune tamē foramen cōuertantur: nō Galeno tantū, sed veteribus quoq; omnibus Anatomicis, quot quot ante Vesaliū scripserunt (vt nemiā sua defraudemus laude) ignotū. Vnde & excrementorū, quæ ex oculorū cauitatibus in palatū descendunt, iter ignorauerunt. Statim igitur tria prædicta sphenoidis foramina in oculorū cauitatem terminantur, si nam quendam sibi ipsi subiectam inuenit: à tergo processū vespertilionū alis quamvis milliorū: per quem sinum aliquantisper descendens pituita ei primitiua foramina occurrit, quod impregianturū intēdūms, ab osse iugali in processū figuris absconditū, sphenoidi quidē, & quarto maxillæ superioris, ossibus cōmune existens, in quā vnum cū septimo prædicto foramine intrō perlorans. Quanquā rectū dicendum venit, illud in hoc peruenire, pituitamq; eruere. Deinceps verō quædā eius pituitæ portio, quæ superne descendens in prædictum foramen minimē recepta sit, nimis fortasē decorsum, vel sua grauitate, vel fluxibilitate accelerans, in aliud foramen decurrit, quod maxillæ superioris osium, præsertim verō sexti secundū Vesaliū, Galeni verō quinti esse ostendimus in palatum penetrans. Sed de huiusmodi excrementorū expurgatione vberius infra loquimur. Hunc verō foraminū numerum cōpleamus. Decimū itaq; illud foramen sphenoidis etiā cōmune est: quod sub minore oculi angulo positum est magnā potius fissuram, quam foramen representans, & sphenoidis, ac maxillæ superioris primo, quartoq; ossibus cōmune. Per id tertij quidem neruorum paris, secunda crassior posteriorq; priore propago, quæ per tertium foramen egressa fuerat, ad temporalem precipuē musculum distribuenda descendit, cerebriq; (vti prædictū iam est) ac peculiaris quoq; oculorum excrementa pluriā in palatum per id ipsum excolantur. Vndecimū verō ab hoc foramen pendendū est: quod sphenoidis ossis proprium est. Quod sepius cū ad est (interdū namq; desideratur) ex intrinsecis ipsius sphenoidis cauernalis, sinibus vtriq; paulo supra nonā prædictū foramen ad narium cauitates penetrat. Nonnunquam tamen minimē ad est foramen id, inseq; à Galeno prorsus ignotū. Vel quia sphenoidis intus cōcauum, cauernosum os illud nō sit, prout a liquido obseruauimus. Vel quia (vt nō infrequenter etiam vidimus) tamen cōcauū, cauernosumq; est: clausū tamen sunt vndiq; tales cauernæ, abq; vilo videlicet foramine. Ad v' neq; ad nares, neq; ad aliam vllam partem respondeant. Quocirca igitur id foramen addit, nos vndecimū ordine statuimus. Per id foramen in prædictis sphenoidis cauernas, seu dicere maus, antra, aer ingreditur, ad auditus, magisq; ad vocis perfectionem (vti deinceps enucleare conabimur) summo perē adiuuans. Fortassisq; si nonihil excrementosæ humiditatis à superposito adene in huiusmodi antra penetrarit, p huiusmodi foramen foras in nares promptissimē expurgabitur. Duodecimū deniq; foramen sphenoidis est non proprium, sed tribus ossibus, videlicet ipsi cuneiformi, primoq; superioris maxillæ ossi, atq; etiā

Fig. 1.  
p. Cap. 4.  
post. princ.

Septimum  
foramen  
sphenoidis  
propriū.

Magnitudo.

Figura  
Vixduplex.

Ostium  
foramen  
sphenoidis  
propriū.

Vixduplex.

Nonū  
sphenoidis  
foramen  
cōmune.

Vixduplex.

Decimū  
foramen  
cōmune.

Magnitudo,  
60, & figura.

Vixduplex.

Vndecimū  
foramen  
sphenoidis  
propriū.

Vixduplex.

Duodecimū  
foramen  
sphenoidis  
cōmune.

temporis secundę partis processū cōmune est sub zygomatico ponte stratum: per quod tēporalis musculus (vt postea videbimus .b.) tutius descendit. Duodecim igitur tam propria, quam cōmūnia foramina iam enarrauimus: quę ad os cuneiforme vel secundū in totum, vel secundū partem: siue intus, siue foris spectant. Cū verō totidem in sinistra sint, quot in dextra fuerint: vel econtrā. Idcirco sphenoidis ossis foramina omnia, tam propria, quam cōmūnia sunt viginti quatuor. Quorū propria sunt quatuordecim, hoc est, paria septe: vt videlicet primū, secundū, tertium, quartū, septimū, octauū, & vndecimū par. Cōmūnia verō sphenoidis cū tēporis osse (quod capitatis etiā est) quatuor foramina sunt: videlicet et ipse quintū, & semper sextum par. Cōmūnia autem sphenoidis cū ossibus tēporū, & maxillę superioris alia duo foramina sunt: videlicet duodecimū par vltimo narratum. Cōmūnia demū ipsius etiā cuneiformis cum maxillę superioris ossibus alia quatuor existunt: scilicet nonum par, atq; etiā decimū. Ad summū igitur omnia sunt foramina predicta quatuor & viginti. Propria verō quatuordecim: cōmūniāq; decē. Quoniam autē octauū, & vndecimū par, quę propria quidē sunt itāpē desiderantur: Idēdē propria sphenoidis foramina semper inuenta, & nunquā peficientia sunt numero duntaxat decem, paruaque quinq;: videlicet primū, secundū, tertium, quartūq; , & septimū par. Hęc sunt effatū digna, tam propria, quam cōmūnia sphenoidis foramina. Quod si nonnunquā foramina alia quedam, vel in hoc, vel in alijs quoq; ossibus reperiantur, quę a nobis pretermittā fuerint: per quę quidē capillares alique venulę, seu etiā arteriolę in ossa, pro viū nutrimento, calorūq; innati cōseruatione, penetrēt: illa quidē hic referre minime curauimus. Vnico enim (vt ita dixerim) verbo dictū de omnibus his, q; scilicet propter ossium nutritionē plurima foramina in seipsis reperuntur: sed in nōnūlis quidem plura, in aliquibus verō pauca: Item alia quidē eorū cūdentiora (quā maiora) alia verō tenuiora, obfusiora; (quia minorā) sunt. Sed cūmuerō his p̄positis tempelutatum est, vt ad vtriusq; temporis ossium effatū digna etiam foramina cōuertantur. Quę sunt in vtroq; simul vt plurimum numero duo decim, videlicet in alterutro sex: propriaq; omnia existunt. Quorū primū numerabimus propriū quod in auditorio tympano existit, ab interioribus ad exteriora euidens, magnūq; , sed in aurem anfractuose non rectē penetrans: per quod verē quintū par, seu manus quinti neruorū paris maior (secundū ipsum etiā, Galeno referente .i. Marini) radix ingreditur, pertransitq; : donec in tres partes hæc in amplo meatus extremo diuidatur. Quartū yna, vt videbimus: quę scilicet mollior est, auditoriū organū efformat, perq; ipsū, suasie internas cauernas tota distribuitur: Alia verō per secundū statim pendū foramen: Tertūq; per tertū recurrit. Idcirco foramen id ratione primę, principalisq; partis auditorius porus, meatusue dicitur: ad a rem exteriorē longē, quam intus, qua cerebrū respicit, latius, ampliusque existens, anfractu osū in tamē, tortuosūmuc, ac admodū variū. Ad eū vt durus quilibet stylus penetrare ab exterioribus introrsūm, vel econtrā, nequeat. Nisi fortassis interdū porcina seta, vel huiusmodi ali quod plicabile, violenter tamen, ac maxima diligentia impulsūm petrascat. Id quod rarō, & maxima cum difficultate nonnunquā fieri potest. Quamobrem in eum occidit errorē philosophorū summus Aristoteles .k. vt nullū ad cerebrū ossis aurium meatum esse crederent. Eo videlicet deceptus, quia stylus, vel acum introrsūm ad caluarie cavitatē penetrare, ingrediq; nō posse contempserat. De hoc quidem foraminē in libro de neruorū dissectione sic Galenus ait .j. [Alterū; ex altera quidem exoritur neruus, ac in priore magis parte, qui auditorius vocatur, qui vnā cū dura cerebri membrana inde exoriente in auditus foramen incidit: cum qua in latitudine sese explicans meatum sublinat, &c.] libro etiā de vīu partū nono de hoc foraminē subintellexit, per hæc verba .m. [Post has autem a capitis lateribus, versus ossa lapidea sunt productiones. Quarta autē est hæc cōiugatio neruorū, nō ipsorū quidē adhuc durorū. Diuiditur porō in ipso per ossa tantum in duas partes: quarum altera quidem in auditorium meatum: Reliqua verō in cecum, &c.] clariū autē id expressit paulō infra .x. dicens. [Quintam verō quandam neruorū cōiugationem ex obliquo capitis partibus emergentē ossibus lapideis incidere memorabimus, o, ipsāq; bifidam, ac duplicem factam duobus excipi foraminibus inæqualibus, ferriq; per foramen latius (est autem id de quo impręsentiarum intendimus) maiorem eius portionem rectā ad aures, &c.] Cur autem in ossis cavitatē, multiq; cauernulis a quinti paris neruo obānitis, & nō sicut alia sensoria in tenuiore substantia organum auditoriū cōstruicit natura, perbellē Galenus ostendit, sic libro etiam de vīu partū octauo testatū nobis relinquens .p. [Ad aures sanē descendere etiā omnino propaginem quandam a cerebro, erat necesse, sensibile extrinsecus occurfū excepturam. Sed quoniā sonus, & vox id ipsum (scilicet sensibile per aures, vel auditum) erant: siue aer percussus, siue aeris quedam percussio. Nihil enim interest, modō vnū hoc duntaxat cōitet, motum, qui percussione sit, quasi vndam progredi oportere, atq; ad cerebrū ascendere. Non igitur liceret amplius, vt in oculis, ita & hic, neruorum tegumentum quoddam (puta membranas, carnes, aut aliquid aliud huiusmodi) apponere. Id ipsum certē maxime impediūfset, quōminus aer motus ipsis accideret. Idq; potissimum si parus quidam esset motus: cuiusmodi in exiguis est vocibus.

Vfus .h. Cap. 6. quom.

→ q. d. g. aniq. 80q

z. u. q. z. u. q. alio. q. d. q. q. q. q.

→ q. d. g. aniq. 80q

→ q. d. g. aniq. 80q

→ q. d. g. aniq. 80q

→ q. d. g. aniq. 80q

→ q. d. g. aniq. 80q

→ q. d. g. aniq. 80q

→ q. d. g. aniq. 80q

→ q. d. g. aniq. 80q

→ q. d. g. aniq. 80q

→ q. d. g. aniq. 80q

→ q. d. g. aniq. 80q

→ q. d. g. aniq. 80q

→ q. d. g. aniq. 80q

→ q. d. g. aniq. 80q

→ q. d. g. aniq. 80q

→ q. d. g. aniq. 80q

→ q. d. g. aniq. 80q

→ q. d. g. aniq. 80q

→ q. d. g. aniq. 80q

→ q. d. g. aniq. 80q

→ q. d. g. aniq. 80q

→ q. d. g. aniq. 80q

→ q. d. g. aniq. 80q

→ q. d. g. aniq. 80q

→ q. d. g. aniq. 80q

→ q. d. g. aniq. 80q

→ q. d. g. aniq. 80q

Cōna An-  
florelem.  
k. s. de luth.  
animati  
c. 11. post  
princ.  
I. Cap. 6.

m. Cap. 10.  
in princ.

n. Cap. 11.  
post med.  
o. Cap. 10.

Dubium.

p. Cap. 6.  
circa med.  
Responso.  
Cur auditus  
rius meat  
ossis.

→ q. d. g. aniq. 80q

20 cibus. Non tamen nudi penitus nerui erant relinquendi, ne omnibus externis iniurijs essent ex-  
 21 positi. Sed neq; etiam (quod postremū est, ac tertium) rarum ad eō openmentū hoc, ac tenue fuit  
 22 faciendum, vt acri esset penetrabile, ac peruium. Quod si ita esset, non modō aeris ipsi facillē la-  
 23 derentur variē verum etiam cerebrū ipsum refrigeraretur. Quod cū natura prospexisset, con-  
 24 structionem cū forti propugnaculo ad patiendā difficultatem fore quidē accommodauit: at sensio-  
 25 nium ipsū sordidum effecit. Si verō cōstructio nullū haberet monumentū, eam inanijs aper-  
 26 tilitatem futuram. Tertium autē, si modō medocree aliquid ad securitatem adēpta esset amplius  
 27 adiuumentum satis ipsam habiturū os durum, ac densū in auribus oppositū flexibus obliquis inlar  
 28 labyrinthi ipsū pertudt. Hæcētus Galenus. In quibus quidē verbis didicimus, quare in osse  
 29 duro, ac densō, & nō in carne, vel alia molli substantia audiendū organū locauit natura. Cur autē  
 30 obliquē tortuosū, & inlar labyrinthi flexuosū cōstruxit; itam rationē subdit, dicens. [Quō  
 31 frigidū quidē aeris integras (quas ipse ex recta irruptione erat habiturus) flexuum varietate  
 32 sensū exolueret: Aliorum verō corporum exiguorū impetum longē atē propulset. Quidō-  
 33 quidē quæ meatu ipsō sunt maiora, nō modō nō nocitura erant: sed ne meatum quidem erant  
 34 contactum. Minorum autem, quæ celeriter, ac violentē, & recta ferrentur, meandus illis prius  
 35 incidereat carū necesse. Quæ verō leniter, & velut in illis volutata, citra violentiā, ac manūte  
 36 operimentum erant cōtactura.] Sed hæc de auditorio tympano propter secundū offis temporū  
 37 foramen dicta iam sint. Ex Galeno tamen imperfecta: Cūm auris cōstructio, audiendūq; modū  
 38 à nobis antea \* declarata prorsū ipsi incognita existerit. Nō modō enim tria superius declarata  
 39 officula, illiq; prepositam in officio meatus membranā ignorauit Galenus, sed tres quoq;  
 40 prescriptas caueculas, quarū primam nonnulli tympanium propriē nuncupant, secundam verō  
 41 labyrinthum, tertiamq; cochleam. In quas quidem exterior aer minimē, nisi præter naturam in-  
 42 greditur, impediēte prædicta tympano præposita membrana: sed eo modo auditus fit, quo nos  
 43 antea declarauimus. Galeni autē ratio de obliquis flexionibus, varijsq; chartulaginearū auricularū  
 44 verificatur, quæ in ossis meatus officio primō ante membranā sunt. Has enim offes etiā & in  
 45 ossis substantia similes esse machinatus Galenus est. In quibus aer in gyrum quandam reuolutus  
 46 ingreditur, sed eas in osse, ibi nō esse diffinitionē cōpertissimā omnibus erit. Alter verō labyrinthus  
 47 in secundo lapido offis foramine existit: quod cæcum veteres Anatomici nuncuparunt: nō  
 48 quia vtrinq; penetrans nō sit, foras quidē in se, intro autē pedgēto primo foramini cōmissū,  
 49 ad vnamq; redūctum: Sed quoniā in exterioribus duntaxat per se cōsidēratum quidens est, an-  
 50 fractuosē, tortuosūq;, & alterius inlar labyrinthi vsq; adeō procedēs, vt seta porcina, vel plum-  
 51 beus etiā stylus pertranire nō possit multis visum fuerit, vnde cæcum ipsū nuncuparunt. (Nos  
 52 autem porcina setam dextrē antorsū impellentes, intrō ad cerebri locum, & eositā, pertran-  
 53 sire vidimus.) A medio serē meatus, labyrinthus primi auditorij vocatū, apertū, nihilominus  
 54 sinus extremo exordiens foramen id (veluti paulō posterius hoc, vt videbimus, etiā tertium ex-  
 55 uaubitur) in posteriora quidē ad medium locū mamillaris, styloidiq; processū egreditur. Cuius  
 56 quidem vius duplex est. Primus, vt per id secundū quinti neruorū pars furculus: vel (si cū Ma-  
 57 rino, & Vesalio minore radicem, ad quartū potius par ex Falloppio reducendū, adiungamus)  
 58 quinti paris maioris radicis furculus idem secundus, veluti per canaliculum quoddā prius pro-  
 59 cedens, quasiq; dea recurrentis foris egrediat. Vbi cum sibi focio per tertium latam exponendū  
 60 foramen egressuro furculo, cumq; tertie grossioris partis verē tertij neruorū paris, seu manus cū  
 61 Vesalio dicere, maioris radicis quiddā sobole cōmissus, coalescētisq; ad musculum tendit tempo-  
 62 rales, masticatorijsq;, & buccarum motores primos, ip̄ samq; demū faciei cutem, auricularēq;  
 63 & circumstantes earum partes distribuit. Secundus verō eiusdem canaliculi vius est, vt arte-  
 64 riola quædam, venulaq; per eum vnā cum prædicto nerui furculo in auditorium organum itura  
 65 pertransiret. De hoc secūdo foramine Galenus in libello de neruorū diffinitione sic ait. q. [A po-  
 66 steriori verō parte alter in aliud quoddā lapidosi offis foramen incidit, quod cæcum appellatur.  
 67 Sic enim veteres diffinitionis profēssores hoc foramen (Græcē τρυπη) nomināt: propterea q̄ an-  
 68 fractum illum, per quem neruus foras post aures exedit, haud possent perfectē personare.] Libro  
 69 autem de vsu partium nono rursū ita inquit. r. [Reliqua verō, scilicet neruorū quintæ cōiuga-  
 70 tionis pars in cæcum nuncupatū foramen, non tamen reuera est cæcum, vt dicitur: sed existimō  
 71 eos, qui primi id nomen ei imposuerunt, in ipsum demissis fuscullū, aut setam porcina: deinde  
 72 cū traiecerit ipsū non possent, illic alicubi finire ipsū putauisse. Causa verō cur nihil elabatur  
 73 est, nō opētas, sed flexiosa meatus obliquitas. Quōd si paulatim torū os circumcidens, neruūq;  
 74 nudauerit, ipsū flexus, atq; meandros deprehendes; neruūq; tibi extrā exidere ad aurē appa-  
 75 rebit.] Cuius labyrinthi in huiusmodi etiā cæco vocato foramine rationē posterius adiunxit Ga-  
 76 lenus per hæc verba. f. [In aliud verō angustius foramen (quod sanē cæcum appellat) reliquam  
 77 partē (scilicet neruorū quintæ cōiugationis) illā ipsam per foramen quoddā, quod est propē aures  
 78 penetrare, viamq; omnē, quæ est inter principij nerui internū, & finem eiusdē externū, variē  
 79 inlar

Cur inlar  
labyrinthi  
flexuosum.

\* In proce-  
sulo com-  
cōtra Ga-  
lenum.

Incognitū  
est quomodo  
auditus fit  
quod nos  
antea declarauimus.

Offis tempo-  
rū forame  
secundum  
propriū.

Vius du-  
plex.

q. Cap. 6.

τρυπη.

r. Cap. 10.

f. Cap. 13.  
eiusdē ver-  
sus finem.

inſtar labyrinthi cuiuſdã circũuoluit. Hunc ſanẽ labyrinthum natura nõ fruſtra efficit, ſed muſculis tẽporalibus cõfulens, neruũ eius durum immiſit, immiſit nihilominũ & buccis. Octoſum enim hoc loco, neq; perforatum, neq; fragile, at durum cũm haberetis, eõ potiffimum ad durũ nerui generationem eſt abuſa. Nam ſi nerui omnes quõ longiũs a principio dig rediuntur, eõ duriores ipſos licet efficere, artiſicioſiſſimẽ cõpenetur viam per os lapideum huic neruo cõparaffe. Nam tũm iplius longitudo, tũm loci ſiccitas durum ipſum, ac ſiccum facile erat redditura. Vbi enim multo humido imbutur, nullum ei ex via longiore accedit emolumentum. Vbi verõ locũ durum, atq; aridum permeat, ibi exsiccatur facillimẽ, atq; obdureſcit. His omnibus accedit, & ex oportuno lapide huius offis ſitu ſecuritatis vtilitas, omniaq; videtur, quibus neruus hic egebat, ex vno hoc flexu cõplexa ſecuritatem, viq; longitudinẽ, lociq; ſiccitatem. ] Ecce igitur rationem, quare cõcum foramen dictum labyrinthi, ſeu uclius dixeris, canaliculi cuiuſdã inſtar flexuoſum eſt. Non ſicuti de auditorio labyrintho prædictum a Galeno eſt, ad defendendũ ſcilicet cerebrũ, ne frigidus aer, vt eſt, intrõ ingrediens cerebrum ledat. Itẽm vt in minorũ corporuſculorum, quæ intrõ transgredi poſſent, impetum a longe propulſiarent. Non inquam ob eandẽ rationem in alio foramine cæco vocato meandros natura fabricauit: ſed vt motuus neruus per id foramen penetraturus ſiccior, ac per hoc durior, validiorq; euadat, ſecunõq; tandẽ fiat. Ex longo enim itinere quod per flexus illos tortuoſos acquiſiuit, præſertimq; in offe, dura quidẽm, ſiccaq; ſubitãtia inſclusus neruus ſiccitatem, duritiẽmq; adeptus eſt, qua indigebat ad mĩnus robur propter inõũ temporalium, maſticatorũq; muſculorum, ac buccas mouẽtium: quibus motoria virtus a tali neruo diſtribuitur. At cur nõ modõ flexuoſum, ſed parũ quoq; ac anguſtũ foramen id cõcum eſt, Galenus rationẽ poſt pauca ſubdit [ Quõ foramen id, quod eſt ad os lapideum, latum eſſe nõ poſſet. Hac enim ratione multi hi flexus perſpicuẽ perirent, oſe toto parũ lato foraminibus abſumpto. ] Sed tertium offium tẽporis foramen perpẽditur a Galeno, cõcũq; ante Veſaliũ Anatomicis miniẽ cõſideratum: quod neq; in externa caluarie ſede, neq; in interna cõſpici commodẽ poteſt: niſi tẽporis os a ſphenoidẽ, acedum alijs capitis offibus ſeparemus. Tunc enim qua parte ſphenoidis extremus terminus poſt quantum prædicitur eius foramen cum tẽporis offe, ſub inferioris mandibule articulum, capitulumue ſuſcipiente cõiungitur ipſumq; auditorium tympanum contingit, inſtar cuiuſdã rimę foramen id eſt. Quod ſi nõ reẽtum, nõ adẽ tamen anfraẽtuofum eſt, obliquũue: quin porcina ſeta, vel plumbeus ſtylus, ſiue ab interioribus extrõſum, ſiue eõntrã ab exterioribus intrõſum propulſus perſalcẽ trãſeat, penetrẽtq; in oppoſitam partem. Quod eõ faciliũ patet: quõ magis aſſociatũ eo fuerit. Hoc igitur foramen duntaxat offiſſe Ariſtotelem omninõ credendũ eſt: tametiũ nec a ſuis interpretibus, neq; ab ipſo etiã Galeno perceptum: quõ ſic videlicet philoſophorũ ille maximũ ait. x. [ At in oris palati viq; ſemita pertendit ] q. d. hinc [ ſcilicet ab aurium exteriori foramine a quo nullũ ad cerebrũ pertinet meatum, quanũ nõ reẽtẽ, prædixerat ] in oris palatum viq; via, foramenue procedit. De hoc tametiũ magni (vt videbimus) momenti foramine Galenus nullã penitẽs notiã habuit: quantum ſcilicet ex eius libris, quos vidiffẽ nobis permiſſum eſt, conieſtari poſſumus: quemadmodũ neq; illam quinti neruorũ paris tertii propaginem cognõit: quamobrẽ ſemper in duas partes, nõ in tres (vti nos fecimus) illud diſtinxit. .m. Foramen id rotundum nõ eſt, ſed depreſſum, amplumq; vt fiſuram potiũs, quam foramen exiſtimares. Huius autẽ vius triplex etiã eſt: primus quidem vt a quinta neruorum propria, verãq; coniugatione, quæ in auditoriõ meatum penetrauerat tertium ſurculum ſuſciperet: qui quidem quali recurrente tanquã durior in trãſitu per inedium offis factus, deſcendenãq; ad muſculos inferiorẽ maxillam attollẽtes, temporales inquã præcipuẽ, maſticatorioſq; vocatos diſtribuitur, faciemq; & buccas, tertij neruorũ paris maioris (vti prædictũ eſt) radices primẽ ſoboli admiſtus, alteriq; ſibi ſocię propagini, quæ ab eodẽ quinto neruorum pan per ſecũdũ ſtatum dictum offis tẽporũ foramen cõcum vocatũ recurrit, egrediturq; velut in eius etiã declaratione iam iam tetigimus. Per id verõ etiã foramen (vt ſecũdũ quoq; vſum artingamus) pertranſeunt iugularium internarũ tam venę, quam arterię, minoris cuiuſdã propaginis ſurculi: earum quidẽ, quæ per quintum ſphenoidis foramen inũs caluarie ingrediebantur. Pertranſeunt inquã tam venula, quã arteriola ſimul cõiungẽtẽ per eã partẽ, quæ palatum reſpicit, ingredientẽs, & in auditorium organum petẽtes, priuſquã iugulares illę caluarie ingreſſe ſunt. Quamobrẽ & minis reſtẽ Ariſtoteles ait. x. [ Et vena de cerebro deſcendit eodẽm. ] Niſi verba eius, & non mentem gloſſare velimus, qd ſcilicet de cerebro, id eſt de cerebri loco, ſeu parte, quoniã ab interiorib⁹ extrõſum petere videtur, quanũ nec verẽ ab ipſi (vt dictum eſt) caluarie cõiungente. E quibus quidem omnibus in ſecũdo, & tertio ſuramine temporum offis, præſentẽs: quoniã ſcilicet quinti paris neruorum maior radex, ſeu melius dixerimus, tota verẽ diſti quinti paris radix per primũ foramen, è cerebro procedens, ad medium propũ cum venent in tres diuiſã propagines, & nõ ſicuti Galenus dicebat in duas eſt. Quarũ vna, quæ mollior quidẽ eſt, auditorũ organum efformat: ſecundãq; ad ſecũdũ foramen, tertiaq; ad tertium deſcen-

Temporũ  
offis for-  
amen tertũ  
proprium.

e. i. de hiſt.  
animal.  
c. i. i. poſt  
penc.  
Cõtra Ga-  
lenum.

u. Vt de ner-  
uorum diſ-  
ſec. cap. 4.  
p. de v. p. c.  
10. & 13.  
Figura  
Viuũ-  
plex.

Cõtra Ari-  
ſtotelem.  
x. de hiſt.  
animal.  
c. i. i. poſt  
penc.

descendentes, ambæ diuiores recurrunt, posteaq; extra caluam non sibi inuicem modo, sed cum prima tertij neruorum paris propagine in vnum coniunctæ, coalescentiq; ad facies, buccarum, temporalesq;, & masticatorios musculos perueniant, intusq; in maxilla inferiore latefactes, perq; eos distrahuntur, & distendantur. Ex istis inquam proptensis, prælabatis; liquet ratio, cur etiam per os, aut palatum, & buccas, non solum per auricularia foramina auditus: prout experimento lepidissime tum publice, tum priuatim ostendimus: vt v. g. si nostrum quispian exquiritissime obtinens, quantum possibile fuerit, aurium foraminibus: adeo vt nil pronus audiamus: Aliusq; sit, qui cytharam, vel quoduis aliud musicum, vel non musicum etiam instrumentum pulset, vt sonum edat; nosq; interim cytharæ manipulum dentibus, aut ore, buccisve tangamus, eoque hendamus, aut mordeamus. Quinimò (quod maius est) aliqua virgula nostris dentibus apprehensa, in vna v. delucet extremitate, alteraq; interim tale sonans instrumentum attingamus, scilicet clarissimèq; sonum eius audiemus: remoto verò à cythara, seu quouis huiusmodi instrumento, virgulæ extremitas: nihil pronus, vel obscurissimè illud audiemus. Sed tones exquisitè (non scelus ac si relectas aures haberemus) illud audiemus, quoties pulsatum instrumentum tangemus. Quod experiri cuius, obturatis adamussim proprijs auribus, saltem suis vi quadam immansis auricularibus digitalis, promptissimè est. Nos autem surdos aliquos vidimus hoc factò experitò mirum in modum eo siue cytharæ, aut cymbali, siue cuiuslibet huiusmodi musicalis instrumenti sono ab eis percepto delectari: veluti quidam Hispanus noster ob raras ipsius animi dotes familiaris est, non ex nativitate quidem, sed ex morbo factus surdus, obstructo inquam externis auditorio meatu, qui tamen rectè, atq; exquisitè cytharæ, prius quæ surdeferet, pulsare, tangereq; didicerat. Quoties verò nunc surdus iam redditus eam pulsat, nullam ex sua musica delectationem perciperet, tanquàm non audiret eam, nisi cytharæ ob id cõsuetò longius factò manubrii proprijs dentibus morderet, orq; cõprehenderet, aut (saltem per virgam ore proprio apprehensam alia ex parte pulsatam à se cytharam tangeret. Id ipsum igitur ideo cõtingit, quoniam secunda, & tertia quinti paris neruorum propagines à prima, quam ob auditorij organum in proprio eius meatu diuiserunt: separataq; ac rursus extra caluam vnite, cum tertij (vt diximus) neruorum venis paris primo furculo coalescent; atq; in vnum reducuntur ad buccas, temporaq;, & faciem descendunt, mandibulamq; inferiorem cõstringentes, sursumque attollentes musculos, quibus omnibus mouèdi, mandibulamq; inferiorem cõstringendi vis distribuitur. Ob huiusmodi ergo coalescentium neruorum in prædictis musculos distributionem, eorumq; neruorum quinti paris secundæ, tertijq; propaginis cum auditorio organo per duo iam iam dicta foramina cõsensum per ipsum quoq; os, palatūq; auditus fit. Obiectis etiã foraminibus, tertijq; magis cõsensum ad palatū, interna; oris regiones, cõtingit, vt attractis, rete utiq; in buccas aer, ilq; quasi à buccarū musculus introrsum propulsus in aures quamprimò tendere sentitur, ibiq; sonus, strepitusve quidã à nobis ventorum, turbidissime in istar percipiatur. Quinimò vêtus, aeris quidã in eas partes, circa mamillares, styloidesq; processus accenatur, dolorem ibi nonnunquã inducens: præsertim quoties in buccarū tunc factone, aerisq; violenta quadã propulsione diuinus insistimus: præcipue quia quinti etiã venis neruorum paris lenticuli quidã ex ipsèdem secundi, & tertij foraminibus propaginibus in glandosâs illas, membranosâsq; partes disseminantur, quæ circa auriculæ radicem cõsistunt, aliq; in totam ipsam auriculæ radicem dispergantur. Hinc verò etiã succedit, qd proprii cantū, seu vocem, præcipueq; bassum vocatū per os, & palatū, nostraq; tempora clarius sentimus. Nisi enim inde in auditorij organū proprius sonus, propria; vox perciperetur: sed fors egrediens pectus ille aer solus ad nostras aures perueniret, indeq; duntaxat sentiretur, non adeo exquisitè, atq; elegantè, vt propria, sed non scelus ac alienâ voce perciperemus, audiremusq;. Non temere igitur talis neruorum cõsensus, & coalescentia facta est: cumq; ad perfectâ huiusmodi resonantiam, vel in echo, perfectiōq; auditū pluribus indigeamus antris, cauernulisq; vacuis, acereq; interim plenis: Hinc euenit, vt non modò (præter auditorij meatus tria vtrinq; antra) mamillarū processuum cauitates aere plenas natura fabricant, quæ parua, ac minimè sufficientes ad resonantia fuerant: verum & mandibulæ quoq; superioris os quartū adeo excavauit: vt maximam ibi cauernam cõseruaret, sphenoides etiã maxima ex parte cauum, cauernosūmq; ob id ipsum factum est. Quamobrem & ad eam sphenoidis quædam partem sub sella positam auditorij tympanum quodammodo dirigitur, ac vergit, propeq; accedit, quæ cõcaua, & cauernosa vt plurimū est: fortassisq; ad huiusmodi resonantia perfectione sphenoidis in frontis inferiore, anterioreq; parte sub ipsi supercilij intus, pauloq; etiã supra cauernulæ existunt. Ad eò vt non aliqua subtilitate fere aer duntaxat oppletas natura illas omiserit. Quas secūdam vulgare loquendi morè vacuis nuncupamus: tamen vacuū natura abhorruit. Propter exquisitâ inquam huiusmodi resonantiam, indeq; exquisitiorem, perfectioremq; auditum huiusmodi cauernulæ, vacuæq; interim remanentes factæ à natura sunt. Quod si nonnullis vel sphenoidis, vel frontis, vel fortassis (vt interdū obseruauimus) vtriusq; cauernæ desint, non adeo exquisitè illos auditū obtinuisse credendū est. Nō igitur ob odoratū facte sunt frontis cauernulæ

Nota experimētum.

v. 1. 30.

v. 1. 30.

Experimētum factò.

v. 1. 30.

Quoties et si capitis in auditorio, istud quod maxime se pericit: horum duorum vis. Quod maxime superius in caua narū vis.

Contra quosdam rectiores.

(vt ruditer nonnulli pronuntiantur) cū nonnulli proposito odorabili obiecto, fumosiq; ab eo refecatis vaporibus, aut (quemadmodū philosophorū plurimi placet) speciebus ad cerebrum, seu cerebri vetriculos anteriores per narium cribra, mammillaresq; illos cerebri processus ingredientibus odorato fiat. Nec amplius (eo remoto) odor remaneat: vt quispiā forte dicent in eis cauitatibus huiusmodi fumales euaporationes cōseruan (prout nonnulli rudes crediderunt) vt aliis absente etiā obiecto odor ipse sentiat. Ad quid igitur hæc frontis ossis cauernula? Nisi ob eundem dixerimus vsum: ob quem in reliquis capitis, maxillæq; superioris ossibus factæ sunt? Vtrūq; ex frontis duplicitate maiorem in anterioribus cerebri custodiam, ex aliorū verò ossium cauernulis leuitatē lucrati fumus, nimumq; capitis pondus inde euitauimus. Quamobrem uō semper ea sphenoidis sub sella existens duplex, & per medium diuisa cauernula ad nares exitū habet per ea foramina, quæ sphenoidis vndecima paulo ante posuimus. Nonnunquā enim deesse nos ibidē enarrauimus. vbi enim (vt opinor) firmiss, solidiusq; os illud fuit, cerebrūq; tēperamēto siccius, ob materię (qua formans faculas vitur) anduitatem. Ad eō vt nullus fortāse tumor sit, q̄ cerebri humiditates in adenem descendentes, ibiq; (vt videbimus) quādentēs immorātes in eas cauitates penetrare queant: tunc abiq; foraminibus formare illas natura voluit: vt quæ velut in necessarijs nō deficere: ita neq; in superfluis abundare cōsueuit. Quoties autē ob materię raritatem laxus, nec ita solidum, & durū: sed pumicis instar imbecille futurū erat: ibi sphenoides os: tunc foraminibus natura ipsū donauit. Quo si quæpiam fortassis aliquando humiditas in eas cauernulas descendit, promptū facillimq; inde exitum habet. Quamquā minime nos præterit ingemiosum quempiam rhetorica potius hæc esse dicturū, præsertim si duntaxat aliquando perforatum os, eo quod huiusmodi foraminibus destitutum est, inuenierit. Sed cū numerō quamprimum sententiam proferre suam nō audeat, nisi ætatis, ac vniuersalis quoq; totius corporis tēperamētū diuersitatem in cōparando aduerterit. Tutius verò interim fuerit, dixisse, q̄ quoties formans; seu formatiua facultas fortis est, materiāq; sibi obedientem nata sit, cauernulas has, foraminibusq; easdem ad narium cauitatem peruas intendisse. Quod si nō nunquā, vel cauernæ, vel earū foramina defecerint: Mōstruositas potius, ac particulari formatio defectus attribueritū est (quemadmodum & alij huiusmodi quamplurimi defectus cōiungere solent) etiam nō auditus modō, sed omnium quoq; actionū perfectionem, & quod melius est, dummodō possit, impeditaq; non sit, eligere cōlueverit. Ridelicet interea eorum sententiā (qua vt noua gloriatur) omninō reputamus: qui frontis, sphenoidisq; sibi inuicem cōtinuas (vt aunt) cauernulas propter spiritū aere nutritionē factas esse existimant. Vtrū enim q̄ huiusmodi cauernulæ sæpenumerō, præsertimq; in osse frontis, desunt, & in quibus etiā ad sunt, nonnunquā accidit, q̄ vndiq; cōclusæ sunt, neq; ad nares ipsas pertinentes, neq; sibi inuicem, nisi rarisimē, frons cū sphenoidē fortāssē, vt aiunt respondentes (quamuis à nobis huiusmodi cōsensus adhūc vsum nō sit) sicq; horū spiritus nutritionē destituerentur. Neq; si omnibus quidem adessent, apertæq; etiā cōclusæ sint, & sibi inuicem cōsentes, aliquis tamē a sphenoidis cauernulis duriore duplici coracæ coopertis ad cerebrū, seu cerebri vetriculos meatus existit: per quē sibi preparatus aer sursum ascēndat, siue trahatur: Nec esse ibi foramina, vel meatus cōgruū (vt postea videbimus) fuerat: Multoq; minus inde, sed neq; à frontis cauitate per cribra octauis ossis foramina in cerebrū, huiusmodi referuatus in cauernis acr ascēdere potest. Cū nulla pars inueniatur, quæ talem ex cauernis aerem sursum attrahat. Neq; enim cerebrū, neq; ossa tali, tantaq; virtute à remotis attractiua, prædicta fuerant. Nisi enim inspirando ab exterioribus traheretur, nunquā in nares, aut palatum, neq; in pulmonem ipsum aer perueniret. Quæ inspiratio quomodo contentū aliquid in prædictis cauernulis aerem in cerebrū impellere queat, minime videmus. Sed nisi magis dignum est, aerem dicere in ossium cauitatibus ob spiritū generationem, siue nutritionem referuari, seu preparari. Cū ex arterijs vndiq; , ac (si Galeno etiā confidas) per nares, cribrumq;, quouis tempore ipsiua ad se se allicere queat natura, neq; huiusmodi indigeat receptaculis: a quibus interim neq; trahere aerē, necessitatis tempore possit, ab ea, quæ dicta iam sunt. Melius autem fortāssē fuerit alijs potere de octo prætactis antris, cauernisq; quorum fuit ossium capitis, duo verò maxillæ superioris, quomodo, & qua ratione a natura fabricate sunt, enucleare. Cū precipuē a generationis initio, in ipsaq; etiam infāntia sæpissimē, aut vix, aut nullo modo adsint: sed paulatim magis, magisq; incrementē puero dilatenur, & excāuentur. Haud enim præter rationem sic à natura ordinatam est. Etenim cū tenella, paruāq; ea ossa circa principia sint: siquidē statim euidētē, à implamāq; cauitatem simul obtunnificā, vsq; ad eō quædam imbecillima, fragiliaq; fuisse: vt a quouis leui causa frangerentur: facillimēq; a quantumuis paucō humore corrumpentur, eroderēturq;. In quæ hercle pericula exponi ea momentanea ossa: præsertimq; sphenoides os, minime decebat: Nō vrgente interim vsum aliqua necessitate (vt patet.) Etenim tamēsi ob auditus exquiritorem resōnantiam, & ob ossis leuitatem facta esse huiusmodi antra prædictū est. Pnmū tamen vsum, ac principalem (præcipuēq; sex antrorū scilicet quæ in malis, in sphenoidē, & in fronte sunt) alium

Quæ in  
stris caue  
ris sphenoi  
dis deest.  
Ratio pri  
ma.

Obiectio.

Responsio.

Alia ratio.

Contra  
Resolūm.

Cauernulæ  
vniclaris  
sæ.

Cur in pu  
eris caue  
ris delin  
q.

Vsum res.  
Vsum pri  
cipalem.



esse opinamur: videlicet propter propriam maiorem perfectionem, & expressionemq; ac sonora modulationem. Quis enim in hoc ambigeret, si cytharas, & cymbalaq; , aut etiã tympana, & huiusmodi plurima instrumeta musica pendissent, quomodo, pulsato in exterioribus per chordã aere intus extensus amplia cauitas, siue reclusi dixerim, in amplia ea cauitate conclusus aer resonat, resonatq; . At grauius quidem, vel acutiùs, & maior cum tinnitu, aut minore tantò, quontò manus, minùsue antrum subest? Velut igitur paulatim cretèntibus magis pueris, antra illa magis dilatantur, maximòq; (vt opinor) puberatis tẽpore, quo calor naturalis exaudiscit iam, & humiditasbus præuincit, ac magis dominari iam incipient: Ita grauior eorũ vox fit, magisq; sonora, & tinnens, dum ex acuto, tenuiq; cantu hinc priùs incipiunt, deincepsq; ad basium vocatum pertranseunt. Huiusmodi autẽ grauiore, magisq; tinniente, ac sonora voce, veluti & exquisitiorẽ auditu circa principia: præfertimq; , dum loqui non dum poterant, pueri miramẽ indigebant. [ Duo enim hæc, scilicet auditus, & vox (vt philosophus ait. y.) ab eodem initio proficiscuntur.]

videntur. Quamobrẽ & auditus, & loquela maximẽ ab ortu nature offendi possunt, difficultatq; perferuntur. At quid mirũ, qd pueruli auditus perfectione, veluti & loquela vacent: cum sensus quoq; alios omnes, ob turbulenta precipue humiditatẽ, imperfectos adhuc reuincant? Inde; eorũ intellectus etiã, ac voluntas summopere impedita sit. Non igitur hæc cauitates necessariẽ simpliciter ad auditum, veluti auditũ illud tympanum, labyrinthuq; , atq; cauernas, membranasq; item, & officula trã: Neq; sic ad vocẽ, quemadmodũ pulmo, palatumq; , & larynx, atq; ipsius laryngis, sũtilis lingua. Illa enim omnia prædicta velut simpliciter ad naturales actiones perneccessaria iam a generationis initio statim expedita, perfectaq; sũnt. De his verò antris idem, quod de ipsis quoq; dentibus pronũcianda est. Etenim tẽpore, quo masticatio minimẽ iudicet homines, dentes gignere, extrorsumq; propellere natura, tanquã omninõ superfluos maximẽ curauit. Qui tamen postea paulatim, ac successiue oriuntur, & extra erant: quũ iam mandendi tempus accedit liquidus enim viscus ab initio tanquã humidissimis infantulis (ac per hoc lac ipsum) congruentior est. Quonia; brutis multis animalibus tanquã homine tereciterioribus ab initio statim donati sũnt: quibus siue ad mandendũ, siue ad mordendũ suã; defensionem, ab ortu statim indigebant; deficiente ipsis intellectu, parentumq; cõsũto regimine. Ad eò vt in omnibus sapientissima natura cõmendanda sit: quæ in necessarijs nõ deficit, neq; in superfluis abundet. Ad quã quidem vocis modulationem prædictã, tinnitumq; , & auditus perfectionẽ, & sonorum quãdã reipsonionem, duo præceptis antra cõducunt: videlicet quæ in malis, quatuor diebus maxillẽ superioris ossibus excavata sunt. Idcirco hæc quoq; duo in omnibus generatim adultioribus hominibus inuentus: quæ aisorũ quoq; prædictorũ ossium antris maiora sunt. Secundo loco ab his ea conferuntur quæ in sphenoidẽ sub sella, & tuncq; non semper, vt plurimum tamen reperiri solent. Tertioq; demum qd prædictas actiones conducunt, minus etiã prioribus frequẽtia, quæ in frontis ossẽ existunt: cum multa viderimus frontis ossã huiusmodi cauitatibus, antrũq; , earentia. Quod verò maiors momẽti, admirationisq; est, nunc perpendamus. Etenim cum nõ ad auditum modo, sed precipue ad vocẽ sex hæc antra maximẽ conducunt. Idcirco prouidentissima natura nõ solum vacua, soloue aere plena huiusmodi antra fecit, sed etiã tenuissimã quadam membrana cõstantius subleuauit, quò perfectior quoq; resonantia fieret. Sic enim in fornicatẽ, ac leuissimã superficie perpolitã, ac illinitã domus, camereq; magis resonare videtur (vt inquit Aristoteles. z.) quoniam restringenti, reuerberãtiq; , maiore datur facultas eis propter leuitatem: cum rimis adhuc innumeri; continuq; existant. Quinctiam acris quoq; immobilitas fortalẽ aliquid facit. Congestus enim vnuerũq; , coadunatus aer ibi, occurrentem sibi alium retorquere, ac reuerberare vehementius potest. Sic igitur & cytharas, & cymbala, quò leuiora, & præter omnem simulam sũnt, eò perfectius resonare vidimus. At quid de huiusmodi antrorum viũ, propter vocem, & auditũ fortẽ admiraris? Vide igitur Aristoteles problema, quũ ait. a. [ Quam ob causã si quis doliũ, & lagenas, & cætera id genus vasã figurina inania obrutus, operatq; , (sicut nonnulli faciunt, qui in testudinis, cameratue testis, præsertimq; , in eorũ angulis huiusmodi inania vasã obruere, propter ædificij leuitatem, conseruerunt: haud enim citius) Apponen si tale problema intelligendũ sit:] domicilia resonare amplius possint? Nec non si puteus, aut cisterna, vel aliqua fouea in domo sit, magis, magisq; ita fiat (scilicet vt resonet) necesse est? Ad quod quidẽ propositũ dubiamẽ respondet Aristoteles, sic dicens [ An quòd ratio resonandi non nisi refractio est? Sic enim possimũm resonandi illa reciprocatio nascitur. Ergo puteus, & quælibet fouea angustã obinet, & aerem colligere (q. d. simul coadunare cõgregatq; , & ita congregatũ retinere) potest. Dola verò, cæterãq; , sũtilia densitatẽ quoq; suẽ ambientis forẽ præferunt. Itaq; vtrãq; de causã illud euenit.] Est igitur causã resonantiẽ duplex. Prima, quia concava hæc aerem cõgregant, simulq; , vniuũ cõtinent: qui sic æcuerant, vnitusq; magis aliõ de se venientem repercutit: bancũ in puteis, & foueis esse philosophus ait. Altera verò causã est, ambientis, aggregantisq; æreĩ corpus densitas, quæ aptius repercutere queat. Hancq; , vltra primam,

y. 11. problemam  
problema  
scilicet.

Cauernæ  
vitijs, non  
simpliciter  
necessaria.

ab  
antra A  
antra V

struere  
aut in-  
doli

mundi  
obscuro

Que antra  
ad vocẽ  
modiora.

m. 11. prob-  
lemãri  
scilicet

Problema.

a. ibidem  
problema  
t.

Cõra Ap-  
ponẽm

scipõniõ.

scilicet

Resonãti  
ratio da-  
plex.

primam, in dolijs, ceterisq; fideihs vasis existere ſubdit. Hæc enim magis reſonant, cuiuſmodi etiam ciſternę ſunt, ſum ob inanis aggregatũ, cõdenſatũq;, ac ſimul vniũs aerem, tũm ob denſitatem cõtinentis. Quod autẽ denſiora ſunt, patet. cũm intus aquã optunẽ cõducunt; quæ tamen parietes, omniaq; edificiã penetraret. Quam ob rem cũm vtraq; cauia in ciſternis addit; quæ denſioribus parietibus, & baptumine à noſtris vulgõ nuncupant lenius circumdata; ſint: Idcirco magis, quam fouere, vel putei reſonant, magisq; ad hũc ex puteis, ſeu foueis quæcunq; denſiore, ac leniore lapide fortassis cooperta ſint, reſonãt; quobẽs domus pauimentũ quiſpiam percunat; vel etiam ſuper illo vociferet. Concaua igitur omnia, lenioraq;, ac de flore corpore cooperta magis reſonant. Hinc igitur ſucceſſit, vt ſex antra prædictã, quæ magis ad vocem, & auditũ faciunt, nõ modõ duntore cortice, ſed membranula etiam leni ſubinito circumdata ſint. Nec verõ abſurdum eſt (inquit Ariſtoteles) q; obruta, coopertaq; ſcilicet vaſa ſiẽtula ſonitum maiorem faciant. Vox enim nõ minus in ima ſe deſert; de niq; quoquoꝛſus, atq; etiam in orbem ferri, putandũ eſt. In ima ſe deſert; intellige muros etiam, ac terrã quoq; lapidibus penetrando. Quauisq; enim vñſus (vt in alio problemate dixit Ariſtoteles. b.) per ſolida nõ tranſiat; vox tamen, ſonũsque; penetrãt, ac penetrat. Cũm vndiq; liceat audire. Vox enim quoquoꝛſus profertur; omnia preceptat, penetrat, trãlapſaq; audiri vndiq; poteſt; ad eõ vt parietes nulla ex parte perforator penetrãt. Id quod inde opinor ſuccedit, quoniã parietes, & quæuis intermedia ſubſtituta iam æris particeps eſt. Quamobrem per partem poſt partẽ æris alteratio, percuffioq; ſpiritalium intermi eſſeõta ab exterioribus introſum, & ab interioribus extroſum penetrat: apnozem penetrãdi ſocum veſtigans ſecundũ totũm circũitũ, quã poſſiſſimũ queat. Id quod apnoze delatio ſicẽtẽ nõ poteſt. Simplex enim hæc eſt: quæ per directã lineam produere indiaphana ſoleat, ſunt autẽ intus parietes obſcuriſſimi. Itaq; noſtrę ſentẽtię de prædictõrũ antroru vñũ minime repugnat, q; ſcilicet hæc aperta nõ ſemper ſunt, foraminibusq; perua. Abſq; foraminibus etiã reſonare, velutũ ſub terra, vel edificijs obruta vaſa inania, foueõq;, & ciſternę reſonare queunt. Verũm enĩm uerõ quæ in fronte ſe piũs exiſtit ſiẽ ſimplex, ſiẽ duplex cauitas aliũ habet; præter ſuperficiẽtes (quanquã neq; hunc ſimpliciter neceſſariũ, ad maiorem tamen cõmoditatem opõrãtũ) vñũ videlicet ad excrementõrũ faciẽm expurgationem. Etenim cũ in phialam, ſiẽ quodẽtũq; aliud vaſ vel ore, vel ſolibus vehẽmeter aerem, v centumue inſufflamus, in pellicuſõq; ſi quid in collo illius vaſis adhærens, tenaxq; ſit, quod forte manibus extrahere nequimus, attenuabitur quidũs, & ab ære, ſtatũq; illo regrediente, ac reuerberato ſepẽmerõ foras proiectũs phialã, vaſq; illũ nõdũm relinquere ſolet. Quũ igitur valldẽ per nares exuſſemus, & præfertim quũ vel alteram, vel vtraq; natem exuſſando cõprimimus: vt quæ tam in ſpongoidis oſſis ſubſtantia imbibita, quam in intermedia eiũdem, & ſepti loco excrementa retenta ſunt: odoratiõẽ ſepẽmerõ, necdũm reſpirationẽ impediẽtia, atq; loquelã deturpantia cruſtare, atq; expurgare conantur, aer ille exuſſatus per duo foramina eſſantã digna in ſpongoidẽ oſc inſculpta, & ad frontis cauitatem interdũm reẽtẽ, nõnũquã verõ ſub vocato tertio maxillę ſuperioris oſſe obliq; penetrãtia ingreditur, aſcenditq;, ſeu ſuſũm impellitur, indeq; repercuffus a tergo vehẽmenter ſperangioſum os, excrementaq; in ipſo, & circa ipſum retenta, deoſum expatens, ad eorum expurgationem ſummoperẽ cõlerat. Id quod timetũ abſq; huiũſmodi etiã frontis cauerntis fieri queat, haud tamen itã cõmodẽ, ac perfectũ: ſicut cum huiũſmodi repercuffione (vt patet) fieri poteſt. Vltra q; expreſſio etiã quedã in aſcenſu æris, ac illius mucroſis extenſuato, & ad fluxũ promptũ fit. Cumq; promptum exitum ad nares antra hæc frõtis habeant; deoſumq; tendant, aerq; prædictũ ſepẽ ingrediens, ac ita repercuffus omneũ quecunq; in ipſis antris reperiretur, ſuperfluatẽm expurget, deoſumq; propellat. Idcirco ſemper vacua, & præter omne ſubſtantia intus cõtẽtãtã à nobis inuenta fuerunt. Cũm tamen quæ in ſphenoidẽ, ac maxillę cauitates exiſtunt, nõnũquã mucroſam ſuantem, viſcidãq; pituitã (ſicut ranõs) in ſe cõtinerẽ inuenierunt. Quam proſeõto proprii oſſium nutrimentũ paulatim aceruatã ſuperfluatẽtã excrementitiã fuiſſe opĩnamur à natura minime ſuperatã, vt per ſenũũ occultũ hãitum, ſiẽ per ſenſibilem aliq; meãtũ expurgare poterit; vñũũũq; eſt à ſuperpoſita ſibi pelũ nõnũq; excrementõrũ in ipſum excolari. Quæ interim pituita, niſi ſuperfluõ cauitatem replet, reſonãtionẽ penitus nõ impedit. Semiplenę enim ciſternę iam reſonant. Quod ſi nõnũquã repleto modõ excedat, nõnũq; præternaturale voci, & auditũ in ſerre credendũ eſt, prædictãq; reſonãtãĩm ledere. Quo modo autẽ natura tẽporis progreſſu huiũſmodi à nra quali excauarit, intellige. Idem enim hi, quod iam optunẽ piſtis, fermentãtiq; panibus, dum in furno coquantur, cõtingit. In illis enim humidã aliquã interores, præcipueq; cruſtã inter, ac micã, partes diſcutiens calor, eleuatõq;, & dilatãt: dum eas in vapores conuertit, antra quedã efficit: frequentũq; inter inſimã cruſtã, & micã, micque baſim, parte, qua magis vegeteſcibãt calor, ea ſpũſculẽ obſtrauimus. Ita igitur naturalis calor huiũſmodi tenerrima, humidãq;, ac cereũtãtã ſerẽ mollia, ac per hoc in ſe piũ cadentia, & plena, & quodãmodo ſolida oſſã deſiccãre incipiens, in vaporesq; priũ digerẽtẽ

b. 11. libro  
problemã  
te 45. & 12.  
Cur viſus  
non penetrat  
muros  
vox verõ  
ſic.  
Auditus.  
Viſus.

Cauitas  
frõtis vñũ  
alio.  
Pulcherrũ  
exemplũ.

Cur antra  
frõtis ſe q;  
munda.

Antrum  
girato.

interiores humiditates, inflat, dilatataq; & vitriariorū inflar extēnis incrementū efficiē. Illis verō deinceps vaporibus per halitū diffusis, præsertimq; aliqua humoris portione in superiores dentes, eorumq; exitū, & incrementū digesta, intus antra remanent magis, magisq; in dies adactū, excuataq;, quō maior a calore siccitas in huiusmodi ossibus inducitur. Quæ tamen haud caloris tantum vi, vt calor est elementaris, sunt. Sic enim idem in omnibus ossibus accideret, nisi vt naturalis est, caelestis etiam caloris particeps; & ab anima, seu formatae facultate propter aliquem finem regulatur. Quæ quidem cum fundamentaliter, formaliterq; alia nō sit, Hippocrates, Galenusq; etiam, & Aristotelis opinione, quam veterūdi facultas (vt alius vberimē offendimus) iud finem vsq; vitæ perdurat. Verūm de sex his antris ferē ad nāsam vsq; hoc in loco, vitra quāti propofueramus, dictum est. Impresensiarum enim obiter pro auditōno quidē organo, tribusq; cum ipso resonātib; præter mammillarū processū antra, tam sphenoidis, quāmi frontis, atq; etiam multo magis maxillæ superioris quartū ossis amplis cauitatibus, cauematq; vitriatq; positis; hoc est, in quolibet auditōrio organo tribus pertractare consequentia traxit. Maximē autem (vti præostensum iam est) ob exquiritam propriæ vocis resonāntiam. Consequentē in quā necessitas ad hęc antra nos traxit: dum de tribus temporū ossis foraminibus loquere mur. Quibus nihilominus expeditis, ad quartū insignē foramen pertranscamus: quod maiori sphenoidis artetiq; ramo caluaniam per sextum quoq; sphenoidis prædictū foramen ingressū excuatiū, & clarumq; est. Id inquam nō recta quidem caluaniā perforans, sed inflar oblongi meatus à posterioribus, exterioribusq; obliquē antorsū in priorē regione foraminis sphenoidis sexti, in temporis ossē insculptum est. Cuius principū est, propē foramen sexto (vt videbimus) neruorū pari dicatū: quod temporis, atq; occipitis ossibus cōmune est: directe quidem sub maxillæ inferioris cum ossē temporis arcebat, pauloq; tamen postensū; opposita in parte foraminis prædicti temporū ossis primi: A altero intem latere sutura cōmuni sphenoidis, ab altero verō lambdoideis futuræ aditamentis cōterminatū: supraq; se posterius styloideū, anterius verō sphenoidis acutū angulū obtinens. Cuius foraminis exterior ossis pars deorsū ad fauces spectans puritatis inflar aspera; inæqualisq; est. Eius autem vsus nō est quide in, vt hoc errabundo itinere vitalis spiritus cerebro exquisitū prepararetur (vt Vesalij sententia diuino me hercle suo ingenio indigna; & minimeq; consentanea existit) parū enim breuēq; admodū huiusmodi iter est: vt nihil ad talem preparatiōnem sufficere, vel conferre queat. Nisi cæcinnorū, capreolorū inflar multas ambagibus, & reuolutiōnibusq; cōterqueretur. Huiusmodi enim preparatiō à rectiformi plexu mirabili vocatū sit: quem nos (quicquid alij recentiores dixerint) nō semel publicē, præuatiq; in homine offendimus. Verū est tamen, qd si qualis in brutis est, talis in homine ipso inueniretur: nō ad eō mirabile esset. Cum omnibus euidētissimū vel in capitis nondūm natorū edorum, nedūm bouū; aliorūmq; perfectiorū brutorū sit. In homine autē nisi maxima cum diligentia, acutissimāq; saltē dissectuēntis, vniūcū crassiore sibi supposita cerebri membrana dilipari solet: & ab incisōrio instrumento (vt sic dicimus) absorberet. tuam ob rem vsq; adeo euasit, vt quāplurimis negligenter fortē dissectūbus illum vidisse permisum nō sit. Quauis cum aliquantulis offecerit; nec penitus ignorauerit Falloppus vmbra, imaginemq; retis, ob maximā, ferēq; inuisibilem eius tenuitatem, nuncupans, nō rete (vti dixerunt veteres) mirabile. Contingit autem huius rei difficultas, quoniam longē tenuioribus spiritibus intellectu perditis ho mo, quam bruta indiget. Quibus post mortem exunctis ferē inuisibiles minutissimē illę arteriole euadūt. De quo nihilominus mirabili retiformi plexu alibi nos vberius locuturi sumus: nullam esse rationem dicentes; cur in solis brutis esse, non in homine debuere. Sed cum nō de hoc loqui ad ossa pertinet, vt postitū est, vt nostrū ad propōsitū quartū foraminis vltimū reuertamur: Est enim foramen id veluti securior quēdam semita soporarię arterię, ex loco, ad quem sursum rectē ascenderat, diuisaq; est; vt minore ipsius propagine per quintū sphenoidis foramen prædictū in caluariā ascēdētē, maior inde procedens antorsū ossē cooperta, & defensaq; per huiusmodi quartū foramen, meatumū procedat, donec ad sextum sphenoidis foramen protrahatur, perq; illud in caluaniā penetret; ascendatq;. De hoc foramine Galeus libro de vsu partū sexto decimo. i. sic locutus est. [ Reliqua verō ( scilicet soporarię arterię; de quāri loquebatur ) pars anterioribus partibus per foramen, quod est in ossē lapidofo, sursum fertur, & ipsa ad plexū retiformē, quę ego prius dixi, &c.] Rursūq; in calce libri de eodem intelligit, dicens. [ Nisi qd ad plexum retiformē, vt quōm de his ageremus, indicauimus, arteria magna fertur, sursum per loramē, quod est in ossē lapidofo, &c.] Confuse autē in libello de venarū, artiarūmq; dissectione ait. #. [ Ad omne quod ex carotidibus est reliquū sursum recta procedens penetrat in caluaniā, inibiq; textū illūm ad retis imaginē cōmpositū efformat, &c.] Confuse inquam. De quo enim foramine loquatur. An scilicet de hoc temporū quarto, an de sphenoidis sexto, an de vtroq; intelligat: per quæ ambo pertranfit, vt in caluaniā subeat, minime expressit. Magis tamen de sphenoidis sexto intellexisse (vti supradictimus) apparet. Quoniam per illud immediatē intus caluariā penetrat. Sed hoc minūm momenti

iond q; La  
mānē eb  
+  
Brogno 7  
-mōi hōiē  
mip am  
mōm

o 7 anō  
mōiū  
mōiū hōiē  
mōiū  
mōiū  
Foramen  
ossis tempo  
rū quartū.  
mōiū  
mōiū  
mōiū

mōiū  
ob  
mōiū  
mōiū

Vlti  
Cōtra Ve  
salium.

Re mōiū  
mōiū  
mōiū

mōiū  
mōiū

Cur inuisi  
bile in ho  
mine.

Verus vsus

e. Cap. 11.  
post princ.  
idem cap.

14. in fine.  
mōiū

d. Cap. 11.  
post princ.  
mōiū

est. Sat enim, si perq̄ fuerit Galeno cognitum id foramen, ostēdit sic. *Tamēti ex fatis, de prauis*  
*iq̄; de neruis libello motus V. c. i. Galeno in cognitū voluit, prout ante nos tenuimus. Ad*  
*quantum igitur accedamus temporis, ostium foramen, quod est in exterioribus (quoniam adest) eui-*  
*dentissimū. Quōm adest inquam. Etiam sepe nō mero in altera parte tantum; nonnisi quālibet verb*  
*& in utraq; deest. Iuxta lambdoidas ergo iuturq; addita; necita ad posterorē procedēs in similitudine*  
*regionem postquam est, in finem penetrans temporis ossi post auditus in symphysis insculptū, illae*  
*ad primo, secundūq; crassiores membranae sinibus furculi quādam pertineant, ad curq; egressant.*  
*sumq; exteriorū partū nutririōnem. Patet autem hinc quādam in cerebri affectibus calidū simi-*  
*guntem post aures mutare cōtra. Vbi enim ab sunt haec foramina; rursūm per iuturq; lambdoidi-*  
*dis addita; necita foras transmittere solent, exterioribus nonnisi quādam venis ascendētibz cōtra;*

Cōtra Ve-  
sculū  
Secūdo ad  
temporis  
foramen.

Vit.  
quod est  
quod est

Occipit  
foramina.  
Primum

Magna-  
do.

Vit. du-  
plex.

Figura

quod  
quod

Secūdo, &  
tertiū for-  
min occipi-  
tis.

Figura.  
Vita.

Quantū, &  
quod.

Illam tra-  
dē in dō-  
sim

ad dō V

et dō  
dō

Occipitū,  
et in cō-  
muni for-  
aminae  
duo.

Vit. du-  
plex.

Vit. du-  
plex.

Secūdo ad  
temporis  
foramen.  
Vita.  
quod est  
quod est  
Occipit  
foramina.  
Primum  
Magna-  
do.  
Vit. du-  
plex.  
Figura  
quod  
quod  
Secūdo, &  
tertiū for-  
min occipi-  
tis.  
Figura.  
Vita.  
Quantū, &  
quod.

Quod in septima figura procedit, num. 2. signatū est: cōmēto verbū huius capituli presentē lit. et  
ostendit. Quātoq; non modo dicitur: sed totus etiā corpore ossium foraminū propriū  
dubio procul omnia maximum. Vespinali medullae ex cerebro descendētis, primūq; egredientis,  
& ē caluaria foris emergentis iustas, sicut uterq; principium sit: atq; vñ in ipsis arteriis ingressū,  
viamq; prebeat, quā per transuerās ceruicis vertebraū processū ascēdentes in caluarie vniūq;  
ingrediantur: vt vniūq; per id foramen tria pertineant; vñ scilicet egrediens, quod est spinales  
medulla, duo verbū, scilicet arteria, ingredientia, foramen quādam id, tamēti in orbem videri  
apparet. Exquisitū tamen eōdem planibus quadrilaterū quodāmodo vñ debetur: Ad eō quidem  
omnibus cōpertissimū id foramen, cuiusq; vniūq; vt ipsum iustas dicitur, q̄ hōiūq; in vniūq;  
superpondū sit. Secundum verbū, & tertū foramina sunt; Alterū quidem in dōctro; Alterū  
autem in sinistra predicti maximi foraminis laterē perculū, quē in prima huius cōmēti figura dī-  
littera in signitur. Oblonga quidē ambo, orbitulariaq; & obliqua ex posterioribz, interioribzq;  
in antētia, exterioraq; procedēta sunt; Transitū gratiā neruorū septimi paris qui anteriorū  
idē tendere debeant: vt cum sexta neruorū quorū cerebri cōiugatione, ob manus rōborū, cōiū-  
gantur, atq; colliguntur. Quartum deniq; ac quintum foramina sunt in septima procedēti figura  
lit. 4. notata, in alterutra quidem maximi foraminis parte posterius tamen secūdo, & tertio ita,  
quod ad extimū ipsorū. Ab externa enim occipiti sede incipientia haec extra caluarie vñ; in medio  
terē latens caputū littera h. i. in eadem procedēti septima figura in signitur, quibus vniūq; cō-  
prima ceruicis vertebra dearticulatū, integrosim procedentia cum predictis scilicet, & tertio for-  
aminibus in vniūq; cōfunduntur: videlicet quartū cum secūdo in dextra parte, & quintum  
cum tertio in sinistra. Ad ob vñ in interioribus caluarie partibus duo tāq; foramina maximū ex  
parte apparet; quae tamē in exterioribus quatuor inceperat: seu maus dicitur (& rebus quā-  
dem) q̄ duo intus incipientia in quatuor foras terminata foramina sunt. Per haec igitur duo vni-  
ma foramina vniūq; furculi, vniūq; scilicet vniūq; egrediuntur, delcēduntq; ad finem quēdam  
quem ceruicis finem Diuinus ille Falloppius primus eius inuētor nomenclauit. Quāquam  
pluriculē horū alterū, nōnunquā verbū & ambo haec duo vniūq; foramina delcēta exterioribus  
cōsueuerunt. Quō nihilominus in casu nunquā in necessanis deficiētis natura fecit, vt eorū vices  
supplerent secūdo, & tertū predicta ceruicorū septimi paris transitū dicitur foraminū. Quā-  
brem & tunc non adē orbitularia ea sunt, sed oblongiora, & internā ampliora. Presentē q̄  
exterioribus: vt nō septimo tantum neruorū pari, sed vniūq; quorū predictis locū prebēnt. Quā-  
sta igitur predicta occipitis foramina sunt vt plurimum quinq; nōnunquā verbū quatuor: sed ali-  
quando tria duntaxat reperitū. Sed haec de occipitis ossis propriis foraminibus dicitū sunt. Pre-  
ter quae alia duo cōspicienda veniunt: alterū scilicet vniūq; cōmuni occipiti, ac temporū  
ossibus, nunquā plus occupāda, quam temporū habent. Ex quo si quisiā in interiorē, pits for-  
mina connumerare velit, minime ipsam vniūq; tabunus: tuncq; occipitis foramina septem etiā  
pronūtiabit. Est autē id amplū, neq; admissū circulare, sed quōdammodo geminū in vniūq;  
In prima presentē cōmēti figura c. huiusmodi foramen designatū est. Ver id nō modo extimū  
cerebri neruorū par dōctum a cerebro extra caluarie anterorū prius procedēs delcēdit  
parte scilicet interiorē: sed externa etiā maior iugularis interiorē ioboles ad caluarie posteriorē  
finem tendit, ingrediturq; De hoc foramine Galenus libello de neruorū dissectiōne loquitur, q̄

dicens. [Sexta neruorū à cerebro orientū coniugatio vno quidem vitæ foramine, quod proprie infernam forame nūcū, quæ à literæ Λ. similitudine, lambdoides appellatur, situm est.] Paulus infra iterum scripsit. f. [In quibus etiā libris (scilicet de Anatomicis administrationibus) de usu illorum neruorum traditur distributio per id foramen, quod proprie finem futuræ lambdoidis est, dicitur exterior, &c.] Rursumque [libro de vñ partū sexodecimo id voluit, per hæc verba. &] [Reliqui verò arteriæ carotidos pars, quæ retrò magis ferri dicebā, dicitur & ipsa in duas partes maximas: Primum partibus inæqualibus. Quartū minor retrò magis ad basim cerebri accēdit, magno, ac prælongo foramine ipsam excipiente: quod est in fine sunturæ inferioris. Quæ litera λ lambdæ foramen præferat, &c.] Non tenet autem Galenus inquit, in fine, seu proprie finem futuræ lambdoidis esse huiusmodi foramen: cum ita sit. Quinimodò huius futuræ additamenta iuxta quartū, quintumque, occipitis angulū, parte quidem inferiori, per mediū tale foramen dissecant: quicquid occipitis est, ab eo, quod temporum ossis est, capō separantes. Quinquā nō rectè Galenus per id foramen arteriam ascēdere ait (perinde ac alias videbimus) Tempestiuū verò est, vt frontis quoque, ossis foramina declaremus. Quæ quidē quatuor esse propria solent. Quorū duæ prima exteriora sunt: alterā videlicet vtrinque in supericilijs iuxta maiore oculi angulū, excelsius litera t. in sexta procedij figura cōnotata. Quinquā vt plurimū nō foramen cōpletum est: sed finis quidam, velut semiprotinus, aut in altero dantaxat latere sic est: in altero verò exquiritur foramen paratū quidē: per quod vtrinque in supericilijs cerebri partū prima propago radice pertransit ad frontis cutem, musculofanquē: eius substantiā, per secundum ante iphenoidis foramen egressa ascendens, ad sensum, & motum, illis distribuendū. Præter hæc autē alia duo foramina intemta sunt, quæ ab antro, cæcænaq; magna, litera k. in prima, & secunda præsentis cōmæ, signata, notataque nares definiunt. Quando scilicet intrū illud frontis adest, quādoque enim nō inuenitur, prostante iam dimimus. Quæ duo hæc foramina nō nunquam recta vidimus ab antro, & nares penetrare: nō nunquā verò obliquè procedentia, vel ut antea quoque de anteriorū huiusmodi vñ loquētes, enarramus: vbi & huius quoque foraminis vtrinque vñm pertransimus. Vestrā enim verū ad octauū ossis foramina nō cōuertit, præcepō occasio accierat: vbi magis inuolutū est, ob multas ibi succurrentes difficultates. Multa quidē igitur foramina, etiā: parua sunt, et ad tempore *diffinitis* q. d. cribriformis, vñ cribrō simile ab Anatomicis nuncupatū sit: ab Hippocrate autē, & Galeno potius *cribriformis* q. d. spongiforme, seu spongiosum (veluti prædiximus) b.) apē pellunt. Inter quæ foramina primū cōsideret vñm, ac parū ipsi octauū, ac frontis etiam ossibus cōmune existens ad extremitatē quartæ procedij figuræ litera i. locus eius notatur, vbi et frontis ossis cōiungitur. Id quidem nō ob aliud factū, nisi vt tertius duræ cerebri membranæ linea ibi pertinens adhereret. Præterea duo sunt alia foramina ad iatus processū illius, qui cæcūm in dextrum & sinistrū distinguit (quem in eadem figura litera B. cōnotat) vtrinque: videlicet vñm frontis anteriori sedi proximi. Sunt autē ambo hæc longiuscula quidē, & rursus potius, quam foramina nuncupanda. Cū in rimulū spōiē referant. Quæ namque in his ossibus cæcæri processibus referre sunt: Venule interspiciuntur exteriorē soboli tertij cōdentes que ab exterioribus intrisum per rimulū amplitudinē exponēta ad duram cerebri membrā transmittunt. Præter hæc autem quamplurima sunt, nō tamen pariter, determinatōque numero sita in hoc ossis foraminibus recta nihilominus, peruaq; siue interiori, siue exteriori, inferiusque respicientia. Ad narium nūcū cavitatem, & nō ad spongiosū ossis terminantur. Id quod nō adeo de Galeno, quem modico de diligētissimo illo naturæ exploratore Vesalio nobis ad imitationem afferit, quem modo scilicet coram foraminū transitum, semitatum nō aduerterit. Cū tamē euestigō adij aliqua euidē ossis per te tamen sumpti dissectione, siue aliqua fractione, siue ad iosis radices, siue ad oppositā candulam huiusmodi os, & foramina cōferatū, ex opposita quavis, siue interiori, siue exteriori parte foraminum rectitudinem, ac transitū ad medium septi, & spongiosū ossis locum vtrinque videbimus. Quod si æquū, vel porcinam fetam transmittere velis, aut æquum, vel quavis liquidam substantiam percolare, non ad spongioses os, sed ad mediū prædictū locum penetrare cōpctissimū tibi fiet. Cuius quidē cribrī vius tametī antea à iuxta Galenū dignitata à nobis declaratus est: nihilominus tamen vberius nunc, alitiusque iuxta nostrum sententiā, vñ cum ea, quæ per palatum, siue per iphenoides os sit, excrementorū expurgatione repetatur, quæ quæsiuissimè declaretur. Hōc dantaxat pro cunctis ossiū capitis foraminibus prænotato, siue potius in memoria per epilogum quendā reuocato: quod cum propria capitis effata digna, momenta nosq; foramina sint vt plurimum triginta septem, cōmuniā verò tredecim: quoniam quidem cunq; quatuor quaginta. Sūt igitur propria triginta septē: videlicet iphenoidis propria quatuordecim: cæcæna in quatuordecim septemque cōmuniā, ac septem, nono, decimoque, & duodecimo partim per ius cōmuniā, vñ remaneant per septem, prope, in modo cōmuniā ad ius, primū, secundū, tertijque septimū, octauū, & vñdecimū, siue vñdecimū: quæ nō sunt in anterioribus: sed in posterioribus decim. Item sunt propria quædam ossiū temporū numero duodecim: videlicet parua sex

C. Cap. 26. v. 1  
No. 1000  
f. Cap. 100  
p. 100  
p. 100  
p. 100  
p. 100  
p. 100  
p. 100  
p. 100  
p. 100

Cōtra Galenū, & Vesalij quoque: Præter ossis foramina: p. 100 quatuordecim: p. 100 p. 100 p. 100 p. 100 p. 100 p. 100 p. 100 p. 100 p. 100

Temp. & C. quatuordecim: p. 100 p. 100 p. 100 p. 100 p. 100 p. 100 p. 100 p. 100 p. 100 p. 100

Vñ.

Ossis ob. 1

ad foramina:

ad. 10. 100

Galienū, &

primū, & 100

10. Supra

comæ, &

7. huius capitis.

Præter cōmune.

Vñ.

Secundū, &

100 p. 100

100 p. 100

Vñ.

100 p. 100

100 p. 100

100 p. 100

100 p. 100

100 p. 100

100 p. 100

100 p. 100

100 p. 100

100 p. 100

100 p. 100

100 p. 100



hos perulam nobis referre. Cuius altera mantica in dextram septi partem, altera verò in sinistra pendet; adeo vt ita cribrum cù superiore processu ad spongiforma hæc ossa se habeat, vti ea intermedia per se pars, quæ super humeris portantis hominis, vel super sella, vel equi, vel mule firmatur, media inquam existens inter vtramq; manticam. Est igitur vtrinq; simile spongiforma os manticus. Quod quidem nõ secus, ac perula, super inferiore processu, quàm super quodã tabula in latus polita, macerata moue equo relidere videtur. Est autè vnus vacua vera perula vtrinq;, labiaq; concauitatis exterosum respicientia habet. Per quæ siue panis, siue obsonia in vtramlibet manticam iniiciuntur. Ita igitur hæc huminodi spongiformis processus vtrinq;. Etenim siue concauitatis labia exterosum respicientia obtinet: quæ ad secundũ, tertiumq; vocata maxillæ superioris ossicula respondent: siue melius diximus, ad cõmunem secundam futuram, parte, quæ hæc ossicula a frontis oste segregat. Quæ quidem ossicula cùm per partes istas vnus, manticaquẽ externam superficiẽ representant. Internam verò, siue labium, siue extremũ, aut veluti quandã pere futuram dicere malis, propè futurã capitis ossium propriam, quam diximus sextam incipit; in medio scilicet superioris processus, & præditẽ sextæ futuræ. Ad eo vt nõ à sexta tantum futura spongiformis ossis superior sinus, cancriaq; excrementa recipiat: sed exterius etiã à secunda cõmunĩ, quæ scilicet a tempore ad tempus per medianam oculorũ cauitatem procedit. Quamquam & ab alijs futuris, quæ huiusmodi vocata secundũ, & tertiu ossicula abinuit, & à quarto maxillæ superioris ossis dislegant, huiusmodi spongiforme mantice in seipsis recipiunt. Internum verò sub præditis ossiculis spatium inane, cauertotumq; est. Melius igitur fuerit secundũ, tertiũq; à Vesalio numerata (veluti dictum iam est) superioris maxillæ ossicula, huius spongiformi ossis partes, ac externas superficies esse, prætere: cùm verè illis coalescat, vnianturq;. Verũm nunc, & in præcedentibus cõnumerare clarioris doctrinæ gratiã, secundũ Vesalij ordine volumus. Cumq; etiã ad locũ peruenimus: vbi res propositõ magis de maxillæ superioris ossibus locuturi sumus; præter huiusmodi ossa cõtrã disponemus .p. Dico igitur maioris oculorũ anguli ossa, videlicet secundũ & tertiu aliquando numerantur: quæ tamen inter se cum spongiforme intus coalescunt, perantq; prædictam cõstituant. Hinc nõ diuim modo capitis propriam sit utarum, scilicet sextæ, & septimæ, præsertim verò sextæ: quæ magis ad cribriformi os attingit: sed etiã maxillæ superioris earum, quæ secundũ, tertiũq; vocata istius ossa, & abinuit & à quarto eiusdem ossis distinguunt vtilis à nobis præsentibus .q. nonus patet, qui erat propter liposorum, aquosorumq; deorum vegetantium excrementorũ translocationem, expurgantibq;. Etenim tamen quæcumq; per dimidiã cribriformis partis foraminula nõnunquã percolantur, excrementa in amplam nasi cauitatem recta decidunt, vbiuq; præditõ est. Quæcumq; tamen per huiusmodi sextã futurã, itemq; per eas, quæ in oculorũ cauitatibus præditæ sunt, refluunt, percolanturq; nec nõ per alterius medietatis exterioris, scilicet ipsius cribri foraminula deorsũ in penetrantia excrementa in spongiosorũ ossium superiores cauernas ingrediuntur; indeq; ad nanam capacitatem per euidetiorã quedã foraminula desillant. Idipsum verò intem sedulo perpẽndendũ est, quoniã etiam per cribrum aliqua excrementorũ portio retere, & nõ tortuose, anfractuose in amplam nam capacitatem maxima ex parte desillat: haudquaquã tamen ob id statim, vel cõtinuò decider: vt vel inuis nobis comedentibus fortasẽ, vel scribentibus, siue quoduis polytium opus agentibus foras turbet creat. Nisi quonq; superfluent multa humiditas deorsũ ruat; vt præsertim humidior & puerilis, aut cõtra manu venas etiã profectionibus, lachrymanibusue quibuslibet accidere nõnunquã vidimus. Huic enim absurdo prouidit natura, huiusmodi spongiarũ, pumicumue in star aspera ossicula, septa versus oblique spenunmerò cõtorra, & gibbosa in trãitu apõnes. Etenim egrediens gutta à cribri foraminibus, quamprimũ ab inspirato aere frigidiore efficta coagulatur, de nioriõ, ac minùs fluida euadat, illiq; asperitatibq; adherens, quæ extra spongiarũ internos sinus decidunt, firmatur, obstruitq; intersidum vsq; adeo firmatũ, vt quãtuus fluida, tenuissq; humiditas postfocquatur, ad descendendũ tamen illa impedita sit. Ad quam morã maximè facit, q̃ paulatim magis, magisq; ab inspirati aeris modica frigiditate cõdensatur humorelib. Modica inq; valtior enim frigiditas cõprimendo nõnunquã, cerebrũq; humiditates exprimendo, & per nares fluore, & lachrymas etiã mouet. Inspissatus ergo humor (vt diximus) non adeo ad fluore promptus est; præsertim, cù per cribrũ huiusmodi totum euacuatõ naturalis nõ sit. Nisi quum malè affectũ, intemperatumq; (vti videbimus) ipsum cerebrũ est, tanq; anteriorũ magis cerebri partiũ, quã ventriculorũ sua excrementa in palati infundibulũ, aliunde deiiceps cribrum erudantũ superfluat de descendit. Ideoq; nec fluoris impetus inesse solet. Inde autẽ, vbi quadrantenis inspissata, & spongiosorũ ossium asperitatibus & exterosibus, septoq; indurẽtis cõmoratur, magisq; si in spongiarũ anfractibus recepta eadem sit: per exufflationem, congelata iam, retentãq; expurgari solet. Impellente scilicet eam à posterioribus, interioribusq; ad anteriorã, exterosaq; deorsumq; accentuum expirato exufflatõq; aere tanquam à tergo cõprimeat, anterioriãq; propelleat. Vt cuius cõpertissimũ est. Id quod facilius assequimur, vbi cõpressis aliquo modo namq; vehẽmentiorcm

deatidig  
 2ohm  
 abm  
 p. labrã c.p.  
 com. 2. j. d.  
 moul  
 q. Supra  
 com. r. h.  
 ion capis.  
 114. 1. 5  
 abm  
 101. 1. 1  
 rigol qe  
 12. ab in 16  
 abm  
 12. 1. 1  
 10. 1. 1  
 10. 1. 1  
 10. 1. 1  
 10. 1. 1  
 10. 1. 1  
 10. 1. 1

siorem talem exuillationem, ac per hoc vehementiorem expurgationē fecimus. Hinc igitur eā succedit, vt odoratiorem excrementa illa, vel in cerebro huius retenta, vel in medio septi, & spongoidis (cuius asperitatibus adhaerent) vel in ipsis etiam spongoidis cauenulis obstruendo impediunt. Quod autē per cribri foramina pertranseant aliquando naā excrementa, quantum nō certissimum, coniecturalē tamen in ditiū in quibusdam preternaturali affectis hominibus nō infrequenter habuimus: vt qui nō modo prorsus impeditā, ablatamque, seu diminutam, aut interdum corruptam, seu depravatā habent odorandī actionem, seu inaus dicere passionem: sed etiā quādam vehementius iterū, atq; iterū per nares exuillantes tandem excrementa quōdam maxima cū difficultate, instar chordarū si fecali: viscida, & in globulū coacta eiecerunt. Quarum chordarū, seu filamentorū formam prius in transitu per rectū cribri, potius quā per obliqua anfractuosaq; spongoidis foraminā adcepta esse repraesentant. Quam tamen adhuc cōspicimus duntaxat excrementa conseruant, quae luminoperē viscida, glutinosaq; sunt. Quam rursus ob glutinosi tateū, lentitiemue vsq; adeo interdum spongiosis otibus, siue in eis in corū cauornulis retenta, siue ex ternoq; superficie si nullā adhaerētā inuorantur: vt fetore ibi corrupta suscipiant: corrumpūq; ipsi nōnunquā & ea, quibus adhaeserunt, oīa corrumpere consueverunt: vt inde patens etiā ipse continuū huius in naribus fetorem leniat (non certissimū inquit, quauis nōnulli sic crediderint, quoniā ā spongoidis foraminibus tortuosis etiā - talis funiculari forma fieri potest.) Ad huc de primo, scilicet octauū odis cribro, dicta iuocūq; sunt. Ad aliud verō cribri, sphenoidis huius, conuertamur: vt exquisitē omnem cerebri excrementorū expurgationē (siue per nares, siue per palatum fiat) elucidemus. Inquit igitur de hoc Galenus: x. vbi de adne cerebri superfluitates per duos meatus ad infundibulū descendentes recipientē locutus fuerat, hoc modo [ Excepit autē hunc (scilicet adnē) os cribroso cuiusdam simile in partū defines. Hoc igitur est crassiorū superfluatorū via. ] Suae autem *ὀσσεως*, id est cribri, siue *ὀσσεως*, quod est, cribroso cuiusdam *ὀσσεως* caudex Græcus habet) simile dixerit, nihil refert. Sae est autem, qd cribri, siue cribrosi ossis instar perforatū os sphenoides posuit. Verū tamen mēro insurgunt hic recentiores quā plurimū, ac ferē ( Syllio excepto) cuncti Galenū inreptantes; qui perforatū esse os illud, instar cribri, cōtra omnem proculdubio sententiā scripserunt. Quorū aduersariū primus Velalius\* extitit. Aduersariū quem plurimā fundit,\* nō ventatis (vt apparet) zelo, sed inimicitiae potius, vel inuidiae stimulo agitatus: vt hae foramina, vel nunquāma se (eo, quo tenet loco) videri: vel in vāo foratissimū cranii non struosē, aut ob cariem, siue post mortē in sepulchris, cemeterijsq; siue etā recentiorū mortuū hominis perforatū sphenoidē perspicere (quemadmodū ex morbo Gallico nōnullis actibus, impossibile nō est. Nōq; nōnunquā cuiusdā aurificis totum palatū ab ea Gallia lue pessimē vexatam, corrosūq; vidimus: vt reiectis sphenoidē per tūm, quae dorsū prius in trachelū arctenam ceciderat, ossi in frustulis maximam cōspicientibus admirationem induxerit) videri saliter tamen in omnibus, vel inuita ipsi (quae nunquā fecerit, nec scissis talia foramina in eo loco poterat, sed ut fonnauit quidē) natura, inuitūq; nostris oculis, ea tōcedere voluerit. At Syllio Renatus\* quidam, pro Velali, ac ventatis defensione nō temere aduersatus est: sui interea preceptoris correctionem, pro Galeni etiā defensione subiungens: quae est, vt loco dicitur *ὀσσεως* id est [ cribro ] legendum sit [ *ὀσσεως* ] quod est, [ cuneo ] vt Galenus verba haec sint. [ Excepit autē hunc os cuneo cuiusdam simile, &c. ] Sicq; statim omnis erroris immunem hoc modo Galenū Renatus suo cō preceptoris Puelio reddidisse credit, gloriaturq; est. Minimē interim aduertētes ambo, doctior in quā prius ille preceptor: deū verō ingeniosior hīc di scipulus, qd inuitū Galenū emendarunt, eius verba, & inuentū minimē perpendentes, neq; obseruantes. Quod enim Galenus multis foraminib; pertusūq; ac per hoc cribrum, siue cribrosū quodam os referens cuneiforme os intellexerit, pro excrementorū expurgatione, ter quidē in paucis verbis eodem serē in loco: y. vltra praedicta ab illis glossata verba, cōfirmavit. Primū dum sic praedixit. x. [ Cū igitur natura, nō vt palatū os: ita capiens tenuibus foraminibus, quasi cauornulis quibusdam pertudit, &c. ] Ecce igitur quomodo palatū os (sic id ipsum sphenoidis se penumero nuncupat) tenuibus foraminibus pertusū esse, siu pponit. Secundoq; rursus idem cōprobatur: quibus sic post cribri mentionem ait. [ Cū autem nō statim exchoana exardat per palatū foramina, cūm requirere eisset equum, hoc praetermittunt: quemadmodū & de nariū ossibus cribrosis, &c. ] Tertio demū eandem approbat tenentium: sic post pauca subdens. x. [ In palatū verō, ceū in os foraminibus desinentibus, crassūq; praeter tracheā, &c. ] Quid igitur dicendū hūc est? An de Galeni mēte foratissimū ambigens adhuc es? Vidēs Galenū in seruis, quū ita rursus & quarto scripsit. y. [ Hec quidem sunt in his, quae ad duram meningem pertinent. Quibus autem superuehitur tam ipsi, tum quod ipsa cōtinetur cerebrum, adnē est, & plexus reniformis, & ipsa in palatum perforatū. ] Iterumq; & quātū in sra nō aliud voluit, sic dicens. x. [ In nares quidē per foramina ossium cribri similū producente: In os autē, per foramina glandulē in fundibulū propinquā. ] Sextoq; demū, ne amplius in re tam clarissima cōcutas; ab eodem nō aliud vnde cimo libro. a. didiceris,

Sphenoidis cribrosi secundū r. s. de v. p. cap. 3. post princ.

Cōtra Galenū.

\* Lib. 1. c. 6. venus s. 8. & c. 12. circa med. & lib. 7. c. 11. post med.

\* In caluonia sic dicitur amolitione.

Renati solutio.

\* In sua apologia ad secundū Syllii de pulsat. Cōtra Puelium, & Renatum.

f. lib. 3. de v. p. 1. Cap. 1. versus finē.

n. Cap. 3. post med.

z. Cap. 10. dem versū finem.

y. Cap. 8. circa princ.

z. Cap. 14. post princ.

a. Cap. 12. post med.



ita de vsu partium scribente: [Palati verò os cõtra velut cunicus quidam medius inter caput, maxillamq; iuperiorem incõbit, cõternens iam in sese meatu cerebri purgantiu foramina.] Septem igitur Galeni loca idè de sphenoidis, palatiue offis foraminibus pertractãtia noue dicta iam sint: vt frustra Galeni contextu corrigere, atq; emendare conentur: ipsimq; Galenũ excusare, præter eius mentem esse dicentes, foramina in sphenoidis posuisse: si quidè tones ipsimet proprijs verbis eandem sententiam cõprobat, nõ perforatũ modo esse sphenoidis os: sed tenuibus ipsiũ foraminibus perforatũ esse: dicens: i ad eũ vt alterũ et cerebrum nũcupare, absurdum minime fuerit. Quanquam nõn ea erit, seu eritrosi, aut spongiosi alijs in locis nõ expresse, in eandẽ tamen sententia necessãriõ deuenit. Quid igitur in huiusmodi re pro Galeno dicendũ? Si neq; Sylius, neq; Germanus ille suõũ Renato discipulo eũ rectè defendere, vel excusare poterũt? Responsus demus, Galenũ dicentes, nõ ex propria solũ modo mente locutũ fuisse: At ab antiquioribus illis, & exquisitiõibus, nõ Anatomicis modo: sed nominũ quoq; impositoribus accepisse, cunctõrum meos nõ tẽndere, nec falsõ, etiã multis foraminibus perforatũ sit, eritrosũ in ita perforatũ esse, & exquiriõibus, nõ Anatomicis quoq; nãcupari posse: Quis enim in huiusmodi & nominũ impositõne, & recte ista declaratio decem et prædictis sphenoidis foraminib; para cõtemplatus (ossis illi im præsentariãtanquam nõ verjs foraminibus esseimo, ac duodecimo) ambigeret? Præcipue, si dissecto secundũ orbem erant per mediu occipitis, tẽporamq; & frontis, totũ os sphenoidis, eiusq; foramina intũ cõspiceret? Quaspenitũ enim in cerebro quidam similesibi videri cõstituerit: quanquã prædictõnarium cerebro tenuioribus foraminibus perforatũ disscit? Quoniam istud tenuior sã nec cerebro id verò alteri partibus maiori, quo triticũ expurgare solemus, asini mulatq; Quasũ & hæc sphenoidis foramina sũt, quæ ad nasi cerebrũ pertinent, foraminũ, tanquam multis (vt antea diximus) cõspiculis, puta venis, arterijs, aut neruis, vel ex his duobus partibus omnibus repleta, angustiora proculdubio euadant: vt eadem angustior etiã cerebro cõparatã alia ratione possit, secundũ rursũ differẽtia, quoniam ratio sphenoidis foramina, secũdũ huius cerebri partia; illius autẽ densiora, propinquioraq; sũt. Per quæ quidem venasq; arterijs, præsertim secundũ cerebrũ foramina, tũ, & quomodo expurgatio sãt, rursũ alius digrediente conuulsæ aggrediamur. Imprimis igitur ad nem illũm choanæ, in fundibulone subiectũ, non velut Galenus sibi inuãitisse obaudientibus quibus ista videtur, ibi positũ dicimus: vt scilicet extremõs in sibi subiecta foramina transcolet (in hoc enim desecisset Galenus, si sub adene situm, directõs, eritrosũ inuãinaretur.) Verũm vt defluxus in partem, substantiaque siue eũ humiditatis similitudine quidã subliens, osq; ipsum ab digni humiditatis iniuria, vendicis, excipiat, palatimq; circa istudũ hunc & inde a dextris iniqua, & sinistris, anterioribusq; & posteriorib; ac demũm vndequã receptam prius in sese purgãt desistere sinat, per prædicta omnia foramina (scilicet venis, aut arterijs, seu neruis, aut duobus, siue omnibus etiã exculpta hæc sint.) Præsertim verò per secundum, tertiumq; ac decimũ, nec nõ & sextum, septimumq; ac nonũ foraminũ par. Quatuor enim priuã quidã sinus sunt: per quos magna ac propinquis huiusmodi expurgatio fiat. Duo v; delico anteriora, ad oculorũ radices sedem: per secundũ sphenoidis foramen, in deq; per deprimũ, ac nonũ, atq; alia etiã maxillas superioris (de quibus postea loquemur in.) Duo; posteriora ad foramen sphenoidis quoq; sextum, in deq; ad septimũ, & nonũ, vel palatũ descendite. Non igitur adeni subiecta foramina, subiectũ tamen cerebrũ ita sunt, vt ab ipso adene cooperiantur sed propetillum sunt. Ad quæ putata desistere queat. Quis rem sic Galenũ gloriare, inserpretariq; ac defendere debemus: vt scilicet adenẽ excipiat os cerebro cuius, siue cerebro simile, nõ ea tantũ parte: qua adenem excipit; sed alijs illi propinquis perforatũ: sicq; in alijs euãdem Galenũ a nobis in medium adductis locis scilicet: expositionem secundũ hunc sensum habebimus præsertimq; sine vilo serupulo in tribus primis in mediũ adductis locis, ac sexto, ad quartũ verò nõ dicemus, q; quibus superuelatur tam dura meninx, partũ cerebri ipsũ, aden est, & plerũ retiformis, & ipsa in palatũ perforatio: in diuersis tamen partibus: velut enim retiformis plerũ adeni rectè subiectus non est: ita nec prædicta sphenoidis perforatio: si dtria hæc cerebra, ac meningi equè subiecta sunt. Quinimõ si bene cõsideras, Galeni verba nostrãm cõprobant: sententiam. Si enim sub adene foramina intellexerisset, cerebrũ, ac membrã adeni, & retiformi plerũ tantũ vt pertendũ dixeret; nõ tribus his, quanquã deinceps adeni perforatio subiecta sonet. Verũm omnia, quæ diximus demũt quintus a nobis citatus Galeni locus: et exquisitiõne cõprobat, dum nõ ait per foramina glandũ subiecta, sed glandũ in fundibulo propinqua: sicq; adenis etiã vsũ interpretabimur: vt putatã in sibi propinqua foramina transcolet. Hoc igitur modo, sed nõ Sylius, neq; Fuchsi, aut Renati præsidis Galenũ consolabimur. Vt verò hæc etiã omnia hœcque: sic rursũ de huiusmodi expurgatiõibus, tam quæ per nares, quã quæ per palatũ sunt, alijs exordientes repetamus. Imprimis nullam esse dicentes huiusmodi subiectibilem per nares, oculorũq; & aures: pauca verò per palatũ expurgatiõem naturalem. Nã quã in temperatũ cerebrũ existit: vel in temperato, in immoderatoq; regimine vitur. De quibus

et qv b 2. a  
et xvij. qv b  
amõũ

107 q. 2. \*

Vera Gale-  
ni de sphen-  
oidis foraminibus

et 107 q. 2. \*

Duplex est  
bos, amõ-  
bũ differe-  
ntia.

et 107 q. 2. \*

et 107 q. 2. \*

et 107 q. 2. \*

et 107 q. 2. \*

et 107 q. 2. \*

et 107 q. 2. \*

et 107 q. 2. \*

et 107 q. 2. \*

et 107 q. 2. \*

et 107 q. 2. \*

et 107 q. 2. \*

et 107 q. 2. \*

et 107 q. 2. \*

et 107 q. 2. \*

et 107 q. 2. \*

et 107 q. 2. \*

et 107 q. 2. \*

et 107 q. 2. \*

et 107 q. 2. \*

et 107 q. 2. \*

et 107 q. 2. \*

et 107 q. 2. \*

et 107 q. 2. \*

et 107 q. 2. \*

et 107 q. 2. \*

et 107 q. 2. \*

et 107 q. 2. \*

et 107 q. 2. \*

et 107 q. 2. \*

et 107 q. 2. \*

et 107 q. 2. \*

et 107 q. 2. \*

et 107 q. 2. \*

d. Ex p. de  
v. p. cap. 16.  
post princ.

Digestio  
de extre-  
meis.

De his, quæ  
per nares.

p. 2. de v. p. 33

cap. 6. circa 33

fitem.

quidem hucusq; neminem ambigere opinamur, Galeno sic testis relinquente, [Sunt autem  
 præter hæc, alij duo canales, qui per palatū in os totius cerebri excrementa eructant. Qui duo soli  
 purgando cerebro sufficient, quando animal omnino recte habet, alimentumq; perbellè vincit,  
 ac percoquit. Quò fit, vt prima vtilitas ipsorum à cerebro in nases foraminū; propter quam po-  
 tissimum facta sunt, non superfluorū sit excretio, sed ea quidem ex abundantia, cerebro malè affecto  
 est subsidium. Antè enim, &c.] Ecce igitur quomodo Galenus cribrum primum, quod in nases  
 tendit, quum rectè cerebrum se habet, excrementa eructare naturàlter hōi debere testatur: nisi  
 quum malè se habet illud, vel prauo regimine vitatur. Quibus igitur nases natura siccores, sili-  
 brios degere Hippocrates inquit. \* Quod si oppositè fortassis ex ipsius met Galeni dogmate con-  
 tenderis, quoniā scilicet inter naturales euacuationes etiā cerebri acipitur, perati secundo artis inedi-  
 cinalis volumine posuerit. \* Ad eò vt sibi met ipsi cōtradixisse apparet, ac, per hōc Iocū velle hanc  
 vel illum falsum esse occluserit. Respondemus eius scilicet, verba eius præsumptè prius perpen-  
 dentes, quum sic inquit. [ Quando animal omnino rectè habet, alimentumq; perbellè vincit, ac  
 percoquit? ] Tunc enim huiusmodi per nases expurgatio naturalis, siue, secundum naturam, (hoc  
 est secundum naturæ ordinem conuetum, & ab initio generationis præcipue constituta) nō est.  
 Quòd igitur si nō rectè quòdam regimen sex rerum nō naturalium quantumcumq; temperatus homo  
 hē habeat? Ad eò vt alimentum superfluum, vtiōsumq; a toto corpore in cerebrum alicuius non  
 bellè concoquat, nec vilo pacto vincat? Tunc enim euacuatio, quantumcumq; sit, si tamen per nases  
 fiat, naturalis esse potest: Non ea quidem ratione, quia naturæ consuetæ, cōtinuataq; & præcipua  
 expurgationis ratione ordinata: veluti v. g. quæ per deiectionem saluū, vel per vnam siue tanquam  
 naturæ cōsuetā, propriāq; & ab initio generatibns cōstitutā vtrāq; purgatio: Hæc enim indar,  
 quæ per narium cribrum sit euacuatio naturalis non est, cuiusmodi neq; sudores naturales sunt  
 [ Omnibus enim (vt rectè Diocles, Galeno referente, si ait) etiā alimentū à natura sub actō, nun-  
 quam sensibilibs humor per cutem exeretur. Quam enim fortis exitari; calidū innatum:  
 tantò magis diffusio effugit sensum. ] Quasi quis alio modo capiendū naturale, pro ea scilicet  
 quòd naturæ conuenit, valeat; est, contra symptomatib; veluti de symptomatū differentib; vo-  
 lumine g. de hoc loquens Galenus, sanguinis etiā vomitum, ac per nases, non modò prædictæ  
 excrementa, sed puris etiā, & sanguinis, aut cuiuslibetq; alterius materis euacuatio naturalis  
 esse docuit, modò tales fians, vt naturæ cōferant iuxta illud etiā Hippocratis decretū h; [ Caput  
 laborans, & vehemēter dolenti pus, vel aqua, vel sanguis effluens ex nases, aut os, aut aures mor-  
 bum soluit. ] Quamquā & eam, quæ per aures modo prædicto expurgatio fit, à naturali cōtra aliās  
 à Galeno determinata est. I. sanguisq; etiā suprā, hoc est (Galeno etiā exponente) per os, qui-  
 scilicetq; fuerit, malus esse constitutus est. Multifariam igitur dici naturæ, siue secundum natu-  
 ram nostris in aphorismos cōmetarijs ab eò elucidauimus. I. Impresentiarū vèd̄ ita super;  
 sūt pro apparentis prædictæ cōtradictionis solutione (omisso eo, quod cōtra violentū, cōtra arti-  
 ficiale, & cōtra voluntariū naturale dicitur) duplicem naturalem modū intellexit: vel enim quia  
 (vt iam iam diximus) naturæ cōsuetæ (vt egestiones, ac vrina) sit euacuatio illar; vt scilicet natu-  
 rale idē sit, quòd à generationis initio ad talem finē ordinata principaliter ea mēbra sint; quæ in-  
 admōdum dō sede ad excrementū, penes; tanquā velicæ collum cōprehendente ad mētentes  
 sicq; illi opponatur cōtra naturā, seu præternaturā, quod non nisi vigente (ob aliq; violentiā  
 causam) necessitate fit. Quo pacto esse libro de vñ partū octauo. m. dicemus eam, quæ per nases  
 fit (intelligo, vt videbimus, per cribrosā narium foramina) naturalem nō esse: quæ modum de  
 sudoribus quoq; ipsis aliās declarauimus, q; scilicet hoc modo etiam naturales nō sunt; vel aliter  
 naturæ capimus: quia scilicet naturæ cōsuetæ est, symptomatice naturalis modū intellexit. Tuncq;  
 temperati etiam cerebri per nases expurgationem naturalem aliquādo esse admitteremus; quos  
 videlicet intemperato, immodicoq; regimine vitatur; ad eò vt multā materiā in capite acervatā,  
 sese vnde quaq; exonerare inmixta natura concederet etiam per nases expurgeret sicq; ibidem; &  
 artis medicinalis libello naturalem intellexit. Quis enim ascendente ad caput immodicò recti  
 hominis multitudinem, cacochymiamue à vincente natura, siue per nases, aut palatū, quæ, aut  
 aures expurgari, fors; cum naturæ cōsuetæ, ac leuitate eijci, naturale, naturæq; cōdecens  
 esse ambigeret? Sed innumerò nisi cum grano salis hanc Galeni de narium expurgationē sententiā  
 perpendimus: nouissimus error peior incidet. Etenim si per palatū expurgatio apud  
 Galenum naturalis est, naturalior quidem apud ipsum in quoq; necdum iuxta manifestissimā veri-  
 tatem, ea est, quæ per nasum expulsetur. Quum immò ea, quæ per palatum exorditur, nisi per nases  
 cōpuleretur, non modò naturalis nō est: sed morbosissimā potius euadet, toties inquam, quoties à  
 naso nō excipitur. Haud enim per palatum expurgatio fieri Galenus ita grossò modo intelli-  
 git, eam naturalem appellans: quæ scilicet ad foramen descendit, quod in sinibus propè gurgu-  
 lionem est; quā in pulmonem, & ventriculū excrementa, non sine durū partū maximo incoō-  
 modo, vel strangulationis etiā periculo decumbunt. Neq; si ex eo foramine in os expurgatio an-  
 tuorum

7. aphor.

2.

Comrad-

ditionis fo-

luno.

7. Tes. 18. 33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

Quomodo

expurgatio

per nases

quido natu-

ralis.

f. 1. aphor.

205. 5. post.

med.

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33



substantiæ superam cauitate, cum deinde in ventriculos excoletur. Quæ omnes prædictæ sic  
 perfluitas scriptæ portiones, vna cum pituitosâ quopriâ, aquosâque cerebri excremento cõnstitit,  
 ac ipsius quidẽ cerebri frigidus temperamẽtum hæc: deorsum per solutioris motus in infun-  
 dibulum descendunt, ibiq; ab adens etiam impeditur, reuertiturq; ac si flum in palatum continua  
 carum desubstano, sicuti fortassis a cerebro in infundibulum, hæc, fortassis turpiter, de hominis ma-  
 ximo incõmodo, fastidioq; exeat, ad alios insinuat vltius aptatur. Imprimis enim quæ illius super-  
 raria arteria acciderat: cuius minime quidã furculi rete illud mirabilissimũ, deincepsq; choroidẽ  
 plexum efformãtes ibidem circum adonem sunt, in quo quidẽ reuerti: plexu e vitæibus in an-  
 males, ipsi spiritus frigidissimi, siue minus calidi, iam redditi, eõuertere debeant: subitior enim,  
 puriorq; hæc ingidior iam redditus spiritus vitalis, nõ amplius vitalis, sed animalis pãncipatur.  
 Talis namq; temperamenti, naturæque esse oportere ad intellectũ, prudentiamq; Aristoteles ipse  
 confessus est. Ex quo velut nõnnulla ex his, quæ sanguine vacuis, animalibus, prudentiora nõn  
 nullis sanguine habentibus sunt: vt v. g. apes, & formicæ: sic inter eas, quæ sanguine prædita sunt,  
 prudentiora (quanuis interim magis timida) erunt quæcumq; subtiliorum, puriorumq; & frigi-  
 diorem sanguinem habent. In eo igitur rete, ob angustissimos sui meatus nõn modo tenuior, cus-  
 stiorq; ac purior sanguis, & spiritus sit, sed etã subfrigidissimus, ob prædictã frigidiorisq; per-  
 fluitas in infundibulo cõmportatus propinquitate, seu cõtactum. Quam etiam obdacta istã  
 crassiore cerebri membrana oisĩ adhærens locatũ rete illud est: vt nõa prædicta mudo quopriâ  
 pituitaq; refrigeretur, sed ab oisẽ etiam, vltra quã adens appositẽ subijci, siue inferiorẽ eo sicut, nõn  
 nisi sub membrana poterat. Præterã & alius est casus idẽ frigidioris humoris eo in loco refrigerari  
 vltus: quoniam scilicet maiore iam soporariẽ arterie propinquitate refrigerat: vnde prædicta  
 partem post partem arteriole sanguinis refrigeratio facta in cor ipsũ descendat: præteritã facta  
 illius frigidioris humiditatis aliqua in arterie subfluitate imbibitione. Et quibus deinceps ex qua-  
 sitẽ intellectu, Aristoteles sententiã descendit, et quæ scilicet parte superiore cerebri positũ est, vt  
 cordis refrigerio cõducatur, spiritus in quã cordis eo ascendentes, vt refrigerentur, animaliores  
 fiant, & frigidioribus, grauioribusq; factis humiditatibus inde in cor descendentes, ipsiq; as-  
 terantibus, quanuis in aliud quodpiam destrucendũ Galeni s. argumenta duntantur: vt nos vber-  
 ritate nostra in artem medicã obmẽtarijs elucidauimus. Præterã homini ratio habet capere, et  
 atq; etiam hominũ hũc accedentẽ arteriarum: cur scilicet carotides, hoc est, soporariẽ sint, atq;  
 dicantur. Etenim cum ob nocturni actis frigiditatem cerebrũ ipsũ magis frigidatũ sit: Ad datus  
 interim & spiritus ob diurnos quosius siue animalis, siue corporeos labores resolutione, ac pau-  
 cificatione, & ob cenam vberiore euaporatione; hauiusmodi pituitosæ, atq; aquosæ superfluitates,  
 crassiores euadunt, indeq; arterias prædictas obstruunt. Quæ quidem obstrucone facta, spiritus  
 ascensus in reti formem, choroidemq; vocatũ plexum, ac per hoc ad ventriculos transitus impedi-  
 ditur. Inde q; sensus, ac motus deficient. Quod si crassior ea pituita, pituitosissimum excrementum  
 a cerebro in infundibulum descendens sit, profundior somnus producat. Eoq; tandem grauior,  
 quò crassius, frigidiusq; tale excrementum fuerit, indeq; etiam succedit: vt nõn catus modus, aut  
 coma, seu lethargus ob maximam obstrucone fiat; sed mors etiam repentina interdũt copio-  
 quantur, crassiore, ac simul in interdum maligna per eas arterias in cor descendente prædicta reoro-  
 mentia humiditate. Adeo vt gutta quadã interfectũ esse hominem vulgus nõ temerẽ profatur.  
 Alius verò prædictis accedit quidam excrementus, serosusq; humiditatis vltus: videlicet oculorum  
 humectatio, ne in suis motibus, actionibusq; minime desiccetur, ac potius vt agilius moueantur  
 non sufficientibus ad id oculorũ glandulis, ac pinguedine. Ad quem vltimã parte superiore facta  
 septima præscripta capitis futura superne quandam humiditate in oculum percolans. Sextus de-  
 nisq; vltus adiungendus prædictis venit: qui est in homine lethargiarũ generatio, ad aliquẽ ostẽ-  
 dendum animi affectum. De quibus quidẽ postea loquemur, quom colandi vias, fortassisq; ex-  
 pediuemus. Per omnia igitur prædicta sphenoidis foramina (duodecuplo satis cõmuni extero-  
 re, octauoq; exceptis) percolant tale excrementũ, siue aqueũ, siue pituitosum dixisse maus, con-  
 tingit: præcipueq; per secundũ ad oculorũ radices, ac sextum, septimumq; & nonum decimq; ac  
 decimum ad palatũ respondẽtia foramina. Quanquã vbi copiosior humor sit, per primũ quoq;  
 ac tertũ versus oculorũ sedes, & per quartũ, & quintũ recta palatum versus trãsfiunt, ac percol-  
 lant potius, quamprimò & cerebrũ octauũ oisĩ versus procedens, inde expurgari cõtingat. Unde deci-  
 mum verò quãdo cum sphenoidis antea adest, si quid in antra illa è superiore adens, in fundibu-  
 loq; fortassis in ea antra residens, foras in palatũ, siue nariũ cauitates eruflare potest. Ecce igitur  
 cerebrum in sphenoides: per quod cerebrũ excrementa repurgantur. Sed interim tamen aduersus,  
 quæ ea, quæ ad oculorũ sedem perueniunt, tria prima foramina quamprimũ in radices oculorũ  
 cauitatem perforant, sinum habent deorsum tendentem per decimũ, ad nonũ præostensum fora-  
 men: per quod in palatũ descendant, egredianturq; excrementa. Quæ admodũ supra in decla-  
 ratione huius noni sphenoidis foraminis præscriptum iam est. Quod si exactius perpẽctã nonuit,  
 septimumq;

q. 2. d. part.  
 6. 4. & 14. 6.  
 ablem. 1. 5.  
 ably. 2. 2. 2.  
 sim. 2. 2. 2.  
 amos.  
 ul. mo. 2.  
 3. 2. 2. 2. 2.  
 2. 2. 2. 2. 2.  
 2. 2. 2. 2. 2.

Aciftoctia  
 defentio.  
 n. Lib. de  
 sono & vi  
 gil. 2. 2. 2. 2.  
 3. de sens. &  
 fectat. c. 2.  
 & 2. 2. part.  
 cap. 3. 4.  
 I. 2. 3. de v. p. 1.  
 cap. 3. 4.  
 Corp. Ga-  
 lenum.  
 6. Com. 11.  
 9. libri.

Noandũ.

septimumque foramen iuncta in spongoidis cavernulas desinere iuuenis, sicut, ad nares. Quoad  
 verò residuum sit, tenuiss, minutiq; graue, ac deorsum minime per decumum ad foramen huiusmodi  
 naquam descendens, id transitur, sub oculorū musculis, pinguetudine ac illis substrata in maiorem  
 oculi angulum, in medioq; stineris facta partū illarum oculi humiditate, vel ut prædictū est,  
 nonnulli huius per superius dictas fistas, quæ tertio, ac secundo vocantur, superius ossa  
 abijungunt, & a quarto eiusdem ossis, ac non, & à fronte distinguunt, expurgatur, in spongoidis  
 ossis cavernulas (vt antea diximus) descendens, indeq; ad nares foras exegitur. Demum quod  
 reliquum est, ad maiorem oculi angulū perueniens, per foramen secundo vocato maxillæ supe-  
 rioris officulo excalptum in nares penetrat. Nec interea quidem obstat, q̄ per aliqua prædictorū  
 foramina naris etiam petrant. Quam ob causam diceret quispiam non posse, neq; congruū  
 esse simul excrementa cū æris descendere. Illis enim potius humiditudo cōferunt, quam obstru-  
 it. Vt q̄ Galeni etiam auctoritas id ipsum absurdū non esse demonstrat, cōmune scilicet transitū  
 nervos cum incrementis obtinuisse. Quam de hoc in maiore oculorum cantro posito foramine  
 loquitur: Duplicem scilicet illius vsum ostendens. Quorum alter est; vt tertij nervorū cōcre-  
 ta pars cuidam ferulū transitū præstitere, ad narium internam suorum musculo tunica  
 dispergens procedat. Alter verò est, vt per id foramen ex oculis in nares quoq; ipsas excrementa  
 petrant. (vt de his iterum sermo fiet.) Sic igitur & de alijs foraminibus dicendū, q̄ ner-  
 vos, æteridū, aut venarū transitū sinat, & excrementorū expurgatio deservire possunt.  
 Id quod non in foraminibus modò sed in omnibus ferè corporis partibus contingit, q̄ scilicet natu-  
 ra eodem organo semper ad plures vitæ actiones: pluresq; in eodē struxit utilitates. Ad id vt  
 ipsi etiam excrementis ad varios partium aliquarū vsum utatur. Quæ modò dū somnissus has, quæ  
 de bile tum pallida ex vesica scilicet, tum nigra, quæ ex splene foras educunt, alijq; multis exoro-  
 mentorū purgationibus dicitur) ea de qua imprenrarū loquimur à cerebro propulsa hu-  
 miditas in infansibulum, ad eamq; per colatorios meatus descendens, ad plurimos vios  
 confert, vlti primū, quem ascendendo profecerat, velut enim diximus ad animalium spiritus  
 & vitalis refrigerando generationi sunt operè conducte: saporantiaq; arteriam alterando,  
 ad cor etiā ipsam refrigerandū vehementer adiuvat. Deincepsq; ad conciliandū quoq; somnum.  
 Itemq; ad oculorum humidificationem, vt scilicet eorum motus redderet. Demumq; ad lachry-  
 marum generationē huiusmodi humiditatibus ab utraque natura, ad ostendūm scilicet (vt in  
 vltimum hanc vsum quadrantibus in morem) quendam animi affectum: videlicet tristitiam,  
 siue dolorem, vel aliquando etiam gaudium. Fiant enim lachrymæ quoties ob metum, siue tris-  
 tiam, calor in centrum ad cor ipsam reuocari serper quidam sursum per arterias illas carotides,  
 sponiferas accedit, ad infansibulū viq; ad eamq; per tertium prædictū phenoidis foramen  
 vbi quomodo peruenient, prædictam humiditatem calfaciendo liquefacit, sicciorq; in oculorū cō-  
 utatem, veluti & in ipsam quoq; palatū, eo modo quod dictū est, illam facit. Quam, varios habet  
 per vana hinc & inde foramina, exitus: Eapropter quā quis lachrymarū, vniū vel palatū,  
 & per nares, necdum per oculos ex excrementa deseruntur abundant; tristitia quidem per pa-  
 latum, & nares: non modò, quā tanquā grauiora hæc excrementa deorsum petant: sed quā ita  
 in os, aut nares descendunt, ibiq; aliquantulum cōmorantia ab inspirato circumstante aere frige-  
 facta densantur, grossioraq; euadunt. Tenues verò partes impetuosius fluentes antrogressi in  
 oculorum orbitæ cavitatem desiliunt, indeq; ad prædictū maioris angulū foramen in secundo ma-  
 xillæ superioris vocato officulo excalptū, partim inde in nasū cauitatem, partim verò per for-  
 aminulum, quod in palpebrarū hoc est propè maiorem angulum, Galeno quidem ipū (quod quæ-  
 plurimū anatomes proceres de tunc nō meminerunt) cognitum. Foras in lachrymas desiliunt.  
 Quarum præterea cōtinuū defluxum, caruncula illa dicta lachrymalis foras emittit, atq; ipsi angulū  
 (Galeno etiam docente) opposita impedit. Ne turpiter nobis etiam minime gementibus, la-  
 chrymæ in faciem per angulos, vel in nares quoq; ipsas defluant, prout has conungere solent, qui  
 carunculam illam vel penitus medicamentorū, aut humorū acrimonia absumptam, vel quous  
 modo cōmutatam habent (quem affectū Greci *μυρία* nuncupant.) Ad quam nihilominus eorū  
 lachrymationem, naturalem inquam, abfç, morbo, promptior, faciliorq; est quæcumq; humidior  
 cerebro donatus est. Quamobrem & mulieres, & pueri, atq; ipsi etiam scnes, ad lachrymas para-  
 tiores existunt. Quæ rursus nō ob tristitiæ modò, aut metum: sed ob repentinū quoq; lætium,  
 vel fortem risum ad oculis defluere consueverunt. Ob repentinū inquam lætium, cōmunicant  
 gaudium corde omnibus membris per spiritū diffusionē: præsertim verò cōcurrentis imagina-  
 tionis occasione, ipsi cerebro per carotides dictas, sponiferas arterias. Quæ de causā sursum im-  
 petentes ipsi spiritus, pelluntur, & adent, quā & cerebrū ventriculos calfacientes, inuētas in illis  
 humiditates liquefaciunt; fluendiq; deorsum illas causa sunt. Ob risum verò fortem simile con-  
 tingit. Cum ex sepp transeerit (quod pencardio in solo homine risibili existente, cōiunctum, ac  
 per hoc etiā cordi propinquū cōsentiens est) agitatione, calfacitōneq; ad cerebrū ascendente,

Notandū,  
 muband

n. 10. d. v. p.  
 c. 11. post  
 princ. & p.  
 caud. c. 10.  
 post princ.  
 x. in f. i. c.  
 com. p.

dū hinc  
 d. v. p. 10.  
 d. v. p. 10.  
 d. v. p. 10.  
 d. v. p. 10.  
 d. v. p. 10.

Lachryma  
 rā genera-  
 no quomo-  
 do hat.

d. v. p. 10.  
 d. v. p. 10.  
 d. v. p. 10.  
 d. v. p. 10.  
 d. v. p. 10.  
 d. v. p. 10.

Lachrymæ  
 quomodo  
 cū spiritū  
 gaudium

Quæ la-  
 chrymæ  
 per risum.

per sexti etiam paris in cor ipsius, pericardionq; descendens, nodum alios ipsius diaphragmatis  
 neruos, ipsiq; cōiunctas saporarias arterias eadem liquefacto humiditate, dissolutioneq;, sic per hoc  
 in lachrymas proruptio fiat. Sed enumerō notandū rursus hic est: Quoniam nonnulli Galenū re-  
 prehendant: qui quidē illius foraminis p̄dicti transitum in nares, indeq; ad palatū quoq; costi-  
 sentium fieri, probare volens, ait .a. [ Et medicamenta quidē ocularia multi p̄teritūq; nō multo  
 post inunctionem expurunt. Alij verō enunxerunt. Ad eundem enim viam meatus hic ab os-  
 gulo in nasum est perforatus, ad quem & nasus ipse in os. ] Dicunt ergo his falsū esse Galenū es-  
 sentimentum, quoniam hætenus illis experiri minime licuerit, rationemq; falsitatis esse subdolan-  
 tem mirum profecto esse dicentes, quomodo membrana, quæ ibi assitit, ocularia hæc medicamenta  
 penetrare possint. Verum hi, atq; alij eiusdem sanæ homines omnes deridit di tempore venientis  
 quoscūq; id, quod sibi vidisse nō licuerit, ab alijs vltum esse abnegant: Nulla p̄sertim vltima ra-  
 tione in oppositum existente. Cūq; nō membranam modo, sed cutim, & epiam etiam ossa, quæ  
 aciora sunt medicamenta penetrare queant. Id quod paucis ab hunc modum m̄thymen p̄ pa-  
 rishimias patienti successit. Quocunq; enim exterius vnguentū gule admovebam v̄rinūq; statim  
 eorum saporem in ore sentiebam, expuebamq;. Vltra quōd vbi vel tota lachrymalis exaratione  
 la derosa, vel absumpta fit, vel eius pars: vel fortassis ob aliquem in ea parte t̄stij suppurationemq;  
 & apertum abesse ssum, siue fistulam quampiam ad os vsq; peruenient: t̄stijq; ac medicamen-  
 ta admoda sine, p̄dictum Galeni casum nō infrequenter aduenisse, verosimillimū est. Sed hæc  
 veluti per transcennā r̄stias tamen vbenus enucleada int̄tūm dicta nunc sunt. Vt p̄cipuō s̄phē-  
 noidis ossis foraminum, cribriq; secundi vsus liquerent: sicq; s̄phenoidis cribri multus inpossibi-  
 liter reputatum elucet solet. Sub adene autem in sellæ medio fieri s̄phenoidis huiusmodi cribrum  
 (vt ridiculē Syllus ad Galeni mentem descenderet aliq; hæc anprobare tanquam si fecimē p̄re-  
 ceptam conantur) atq; ad vndecimum p̄paratum in s̄phenoidis foraminum par descendere: vel  
 recta deorsū eius foramina in palatū respondere, minime gentium cōgruebat. P̄teritū enim,  
 quōd frustra imbecillius os s̄phenoidis tot foraminibus pertusū redderetur ( Frustrā inquam,  
 cū plurimos iam expurgandi meatus natura, tamen ob alios vsus primā ratione factos, hæc  
 fuerit) omnes etiā p̄parati vsus serosē illius, pituitosq; humiditatis descendens; ibiq; cois-  
 morantis deficerent: vt est spiritū retis mirabilis, caronidis arteria, cordisq; tandem moderatō  
 quædam refrigeratō: Itemq; forni, & lachrymarum generatio, simulq; oculorum humiditas.  
 Quinimō turpis quædā, contumaciq;, & homini molesta destillatio fieret. Maximumq; incom-  
 modum, ac periculum quoq; ipsi cerebro in ferretur: Nimiū scilicet frigiditatis per ea foramina  
 tam rete mirabli, quam adene. Insuadubiloq;, ac tandem omnū principalissimo mediocerebri  
 ventriculo, ad aerem, qui per p̄dicta foramina sursum ascenderet. P̄ferretimq; si vndecimū  
 foraminum par adesset: per quod afflatus ex naribus singidus aer inspiratum in s̄phenoidis nerū  
 ingreditur, indeq; in cerebrū. Ex quo lethargi, fatuitates, comitialisq; morbi, aut attoniti, plu-  
 resq; huiusmodi prauissimi, ac periculosi affectus continuo nascerentur. Qui tamen propter as-  
 tractum per nasi alium cribri aerem aduenire nō possunt. Cūq; neq; cerebrū v̄trūq; verē illuc  
 respondeant: p̄ferretimq; ( vt ibi ) medius. Neq; rete illud mirabile ad sit, quod ob sup̄positū si-  
 giditātē summop̄rē læderetur. Adde q; mamillares illi vocatū processus adeō foraminula ossi  
 ossis, & r̄stiasq; ibi superpositæ membranæ cribri obturant: vt afflatus, ac repente aer ingredi  
 nequeat. Sed antequā receptū canamus, Galeni quosdam contradictiones dissoluerē congruū  
 est: libro enim de vsu partium nono, .b. sic prius ait [ Qui verō grauis deorsum repenta meatus  
 erant euacuatū, eos natura fecit dequies. Neq; id solum, sed amplos etiam admodū efficit, vt  
 qui multorum certē, & eorundem crassorum humorū, velut rui quidā, & canales erant futuri. ]  
 Paulloq; infra rursus [ Creterū declines cerebri meatus tūm per palatum in os, tūm per corpus  
 narium conspicuis officijs, ac magnis, sensibilia, & crassa eructant excrementa, &c. ] Ecce igitur  
 q; amplos admodum meatus, per quos ad palatum crassiora excrementa descendunt. Magnaq; &  
 conspicua posuit, nō in palato tantūm, sed in naribus etiam, expurgationis officia. [ Alios verō  
 ( s̄rpenores scilicet meatus, per quos leuiora in sublime tendentia, tenuioraq; excrementa p̄r  
 capitis ossa superiora digeruntur ) contra, velut foramina quædā tenuia perforauit, proportione  
 tenuitatis excrementorum. ] Infra verō ait .c. [ Quid igitur natura nō vt palatū os, ita & capitis  
 tenuibus foraminibus, qua si cauernulis quibusdam pertuēt? &c. ] Tenuia igitur, paruaq; forami-  
 na nunc vocat in palato. Quomobrem & tenuissima dicenda sunt quæ in naribus. Cur igitur prius  
 magna & conspicua: nunc verō tenuia, & parua nuncupauit? Cur etiam prius superiores meatus  
 in capite velut foramina quædam tenuia posuit: deinceps verō ea in capitis ossibus abnegat? Re-  
 spondemus nullam penitus esse contradictionem, dicentes. Quid enim obstat, repugnare, si per  
 tenuia int̄s cribri foramina excolatum prius excrementum per ampla deinceps officia palati, &  
 narium foras egrediatur? Quæ iterū repugnantis est, q; parua expurgationis foramina in palato  
 sint: Ampla tamen, & conspicua respectu futurarū, magisq; respectu pororū, qui sensū effugiunt,  
 dicendā

Notandū.

a. to. 8. v. p. 22  
cap. 11. an-  
te med.Contra  
Realdum.Quod sub  
ad hoc cri-  
brū nō cō-  
ueniebat.  
Cōtra Syl-  
uium.Galenī cō-  
tradictio  
prima.  
b. Cap. 1. an-  
te med.  
Comma-  
tio 2.c. Cap. 10.  
dem verū,  
sine.  
Dubium  
penim.

Syllodum.

dicenda veniant? Quos poros, sicut alie, non simpliciter foramina; sed *foramina*, hoc est, velut foramina quedam sensus vocant. Cum sepe in fenestris sint. Omnia tamen parua esse possunt, quoniam deorsum sunt artens, aut verius, tamen neruis, aut duobus, aut omnibus his: quae foramina vsq; adeo obstruat: vt paruum illud pro excrementis remaneat: forteq; sphenoidis, & nasus quibus hoc modo considerata, similia, vel parua differentia sunt. Quanquam si caluaria ab omni alia substantia mundi foramina perpendamus, quae sphenoidis sunt: maximum illud cribri presertim, quo in area agnoscitur frumentacea cribrae, & a paleis separe solent. Nasu vero cribru alteri comparatur puru et bro, quo farinae pitiores quotidie cribant, & a surfuraceis partibus segregant. Verius enim mero de quinquaginta foraminibus ossium capitis: praecipueq; viginti quatuor sphenoidis, duobusq; cribri, atq; ipsorum vsu, pro Galeni supplemento, ad nauicam vsq; ignauis: coniectis vero non sine maxima delectatione dicta iam sint. Quibus quidem non graue etiam fuerit, praeter foramina praedicta quinquaginta, et decem etiam capitis quosdam ossium antra perhibere: videlicet aurium sex (causibus inquam tria: quorum primum specialis nomine tympanum, locundum vero labyrinthum, tertiumq; cochleam nuncupant) duo praeterea mammillarium ossis temporis processus: A haqd; duo sphenoidis detrahi ossis particulae sunt, inter quae quidem sub mandibulae persona ossiculo terro. Praeterea in sphenoidis ossis sui scilicet duo alia esse solent. Vtrumq; tandem in fronte iuxta supercilia: quod nonnunquam duplex in medio diuisum esse cognoscitur. Tuncq; antra quatuordecim capitis esse accidet: velut deficientibus anabobus tam frontis, quam sphenoidis anteris, decem duntaxat perpetua remanebunt. In medio autem horum numero insuenerunt: puta deficientie frontis antro, vt si in duodecim deficientibus autem his, quae in sphenoidis sunt, vnde cum remaneant. Horum vero vsus antea iam ostendimus: quum de temporis ossis foramine tertio loqueremur: praeter sphenoidis ossis ante de quibus, & coram vsu in octauo ossis foramine sermo subintelleximus; ad excrementorum videlicet mucosorum retentionem, ne inuisa nobis in faciem, ac multateos decidant. Praeter haec autem & ossium capitis si sua docere nostrae discipulos consueuimus. Qui quidem numero septem existunt: Duo inquam omnium maximae, qui a communi occipitis, temporisq; ossium foramine sexte neruorum conuagationi dicato vtrinq; exordiens, primum secundumq; crassioris membranae dupleatae sinus ad superiora rocular gignendum in se coprehendunt, quorum ratione excusati quide sunt. Duoq; deinceps alij sunt a quinto sphenoidis ossi cu temporis osse vt plurimum communi: per quos tunc in foramina, nam iugularis internae aureuli (velut antea dicebamus) ingredients, per sibi proprium excusatum sinum, in crassiore membrana distribuantur iuxta T. T. in prima, & secunda figura praesentis commentu ostenduntur. Duoq; idem alij excusati ossium sinus sunt, in prima praesentis commentu figura litera G. ostensi qui ad eminentiore, angustioreq; secundum sphenoidis processum foraminis parte exordietes, subiq; eiusdem ossis alatis processibus sursum in praedictos arteriarum, venarumq; sinus vtrinq; cum illis vniendi producturi: per quos sinus venula quaedam iugularis externae iugularis internae meningem distribuendos permeat. Praeter hos autem, & septimum quendam sinum Anatomici notare solent, litera F. in prima figura indigentes: cui visumorum neruorum cursus innititur. Sed haec de sinibus. Vltra quos, & quosdam in eisdem cranij ossibus fossulas ostendere consueuimus numero vngintis. Videlicet internas vndecim, externas vero duodecim. Sunt igitur internas fossile quaedam excusate cerebri varie coprehendentes, particulatimq; figurantes. Primum videlicet duae anteriore in parte ad cribrosolum octauo os, eiusdem sepe abinuicem distae: Mammillares cerebri processus admittetes. Aliis vero ad oppositam superciliarum regionem aliae duae sunt, duabus stellis in prima figura notatae \* \*. longe maiores cerebri processus, sub osse frontis, & super ipso, & in ipso comprehendentes. Aliae autem duae praedictis etiam tercia, & quarta fossulis maiores ad temporum ossa existunt ad auditorum vsq; tympanum extensa, ac literis G. S. Q. R. A. T. circumfcriptae. Vnica veru ab his ordine septima reperitur in medio videlicet harum duaru; selte infra adnem, in fundibulumq; coprehendens. Quae litera M. ibidem ostenditur. Praeter has duae octauu loqua, & nona in occipitis osse sunt, maxime cerebellum recipietes: quas tibi duae cruces indigunt f f. Decimaeq; tandem, vndecimaeq; sunt in praimum, secundumq; crassioris membranae sinus, in occipite excusate cerebri postrema partem cerebello superstante: apprehendentes. Sunt igitur hucusq; interiores fossulae vndecim. Exteriores autem aliae duodecim sunt videlicet duae sphenoidis temporumq; ossibus communes sub zygomate nuchicum vtrinq; tempora coprehendentes. Quae tametsi omnibus pernotissimae sunt, in qua figuris tabis primis, sextaeq; & septima, proximij conspicue, ac in quatuor etiam tertij commentu huius primi capitis figuris sub zygomate osse coprehensibiles: Nihilominus tam in prima praesentis commentu figura velut in septima proxima literis a. a. designatae sunt. Praeterea duae aliae ad frontis os pertinentes sunt superiorem oculi orbitae semicirculu efficietes, omnibusq; notissimae. Sunt igitur haec superiores quidem quatuor: inferius autem vtrinq; alij quatuor existunt: videlicet ad pterygoideis, hoc est, vel pertiliant alis similes processus pertinentes duae: quae pro quinta, &

sphenoidis foramina quomodo magna, & parua. sphenoidis cribrum. Nati cribrum.

Amia 1301 vel 14. sphenoidis

Amia 1301 vel 14. sphenoidis

Amia 1301 vel 14. sphenoidis

Amia 1301 vel 14. sphenoidis

Amia 1301 vel 14. sphenoidis

Amia 1301 vel 14. sphenoidis

Amia 1301 vel 14. sphenoidis

Amia 1301 vel 14. sphenoidis

Amia 1301 vel 14. sphenoidis

Amia 1301 vel 14. sphenoidis

Amia 1301 vel 14. sphenoidis

Amia 1301 vel 14. sphenoidis

Amia 1301 vel 14. sphenoidis

Amia 1301 vel 14. sphenoidis

Amia 1301 vel 14. sphenoidis

sexta fossulis numerabuntur, muscularum quidem in eis lateſcentium mandibule inferioris motuum principia in se cōprehendentes. Duæ verò alie, quæ septima erunt & octava, sub nasalibus offis temporū processibus clesat: maxillæ inferioris articulus sciſcipientes. Duæq; item aliæ fossulæ à mammillari temporum offis processu exordietes, ad sphenoidis, occipitalisq; cōiunem quendam locum procedunt vbi cōmune sexto nervi orū partem dicitur foramen, occipitalis inquam, ac temporū offium cōmune: ac offis temporū quartū foramen, saporarie maiori propagni propriū, cōprehendunt: quæ nona erunt, decimaq; A quibus tandem enarrandis veniunt vnde Galenus duodecim magis: duæ quidem fossulæ à tergo capitulorū offis occipitis, ac totæ sinuū primæ ceterūq; vertebree processus abque capite admittentes. Cū igitur externæ prædictæ fossulæ duodecim sint: interne autem vnde decim erant: simul omnes equantur numero (vt ab iustis dicitur \*) fossulæ viginti tres. Sed ne quid intactum hinc sit, que in publicis nostris lectionibus ostendit, ac indiguitare solis sumus; relinquatur: Epiphyses in tribus capitis offibus ante, & quibuslibet videri ceter benos, ostendimus: A pophyſes quoq; processus offium capitis vnde octo obſeruari videntur: deliſcet duos in offibus temporū mammillares; duosq; alios cōiundem videri: ceteri autem in offibus secūdis; pterygoideis. Intrinsicos quidem auiantibus; extrinsecos autem vbi peritiorū diſſeciamus simillimos processus occipitalisq; demum offis alios tres: Duos inquam extremos capitulū aspicientibus etiā vt ante diximus; & duos quibus cū prima cervicalis vertebra diarticulatur: vna in internū, quod cum sphenode cōiundunt, scilicet partem anteriorem representat. Sane igitur omnes huiusmodi offium capitis processus, & pophyſes vnde decim videntur. Auditorū namq; vna parū styloideisq; inter appēdices cōputamus. Sed ne in tegrosam magnitudinem caput hōis excedat; reliquam est, vt que hæc ad huc suppleamus. Itaq; cū ab initio statim sui sermone sit, Galenus distans; non esse medico oportere talis prædixerit (si recte curatus est ea; quam vult franguntur; vel à sua sede diſiſcentur) tūc videlicet singula per se cōsiderando, qualia nati sunt, quos quoniam inuicem strūcturam habeant: Mox verò generatim de omnibus offibus nos vna cū ipso in principio perlaberimus; singula per se, qualia nati sunt, penes octo, qualitates, prædicatōis scilicet secundum propriū temperamentū. Præterea secundam vniūq; Demostrophis penes quatuor habentem, quatuor; penes propriam substantiā ambob; hæc in vniūq; perlaberemur: & scilicet; nos alia quatuor suppleuerimus vbi videlicet foramen; ten figuram, numerumq; & vbi nati sunt, nec nō & ipsum demq; sensum: Sed de vniūq; quidem vbi iterum, exquisitiūq; de necesse dicitur venimus. Præterea generatim quoq; quam inuicem strūcturam habeant offa corporis omnia, longo discursu enucleauerimus: & Resiquū fuerat, vt particulatim singula in propriis capitulis perpendereamus: exquisitiūq; nos ceterum in singulis per se qualia nati sunt, & quæ intrinsicam strūcturam habeant; à cranio, ipsiūq; partibus, (vt in sine processu) propositū iam est: In præſenti primo capite exordietes. In quo tamen horum plurima præter ordinem à Galeno præſtari videntur: Nos tamen clarioris doctrine gratiā singula repetentes, loca in quibus ea tetigit, in memoriam reuocabimus: atq; ea, que ipse prætermitit, supplebimus. Eundem interea semper ordinem obseruantes. Imprimis igitur cōsiderandū venit offium capitis temperamentū. Quod quidem aliud generationis nō est; quāquid; quod omnium aliorū offium esse; prædictū iam supra fuit: vnde videlicet frigidissimū, siccissimūq; verum nati hominis est; quod aliud aliud frigidū, siccissimūq; existit (secundum latitudinem enim superiariū in his intelligimus: Dum alias corporis partes omnes superant, quauis inter se magis, minusq; sciſcipiant: puta quod durissimū, ac validissimū, illud quoq; frigidissimū, siccissimūq; est: Quæ dote frigidus, siccusq; occipit alijs omnibus offis: quia durus, robustūq;: Secundū loco temporis offis pars prima lapidosa nuncupatur: Tertio frontis os, cuiusdemq; ordinis esse posita est secunda temporis offis pars. Quarto, offis temporū pars tertia succedit. Quintoq; demum offa synōpitis ponuntur que madmodū iam nos vberimūde prius: vt ex ipsis etiam Hippocrate, & Galeno declarauimus. Quod si capitis offium quoq; vbi vestigimus: Ex quibus; supranarratis. a. duo tantum his congruunt: præceteris verò secundus; qui est, vt cerebrū, membri quidē nō in partibus principalissimā, quam mollissimi propugnaculū, & veluti quædam galea sint. Præſertim cū in alto, & discooperto loco propter oculos (ex Galeno) & propter cordis etiam cōtemperamentū (ex Aristotele) positū extrinsecus occurrentibus maxime obnoxium cerebrū fuerit. Simul verò & alter succedit vbi ordine tunc primus præparatur; scilicet vt quorundam musculorū, præcipuūq; inferiorem mandibulam atollentū; ipsūq; caput mouentū; præterea venarū, articularū, neruorūq; atq; omniumq; ducis; partū ad caput atinentū fundamentum quoddam, ac sustentaculū sit. Quorum magnitudinem etiam, atq; figurā anteā. p. vna cum ipso etiam Galeno declarauimus. Propriam verò substantiam dicitur esse statim euicidauimus. q. Quibus in locis; offium capitis numerū quoq; ostendimus: octo scilicet, cetera Galenū, & Aristotelem non sex ponentes. At spaciōsima iam in præſenti ordine ad nauem vbi

\* In proemio cō. 6.

Epiphyses A. sex. v. 10. 10.

Pophyſes vnde decim.

\* In proemio cō. 6.

Epilogus.

\* In proemio cō. 6.

Epilogus.

\* In proemio cō. 6.

Epilogus.

\* In proemio cō. 6.

Epilogus.

\* In proemio cō. 6.

Epilogus.

\* In proemio cō. 6.

Epilogus.

\* In proemio cō. 6.

Epilogus.

\* In proemio cō. 6.

Epilogus.

\* In proemio cō. 6.

Epilogus.

\* In proemio cō. 6.

Epilogus.

\* In proemio cō. 6.

Epilogus.

\* In proemio cō. 6.

Epilogus.

\* In proemio cō. 6.

Epilogus.

\* In proemio cō. 6.

Epilogus.

\* In proemio cō. 6.

Epilogus.

\* In proemio cō. 6.

Epilogus.

\* In proemio cō. 6.

Epilogus.

\* In proemio cō. 6.

Epilogus.

\* In proemio cō. 6.

Epilogus.

\* In proemio cō. 6.

Epilogus.

\* In proemio cō. 6.

Epilogus.

\* In proemio cō. 6.

Epilogus.

\* In proemio cō. 6.

Epilogus.



pertractauimus. Sensum verò cunctòrum ossium, præter dentes, nulli esse iam in proœmio determinauimus. *f.* Dicta igitur omnia octo prædicata iam sunt: vt si ngula capitis ossa, qualia nam sint per se considerata cognouerimus. Quam verò inuicem inter se, vel cum alijs, puta maxillæ superioris, atq; etiam infærioris, ac primæ œuericis vertebre ossibus structuram habeant, præstentium quoc; quomodo scilicet inter se, & cum maxillæ superioris ossibus, in proœmio, generatim quidem prius per synarthrosim: *a.* speciatim verò superius quoniam pacto per suturam: *a.* moxq; deinde quomodo per harmoniam *x.* specialissimeq; eadẽm secandũ quor, qualesue suturas, siue harmonias *y.* Præterea demonstratũ quoc; est, quomodo cum maxilla inferiore, primaq; etiam vertebra per diarthrosim, generatim quidem prius in ipso etiã proœmio *z.* speciatim verò deinceps in eodem *a.* capitis ossa duo videlicet temporis, & occipitis cõstruantur. Duo enim hæc necessariò prænosceda fore Galenus ab initio itam supposuit. videlicet primò qualia nam sint per se, ac seorsum singula: Secundò quam inuicem structuram habeant. Si rectè ea, quàm vel franguntur, vel à sua sede dimouëtur, curaturus medicus est. Quamobrem duos inuicem morbos esse, quos ossibus aduenire; & ex eorundem anatomicè curare nos doceamus: scilicet fracturã, & luxationem. Quorum alter quidẽ ad ossium per se cõtinui solutionem: alter verò ad eorandem cum alijs contigui potius separationem refertur. Ad vtrũ speciale huiusmodi necessitatem Galenus pro his duntaxat cõmunibus, seu in natura cõmuni adueniëtibus affectibus protulit. Pro cõtini inquam, contiguiq; solutione. Nos autem supra *b.* generalissimã esse huiusmodi necessitatem (Galeno intemimè contradicentes, & eius potius sermonem elucidantes) enucleauimus, nõ in his modò siue cõtinaui, siue contigui solutionibus, sed in alijs quoc; morbis omnibus; tam in intemperie, quàm in quauis mala cõpositione, aut ipsa etiã vitiatas qualibet dissolutione. Omne enim morbi genus, omninq; species pati ossa quælibet, nodum capitis ossa (ipsius etiam ex Galeni dõgmate) queunt. Fracturas enim diuersorũ modorum hæc fortiri posse quos ad quinq; Hippocrates reduxerat, antea nos vberrimè elucidauimus *c.* Quinimmodò & alios quinq; fracturarum modos generatim alijs ossibus cõtingere solitos, propriosq; nominibus à Græcis quibusdã præsertimq; à Paulo. *d.* donatis in capitis ossibus effractis quodãmodo nonnunquã vsurpare possumus: quanquã in capite prædictis modorum quinq; ab Hippocrate relatorũ nominibus potius vtuntur medici. Sed nos alibi de generalibus illis fracturarũ modis loquemur. Sat enim superius nunc fuerit tetigisse, qd capitis ossa omnes pati fracturaram species, modosue, præsertim verò ab Hippocrate descriptos, queunt. Quemadmodũ & duos quoc; luxationũ modos susserre nõnunquam dicenda sunt: quorũ alter à Græcis [*ἐξάρθρωμα*] latine luxatio: Alter verò *παράρθρωμα*, latine subluxatio; seu maus dicere iuxta luxatio nuncupatur. Quotidẽ enim articulus intotũ exident (inquit Paulus. *e.*) cõmuni generis vocabulo affectus *ἐξάρθρωμα* q. d. secundũ vim nominis exarticulatio, vocatur. Quùm autem aliquatenus duntaxat emotus est, aut vsq; ad superficiem è sinu elapsus, *παράρθρωμα* q. d. iuxtaarticulatio nuncupatur. Itaq; si articuli species esse suturam, & harmoniam, antea nos, ex ipso etiã Galeno, declarauimus. *f.* Ad illud superius, subalternumue genus reductas, quam Græcè *συνάρθρωσις*, sine motu videlicet volũtario factam cõtarticulationẽ nuncupauimus: Qua de causã & capitis ossa per articulũ quodãmodo adiuuicem cõstrui, prælibatũ est: Cui dubium esse vnquam poterit, exarthrema, & pararthrema, hoc est luxationẽ (quùm ex quibet disparantur suturæ, vel harmoniæ, & subluxationem quùm non adeo dilatantur) ossibus capitis aduenire posse? Præsertim si ea perlegerit, cõtemplatiuq; fuerit, quæ nos in nostro de tumoribus præternaturã volumine de huiusmodi casu elucidauimus: videlicet ab acerrimã in medio crani, & crassæ meningis, siue aquam (vt in sermone de hydrocephalo diximus. *g.*) sanguinemue, aut aliquam huiusmodi liquidam substantiam, siue flatuosos spiritus, vt deinceps in sermone de phrenitide vberrimè enucleauimus. *h.* [ Rhia Alfabian] Arabicè nũcupari secundũ affectum, ex flatuoso inquam spiritu factum, dicentes: & experimẽtis, vel in nobismetipsis puerulis adhuc existentibus cõprobantes. Ad enuenero non huiusmodi tantũ affectus ossa capitis patiuntur: videlicet fracturã, & luxationem: verum etiam & intemperiem quamlibet, siue simplicem: puta calidã, vel frigidã humidãque, aut sicca: siue cõpositã: puta calidã & humidã; calidã & sicca, frigidã & humidã; frigidãq; demũ, ac sicca. Quæ reliquis minis mala est, quemadmodum calidã, & humidã reliquis tanquã naturali tẽperamento magis opposita deterior. Præterea & in formatione, morborũ omnes species pati solet: videlicet in figurẽ præternaturã mutatione tali, tantãq; , vt naturę operationes ledat, superficiẽq; asperẽ vel lenis culpa, nec non & meatuũ, pororumue, aut cauitatuũ, siue foraminũ naturalũ simili errore, operationes inquam naturę ledente. Addeo vt a postemate etiã, nodum erysipelate. *i.* aut phlegmone. *k.* vel his similibus affectibus vexari posse omnia, nõ modò capitis ossa, in eodem nostro de tumoribus præternaturã fracturã. *l.* præstẽsum iam vberrimè sit. [ Omne autẽ os (inquit Celsus. *m.*) vbi iniuria accessit, aut vitiatu, aut finditur, aut frãgitur, aut foratur, aut colliditur, aut loco mouetur. ] Quinq; igitur (vt patet) Celsus ossiũ affectus posuit. Quorum vltimũ quatuor præstentũ iam sunt. Primus

Sensus.  
f. Com. 1.  
verius sine.  
Quam ista  
structuram ha-  
beant.

l. Com. 17.  
z. Com. 18.  
z. Com. 19.  
y. Cap. præ-  
sentũ à text.  
z. cõ. 1. v. 1. q.  
ad secundũ  
inclusit.

z. Com. 11.  
12. 13. 14.  
& 16.

z. Com. 13.  
& 16.

Moebi of-  
fium.

Ossium quo-  
pius morbis  
necessaria.  
b. In proœ-  
mio cõ. 2.

z. Com. præ-  
eodem.  
f. Lib. 6.  
cap. 8. p.

z. Com. 11.  
z. Com. 12.

z. Com. 13.  
z. Com. 14.

e. Lib. 6. cõ.  
cap. 11. 1.

z. Com. 15.  
z. Com. 16.

f. In proœ-  
mio cõ. 2. 10.  
11. v. 1. q. ad  
secundũ, sed:

f. Cap. cõ. 7.  
17. 18. & 19.

g. Sec. 7. 9.

h. Sec. 8. 1.

z. Com. 17. 18.

Alij ossiũ  
morbis.

i. 7. apoc.  
1. p.

k. Lib. de  
vitiis. cap.  
10. 13. 8.

l. Sec. 3.

m. Lib. 8. cõ.  
2. in princ.  
Tercio  
vide dicẽ

verò est, quàm os ipsum vitatur, canensq; suscipit [ *τρυφή* ] Græci vocant [ Nouissime quidem  
 (vt Galenus ait. n.) quod s. litera superabundat. videtur. Nam a dictione τρυφή est foramine,  
 denotat esse creditur, velut τρυφή, hoc est foramen quoddam estitens; quæ videlicet ab acutus ero-  
 de ostibus humoribus fit. Sub aliud aut ab inatio quidè cadit ægetudinis genus, & ossis τρυφή;  
 id est asperitas potius, quam Tereodon, canescit nuncupatur. Maiori autè foramine facta, & quod-  
 dam veluti sinus apparere, Tereodon, canescit dicitur. ] Razes. n. & post ipsum Auicenna. p. sping  
 ventositatem nuncupant: Alij ipsam ventosam appellant, cuius nomenclaturæ rationem igno-  
 rare nos fatemur. Cùm ex Arabico sic (vt Deo placuit) traditum nomè sit. Nisi forte dixerimus;  
 Gelinax, seu spinax instar foramen, vel foramina sicut humor ille acutus, erodensq;, qui quidem  
 quasi in vapores, & quoddammodo in statum, ventosi intemq; cõueris ossi substantiã penetrat.  
 Vnde veteris spinax, hoc est, vaporosus humor acris spinax instar periferis dicitur. Ideoq; Razes  
 ait. q. [ Tandem (sic enim corruptè scripsit, tereodon) in secundo de morbo, & accidenti (hoc est,  
 libro de morborum causis, r.) quod est ventositas spinax; sit ex humoribus calidis corroditibus, &  
 perforantibus os, & denotatur hoc nomen de perforatorio. ] Ecce igitur, q; veluti Græci nomen  
 τρυφή, hoc est foramine, τρυφή sit, diciturq;: Ita à spinax perforatione, ea quæ ab acutibus,  
 erodentibusq;, & quasi in statum conueris humoribus facta sit, dicit tereodon, hoc est, perforatio  
 potest: sicq; vtinam; nomen a symptomate ipsa videlicet perforatione, vel potius à similitudine  
 impositum sit. Instar enim verinis (quæ Græci τρυφή vocant) in trabibus nascens, illosq; quan-  
 tus durissimos multa vi, ac strepitu erodentis, instarq; validissime spinax vehemèter pungentis ad  
 vlcus erodit, pungitq;, ac perforat. Fit autem huiusmodi osium, præcipueq; digitorum canes nò  
 infrequenter ob sping puncturam: vbi præcipue ab ære male curatum vlcus alteratur, ac per hoc  
 ventosum factu esse cõtingat: cuiusq; si ab aqua negligenter madescat. Nò aliter igitur huiusmo-  
 di os vitium apparet, ac si multis tenuibus foraminibus ab acuta quadam, validaq;, ac dura sping  
 punctum fuerit. Fit autem huiusmodi caries; inquit Celsus, q; hoc modo [ id quod vitatum est  
 primò ferè pingue sit: deinde vel nigrum, vel carnosum; quæ supernatis grauius videntibus, aut  
 fistulis, huiq; vel longa vetustate, vel etiam cancro occupatis eueniunt. ] Maxime autè ex Gallicis  
 luc, tum cetera, tum frequentius, ac magis capitis ossa huiusmodi erosionem, canemq; pati, ma-  
 ximeq; spongoides, ac sincipitis ossa, cõsueverunt. Præter hos verò affectus, alius quoq; ossibus  
 aduenire solet, quem nos alius ex Galeno τρυφή appellauimus. v. q. d. latè explicationem pri-  
 uatim verò in capitis ossibus cornua quædam prosequimur, ac præcipue; circa futuras. Quæ  
 admodum à hinc propriè vocati Dionysisci, ac ( iuxta secundum nominis significatù ) satyrasimi  
 i. x. circa tẽporis sphenoidisq; ossa emergunt: melancholico illo, terrestrisq; succo foras è cerebro  
 per eas capitis tum proprias, tum cõmunes futuras proiectæ, atq; ibidem concreto, & tales ex-  
 tuberationes, cõmuniq; vocabulo exofitationes gignente, paulatim illas postmodò augente. Sed de  
 ossium capitis morbis dictum hætenus sit. Qui tamen ad huc longè plures numerari possunt, di-  
 uersiq; secundò diuersas partes, diuersaq; eorundem morborum cõplicationes. Quæ quia spe-  
 cialius quàm ad curationem peruenimus, elucidare conabimur. Nunc verò nostrã profectum  
 mentem: numerò deniq; tam ingredientiu per supra dicta foramina in crâne cõcauam, quam  
 ab eo egredientiu addentes. Sunt enim egredientia effatu digna, præter extremèta, sed diuata  
 nerui, arteriaq;, ac venæ numero triginta quinque; videlicet ex primo sphenoidis foramine duo,  
 ex secundo, quinque, ex tertio vnũ, ex quarto duo, quæ sunt decem. Item ex primo temporis ossis  
 foramine duo, ex quinto eiusdem vnũ, & ex sexto vnũ sic sunt quatuordecim. Item ex occipitis  
 ossis foramine secundo, atq; tertio, vnũ, ex quarto, & quinto vnũ, & ex cõmuni tẽporis, & occi-  
 pitis vnũ, quæ sunt omnia decem & septem. Totidem verò cũ sint in altera parte, erunt egredientia  
 triginta quatuor. Vnum verò est ex magno occipitis foramine scilicet spinalis medulla, sicq;  
 sunt triginta quinque. Ingentia verò sexdecim esse diximus, videlicet per secundũ sphenoidis  
 foramen vnum, per quartũ vnũ, per quintũ duo, per sextũ vnũ, quæ sunt sex. Item per primũ  
 occipitis vnum, & per cõmune demũ temporis, & occipitis vnũ. Sicq; sunt octo. Totidem  
 verò in altero latere. Igitur ingredientes tam venæ, quam nerui; aut arteriæ sexdecim  
 sunt. Sed alia ossa per se contempletur; quæ scilicet ad supernam maxillam pertinent. Et  
 pertinent. Et primitim definito (iuxta Galeni, quem interpretamur, quæ sunt quatuor  
 mur, ordinem) quod capitis, ac superioris maxillæ com-  
 mune q; est, iugaleq; latine, Græcè autem  
 nuncupatur. De quo qui-  
 dem sic Galenus  
 subdit.

n. Lib. de  
 meeb. cau-  
 sis cap. 11.  
 post princ.  
 p. Lib. 11.  
 contin. 61.  
 l. 1.  
 p. 44. tract.  
 4. cap. 2.  
 Spina ven-  
 tosa vnde  
 dicitur.  
 q. vbi supra  
 cura princ.  
 capim.  
 i. Cap. 11.  
 post princ.

f. Lib. 8.  
 cap. 2.

Essentia.  
 Cornua.  
 Dionysis-  
 mi.  
 Satyrasimi.  
 Egredien-  
 tia 15.  
 i. Lib. de  
 num. peper  
 naturam  
 sic. 19.  
 u. Ibidem  
 sic. 21.  
 x. Ibidem  
 sic. 30.

In greden-  
 tia 14.







Q. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

**COMMENTVM PRIMVM.** Multa sunt in hoc capite dicentur, humanæ caluarie quamminimùm respondebant videtur multi manifestabatur Galeni (salua semper tanti præceptoris reuerentia) defectus. Maxima enim ex parte de futuris, vel cõbopiteorũ cranij sive futuris abitur. Quodq; peius est, interdum ab illorũ quoq; vera descriptione deficient, canumq; nonnunquam caluaris aptabuntur. Pessimũ verò est, quàm neq; his respondebunt prout dicitur sigillatim in capite demonstrabimus. Totum verò hunc sectionem, vñq; ad denum histam, in vñq; conueni- gere caput de hennis: cum eorũq; de maxilla superioris ossibus loquatur Galenus. Ex quo magis distincte illos liquet, quatenus fuerint, de nasi ossibus, vel vñq; sive, hoc est de naso, sive de capite a maxilla superioris ossibus intelligentes: tum quia ibi etiã de maxilla superioris alij ossibus, quæ, nõdum non pñat, pertractat: tum magis quia nasi etiam ossa inter eosdem supramandibulæ ossa, necessarĩõ connumeranda veniunt: pñat tertiõ, quoniã in eo, quod distincterunt capite, os (de naso) titulum indicent, minimus de nasi ossibus sermo est: totus verò reliquus de maxilla superioris ossibus. Sit igitur totus huius hestoria ad dentes vsq; exclusivè, caput tertium. Sed nos Galeni verba cõtemplemur. Quæ etiam huc vsq; in præsentem contextu scripti, vñq; distincta quidẽ in pñatius animalis caluaris sunt, nec minus per se vñq; adeõ clara, vt nostrã nõ indigeant enarratione. De futuris igitur (inquit) superiõrẽ maxillã a capite, & sphenoidẽ ossẽ distincte quantũ bus, pñatitum quidẽm pñat capite fuit. Dum scilicet de cõmunibus illis quibus futuris ossibus factus a nobis sit. Quo & iam capite de proprijs capitis futuris pertractatũ est: g. Dicitantẽ in capite q. d. ab ossibus capitis & sphenoidẽ, quãdã sphenoides quoq; ipsũ capitis os est: partim ipsũ dicitantẽ. Cũm dicitantẽ quodã op. in vñq; an ex ossium capitis numero sit (vt postea videbitur. h.) Non autem cũm sphenoides ipsũ os inter ossa capitis, tanquã cerebrũ pñatitum respiciens, necessarĩõ locũdum statuenamus; cõmunes has futuras interpretabuntur, præsentĩõ pñatitũ cõmune in pñatitũ, sive quæ sphenoidem maxillã a cõteris capitis ossibus, atq; ipsõ ossẽ capitis ossẽ sphenoidẽ fecerunt. Quibus iam præsentĩõ, in præsentĩõ de proprijs maxillæ superiõris ossium futuris sermo fiet. Melius autẽ estẽ inquit neotericos anatomicos insequi quãdã futuræ inquit nominis vñq; vt illigat futuræ nomen largẽ capiamus, prout harmoniam quoq; vt secundũ totam, vt secundũ partem expñat. Sic enim illi futuræ nomen vsũ parte solent. Quorum interea cõsuetudinẽ ratione cõmendat Galenus: quoniã & si extrinsecus harmoni- tate quidã appareant, cõtra illa nihilominus ossa, & exquisitius intus perpendi sãpissimè in sese unũdũ, futurarum vendicariũ in illas, ingredientia reperiantur. Quamobrem eas omnes ossium flucturas, etiam si externis harmoniis appareant, foreq; etiã internas: cũm si sepe non nisi futuræ in quibusdam partibus participare soleant; idcirco futuræ nomine cõmuniter absurdũ nõ esse, nec tõ concludi, neminiq; vendicandum fore sic eas appellare. Dum igitur superiõris maxillæ futuras vestigabimus, cõmuniter ipsas etiã nuncupatas harmonias intelligentes: ne quãpã fortassis circa huiusmodi nomina conturbare nos intendat. Quæ quidẽ sic sumptẽ futuræ omnes, qualescũq; fuerint, a pñatitũ (vt videbitur. k.) Galenũ verò præsentĩõ capite septẽ numerabuntur. Nos autẽ eas in hominẽ ad minus vñq; ad summũ verò quatuordecim esse ostẽdẽmus. Adcõ vñq; proprijs; cõmunibũq; capitis futuris, in prima seculi parte viginti quatuor; esse futu- ras proferte quealms. At nunc ex Galeno singulas ab eo politas contemplemur.

Exposio  
textus  
I. Tex. 1.  
E. Tex. 1.  
I. Cap. 1.  
E. Cap. 1.  
I. Cap. 1.  
E. Cap. 1.

Exposio  
textus  
I. Tex. 1.  
E. Tex. 1.  
I. Cap. 1.  
E. Cap. 1.

h. inf. 1.  
E. 2. 3. 4.  
I. Cap. 1.  
E. Cap. 1.  
I. Cap. 1.  
E. Cap. 1.

I. Cap. 1.  
E. Cap. 1.  
I. Cap. 1.  
E. Cap. 1.

**TERTIVM DE S. E. C. V. N. D. V. S.**

Est autem prima quidem iugalis ossis exorti. Cujus pars altera posterioris tẽdens in cauitatem sub eodem iugali definit, ab eam cõmuni ad sphenoides os futura concurrens: Altera verò pars recta simul, & obliqua iursũ ad oculorũ sedes procedens, in medium illorum in seniorembitum peruenit. Moxq; ibi trãsnãrã dũscissa: vñq; quidẽm parte propẽ maiore angulum exambitum ascendit. Altera verò huic succedente per cõcauum sub eodem angulo

Summa prima & secunda penes Galenũ.

17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

angulo ad cōmūnem capitis futuram pertinet. Ad eō vt tūm angulum ipsūm, tūm naturale foramen ei subiectū, omnibūq; eūdem locū foraminūm maximum existens cōprehendit. Sub dicitur ad duobus futuris tertia pars antedicta: scilicet, inferiorē in sede oculi ambūtu incidens, interius ad ambūtu fortū, ubiq; cōmūnem capitis futuram cōiungit. **C O M M E N T V M S E C V N D V M**

Sutura prima, & alterius lateris secunda. Cōtra Galenum.



**R**IMAM quide in futuram in vno latere, in altero verō secundam dicitur Galenus, quae p̄nōiū superius maxillae os a quarto cōiungit; ut sphenoidē fecerat, rege quodam posteriorē eius partem locutus est: sicuti quodam priorē quoq; donec ad mēdium oculi ambūtu pertinet: Falsūm verō est quod subdit, eam ab utriusq; lateris secundam, non in hominibus modo, sed etq; in apīs etiam simijs, vel tereopterīs, aut canibus. Tertur enim per oculi orbitae medium ad magnam futuram vsq; quā sphenoidis decima futuram cōiūgit antea. h. n. m. n. m. n. m. Simplex igitur vitur; huius primae futurae pars est: tertia scilicet anterior, quarta posterior. Gradū verō cuiusq; fortasse anasistimide h. s. fibris restatūq; emundatū cranium decepsit. crederemus dicit alterius negligētis aiatōmēt negligētis quōdāmodo falsūm h. s. fibris p̄fectissimū est. Quaeq; cōmūnem quēdam exierit latus ad superius incidens apparet, p̄feruorq; in canibus: ea tamen primae futurae iam iam propōitae pars non est. Cūm ab ea nō incipiat, neq; cum ea cōiungatur: Sed neq; ad superiōriū modū in hominib; ad cōmūnem vsq; futuram ascendat. Quam igitur tertiā posuit partem, ea est primae futurae cōiūctus cōplectētū. Quam verō posuit primam, ea in hominē nulla reperitur. Eius igitur locū est secundā quae dicitur futuram statuēda, secundā maxillae superius ossiculū circōferēns, nullāq; eūm p̄cedēta futura prima cōherentiam habens, sed p̄impūntes maxillae superius foraminis statuēdū, m. parūq; in se foramen cōtinens. Eius etiā vice, quam deniq; secundā partem Galenus hīc declaratam, cum nulla quōq; in hominē sit tertia quaedam futura est, tertiā cōiūctam maxillae superius os a quarto distinguens. Tres igitur distincte futurae sūt; nō vna (vt Galenus non recte ait) tripartita: Quae cum in vtroq; latere p̄p̄cedatū, sex hōcūq; erunt. Quod autē Galenus idem in secunda parte declaratione ait, quod scilicet ad cōmūnem capitis futuram, scilicet secundam superius declaratam, vt p̄ueniens, tūm angulū ipsūm maiorem, tūm foramen ei subiectū, eiusq; loci foraminū omniū maximum cōprehendat. Nisi magis falsūm dicere maxillae, angulū oculi intelligere oportet, nō exteriorē duntaxat aliquē maiorem, quā ad nasū, aut tibi oppositū minorē: sed quācūq; angulū maiorem, vsq; ad intempū, qui ad oculū radice spectat: sicut; longū tūm hunc angulū capie mus. A' verō enim angulū introitū vergens multū distat. Foramen verō, quod antea inter sphenoidis foraminū decimū statuēdū cōmūne quide sphenoidis, p̄mōiūq; & quarto maxillae superius ossibus, declaratantes, omniūq; quae ibi sūt, maximum existens. Verūm ad foramen ab ea future portione intīmē cōprehenditur, neq; circumscriptur; quāquā illi vicinū, subiectū sit. Quod si foramen aliud intellexit, quod scilicet nō in frā p̄ primū inter maxillae superius foraminū numerabimus (vbi eūm intellexisse verō maxillae, nobisq; magis ardet.) Id ipsū quoq; nec ab ea future parte eūm p̄prehenditur, tamen si quadantenus tangitur (concessō etiā ea, quod primae futurae portio quaedam sit) neq; maxillae ossis foraminū, quae ibi existunt. Crederimus autē caluaris a Galeno p̄fectas nūmūm quoq; dēfectas fuisse, ad eō vt secundū foraminū aīstas ossiculū oculi dēnt; veluti sepāsimē contingit. Vnde maximum illud foramen sibi vsum est: vndiq; igitur angulū sunt: Galenus; ab errore intīmū sibi ferēnequit. Mānus tāmēn errasset, siquidem angulū, & foramen priore modō intellexisset. Notandū verō etiā est, circa tertiam p̄dictam futuram portionem (quam nos primae portis cōplementum esse paulō ante iam diximus) quoniam ad cōmūnem terminari secundam futuram Galenus ait. At si exquisitē p̄pendēris ad p̄dictū sphenoidis foraminū decimū, seu maius dicere futuram, terminatur: Quae enim inde ascendit futuram portis, pars est quaedam cōmūnis future alterius, primae scilicet sphenoidis os, ipsūm circūferēntis: cum qua posteriorē eius hae prima superioris maxillae futura propria cōiungebatur. Ad eō vt a tribus futuris primū maxillae superioris os, quin rectius a quatuor circumscriptur; posterioribus quidem, intēdūq; a p̄cedēta prima sphenoidis cōmūni. Superius autē ab alia secundā, quae a tempore ad tempus procedit cōmūni. Anterius verō, exterioris; & prius iam dicta maxillae superioris propria primū id os a quarto, dīscerente: Ad zygomaticū deniq; posteriorē, ab alia cōmūni futura dēscendit, ipsūm ab alio temporis p̄fectissimū cecidit, distinguente. Sed reliqua Galeni verba contēpserim.

I. Cap. 1. com. 1. Causa erroris Galeni.

Sutura 3a & 4a.

Sutura 3a & 4a.

n. Cap. 1. com. 1. Causa erroris Galeni.

o. Cap. 1. com. 1. Espoſico prima p. Com.

Causa erroris Galeni.

Cōtra Galenum.

mur, vt alios quoq; nonnullos eius errores, seu malum dicere negligentiam, ut p̄terea dēnegamus.

TEXTVS TERTIVS

Os, quod sit, ut terna maxillæ superioris ossa ex utraq; parte: sinistra inquit, & dextra facta sint, quibus capitis ipsi cõmittitur. Horum igitur maxillæ est, quod iuxta iugale situm est: Nonnulli enim rēporis, supercilijs, & sedis oculorum vna cõprehendit, totumq; exiguū angulū in seipso cõtenuū sumit, ad partem vsq; mali nuncupatā perueniens. Hujc autē tum positione, tum magnitudine succedit os in oculo contentū: In quo ad supenonem maxillā tendentes nervi cõprehenduntur. Minimum autem omnium est, quod circa magnū oculi angulū existit. Nonnulli autem anatomici tria hæc ossa ad oculorū radicem subeucta, vnum esse scribunt: Duas, quibus dashinguntur, suturas vel propositū manūm videntes, vel tanquam exiguas spontē prætermittentes.

COMMENTVM TERTIVM



**R** I A. quidem ossa posuit vtrinq; Galenus hic, quibus maxilla superior capiti cõmittitur. Cùm tamen venis quatuor hæc sint, exquisitiūq; cõtemplando, sex. Est enim præter hæc quartū quoq; os omnium proculdubio maxillæ superioris maximū, quod in se dentes cubitos recipit. Id enim tam intus ad sphenoidis, frontisq; ossa pertinet, quam extra propè nares frontis ossi notabili portione cõiungitur. Quod si nali quoq; officulum vtrinq; pendentes, ordine sextum à Galeno postea statuendū ( licet à Vesalijs quintum) per id etiam, capitis maxillam superiorē cõmittā inuenies. Solis sub dubio quodam remanentibus, ad capitis ossa cõfingant, duobus illis paruis maxillæ superioris ossibus, quæ ad narium internā foraminā circa palatum cõsistunt. Sub dubio inquit remanentibus apud eos, qui cuncti forme os inter capitis ossa cõnumerandū ne sit, ambigunt. Hujc enim duo illa officula cõiunguntur. Quoniam verò cõperissimū nobis est, sphenoides id os, inter capitis ossa necessariorum (veluti prædiximus 4.) cõnumerandū: Idcirco exactius perlabentes, omnia maxillæ superioris ossa capitis ossibus per se cõmitti, siquē, maxillā superiorem capiti, nō per sex ( tria scilicet vtrinq; ) sed per duodecim ( sex videlicet vtrinq; ) quin immo addito ( vt videbimus ) quodā aratri cultro perisimili, pertrediem ossa cõiungi cõcludemus. Quod si de his duntaxat loquamur, quæ ad oculorū orbitā spectant: Rursus nō tria, sed quatuor esse dicemus. Cùm prædictū quartū os magis, quam primū, ad oculi circulum, cauatatemq; intus, & extra pertineat. Id ipsumq; os est omnium maximū, nō primū à Galeno prædictū. Nisi pro Galeni defensionicula quadam, exuflationeq;, dicere quis audeat, de tribus duntaxat locutum, quæ prædictis suturis, siue suturæ primæ tripartite portioibus circū inscripta sunt. Tunc enim tria tantū caput contingentia. Verū exuflationes hæc nullis momentis sunt. Sicut enim in suturæ enarratione Galenus a vera, naturaliq; illius historia magnoperè delat: Ita etiam vt in ossium eorum explanatione. Spectatum verò secundū ab eo defenpi, quod nos Vesalijs ordinem insequentes tertium nuncupare solemus. Haud enim os id ( siue secundū capitū, siue tertium nobiscum appelles ) ad primū sic positione, sicut magnitudine sequitur. Cùm interior id & illud mediū iaceat os quartū. Funditus autem ad oculi scilicet radicē os sphenoides intencat. Sed neq; os id à Galeno secundū dictū, forsitem prædictum est, per quod nerū ad supernam maxillam descendunt. Quartū enim omnium maximū ossis proprium id foramen est. Galenus autem eam suturam iniquè aduertens, quam nos antea .x. tertiam quandū maxillæ superioris futuram nuncupauimus, tertius os circumferentem, & à quarto segregantē; sed alias internum duas falsas effingens (videlicet quas primā, & secundā primæ suturæ portiones statuerat) ossis quarti portionem illam internā tertio nostro ossi confudit, suū secundū os ex ambobus cõstituens. Tria igitur vtrinq; ossa prædicta tres nostræ suturæ distinguunt. Aliæ tamen, quam à Galeno declarauerunt. Quæmadmodū aliter etiam futuræ distibute sunt, quam ab ipso declarantur. De maiore autem cunctis increpandi sūnt anatomici illi: Qui quidem hæc ossa vñ esse crediderunt: vt qui secundam, & tertiam prædictæ suturæ à Galeno delentē portiones: vel rectius dixerunt, vt qui secundam, & tertiam a nobis declaratas futuras nō aduertunt. Quorum tamen excipiam (quod prius est) infecutus etiam ipse Galenus libro de vsu partū vñdecim fuit. .j. Quem librum ante hunc scripsisse tenemus. Dicit enim ibi duo esse, quæ ad anteriore zygomatis productionē, atq; oculorum

Supra G  
i. com. 6. 7.  
& 8. v. 10.  
Inprob-  
ta.  
Galenus ex-  
pluribus  
Inprob-  
ta.  
Com. pag  
col. 10.  
Com. quodlibet  
Vires Ana-  
tomicos.  
Citra Gal-  
enū.  
f. Cap. 10.  
post. prior.







† Tex. 4.

Obiectio. 11  
Responsio  
prima.

2. Tex. 4.

3. Tex. 3.

Sutura 11.

Maxille superio-  
ris apertae & commu-  
nis.

b. Vt ex. 2. hu-  
ius corporis  
peditis est.  
c. Tex. 2.  
com. 4.

Sutura 11.  
de jo. peria  
ti. 112.

Ostentium  
decimum.  
Sutura 11.

c. Com. 3.  
veritas sine.

communis. Notandum vero hoc est: quoniam Graecus caudex habet [πρωτῆ] hoc est, triplex, siue tres. Balaam legendū nō temerē putauit [δ' αὐτῆ] hoc est, duplex, siue duas. Ex his enim quae à superciliorum medio descēderent, duas tantum paulō ante de quartis, maximis siue ossibus loquens, declarauerat: \* de tertia verō eorum officulorum intermedia, nullibi prius commemorat.

Quomodo igitur inquit [ quae paulō ante, in maximorum ossium enarratione triplices esse diximus? ] si duas tantum tetigerat? Ad hanc igitur remouendam difficultatem, breuior, facilioꝝ; via fuit, praedicta Balaam conuersio. Verum nos litteram nullo pacto corrigentes, veritatem ad Galeni quoꝝ; intentionem saluabimus, hoc modo. Tres enim futuras priōri sermone ⁊; declarauerat: alteram scilicet vtriꝝ; à superciliorū medio deorsum descendentem, ad mediū vīq; incisiorum, atꝫ; caninorū vocatorū dentium. Praeter has autem & tertiam posuerat mediam, quae recta per palatum ipsum procedens in dextrū, & sinistrū ossa quarta, & quinta saltem posterius à seinuicem inferiorūꝝ; distinguebat. Quam profecto supernē deorsum quoꝝ; Galenus descendere supponebat, per eam cōmūnem regulam à semetipso nusquā non elēbratam, q̄; vniuersum corpus, nedum superior maxilla, in dextrū, & sinistrū aequē distinguatur. Verum est tamen, q̄; hanc tertiam futuram tanquā posteriōs in sinijs, & canibus, alijsq; similibus existentem, & à nasi officulis distantem, his cōmūnem nō esse reputauit, sed quartis, quintisq; iuxta eius oediōē ossibus statuit. Quinimodō quoties arteriis illud os, quod in sinijs, & canibus incisioris cōtinere dentes (quanuis nō sic in homine) cōponimus, duplex est, vt postea dicit, .i. tunc illis quoꝝ; cōmūnis est. Dicere igitur voluisse videtur Galenus, q̄; que madmodū tertia antea posuimus mediam quandam tertiam futurā rectam, deorsumq; descendentem, antrosumq; , inter duo ossa magna maxillae superiores. Ita tunc tertiam aliam ponimus tanquā mediam, eam, quae nāsi duobus officulis cōmūnis est. Quare dicat [ Est autem in ipso etiam naso tertia quaedam alia, praeter has ] scilicet dictas tres futuras, q. d. non solum illis tertia est media cōmūnis, sed etiam in ipso naso. Quanuis enim extreme duae futurae quartis ossibus, & naso cōmūnes sint: tertia tamē illorū media, hęc nō est: quam nos officulorū nasi mediā ponimus: sed alia. Quibus omnibus praesentibus, videlicet maxillae superioris proprias futuras, praeter quatuor alias cōmūnes, nō solum in Galeni placitis, sed nostra etiam sententiā liquebunt: quanuis harum plurimas nos aliter declarauimus, quam ille à sinijs, canibusq; delapsus proposuerit. Imprimis igitur quōad tres in cuiuslibet ocali orbita positas, triaq; per eas descriptā ossa, quae tam futurae, quam ossa sex erant; nō parum (vt verē in homine sunt) differēbamus. .b. Deincepsq; tameti quoad septimanā, quae per palatū recta procedit, & quoad decimā in palato etiam transuersā, partim quidem cū sphenoidē cōmūni, partim verō propria conuocauerimus: Quoad octauam tamen, ac nomen opiparē differebamus: .c. Sunt enim duae futurae: altera videlicet vtriꝝ; à superciliorū serē medio descendentes, nasi officula à quartis maxillae superioris ossibus segregantes: Ille tamen vnā ē; nāsi officulis terminantur, minimē ad incisiorū dentium segregationem à caninis in homine descendentes, quanuis in sinijs, & canibus ita existant. Eapropter & quatuorū ossium magnitudines nos ampliore statuimus, vt quae dentes omnes in se comprehendere dixerimus. Quoad vndecimā verō iam iam praedictam, .d. quae scilicet à superciliorū medio exquīsītē descendens, nasi officula à seinuicem segregat, cum Galeno libenter cōcurrimus, diuersāq; , ac maximē distantem ab ea, quae per palatum recta procedit, statuimus: vt videtur hucusq; ; maxillae superioris proprias futuras merito cōstituerimus: ossē verō duodecim. Quibus addendum remanet os tertium duodecim aratri cultrū faciens, idq; ; vnica, vel si exquirāmus cōtēplari velimus, tribus etiā futuris (tamēssi cōmūnibus earum duabus) distinctum: sicut; maxillae superioris futurae dici poterunt duodecim, vel fortē quatuordecim ( vt postea videbimus .e. ) Nunc verō cum caetera Galeni verba per se liquant, tempus cōtērendum in cōmūni interpretatōne nō est: Reliqua igitur maxillae superioris ossa in sinijs, & canibus, alijsq; ; multis brutis, minimē autem in homine, inuenta; Galeno referente, audiamus: quōm sic cunctisq; subdit:

TEXTVS SEPTIMVS

Αὐτὸν δ' ὁρῶν ἐν ὄσσι ἐπὶ πρῶτης τῆς γωνίης, ὅθ' ἤτοι μὲν ἰσθμὸν τῶν ἰσθμῶν, καὶ τὰ πρῶτην περιέχοντα, ὁστέον δι' ἐκ τῶν πρῶτῶν δι' ἀκρῶν αὐτῶν ἔσονται ἰσθμῶν ὄσσι, ὅστις δὲ δὲ καὶ ὅστος ἐν τῆ ἰσθμῶν ἢ ἱσθμῶν ἐστὶν ἐπὶ τῆς γωνίης, καὶ ὁστέον τῶν ὄσσι: καὶ δὲ τῶν τῶν ὄσσι τῶν ὄσσι τῶν ὄσσι.

11 Superest autem in maxilla superioris extremo vnum os, in quo dentium incisiorum radices, &  
 12 alucoli cōtinentur. Id ipsum verō magna quōdē ex parte simplex esse apparet, ob exquirācā ossū,  
 13 ex quibus cōponitur, harmoniā. Interdum autē futura in admodum elaboratis sceleris manifestē  
 14 apparet, ei secundum rectitudinem protensa; quae per totum palatum porrigitur.

**Q**UAE hic Galenus de hoc osse refert, in canibus, & simijs, alijsq; huiusmodi animalibus verum esse inuenitur: nunquã verò in homine. Quartum nanq; os vtrinq; positũ idem est: quod in se dentũ omnĩ, tam incisorũ, quam caninorũ, atq; molarũ quoq; alveolos, ac radices cõprehendit. In simijs verò maxima ex parte simplex id videri Galenus ait, non q̃ simplex verè esse intellexent: sed ob exquisitam illorũ harmoniam simplex apparere. Quandoq; autem in ipsis etiam recentioribus, sed maximè in admodum elaboratis, exiccatisq; caluarijs sutura quadam euidenti ad medium in duo officula longa diuisum inuenitur. Galenus igitur, alijq; plures ante eum Anatomici (qui cæcutiendi anam ipsi dederunt) à simiarum, cercopitecorumq;, & canum caluarijs delusi in tot, tatoq; errores ceciderunt, vt maxillæ superioris ossium, suturarumq;, numerum malè pertraxerunt. Quorum interea tanquam à vero scopo aberrantium varias opiniones intelligamus.

Cõtra Galenũ.

TEXTVS OCTAVVS.

*Δίκεται ἡ ἐκείνη γένεσις, ὅτι ἐπιπέτοις διαπεριπέτοις τὸ πλῆθος ἰσοῦ τῶν ὀστέων γένεσις, ἵνα μὴ γὰρ εἴη ἡ μὲν δὴ τὰ ὀστέα πάντα ἀριθμῶσι, τὰ κατ' αὐτὴν τῆς ὀρθῆς ἰσοῦς τὰ ἑκατέρω παραλήπτια, ἕνα δὲ καὶ τὰ κ̃ ὀστέων τῆς ἴσης τῶν μεγάλων σφαιροειδῶσι. ἕνα δὲ καὶ ἡ γὰρ ἕνα δὲ ἐκείνη, ἢ δὲ ἄρα πέντε ἀπὸ τῶν δὲ κατ' ἄρα τῶν γένεσις, ἢ ἕνα τῶν ἑκατέρω μὲν ἀπὸ τῶν ἑκατέρω. ἕνα δὲ ἢ ἑκατέρω ἐπιπέτοις, καὶ ὅτι τῶν ὀστέων τὸ σφαιροειδῆ ἢ πλῆθος σφαιροειδῶσι τῶν τῶν ὀστέων ἰσοῦ.*

Perispicum igitur factũ est, iure de ossium maxillæ superioris multitudine disensionem esse. Nonnulli enim non sex, sed duo prima omnium censent: parvulus videlicet, quæ intus in oculis insunt, prætermisiss. Nonnulli verò & ea, quæ ad nasi foramina spectant, magnis ossibus attribuant. Sunt verò etiã qui ab illis separant, ambo tamen hæc os vnum faciunt. Illud quoq;, quod in maxillæ superioris extremo habetur (vt dictum est) nonnulli quidem simplex esse aiunt: Nonnulli verò ex duobus constitutum esse affirmant. Atq; ante hæc omnia sphenoides inter maxillæ superioris ossia plurimum annumerant.

Opinio prima.

COMMENTVM OCTAVVM.



**S**EX enarrat anatomicorũ diuersas in ossium maxillæ superioris numeratione, falsas interim cunctas, opiniones. Quarum prima est antea iam dicta. Quoniam scilicet nonnulli tria vtrinq; in oculorũ cauitate existentia ossia vnũ, ac per hoc quæ sex verè sunt, duo tantum reputarunt: vt qui suturas internas non aduerterunt, vel neglexerunt: Quamquã neq; Galenus metipse illas rectè intellexit, quemadmodũ prædiximus. g. Secundam nunc addit, quoniã scilicet nonnulli (tamenĩ minis etiam insũ) duo, quæ ad interna ipsius nasi in os foramina pertinent, officula ab ossibus magnis, quartifus minimè fecerunt: sed illorũ particulas esse reputarũt à canum fortasẽ caluarijs decepti, in quibus obscurior eorũ distinctio est. Tertiam quoq; nunc subdit opinionem eorũ, qui eadẽ officula, quantum rectè à quartis, magnisue ossibus distinguant: Malè tamen ambo hæc vnum faciunt: cum verè duo sint, per rectam palati futuram, veluti prædictum quoq; est, .b. abinuicem distinctã: quam futurã illos ignorasse compertũ est. Quartam verò, & quintã opinionem vtrãq; similiter aperitissimè falsam adunxit. Quoniã scilicet nonnulli os illud, quod in maxillæ superioris extremitate haberi dictũ est, .i. incisoris duntaxat dentibus dedicatũ simplex esse protulerũt: Nonnulli verò ex duobus ossibus constructũ reputarũt: vtrãq; in quã opinio huiusmodi falsa est: siquidẽ in homine tale os à quartis distinctũ quæscipuerimus. Nullibi enim vnquã reperitũ, neq; inuentũ esse gloriabũtur. Sin verò id in simijs, cercopitecisq;, aut canibus perpendimus, quanquã Galeno verè duplex esse magis nunc ardeat: Nihilominus tamẽ neq; perpetim, neq; absolutè duplex proferrẽ debemus: eũ aliquãdo in vnũ exactè coaluisse inspeximus. Apparenter autẽ magna ex parte simplex, nõ nunquã verò duplex (veluti Galenus prædixerat. k.) proferrẽdũ veniret. Quomobrem & libro de vsu partũ vnũ decimo. l. absolutè vt simplex ipsum cõputauit. Sextã deniq; opinionem eorũ esse ait, qui sphenoides os non inter capitis, sed inter maxillæ superioris ossia cõnumerarunt. Quorũ sententiã magis in hẽsi se Galenũ liquet: dũ antea capitis ossia numerans, id exceptit, .m. ad maxillæ superioris ossia cõferrẽdũ remittens. Verũs autem inter capitis ossia cõnumerandũ esse, nos antea determinauimus. M. cum effatu dignam cuiusdam portionem compleat, cerebrĩq; substantiam cõtingat. Sed vt Galeni de ossium maxillæ superioris numero ancipitem sententiã cognouentis, duplicem hac numerum vtrinq; in homine falsũ contemplerũ, quũ sic subdit.

Opinio prima. l. Com. 3.

g. Supra cõ. 2. & 3.

.h. Supra text. 1. i. Text. 4. & p̃g̃m̃ũ cõ. text. 7.

k. Text. p̃cedenti. l. Cap. 10.

m. Cap. 1. text. 6.

n. Cap. 1. com. 4. & i. p̃cedenti. com. 5.

ἄρα ἐπὶ τῶν ὀστέων τῶν ἀπορήσθαι βέλους, πῶς καὶ ἴδια κατ' ἕνα ἔχει τὴν αὐτὴν γένεσιν. ἰδὲ ἐν ἐλάτῳ  
 ἠθροῖς συνάλλοι, μὴ παύσει τὸ πᾶν, καὶ δι' ἀκαταξίαν πάντα ἑρπυλλοῦσθαι ἀφ' ἑαυτοῦ, τῆς ἐν τῷ πᾶσι καὶ  
 ἴδια διαρίσσεως, ἐξ ἧς ἔστι τὰ πρῶτα ἰσθμια, περιττῶν δὲ ἕως τῆς κοίτης τῆς ἡραλῆς ἰσθμια. καὶ τῆς ἑπὶ τῷ  
 κροτάριον, ὡς τὸ ἔσθωμα, καὶ τὸ κάτω βάλανον ὁ ἰσθμια ἔστι τὸ κροτάριον ἀπορήσθαι. δὲ δ' ἑρπυλλοῦσθαι τῶν  
 μυχλοῦ, καὶ ἂν καὶ τὰ μέλα, καὶ τὴν ἐξ ἑαυτοῦ ἀληθινὴν ἀσπασίαν ἕραρον ἐκαστοῦ, καὶ δι' ἄλλα τὰ ἕως τῆς  
 ἴσης συντήσεως, ἴσα ἄρα τῶν ἄλλων ἕως τῆς ἴσης αὐτοῦ ἕως τῆς ἀνεῖας ἄλλα δύο κατ' ἕνα καὶ τῶν γένεσιν ἕως  
 ἐν ἐν ταῖς ἐξ ἑαυτοῦ, καὶ ἄρα τῶν ἀπ' αὐτοῦ, τὸ ὀστέον ἕως τῆς ἀνεῖας ἴσης. ἂν ἕως τῆς αὐτοῦ ἴσης  
 τῆς αὐτῆς γένεσιν ἐκαστοῦ, ὅτι ἔχει τὰ ἑξ ἑαυτοῦ τὰ ὀστέα, διὰ ἀρρημίαν, τὸ δὲ κατ' ἕνα καὶ τῶν γένεσιν, ἕως  
 ὄστρον καὶ τὸ ἕως τῆς συντήσεως τῆς ἴσης, αὐτοῦ δὲ τῆς ἴσης ἴδια δύο, καὶ λοιπὰ δύο τὰ μέγιστα, ἕως ἄλλο τῶν  
 γένεσιν, τὰ ἕως τὰ μέλα, καὶ τὴν ἀληθινὴν ἰσθμια ἕως τῆς ἀνεῖας, ἂν ἑρπυλλοῦσθαι ἀσπασίαν, καὶ τὸ ὀστέον ἕως τῆς  
 ἴσης ἂν ἑρπυλλοῦσθαι ἴσης.

Quocirca si ad quamplurimum numerum quispiam redigere velit: Erunt quidem in tota superiorē maxilla ossa quidecim, si verò ad quamminimūm numerum contrahat, non plura erunt, quān osto. Quae sanè omnia deinceps ordine referā, à priorē diuisione incipiens ad quādecim reducēte. Sex quidem erunt ea, quae prima dicta sunt, à cōmuni; capitis futura, itēq; ab ea, quae à temporibus sub osse iugali, & inferioribus oculorum palpebris ad medium supercilioquin ascendit, cōtinēbantur. Duo verò deinceps grandia, in quibus mala, dentefq; ferè omnes inseri recensimus. Alia item duo iuxta narium foramina. Deinceps praeter haec alia ipsius nasi duo. Mox in maxillē ipsius extremitate alia duo. In quibus incisoriū dentes sunt. Prae his autem omnibus sphenoides etiam est, solum inter omnia coniugis experts existens. In osto autem numerata maxillae superioris ossa ad hunc diuisiuntur modum. Sed quidem prima tanquam ad duo numerantur; quod verò in parte maxillae extrema habetur, vnum; quemadmodū, & quod iuxta nasi foramina situm est. Ipsiū autem nasi peculiaria duo. Reliqua etiam duo sunt, omnium totius maxillae superioris maxima. In quibus mala; dentefq; ferè omnes (si cut antea diximus) sedem habent: sphenoidesq; tandem solum ex omnibus coniugis experts existens.

Quod quidem decem.

Quod osto.

**S**IVE ad quindecim reducās, siue ad osto contrahas; vtraq; cōputatio in homine falsissima est. Quāuis enim sex esse, quae in oculorum cauitatibus cōsistunt, ossa cōfiteamur; aliter tamen ea esse in homine declarauimus. .o. quān Galenus ipse descripsit. Praeterea falsū est in maxillē superioris extremitate duo, vel vnu esse os, à quartis, maximūq; distinctum, (perinde ac ostentum iam est .p.) sphenoides demūq; inter capitis ossa numeratū recensimus. Nullo igitur pacto quindecim, sed ad summū duodecim, vel tredecim esse maxillē superioris ossa, cōpertissimū in homine habemus; sex inquam in oculorum cauitatibus: duoq; magis, quae ossa malarū dicemus: duoq; alia ad narium interna foramina spectantia; & demum duo ipsius nasi euidentia, propriaq; officula. Quae omnia si bene computaueris, duodecim, nō plura fient. Quod si aratri cultro simile quoddā os addideris, tredecim cum recentioribus quibusdam pro uersis. Alia tamen ex parte secundum, tertiumq; in oculorū cauitatibus vtrinq; à nobis antea enumerata .q. cū capitis octauo ueniens, prout aliqui faciunt, nouem remanere inuenies. Sin verò tertium duntaxat officulum cum alijs quibusdā recentioribus anatomicis octauo ossi cōiunxeris, vndecim existent: Nunquam igitur quindecim apud exquisitos Anatomicos inueniemus. Sed ne secunda quidem cōputatio sufficiens est. Quāuis enim prima sex non nunquā ad duo reduci possint (secundis videlicet, ac tertijs ipsorum à nobis cum Vesalio positis ad spongoides octauū os redactis, nō antiquorū ratione, quia scilicet suturas intermediae secundam, & tertiam in vtroq; vel nō viderimus, vel omninō neglexerimus; sed quoniam fortasse eadem cum illo vtrinq; effecerimus) Ea tamen, quae ad nasi interna foramina pertinet, vnu esse, nunquam inueniemus. Nisi igitur sphenoides os, aliudq; in extremo pro incisoriū dentibus positum (illud quidem tanquā à maxillē ossibus alienum: id verò tanquā homini extraneum) auferamus, ad osto reducere non poterimus. Vtraq; igitur praedicta cōputatio, tametsi in finijs, & canibus, cercopithecisq; quodammodo fieri vera queat: in homine tamē perpetuò falsissima erit. Aduertendum verò interim est, qd in secūda ad minorem numerū, osto narium scilicet, reductā cōputatione, sphenoides os minimè à nouemmerat Galenus, quāuis de eo meminerit. Si enim annumerare voluerit, tantō magis falsa eorum cōputatio fuerit. Nouem enim cum eo nō osto (ut dixit) erunt. Nec minis à verō declinat alius Galeni numerus, quem libro de vīu partū vndecimo .v. posuit. Vbi os quoq; illud, in quo dentes incisoriū inseri iunt vnicū supponens, sex quoq;

Cōtes Galenum.  
 Quod non quidecim.  
 c. Supra com. 1. & 3.  
 p. Supra spm. 2. & 7.

g. Com. 3.

Quod non octo.

1. Cap. 20.  
 circa prius.

18 oculorū cavitatibus existentiā pro duobus assumpfit. Vnde præter iphenoides os (quia duplex,  
 quod ad nasi interna foramina spectat, ibi suppositū) ad nouem omnia superioris maxillæ ossa re-  
 duxit, sic dicens [Reliqua verò omnia maxillæ superioris, nouem sunt numero: Duo quidē nasi,  
 20 Antæ hæc verò tertium, in quo dentes incisores cōtineri dicebamus. Vtrinque autem duo malarij  
 scilicet, in quibus reliqui dentes omnes inuident supra quæ, alia duo sunt, quæ ad anteriore sunt  
 22 zygomaticæ productionem, atq; oculorū cavitatem infernam. Duo verò reliqua sunt, iuxta nasi  
 24 in os meatus.] Ad eundem nouenariū numerū & antea quoq; declarerat, scilicet ac rursus libro etiam  
 duodecimo. Vbi tandem septem capitū ossibus ierdecim esse deduxit; iphenoides inferum os  
 cum capitis ossibus, & nō maxillæ annumerant: vt de tãti viri in re tam clara incōstantia miran-  
 dum sit. Nos autem clarioris doctrinæ gratia cum Velsio duodecim semper antea in ossium nu-  
 merō cōputauimus. Dubium verò nō iperendū incidere hæc potest. Cur inquam ex tot ossibus  
 maxilla superior constet? Ad quod quidem Galenus ipse non incitè respondet, duas causas assi-  
 gnans, alterā scilicet differentiam ossium: alteram verò distansiam. Primam quidem differentiam  
 26 cum duercis habere subliātas in diuersis partibus oportuit, secundā diuersis earū viis. [Cum  
 enim (vt inquit. .) ipsa vtilitates habeat diuersas, ex diuersis quoq; substantiis ossibus esse cōstita:  
 28 Malarum itaq; ossa sunt crassissima, nasi tenuissima, reliqua verò durissima. Nam patendi diffi-  
 cultatem malis crassities. Illis verò durities suppediat (ecce quomodo secundū subiectā, ipsam  
 30 videlicet distansiam.) Reliquis autem nasus imbecillior existit: propterea quod ipsius officio ani-  
 mali nocere magno perē nō poterat: perinde ac si qua aliarū maxillæ superioris partium esset affo-  
 32 eta. Nam aut in neruos, qui per eam feruntur, aut in masticatorios musculos finire offensionem,  
 est necesse, alijs maxillæ partibus affectis. Nonnunquā verò & partes ad caput pertinentes attan-  
 34 gere, si propinqua illis ossa fuerint affecta. Suggestur nasi ossa leuā fuerint, minimam animalī affe-  
 rent noxam. Quò fit, vt multum à principalibus duritiæ, ac crassitiæ vincantur. Ob hanc igitur  
 36 ipsorum diffinitudinē nō inuicem malarum ossa propriam habent circumscriptiōem. Nasi  
 autem rursus aliam quoq; propriam, Ad eundem autem modū & reliqua, quæ sunt supra mallas,  
 38 & quod in summa est maxilla, & ea, quæ sunt in nasi in os perforatione. Quæ verò secundū lon-  
 gitudinē in vtraq; maxilla est iuxta, eò parata sunt, quod corpus est geminū dextris scilicet, ac sini-  
 40 stris. De cuius vtilitate sæpenumerō adnotauimus.] Ecce igitur duplicem simul rationē multu-  
 tudinis ossium, ac per hoc, multarū suprarū: tum scilicet ossium differentiam, tum diuersam sub-  
 42 stantiam esse partium diuersarū oportuit: tum patēdi difficultatem, ne scilicet vni parti facta le-  
 sio alteri cōmunicetur. Quamobrem & antea Galenus idē dixerat. Altera vtilitate detracta  
 44 (quæ scilicet ad motus earū) ad solam patēdi difficultatem sunt cōparata, quam ex ossium mul-  
 tudinē accidere ostendimus.] Sed in huiusmodi verbis nō parum defecit Galenus, malarū ossa  
 46 crassissima esse opinatus; Ad eò negligens quidē in eorū fractiōne fuit: quinquimodò facillimè per-  
 spicere illorum amplum antrum, ac per hoc substantiæ tenuitatem in emundatis caluarijs abisq;  
 fractiōne poterat. Cuius antea vsum tamē ad auditum, tum quoq; ad locutionem, vocemq; pro-  
 48 priam maximū esse, præter cōmodissimā leuitatem, nos antea iam declarauimus. .y. Magis autē  
 ad talem vsum attēdit natura, quā ad patēdi difficultatem. Nasi quoq; ossa sine dubio tenuissi-  
 50 ma sunt. Nam si crassiora vtraq; essent, tunc vel antū ibi, meatusq; intrinsecus hic minor esse  
 sicq; antū vtilitas ibi dimaneretur, hæc autem in ossactu, & respiratione lesio contingeret, ac in  
 ipsa etiam excrementorū expurgatione. Vel externa magnitudine huiusmodi defectus corrigere  
 necessarium erit, tuncq; turpissimū fieri hominem, nasci homines, grandamq; malarum præse-  
 52 ferunt. Haudquaquā verò interim oblata est natura custodire malarum, nasūq; ac totius demum  
 faciei tum oculos his partibus, vt custodes, tum manus quoq; ipsas, vt defensores apponent. Vt  
 quicquid nocuū aduenturū, occurratur; illis sit præuideant oculi, manūq; statim propellant,  
 54 varijsq; modis operando refringant. Medullæ autem experti illud antrum esse oportuisse, non ea  
 tantū ratione, quā Galenus protulit, quod quoniā scilicet prorsus non mouetur: sed magis propter  
 dictas tum auditus, tum vocis vtilitates. Sed hætenus de ossis maxillæ superioris numero. Reli-  
 56 quum est, vt non secus ac de capitis ossibus obseruauimus. Ita & in his etiam prædicata omnia  
 statim ab initio. & proposita numero quidē octo enucleata reputamus: vt quæ non dū præsten-  
 sa sint, supplemus. Imprimis igitur temperamentū eorū generatim aliud nō esse inuenimus, quā  
 quod in proœmio de omnium ossium temperamento prædictū iam est. & quoniā scilicet frigidum  
 est, & siccum. Particulim verò in ter se abinuisè secundū magis, & minus in huiusmodi frigi-  
 58 ditate, præsertimq; in siccitate differūt, velut in capitis ossibus est. & vt quæ scilicet duriora sunt,  
 densioraq; ac externo aeri magis exposita, hæc frigidiora, siccioraq; sunt: vt præceteris ossis iuga-  
 60 lis pars est, quæ ad primā maxillæ superioris os pertinet, indeq; nasi ossicula, & quæ dentū aluelo-  
 los in incisus cōtinent. Sed hæc parū momenti sunt: cōtemplatione dignior vñus est, varius  
 quidem secundū diuersas partes. Tria enim vtrinque propter oculorū cōplendas orbitas, eorūq;  
 62 ascensionem, præsertimq; os primum, ad vtrinque zygomaticæ, propter prædictos. & eorū vñus, pro-  
 ductionem.

f. Cap. 18.  
t. Cap. 9.  
tertio hinc.

Dubium.  
Responsio.

n. 11. de v.  
p. cap. 16.  
circa prin.

x. ibidem  
cap. 18.

Cōtra Ga-  
lenum.

y. Cap. 1.  
com. 8.

x. 11. de v.  
p. cap. 18.  
in fine.

Digestio.  
s. Cap. 1.  
com. 8.

b. In proœ-  
mio tex. &  
com. 1. 1. 4.  
& 5. & cap.  
1. per totū,  
p̄terimq;  
com. 8. nar-  
sus sine.

Tempera-  
mentum.  
c. Tex. &  
com. 7.  
d. Cap. 1.  
com. 8. ver-  
sus sine.

Ossa ma-  
xillæ supe-  
rioris vñus.  
c. supra  
cap. 2.

Magnitudo.

ductionem. Alia verò duo ad nasi, ac per hoc oliaſterij meatus generationem, hucufq; , & oculorum quoq; defenſionem : omniumq; maxima facta ſunt tum ad dentium omnium ſuperiorum comprehensionem, defenſionemq; , tum ad male productionem, facieue neceſſarium decorum : & antrorum auditum, vocemq; aduuantium generationem, Nec minus propter palati foraminum ad os pertinentium generationem. Magnitudo ipſorum ex præſcriptis quodammodo quidem eſt : nunc autem magis elucidetur, diſcentibus nobis, omnium maximam eſſe quartam, quod eſt dentium omnium ſuperiorum contentiuum. Contra verò omnium minimam ſecundum officulum in oculi maiore angulo ſitum eſt. Maximo autem ordine magnitudinis ſuccedit os primum ad minorem oculi angulum exiſtens, tertioq; os tertium, deinceps os quintum à Galeno poſitum : quod ſcilicet ad interna ipſorum narum foramina pertinet. A quo naſi offacula quintum magnitudinis ordinem obtinuerunt. Figura ipſorum diuerſa viq; adeo eſt, præſertimq; primi, & quarti : vt ea minutatim diſquirere, grauiſſimè ſuperponam, præter omnem eſſet vtilitatem. Secundum verò, tertiumq; , & quintum quæ adratæ quodammodo figuram præſerunt cuius quinti lateris ad os ſphenoides ſpectans ſemiparentheſis cuiuſdam eſſigiem quandam præſert. Sextum deniq; triangulum largè reſert.

Figura.

Tuum verò eſt, ſi maui quadrilaterum nuncupare. Propria verò ſingulorum ſubſtantia eſt, vt denſa ſint omnia, cavitatis ( præter os quartum, quod antroſum eſt ) experta, omniaq; medulloſa non eſſe præter minimas cauernas, poroſue propriam, iuxta Galenum in minimas partes diuiſum nutrimentum, proſerenda veniunt, ſolumq; officulum ſecundum eſt, ſquamè quaſi modo, tenue, vt facilimè computreſcat, decidatue, & in cranij è terra deſoſſis rariffimè reperiatur. Numerus iam iam ad nauſeam viq; præſcriptus eſt. Reliquum eſt igitur, vt ad ſeptimum pertranſeamus : ipſorum videlicet foraminum contemplationem, eo modo, quo in capitis quoq; offibus figuratim contemplati ſumus. Sunt igitur eſſatu digna maxillæ ſuperioris foramina ſexdecim, ſeu maui dicere paria octo. Quorum primum par eſt, ſecundo quidem officulo ad magnam oculi angulum pertinenti, & quarto etiã magno offi cõmune, intrò ad narium cavitatem penetrans in proemij ſexta figura litera L. notatum. Cuius viſus ( Galeno etiã edocente .f. duplex eſt. Primus quidè, vt per ipſum primæ neruorũ tertij paris à cerebro deſcendentium propagnis, per ſecundum ſphenoidis foramen emergentis minori ſurculo viam præbeat : qui ſicrus ad obliuendam internam narum, ſpongioſiq; offis tunicam, præcipueq; muſculoſam, deicendit. Secundus verò viſus eſt, vt per illud non nihil pituitæ, præſertimq; aquoſæ ad internam oculi ſedem illachrymantis in narum cavitatè deſcens, foras inde expurgetur. Secundum eſſatu dignum foramen, ſiue foraminis par eſt, inſtar oblongi cuiuſdam meatus, in quarto, magnoq; maxillæ ſuperioris offe in ſculpti, illiq; proprium, ab infimi oculi ſede exordiens, in anteriorem maxillæ partem, ſub mala deſinens, cuius principium in proemij figura etiã ſexta notatũ eſt, medium inter Q. & S. Exitus autè litera o. & in figura eiũdem

Propria ſubſtãtia.

Numerus.

prima litera n. deſignatũ eſt. Per quod ſecundæ neruorũ tertij paris è cerebro deſcendentium propagnis, per tertium ſphenoidis foramen proprium emergentis portio quedam, vnã cũ arteriola in faciei muſculos diſtribueda, egreditur : præſertim verò in eos, qui ſuperius labrum, naſiq; alias mouent. In ſimijs, & cercopitecis quoad exitum in tria, quatuorue, & interdum quinque foramina deſinit. Tertium verò foraminum par eſt ſphenoidi, primoq; , & quarto maxillæ ſuperioris offibus cõmune, quod cũ nos antea .g. inter ſphenoidis foramina decimum poſuerimus, non eſt cur ſuſtitiã illud hic repetamus. Quemadmodum neq; tempus in repetitione quarti cõteremus, cum ibi etiã quarto maxillæ ſuperioris offis, ac ſphenoidis cõmune ordine noni declarauerimus. Quantum par omnibus manifeſtiſſimum eſt : magnorum videlicet foraminum, per quæ quidè inſpiratio, exſpiratioq; , & odorum tranſitus, ac cerebri denſiq; excrementorum eſſatu digna expurgatio fieri ſolet, & ad vocem percõmoda etiã ſunt. Ab anterioribus retrorũm, exterioribuſue introrũm, vel ſi maui è contrariò procedentia, ſep̄o abinuicè diſtinguuntur illo offeo, quod arati uomen, cultroq; à recentioribus quibuſdam nõ temerè aſſimilato cuiuſdam interius firmatur : parte qua quidè in ſphenoidi, ac ſecundum Galeni ordinem quinto maxillæ ſuperioris offi, prædicatoq; cultroformi cõmune eſt, quemadmodum anteriori quarto, & ſexto, hoc eſt, maximo, & naſi officulum cõmune dicendum quoq; eſt. Sextum deinde foraminum par in illis officulis eſt, quæ ad narium foramina pertinent, noſq; ordine quinta cũ Galeno numerauimus, cũ Veſalio autè ſexta. Anterior quidè altera mox dicendo, externuſq; , ac per hoc euidentius, cũ præcipue maui multò ſit. Quod in proemij figura ſeptima medium inter II. & y. annotari poteſt, tametiã propuè prædicato offi ponunt. Nos tamen lepiſſimè cum ſphenoidis cõmune conſpeximus. Cuius munus eſt, vt excrementorum per tertium, & quartum nũper tacta foraminum paria, ſuperius autem dicta ſphenoidis nonum, & decimum, deſcendentium in palatum, ac ſauces portionis cuiuſdam expurgatio fiat. Septimum ab hoc ſequitur foramen eiũdem quintis offibus ꝑ. dedicatum. In canibus, vel in homine diſtinctũ à præcedenti eſt. In ſimijs autem, ac cercopitecis cõmune : In eadem proemij figura ſeptima, ſub litera y. denotari poteſt. A ſummis enim ſphenoidis offis alatis proceſſibus cõlatum cõmodè in huiuſmodi figuris indigari nõ potuit. Huius autè viſus eſt : vt per ipſum ſcilicet neruorum

Foramina. Primum cõmune. Viſus duplex.

f. Lib. 12. de v. p. cap. 11. &amp; notu eiũdẽ cap. 10.

Foramẽ ſecundũ propu.

Viſus.

Tertiu cõmune. g. Cap. 1. com. f. Quartum cõmune. Quintum cõmune. Viſus quatuor.

Sextum.

Viſus.

Septimũ.

Viſus.

uorum tertij paris, tertiaz omnium maximae per quartu sphenoidis foramen descendens propa-  
 ginis (quam Galenus, cumq; eo Vesalius pro quarto neruorū pari alia ratione numerarunt) por-  
 tuo quodam ad palatum distributa descendat. Olfactū densq; foraminū par est: tamctū simplex  
 in homine, & cōiugis expert, quod in inferna partem ad os pertinetem a patens: vnde Vesalius  
 ipsum vt simplex in ipso quidem homine semper esse determinauit, in canibus verb, simijq; &  
 equis geminū. Quauis enim in praedictis brutis animalibus duplex manifestissimē sit; in homi-  
 ne autē negligentius cōsiderantū simplex: Nihilominus tamen exquisitius indaganti in ipso etiā  
 verē duplex esse tibi videbitur: praeterit verō superius vbi ad nariū foramina terminatur. Idipsum  
 igitur iuxta posteriorem dentium incisiorū sedem ex palato in nariū amplitudinem vtrinq;  
 iuxta septum definit. Est autem id foramen in homine osium maxillae superioris maximorū cui-  
 libet superius ad nares propriū, quauis ad palatū speciosus cōmune appareat ambobus, quod  
 in eadem proceimij septima figura p. p. indigatur. Vius huius est, vt per ipsum tunicae palatum  
 succingēns portio quēdam simul cum venula; & arteriola sursum in nariū cavitates pertranseat:  
 vbi praedicta tunica cu ea, quae nariū amplitudini obducta est, cōnectatur, cōsentiatq;. Hactē-  
 nus de maxillae superioris cistatū dignis foraminibus dictū est. Quae enim nutrimentū potūs gra-  
 tia, ob minimas quasdam intūs ossa pertranseuntēs venulas foraminula existunt: veluti in capitis  
 ossibus, ita & hic etiam negleximus. Quod si duodecim hae hōuq; (praeter tertiu, & quartū par)  
 maxillae superioris ossium foramina: cum in illis quinquaginta capitis ossium foraminibus praedictis  
 .b. adiungas, omnia erunt numero duo supra sexaginta foramina, quae hucusq; in capitis, maxil-  
 laeq; superioris ossibus determinauimus. Verūm ne quid in huiusmodi etiam maxillae superioris  
 ossium dogmate dedit, quod in capitis ossibus praedictū iam est, quinimod & in alijs omnibus  
 obseruandum promissimus, omissio ad sequens caput sensu: eūm solis densitas inesse, praedictū  
 iam sit: .i. omissis quoq; duobus maximorū maxillae superioris ossium antris, & eorum viū antea  
 iam sufficienter enarratis. k. ad alia permagremus: Hoc duntaxat praenotat, qd cum duo maxillae  
 superioris ossium antra sint, illis ossium capitis antra quatuordecim addita erunt omnia hucusq;  
 supposita sexdecim ad summū antra. Sinus in maxillae superioris ossibus effatus dignos annotare  
 nequimus: Nisi fossulas duos duntaxat, casq; ad summum vt in pluribus sexdecim, nonnunquā verō  
 duodecimginti, in quibus dentes ipsi (vt postea videbimus \*) superiores insurgunt. Poreatq; etiā  
 quinq; scilicet in oculorū orbita inferiore duas, quae vob ossibus cōmunes in nariū in sinu canis-  
 tate duas, singulis quartis ossibus proprias, per medium septū distinetas: vnāq; deniq; in palato  
 quartis ossibus cōmunes. Ad eō vt cum praedictis ossium capitis fossulis viginti tribus, sint om-  
 nes hucusq; declarate fossulae triginta nouem, siue quadraginta & vna, cum foueis verō praedictis  
 sint quadraginta quatuor, siue quadraginta sex. Apophytes autem in maxillae superioris ossibus  
 sex duntaxat pernotauimus: Duas videlicet in primis eius ossibus, quae ad temporum ossium proce-  
 dentia os zygoma nuncupatū efformant. Quatuor item aliae sunt, in quartis eiusdem ossibus sin-  
 gulis binar: videlicet sub zygomate altera; Altera verō ad oculi maiorem angulū, propē nasum.  
 Quibus praestentis, qualia nam sint singula maxillae superioris ossa secundū seipsa, iam declara-  
 uimus. Reliquum est igitur, vt quā inuicē structurā habeant, perpendamus. Quod cōmuniū inter;  
 se per synarthrosim, ac per hoc per articulo ossium est: per eam in qua coarticulationis specios;  
 quae nullum motum habet, ex his, quae de ossium etiam capitis cōstructione declarauimus, .k. in  
 his etiā cōperitū fieri potest. Speciationem verō, qd per futuras, vel harmonias, vel futuras har-  
 monias, siue harmonias etiam futuras cōiungantur, & qd futurae nomen largitus capendum nunc  
 sit, praestentis quoq; in praesenti etiam capite est. m. Praeterea & enucleatum quoq; est, in ma-  
 xillae superioris futuras duodecim, forteq; quatuordecim computari posse: Quo autem modo id  
 cōpotum ducentū fietur, nunc ostendamus. Breuius si aratiforme os distinguatē futurant, cir-  
 cumscribentemq; pro vnica futura sumptūmus: tunc vndecim proprijs addita hae, duodecim  
 fient. Quod si tres esse (vt nobis magis aridet) maluerimus: tunc eas sic declarabimus. Vt vna sit  
 inquam, quae huiusmodi os sphenoidae superioris, posteriusq; segreget. Secūda verō, quae idē  
 nasi septo superioris, anterioris, distinguat: Tertiaq; tandem ea, quae idipsum quoq; ad ossibus pa-  
 lati, quartis in qua, & Galeni quintis, infernis fecerit: sed tertia hae ossibus maxillae superioris  
 propria est. Ad eō vt duodecim sint propriae: duae verō remaneant cum ossibus capitis cōmunes:  
 cuiusq; alijs duobus zygomaticis cōmunitus etiā praescriptis; .i. alijsq; maioribus cōmunitus etiā  
 praenarratis .p. decem, & octo futurae dicende veniant, & cū proprijs ossium capitis praenarratis etiā  
 quoq; septem futuris, viginti quinq; futurae in prima saeculi parte ostendi queant, secundū praeter  
 verō numerū viginti tres: Quāquā nos minime praeterit y duas quasdam alias effingi posse pro-  
 prias maxillae superioris futuras ad quartū et quartū os ambas vtrinq; permanentes: Alteram quidem ad se-  
 cūdu praedictū foramen quartū ossis propriū vtrinq; spectans, a loco scilicet exordiens, vnde fo-  
 ramen suū receperat principū, per torū subiectae oculi orbitae intervallo ad inferius viq; ciliū,  
 propter adnatae quid etiā ex pericranio oriūdae membranae firmitatem, cōprehensionemq; non

Osium  
Cōtra Ves-  
salium.  
Vna.  
h. Supra 4.  
r. com. 1.  
Sensu.  
i. ibidem  
versus sine,  
& in proce-  
tu com. 5.  
vt sit sine.  
Antra duo.  
k. Cap. 1.  
com. 5.  
Sinus nul-  
lus.  
Fossulae 16.  
\* Cap. 1.  
com. 2. in  
fine.  
Fonte  
quinq;  
Apophytes  
sex.  
i. Cap. 1.  
com. 8. ver-  
sus sinu.  
in Super-  
ioris & cōm. 1.  
m. Cōm. huius  
capitis  
2. 4. de vit.  
Quomodo  
futurae sine  
duodecim  
Quomodo  
3. 4.  
o. Cap. 1.  
p. Cap. 1.  
12. & cōm. 1.  
q. Cap. 1.  
com. 4. & 5.  
proceimij  
com. 1. 2. 3.  
Superioris  
vici quinq;  
que.  
Prima, &  
secunda.  
Vna.





statum, vel saltem homine citius ad masticabilem cibū cōuertuntur, nō à matre, sed à semetipsis preparandū, masticadumq̄: quomobrem ab ortu quāprimum dentibus indiguerunt. præterim quia illic quoq; vt manibus, atq; etiam vt armis vtuntur. Homo autem diutius lacte vtebens, matriciq; arte, ac manibus adiutus, minime dentibus ab initio statim indigit. Quòd si ab ortu quāprimum dentatus homo esset: semper fili matris (Galeno erudente .y.) molestus foret. Dentū quoq; ad loquelam distinguendā ab usibus infantulis, vt pote nondum loquentibus, superfluis est. Tum ratione materię ( prout alias idem philosophus inuinit .x.) cum ex excremento cōstituantur, velut vngues, pili, cornua, & vngulae. Eā igitur de causa homo inobispo ( hoc est leuitissimū) modū fidissimū; omnium animalū corpore est; & vngues in minoribus pro magnitudine habet. Minimum namq; in eo est excrementum terrenum. Ideo carō igitur & ab initio statim mollissimis, humidissimiq; infantibus generandi, eructādiue foras dentium materia defuit. Quomobrem paulō prius ita scripserat [ Sed cum cetera animalia dentibus, aut dentium proportionali prædita enascuntur, nisi quid præter naturam acciderit (perfectiora enim quā homo, generatione absoluuntur) hominē dentibus carens venit in lucem: nisi quid præter naturā intercesserit. ] Quemadmodū M. Curionem dentatum nominat. Plinius testis est: .x. quoniam cum dentibus natus est: perinde ac & Gn. Papyrus Carbonem, Valeriamq; mulierem quādam extitisse etiam refert. Quauis igitur de ipsis dentibus dubiū propouent Aristoteles: .b. an eiusdem naturæ cō offibus sint. Euidemq; esse naturā antea declarauit, vt soli inter ossa ferri aciem respiciant, ac per hoc in ossium generatione collocandos, veluti etiam cornua, & vngues, vngulaq;: & autem rostra, & cum ex ossium nutrimentū excremento fiant, nutrianturq;: Ex quo Æthiopotum, atq; similitum nigroū dentes, vt ossa candent. Nihilominus tamen non penitus eiusdem naturæ cum offibus esse ( licet in eorū numero cōnumerandi veniant) esse subūnit dicens .x. [ Accidit autem, vt neq; eandem naturā, quam cetera ossa habeant. Cetera enim in prima obstitutione omnia gignuntur, neq; est, q̄ possit oriantur. At dentes post enascuntur: tangunt enim ossa, & non continuantur. ] Huculq; igitur dentes ossa nō esse, eandemq; prorsus cum offibus naturā nō habere, ostendit. Deinceps tamen eandem aliquo modo naturā cum offibus habere, & in ossū numero collocandos forte subiunxit. Quatenus scilicet ex eorum nutrimento hi gignuntur. Ideoq; sic ait [ Ex eorū tamen gignuntur alimento, quod in ossa administratur ( hoc est ex eorū alimentū excrementū) Quāpropter eandē, quam ossa, habent naturam: Et tunc quando illa iam suum numerū receperunt] hoc est, & tunc odium naturā habent, quā illa, scilicet ossa, quibus adnascuntur iam receperunt suum numerū, hoc est, suam perfectionem, & suæ generationis cōplementū in siccitate, ac duritie: vidē nonnullis non modō post vigesimū, sed post octogēsimū, siue in ipso saltem octogēsimō anno maxillares orti sunt: vt testis idem alibi est .d. chartilagines enim incipiunt, ac deinceps paulatim isti ossa degenerant. Non igitur adeo floccipendenda lophistarum opinio fuit: vt quæ veterū rationū Aristotelicæ etiam habeat authoritatem. Ad quorū vltiorem cōprobationē in, alias quoq; rationes cōtemplemur. Est enim secunda, quæ exurgēde regeneratione sumitur. Ossa enim omnia à generationis principio ad finem vsq; perferunt, maiorē in dies siccitatem, duritiemq; acquirunt: Dentes verò lerē omnes, præter maxillares (quos genuinos dicimus) orti iam decidere rursusq; solidiores, durioresq; denudō renasci solent, maximē autē incisioni, caniniq;, ac molares secunda. Atq; ad ipsū duplici ratione, iuxta philosophi decreta, .x. ipsi accidunt. Primum propter melius, ratione videlicet finis: Secundō propter necessitatem, scilicet materiæ. Propter melius quidem, quoniam acuti ( vt sunt incisioni, atq; canini ) in attritione, que masticando fit, eorū hietantur. Latē verò ( vt sunt molares) si nō hietantur, at tamen leuigantur. Ad eō vt à suo imū nere deficiant, in illisq; frustrantur: Ita; alteros succedere ipsis in officium oportet: propterea melius fuit, illos prius ratos decidere, nouosq; profundiorib; iactis radicibus, generari: propter materię autem necessitatem priores decidunt: quoniam in tenui adhuc, molliq; maxilla illorum radices, superficialiūq; nebantur: vnde fit vt infirmi, & mobiles fuerant. Quomobrem & citius decidunt. Molanum verò radices in latiore, durioreq; naturā maxilla, validioreq; ossē cōtinentur: quanquā adhuc nō exquisitē duro, aut valido, vt oporteret; propterea decidunt quidē nonnulli, sed non sic citō, velut tardius quoq; primō nati fuerant. Nascuntur autē denudō, materiæq; ipsis nō deest. Quoniam in ossē adhuc nascente oriuntur: Et quōm tempus adhuc est ad dentū generationem idoneum ( quanquā Aristoteles intento fuit, mola nōus omnibus renascentis abnegare) veluti enim birundinacorū pallorū oculi acū punctū resanescunt, cernendiq; vim ( eodem autem autore .f.) recuperant, serpentiūq;, ac lacertorū abicissē eandē renascuntur: eō q̄ sunt, imperfectiq; adhuc ( Philopono docente .g.) sunt: Ita & dentes ipsi renascentur, quoniam maxillæ ossa adhuc perfectā nō sunt. Idemō recte ab Aristotele adhuc nascentia dicuntur. Quauis enim maxillæ ossa exterius perfectā appareant, intus tamen cōtenti decedunt, velut in vtero embryonibus, cum nondum exactam ossæ substantiam, sed muccum potius, præsertim secundō renascentium præferant, adnasci nō temerē dici possunt. Quod Galenus quidem apertus libro de semine secundo

y. 11. de v. p. cap. 7. in fine.

z. 2. de generatione animal. c. 4. circa finē, & 30. part. cap. 9. verus finem.

a. Lib. 7. c. 16. post princ.

b. 2. de generatione animal. c. 4. versū finē, & 7. d. hist. cap. 7. post princ.

c. 2. de part. cap. 7. verus finem, & 3. d. hist. cap. 7. circa med.

d. 2. de generatione animal. c. 4. versū finē, & 3. d. hist. animal. c. 4.

e. 1. de part. cap. 7. post princ.

f. 1. de generatione animal. c. 4. versū finē, & 3. d. hist. animal. c. 4.

g. 1. de part. cap. 7. post princ.

h. 1. de part. cap. 7. post princ.

i. 1. de part. cap. 7. post princ.

Cur molares tardius decidunt.

f. 1. de hist. animal. cap. vltimo post med. & c. eiusdem g. 1. de generatione animal. c. 5. post med.

h. Cap. 1.  
post med.

h. ostendit, sic perbellè cū de virilibus mēbris intūs primò delineatis, ac posterius extra abdomen emergentibus locutus, subdit. [ Quomodo solere naturam huiusmodi partes fabricare, nec villo alio, cū multa esse tibi argumento possent, tū illud præcipuè, quod in recens editis in lucem animalibus cōspicitur. Dentes enim is intūs in gingiuis adhuc latent: oculi itē in plerisq; adhuc clausi, in nonnullis ne distincti quidem apparent. Quæ omnia in abor tuum obseruatione exactè perspicies, &c. ] Cuius adhuc nascentis maxillæ inditium est, q̄ maxillares dū oriuntur: præsertimq; vitimi genuini dīcti, qui vigesimo sæpius anno excunt: nonnullisq; etiā octogesimo, quibus scilicet in iuuetute nati nō fuerint. Quinimodò teste Plinio .i. Zanclen Samothracei ciuem, cui renati essent post centū & quatuor annos Mutianus visum à se prodidit. Sed hoc bifariam monstruosum est: tum ratione ætatis, tū magis quia nō genuini primò nati, sed qui ceciderint, renati fuerint. Contingit verò id ipsum; quoniā multū alimentū (vt Aristoteles inquit. h. hoc est multū illius materię, ex qua mox deinde indurata dentes propriè dīcti sunt) in amplitudine ossis continetur. Cū igitur dentes prolapsi carnis instar renascantur: ossa verò id minimè obtineant: iure moti sunt sospitasse; vt ab ossibus difficere determinauerint. Sed extra propositū non fuerit huiusmodi naturę ordinem exquisitiū scrutari: Quomodo scilicet sic statuit, vt bis homini dētes, primi scilicet incisori, caninūq; nascerētur: genuini verò semel? Quemadmodum & primi quoq; maxillares vt plurimū semel dūtaxat nascūtur? Vbi scilicet quinq; molares existunt. Vbi enim noui molares subeuntes soli primos propellunt, quatuor dūtaxat erunt molares, sicq; dētes omnes octo & viginti. Vbi verò dimissis primis in medio ipsorum, & caninorum alij superueniunt, primorum nomen sibi vendicantes, primosq; illos post se secundos reddentes, tunc quinq; molares vtinq; existētes dentes omnes triginta duo inueniuntur. Sed vnde nā huiusmodi aduenerit diuersitas, dubium propositū iam est. Ad quod quidem re spōsio venior est: Deo soli notam esse rationem, cū nulla dari prorsus intellectum sedans possit. Ex Aristotelis tamē fundamentis rursus respondebimus, rationem potius renascentię quorundā, vel nō renascentię generalem assignantes, sic scilicet dicentes, nō finis modò, sed matricę magis necessitate factum esse. Cū enim tenuis, mollisq; maxilla ( prout antea diximus ) extiterit, dentūq; materia intūs obelusa, pariter humidā nimis, mollisq; difficiillimè, ac nō nisi squissimis symptomatibus ( Hippocratis etiam re simonio .i. ) excitatis, præsertimq; caninorū, egreditur, foramenq; nouū, ac propriū efformat. Dico cum Aristotele dentū materiam. Quauis enim dentes ipsi ab initio, nō iectis ac ossa eos cōtinentia, reliqua; omnia necessaria, propositū iam intūs mādibulā sint ( prout ex Galeni etiā dogmate ostendimus .m. ) adeò vt noua eorum generatio non sit, sed potius publicatio, exquisitāq;, ac cōpleta efformatio. Quia tamē adhuc dum intūs reclusi ab initio sunt, neq; perfectū dentium formam, neq; substantiam, ac per hoc neq; visum dentū habent: Ideò potius materia dentium, quam simpliciter dens in ipsā infantia dicēda est. Pasta enim ex qua manuum pistoris opera panis fit, quauis eadem semper sit: prius tamen, quam suis determinetur lineis, substantiaq;, per clybandū desiccetur, simpliciter panis nō dicitur, sed materia potius panis. Quocirca absurdum quidem nō est, Aristoteles præparata verba ad bonū sensum reducere: vt scilicet ex ossium extremēto dentes fiant: quoniā ex materia, ex qua ossa iam facta sunt, ad ossium generationem, puta maxillarum superfluente ( quauis superfluere naturā propositū fuerit ) ex quorum etiam ossium nutrimento, quodammodo & ipsi dentes nutri dīcantur: Quatenus scilicet intūs ipsa, tanquā eorum partes quedam existēna eadem materia, humoreue cum ipsis generentur, atq; nutriantur ( venæ enim quæ in dentes penetrant, in maxillam ipsam nutrimentū idem prius eructantes, penetrasse, cōperuissimū est. ) Quia quidem deficite, seu dicere velius minimè superfluente, dentes desunt, vt odontali quiddā natū sint, vt de Pherece diceretur nonnulli per historias testat. sunt. Quia dentibus omnino per naturā destitutus est. Sed nostrū prosequamur intentum. Est igitur primus exoriens dens, velut terbellum, quod efformandi foraminis causā propositū à natura est: sicq; alueoli patent. Ne autem rursus claudantur, & delentantur; alueolorū foramina, tamdiū dentes illi in foraminibus per sistant, perseueratq;: donec noui ab illorū tergo sublatis emerxerint, priores foras propellētēs. Quo enim tempore delicato magis maxillæ ossis, alueoli dilatantur, sicq; necessario priores, faciliusq; decidunt. Cū igitur alueoli à primis dentibus nō dilatantur modo, sed perforati prius fuerint, succedentesq; ( vt dictū est ) siccitate nimulū dilatati; sequendorū ortus, renascentū inquit dīctorum, absq; sensu illas symptomatibus, & absq; omni demum difficultate fit. Maximè autem ad priorum dentium casum cōducit: quoniā ( vt ex Aristotele prædictū iam est ) incisoriū hebetantur, molaresq; læuantur, ideoq; imbecilliores redditi nutrimentum ad se retrahere nō adeò valide possunt. Alij verò interim succedentes, locumq; illorum effugiantes, indies validiores redditi, nutrimentū illud tanquā intūs primi existentes ad se trahere anticipant, illudq; retinentes sibi ipsis vendicant. Quamobrem si accedentes illi priores decidunt, secundi autem validiores redditi, prosperoq; nutriti succedunt. Genuini verò sunt, quos Græci *εσπινθηρας*, sive *εσπινθηρας* q. d. prudentes (*εσπινθη* enim Græcè, latine prudentes

l. Lib. 22.  
cap. 17. ante  
med.

l. 5. de gene-  
ratione  
animal. vt.  
versus finē.

Dubium.

Responsio.

Ratione  
matricę.

l. 3. apoc.  
27.

Quomodo  
intūs reco-  
siti dentes  
dicuntur de-  
ntium ma-  
teria.

m. Paulo  
ante ex 2.  
de itm. c. 5.  
Quomodo  
dētes ex os-  
sium extre-  
mento.

Cur edēti-  
li quiddā  
Ratione  
fuit.

prudens est) & *απειρητος*, q. d. regnans, imperans; *δεν* *τι* *απειρητος*, quod est imperare. Non nullam autem est nostris via cum Arabum principe detes intellectus appelliant: quoniam scilicet maximum est, quia prudentia intellectuq; magis vigent, unde homines imperare, ac regere solent, huiusmodi dentes oriuntur. Cælus *απειρητος*, pro cõplere, & perficere intelletus, ut scilicet creaturas dicantur, quia ætatem perficiant, cõpleantq; quod stare enã potest. Cum verò nulli præc essent in teneriore ætate foramen: ois; maxillæ demus, dentes quoq; ipsi duriores, validioresq; iam sint: Eapropter nõ sine maxima difficultate, & acribusq; s; impetibus eos esse ostendit, forsãq; emergunt. Neq; simul omnes quatuor: sed lãgo interdũ tempore intervallo: vnde Apollonius ait. *Α*. [ Vidi in quodam nasci omni anno, ipsorum unum post quadragesimũ primũ annũ ] Quicũque tempore, quo perfectum iam maxillæ os est (quibus nascens adhuc illud nuncupet Aristoteles. *α.*) valde tam eis natus perfectum statim est: ipsiq; etiam prædicti dentes perfecti statim sint. Idcirco neq; decidunt, neq; decidere opus fuit, vt renascantur. Nisi aliter monstruosus, ac præter naturam, ex aliqua occulta nobis causa cõtingat: perinde ac prædictum iam est. Non ad id tamen monstruosum est, primos maxillares, tertiosq; & quartos aliquando renasce, quando & h; quoq; genuinioris instar maxima ex parte semel duntaxat enascantur. In tertio autem dentitionis tempore: sicut genuinũ in quarto nunt. Pro quorum temporũ cognitione, sciendum est, quatuor dentitionis descriptis posse tempora. Primum quidem est in vero, sicut ex Galeni *p. præscripto* lib. *γ.* v. in quarto formationis embryonis tẽpore (quous modo quatuor formationis tẽpore descriptimus) quo dentes ipsi in gingivis adhuc latentes a natura quodammodo suis limitibus determinantur: vsq; ad eõ interea singulis præsertimq; secundis, mollesq; sunt, vt dentes exatẽ formam, substantiamq; nõ habent: omnium verò maximẽ genuinũ ac primũ maxillares, quos ois distinguit in tenera illa ætate nequunt. Dicit autẽm totum ad tempus primũ nõ solum, dũ in vero a tertio, quartove mensẽ iam infans dictus est, sed postquam etiam etatus est, ad mensẽ vsq; septimũ, pauloq; plus, vel minus. Ad eõ vt eliores fiant, robustioresq; ac duriores per totum id tempus dentes, quousq; & substantiã, & formam dentis suscipiunt. Totum igitur primum dentitionis tẽpus nominamus. Secundũ verò a septimo scilicet exorditur mensẽ, q. ad septimum circiter annũ vsq; perdurans. Quo quidem tẽpore primũ dentes forsã emergunt, qui scilicet in primo tempore formati iam exant, & ad perfectionẽ devenientes: qui numero vsq; ad quatuor erant: videlicet in qualibet maxilla duodecim: hoc est, quatuor incisivos in cõspatu, duo canini, altes vsq; sex & deniq; maxillares, vtansq; & licet tres, quoniam non post dentium omnĩplemẽntum erant, secundus, tertiusq; & quartus. H; igitur vsq; ad quatuor dentes, quibus in primo tempore formati, nihilominus tam enã h; reconducti, occisitiq; ac paulatim durificesq; & in perfectionẽ devenientes, in secundo hoc tẽpore succedere nõ palamur, vt propriũ minus dentium egressũ cõpleant, omnium primũ (vt videbamus) incisivos: secundũ verò canini, tertiusq; maxillares vsq; tres tantũ, in qualibet maxilla vt sint. Similiter numero duodecim. A septimo autẽm anno *α.* deinceps ad quartumdecimũ vsq; tertium successit dentitionis tempus. In quo vel prædicti omnes vsq; ad quatuor (quando rã similes, s; nõ nisi bene temperatis, vegetisq; hominibus perpetuum) vel saltem in maxilla parte duntaxat occisiti, & decidunt dentes; qui in secundo tempore forsã puluuerant (in cõspatu scilicet, caniniq; ac trum maxilla molarũ primũ) decidunt, noui; alii sorũ loca vbi vt dicuntur. Quousq; enim notũ: hoc tẽpore tẽtus forsã resiliētes, nõ sunt, sed in primo etiam tempore geniti fuerunt. In utiq; máxibulã albicoñditi suo pãtere ordine sub primariã acie, medioq; in pãte quodã septo distãditi, prius quidem molares, mollioresq; & imperfectiores manebant: donec paulatim perfecti primũ, & secundũ tempus durificentes, excretaq; ac exquisitius formati, in hoc tertio tempore, prioribus (vti distent) expulsi, egredientur, nõ amplius casuri, sed cõfinescentes, nisi pre morbo (vt inquit Hippocrates. *β.*) perirentur. In hoc autem eodẽ tẽpore verẽ primũ maxillares inter caninũ, & vocatũ a nobis secundũ ante enatum, huc vsq; tamen primũ aliq; progredientes; nõ dũ ante enati vsq; nõ, maxima ex parte enascitur, numerum molarũ argentes, vt quatuor vsq; in qualibet maxilla nũc sint, nõ amplius (vti prius tres sicq; nõ distent, sed lãdoxim resiliēti vt in vsq; parte tãgita duo sint. Interdũ verẽ ex dentibus istis ostendit; duntaxat (quos secundos vocabamus) molaribus illis primis, adhuc tres vsq; perseverent: septis autẽ cadente hoc vocato secundo, duo renasci solent; ipse videlicet cum primis. Emnt autẽ h; quatuor primi nunc primũ enascentes in primo tempore, præsertimq; in vero, & infantia nostri oculis nũnum cõcessi, paulatim deinceps progredientes donec h; egressiõnis prædictũ tempus verũ accēsserit, a septimo quidem anno ad quartumdecimũ vsq; perdurans: nõ omnibus autẽ astantibus huiusmodi tertũ tempus pro dentũ reanovatione datum est. Nisi duntaxat hominẽ, equũ, mulũ, & asinũ (vti Galienus philosophũ penes se testatur. *α.*) quandoq; Plinius in *l.* de arborib; canemq; & rãmiantia, nõnullũ piscium genera quaedam adiungunt. Sed loqui (vt Aristoteles in *β.*) caninos duntaxat in equis concessum est: sic igitur & de canibus, & rãmiantibus intelligendũ, q; h;

iniqui oris  
omnes aut  
liber carnis  
n. 14. pro  
blom. a. mag  
o. f. de  
rejectione  
animal.  
cap. vii.

Dentitionis  
tẽpora qua  
mor. *α.*  
quinq;  
p. d. de sim  
c. i. v. in  
sunt, & pri  
mo casũ  
p. p. & de  
form. s. p. a  
lib. *γ.* a me  
dio infra,  
quousq; di  
gestimõs  
formationis  
tẽpora  
discutitur.  
q. Lib. de  
corp. post  
med. & lib.  
de f. p. a.  
lib. *γ.* a me  
dio infra,  
quousq; di  
gestimõs  
formationis  
tẽpora  
discutitur.  
q. Lib. de  
corp. post  
med. & lib.  
de f. p. a.  
lib. *γ.* a me  
dio infra,

Ex Hipp.  
lib. c. i. &  
Arist. lib.

etatis  
f. lib. de  
q. r. de  
post med.  
mo. *α.*  
i. de  
etatis  
q. r. de  
animal. *β.*  
lib. *γ.*  
lib. *γ.*  
cap. *γ.*  
et h. *β.*  
x. p. de  
genera  
animal. *β.*  
p. de quib;  
a. de hist.  
animal. *β.*

tria prædicta etiã incisorios renouent, quauis prædicti pisces incisorios, & molaris etiã (vt quidam se vidisse retulerunt) cõnouent. Quartum verò demum dentitionis tempus in homine succedit, quo nunquam antea enati nunc primum succedunt, circa tertiam scilicet annuam septimanam, quod tempus (vt audiuitis) maximam habet latitudinẽ: vt quarto etiã, quintoq; septenario, & supra decimum. Quòd si (vt dictum quoc; est) in extremis annis, vel quouis tempore cadentes genium renascantur, quem casum moostrosum esse prædiximus, tẽp quinquatum designari poterit. Sed quæ de his dicenda sunt, postea prosequemur. Nunc autem ne a proposito nimium digrediamur, ad rationes, quæ Iosophyssi suauere possunt, reuertamur: tertiam adiungentes, quæ ex dentium incrementõ sumi potest, ad probandum ipsorum ab ossibus differentiam. Ossa enim omnia octro quodam augendi termino (vt philosophus inquit. 7.) desubstantur. Ad quorum incrementum, reliquarum quoq; partium, quibus hæc subiunguntur, incrementum cõsequitur, ad vigesimum quintum vsq; siue trigessimum annum. A quo statim vigor, statimque sequitur: ac deinceps occultã prius, & demum omnibus conspicuã declinatio succedit. Dentes verò soli in tota vita (vt subdit) accrescunt. Quod patet in ijs dentibus, qui mirum tantum declinant: quoniam scilicet mutuum cõtritionem nõ habent, vt exerti dentes sunt, aut quã mibi oppositus alter deest. Id quod in quã pluribus senibus experimẽto cõprobauimus. [Causã incrementi est, quòd ad perit ad id, cuius gratiã, hoc est, causã finalis, vt lingui officio suo possint. Breui enim tẽpore attriti cõsumerentur, nisi subinde repararentur (ob cõtinuam scilicet mandando factam attritionem, mucosumq; cõgressum.) Quamobrẽ benẽ id quoq; ad rem, quæ accidit, emolita natura est. Quippe quæ in senectutem, vitæq; exitum defectu dentium profertur: & pro vite spatio præsertim modis. Quoniã verò plus indies in dentibus attritione, & minuitur, quã additur.]

Id quod vel nunc senescentibus nõnullis ædaciõs dente nõ magno prædicti loquet. Cũm admodum perirentur, minuunturq;: vt sepe à suo munere deficiant: præsertim cũm ob recreantibus humiditates, quas in se tanquam in imbecilliores redditu suscipiunt, emolliri facili cõsumantur. Sciquidem igitur longior vita hominis fuisse, vt si decies milies, aut decies centies annus vita seruaretur. Tunc & prægrandes primos orti oporteret, & sæpius renasci. Quauis enim assidue recipere incrementum, tamen detriti, plusquã accrescere rent, inutiles demum ad eubum conficiendum euaderent. Igitur eurus nam gratiã dentes capere incrementum, dictũ iam est.] Quam quidem Aristotelis, de augmento dentium cõtinuo, sententiã Galenus quoq; cõprobauit, libro de cõpõsitione medicamentõrum per loca. a. Tamen si dictionẽ addat [ 7. 7. ] latine [ ferẽ ] dicens [ Dentes ex nutrimento ferẽ per omnem animantis ætatem incrementum accipiunt, &c. ] Vnde nõnulli rectius locutum esse Galenum aiunt, modeste vsq;, dicentem [ ferẽ ] Non semper enim, neq; omnibus augentur: Sed hi propriam, medium Galeni, & Aristotelis vocẽ ignorant. Semper enim augeri recte dixit Aristoteles, alioquin breui tẽpore cõsumerentur. Nõ semper tamen huiusmodi incrementum apparere, cũm maior subinde cõsumptio per attritionem facta sit, quam incrementum fuerit. Qui autem oppositũ sibi dentem, cum quo cõterantur, nõ habent, alia ratione tanquã ociosa flaccescunt. Adeo vt si vel nõ augentur, vel secũdũ longitudinem tantum fortassis incrementum acciderent: Mirum nõ sit. Id quod alijs quoq; partibus omnibus quauis in incrementi ætate existentibus accidere cõsuevit. Sepenumero autem magis, quã atterantur, augetur: sepe autem econtra magis atterantur, quã augetur: primum in adolescentia: secundũ in senectute contingit: sepius scilicet auerum (vt Galenus dicebat) quantum augetur, tantum in ciboru mullu deturuntur, vt præsertim in iouentute contingit. Tã igitur Aristotelis, quã Galeni verba in duobus hominibus, duobusq; casibus vera sunt: veluti etiam, qd sepenumero quauis magis augetur, ob giuguarũ tamen excisionem, defectumq;, magis dicooperiã pparentes, maiorẽ reputantur, præsertimq; si relaxata acruo magis à foueolis exe runtur. Semper igitur ad incrementum idonei sunt, etiam si nõ semper incrementum, vel in incrementũ suscipere videantur. Ecce igitur quomodo nõ tenere Iosophyssi ab ossibus differre dentes, ab incrementõ etiã non reputari. Quibus addere quartam rationem possumus, quæ ex ipso etiam nutrimento tam ossium, quam dentium sumi potest: cũm omnia ossa medullam in seipsis veram contineant, siue proprie dictã in amplo sinu (quæ medulloso ossa nuncupari prædiximus. b.) siue largius sumptam, quæ in eorũm cauerulis comprehenditur, ex qua (vt Galenus ipse voluit) ipsa nutritur. In dentibus autẽ huiusmodi quouis modo dictam medullam indefideramus: sed aptissimẽ ex sanguine in eorum sinus per venulas, & arteriolas ingrediente immediate nutriuntur. Cur igitur ab ossibus dixeris esse dentes nõ dixerimus? At quoties addamus rationem, quæ ex parte finis ipsoru ossium, dentiumq; elicitur. Ossium namq; verus, præcipuusq; finis, vñsq; est, tum vltiarũ partium veluti quedam fundamenta, tum vt quorundam viscerum propugnacula sint: quemadmodũ in procmũ expõsitione declarauimus. a. Quauis enim alios sibi quosdã ossium vius propouderimus. Tertius tamen, & quantus (si exquisitẽ perpendens) ad hos duos reducitur. Dentium verò finis, vñsq; ab ijs longẽ dueris est, quacunq; ex quatuor ab Aristotele. a. positis in medium afferatur. Quos

Pro Iosophyssi ratio  
orta ex de  
um incre  
mentis.  
z. 2. de ge  
neratione  
animal. c. 4  
verũ sit.

Causã fi  
nalis.

lib. 1. c. 3.  
in medio.  
An se per  
pugnantur.  
Cõtra quod  
dam excep  
tione.

Quarta ra  
tio.  
Ex deum  
nutrimẽto.  
b. In procmũ  
com.  
& ex 5.  
Quinta ra  
tio.  
Ex coridẽ  
vñ.  
Ossũ vñ  
picipuus  
duplex.  
c. Com. 4.  
Dentium  
vñ quã  
duplex.  
d. 1. 4 part.  
animã. 1.  
sua priã.

non ordine licet Aristoteles : exquisitiore tamen, sic recensebimus. Primus enim omnibus communis est, cibi cōficiendi gratia, incidendo prius, deum conterendo, ac demum molendo, vnde nomen sumpserunt : dicuntur enim Græcè *idivus*, quasi *idivus*, hoc est comedentes, ab *idiv*, quod est, edo. Ita latine dentes q. d. edentes etiam vocantur. Secundus, auxilij causa est, vt pluribus tum sylvestri generis, tum etiam vrbani, quia ipsi etiam homini, vt quum ore, dentibusq; pro manibus vtuntur, .s. ad apprehendendum, retinendumq; aliquid, quod quidem si nō necessarium, vt plura bruta: melius tamen homines multa apprehendunt, retinentq; cū dentibus, quam sine illis. Auxilij quoq; causa sunt dentes ad locutionē: presertimq; priores dicti iūcti forij. Ad litteras enim exprimentas plurimum conferunt primi dentes (vt idem ait) Quocirca Plinius .s. etiam perbellē auctor, nec cibo tantum, & alimentis necessarij dentes sunt; quippe vocis, sermonisq; regimen primores tenent, concutiunt quodam excipientes setum lingue, lenemq; similitudine, atq; magnitudine mutilantes, molientesque, aut hebetantes verba; & quum desinere, explanationem omnem adimentes. ] Quæ res eadem ipsorum dentium visus est, roboris gratia; scilicet vt annorum vnde illis animalia, ipsiq; etiam interdū homines vtuntur, tum ad inuadendū, tum etiam ad defendendū; vt itaq; enim ob causam dentes obtinerent, tum ne ab alijs afficerentur, tum vt alia quoq; ipsa afficerent; presertim quæ ex feris carnivora sunt. Nō temerè igitur longè diuersos vius in ossibus, ac dentibus aduertentes illi philosophæ, dentes in ossium numero locandos fore abnegarunt. Quibus rationem quinquaginta; presertim duas alias addere, ad maiorem confirmationem, possumus. Quarum altera ex ipsorum substantia sumitur; cum solidiores, durioresq; alijs omnibus eiusdem corporis partibus, nedum cunctis ossibus appareant, solij; ferri aciem respiciunt (vt Aristoteles inquit) vnde Celsus ait. g. [ Duriores ossis dentes sunt ] Galeniciq; .b. lapideam, & duram substantiam dentes habent. Ex quo solos igne inuictos dentes esse, neq; cum reliquo corpore creman, Plinius testis est. .i. Hoc igitur argumento motus libri illius insipidus author, qui de natura, & ordine cuiuslibet corporis inscribit Galeno inique ascriptus vna cum philosophi ait. k. [ Dentes nostri ossa non sunt: Ideoq; omnia ossa confringunt. ] Altera autem ratio ex dentium nuditate sumitur. Quoniam scilicet ossa omnia carnis, ligamentisq; aut cartilaginibus, alijsq; substantia cooperiuntur, alijsq; ossibus articulantur. Dentes verò maxima ex parte discooperiti, nudiq; existunt, gomphosiq; clauorum instar ossibus connectuntur. Quamobrem alterius esse nature ab ossibus ipsos dentes, non immerito concludi potest: vel saltem rationabiliter dubitabile est. Verum quæ omnium maxima, potissimaq; ratio pro philosophi esse poterit, ex sensu tandem elicitor. Nullum enim os sentit (philosopho etiam auctore) Dentes autem sentire, cuius sane mentis viro, nodum cunctis Galeni sectatoribus, certissimum est, neruorumq; ob id mollij tertij paris participes esse (vt vberius infra declarabimus .h. i. Quo- niam ipsos [ vt inquit, m. ] vna cum lingua sentire oportebat, ac sapores discernere, non alteri quam cæteris ossis particulis. Demonstratum enim a nobis antea fuit, .n. naturæ exactiorem sensum illis tribuisse, quæ assidue erant his occurrentes, quæ incidunt, aut frangunt, aut rodunt, aut calcantur vehementer, aut refrigerant, aut alio quouis modo alterant: vt animal à dolore ferendæ sibi ipsi opis admonitū, quod seie angit, prius amolitur, quam pars sit labefacta. ] Sic ergo & dentes neruos molles inserunt. Ecce igitur quot modis ab ossibus dentes differunt. Quæ ob res (vt in vnum cuncta recolligamus) si penes ortum primum, regenerationemq; incrementū, nutrimentū, materiam, formam, substantiam, nuditatem, ac ipsam demiq; sensum differunt absurdum nō est vna cum philosophis illis dentes ab ossium numero segregasse. Tuncq; ad Galeni argumentum respondere possumus, dicentes per sufficientem diuisionem factum nō esse. Cum enim dicebat, quod vel nerui sunt, vel arterie, aut venæ, aut caro, aut cartilago, vel adæps, vel adenes, vel pul; Addendum venit [ vel dentes, aut vngues, vel cornua. ] Sic igitur deinceps in non nisi subuulgata propositione diceremus: quod sunt dentes. Itaq; Galeni argumentum in loca concludit. Verum nihilominus est, quod cum dentes alia ratione ossium naturam aliquo modo participent ( prout ab initio statim quoq; huius sermonis assumptimus) breuis, clarusq; fuerat de ipsis sub ossium numero pertractare; presertim cum tot corpori communes nō sint: vtiq; & presertim omnes partes: sed ostenduntur proprij, numeroq; pauci, ac determinati. Sed hæc obiter curiosioribus præcisa sint. De nominibus enim

Galeno conuertamur, quum ait.



*Ostentus h' in xpi d'na...*  
 Ostris h' in xpi d'na...  
 20 *21* 22 *23* 24 *25* 26 *27* 28 *29* 30 *31* 32 *33* 34 *35* 36 *37* 38 *39* 40 *41* 42 *43* 44 *45* 46 *47* 48 *49* 50 *51* 52 *53* 54 *55* 56 *57* 58 *59* 60 *61* 62 *63* 64 *65* 66 *67* 68 *69* 70 *71* 72 *73* 74 *75* 76 *77* 78 *79* 80 *81* 82 *83* 84 *85* 86 *87* 88 *89* 90 *91* 92 *93* 94 *95* 96 *97* 98 *99* 100

COMMENTVM SECVNDVM

V. A. dicit hoc Galenus vsq; adeo per se clara sunt, vt nostra expositione no indigeant. Triplices enim dentes, primi quidem anteriores nuncupati Grecè *trichia*; quod est; latine incisores; secundi vero canini, Grecè *canini*; Tertij; de minimis omnium inquam sunt, Grecè dicitur *Tympan*, q. d. si no latine, Graminatæ tamen *Clauosi*; seu *Clauales*. Nos autem latinorũ nomine vsi maxillares aliquid d. nuncupabimus. Homoq; hominu ratio cõmentõ sequenti cum Galeno declarabitur. Nunc vero de ipsorum numero; ac natura nonnihil attingamus. [Homo igitur (inquit philosophus .i.) ad vltimũ cõmuniẽ præbẽ factos obtinet dentes, videlicet primores acutos, vt læcent, maxillares latos, vt molant; Discriminant eos vtroiq; s; qui canini appellantur, media inter eos natura conditi. Nam & sic dicitur panceretpe vtrinq; extremi esse. Et canini ipsi partum acuti sunt, partum lato quod idem in ceteris quibusdam malibus est, quibus no omnes acuti habentur.] Dentium vero molantium numerus (Galenus gradiente .p.) definitus non est. Sed qui longiores quidem habent maxillas; quinq; intus vtrinq; qui vero minores, quatuor. Maxima tamẽ ex parte (presertim vtriusq; perfectis) sunt quinq; unde igitur dẽnum numerus discernitã solet. Si enim quatuor vtrinq; sint molares; erunt omnes tunc ad summũ viginti & octo; omniaq; enim hominibus incisori; de terminatã quatuor vtrinq; insunt; duo quidem dextri, duo vero sinistri in vtraq; maxilla. Adeo vt vtrinq; partis quatuor sint. Canini vero cupreus quatuor existant, alter quide vtrinq; superior; totide; inferior. Duo decim igitur hi semper sunt, qui sedecim molibus; quatuor scilicet vtrinq; supra; inferius; sed diti, ad numerum peruenerunt viginti & octo. Sin vero molares quini sint vtrinq; tũ & viginti erant. Illis igitur hi; sedecim ad duodecim numerum perfectiorũ aduenit supra; infra; sicut sedecim videlicet in qualibet maxilla. Sin deniq; molares vtrinq; sex existãt (Id quod Aristoteles ostẽdit) sunt omnes triginta sex erũt. Sic viginti quinquã numerus variari solet. Neq; vniq; veterum quibdebet Galenus .4.) quatuor quidem in sinistris, quinq; autem in dextris, autem vtrinq; in sinistris quinq; in dextris quatuor; aut in maxilla inferiori quatuor; superiori autẽ quinq;.] Hec intelligẽde videndum natura; iustissimã ordinẽ. Per accidens enim hæc quoq; didicimus; cõtingẽde potẽt vbi dẽns aliquis in altera trã parte occiderit, vel nondum ortus fuerit. Idẽm vero didicimus; nuncupãti; quoniam in viro est; cõtingit (quicquid Aristoteles .i.) formauerit; in hisq; plures, quam in mulieribus esse ab ipso dicens, pluresq; utraque oribus; panceretq; ac minus interius. Quod si vtrinq; Grecæ vocantur; existere vitam breviorẽ habentibus, quãdis postea id rectius magis ex parte; no abicitã protulerit. Cuius rationẽ in problematibus .5. assignare conatus est. Quisq; no recte cuiuslibet libri Galeni perperã ac scripti author, cuius titulus est [de natura; & quãdã cuiuslibet corporis] immutatus est; dicens masculis triginta duos; feminis vero triginta; dentes incisores. Cõmunis autem numerus conatus duorũ & triginta; simpliciter ab ipso etiã Galeno, .i. introductioniq; authore; .ii. nedum Hippocrate; ita positus est. Cur autẽ homini vni parte vtraq; detent caninum natura produxit, cum homines; lupi; & ceteris multo vtrinq; habeant, merito cũ ipso etiã Galeno .y. dubitantũ est. Sed promptiorẽ responsio ad codẽ habetur, descendõ, q. [Natum ipsã certõ sciebat, se dum hominem efformaret, ansum mansuetũ, ac cuius effingere, cui robur, ac vires essent ex sapientia, nõ ex corporis fortitudine. Quantum igitur ad frangendũ quidpiã duriorum erat necesse, id ipsum duo iatis erant presertim.] Presertim cũ manus habeat, quibus & malleum, & lapides, & alia duriora ad frangendũ capere possit, illiq; vtr: Alia vero animalia;

quibusdã...  
 q. ibidem.  
 Cõtra Aristoteli.  
 r. 2 de hist. animal. c. 3  
 f. lib. 10. gblem. 48.  
 e. vbi signa est. in prin. u. Cap. 11. x. lib. de minimis. f. 10. Dubium. y. 21. de v. p. cap. in princ.  
 2 V T X E T  
 precipue;

præcipue; antedicta, & quæcunq; huiusmodi rapacia, ferociaq; sunt, illis vt armis quoq; vtantur. Cur autem incisores numero duplices effecit, alia quoq; dubitatio existit. Ad quam respondet etiã euestigijs Galenus. *z.* Quoniam scilicet ipsorum utilitas latius patebat, cum nõ ad incidendam modo vtilis sint: sed potissimum (vt inquit Aristoteles. *a.*) locutionis gratia tales, totq; numero dentes sortitus sit. Ad literas enim experimendas, plurimum cõferant, prout antea iam vberius declarauimus: *b.* sunt autem longè plures ipsi molares, quam incisõij, vel canini etiam sint (subdebat etiam Galenus. *c.*) quonia ipsorum utilitas patet latissimè. Quod enim primi vocantur incisores incisurunt, caniniq; quoquomodo cõtuderunt, ipsi deniq; molares vario modo, ac latius molunt. Sunt enim incisõij acuti, ac lati (vt inquit. *d.*) qui moriũ incidere cultri modo possunt, vnde incisõij, vel incisores Græcè *τομῆς*, apud aliquos *τῆμα*, *ἀπὸ τῆς τήματος*, quod est, scilicet, vnde *τήματος* etiam vocantur. Quomobrem dicuntur quoq; *δυσχερῆς*, *κατὰ τὴν δύσχερῆς*, quod est etiam diuidere, & in duas partes diuocare: quasiq; ob eandem rationẽ vocari solent à Græcis *κνήμις* q. d. pectines (quanuis nõnulli interpretentur occisores) vel à similitudine, quia pectini similes iuncti simul sunt, vel ab effectu, quonia cibum ipsium diuidendo quasi pectunt. Alia tamen ratione *γυμναστῆς*, q. d. ridentes, *ἀπὸ τῆς γυμναστῆς*, quod est, rideo, à Græcis ipsi nuncupantur, quonia scilicet nisi nudentur, deteganturq;. Canini hos sequuntur inferiore quidem basi latiores, parte autem superna acutiores: vnde Aristoteles dicebat. *e.* quod partim acuti sunt, partim lati. Qui si propter duritiã ad incisõibz scindi quæpiam manus potuerit, id frãgere ipsi queant. Dicuntur autem *κωνιδῶντες*, latine canini dentes, quonia nõ exertis, sed triangularibus canum dentibus quodammodo similes existunt: vnde receptum apud omnes Græcos tale nomen est. Maxillares demum (quorum nomina cum prædictis mox deinde Galenus enucleabit. *f.*) à mole scilicet molendani similitudine, molares, à clauorum autem, hoc est, radicum clauis simulum multitudinem gomphij nuncupati, asperi, ac lati sunt, duriq;, & magni: vt qui ea, quæ ab incisõijs incisã fuerant, aut à caninis fractã læuigare planè, ac terere queant. [ Quorũ si quidem vnũ quoduis menti-  
 te immutaueris (perbellè inquit Galenus. *g.*) vtilitatẽ repente cernes labefactã. Quãdo quidem si læus omnimò fuisse, nõ asperus, haud quaquã minus suum obire cõmodè possent. Nam omnia ab inequalibus, atq; asperis cõminuitur cõmodius, ob idipsum certè & molas, in quibus triticum molunt, quum tandem cõtrita, ac læuigata fuerint, rursus excidunt; atq; exasperant. Neq; si asperi quidem essent, non autem etiam duri, quicquam ex eis assequeremur: vt qui prius cõterentur, quam cibos cõminuerent. Iam verò si asperi, & duri quidem essent, lati autem non essent, nec sic quidem plus assequeremur. Si quidẽ quæ læuiganda sunt, ea latius basibus affirmata esse oportet. Quæ sanè causa est, cur in caninis, atq; incisõijs læuigari nihil queat, q; ij sint angustius. Inde igitur Aristoteles simpliciter lato inter dentes appellat, *b.* ac planos, *d.* Rusticũq; Epheus us amplas molarum summatates mensas nuncupat. *k.* Græcè *πρωϊκῆς*. Quid si omnia hæc quidem haberent, essent autem exigui? Non ne in eo solo reliqua quoq; vtilitas simul labefacta retur, q; tempore longissimo ad ciborum læuigationem nobis opus esset? Idem porro & de incisõijs, & qui post hos sunt acuti esto iudicium. In quibus mente inuenies labefactã vtilitatem, si quiduis eorum, quæ ipsi infunt, immutaris.] Sed hæc de ipsõrum dentium substantia, figurãq; & magnitudine generatim quodammodo ex Galeno dictã iam sint. Porro quod molantũ (veluti paulò post subdit) mediũ quidem maximũ, qui verò in vtraq; parte ipsõrum sunt (tũm scilicet anteriore, extenoreue, tũm posteriore, interiorue) minores extenent, mirabile est. Id, quod plures ob causas factũ esse, cõpertum habemus (in homine intelligimus, simiarũ namq; intimi, tertũ molitionis *l.*) internã oris capacitatem, quæ certè, quomodo anterior, est angustior, magnos æquè habere dentes, ac median, quæ est ad buccas, quæq; est amplissima. Iniquum enim id quoq; fuisset angustus oris partibus dentes magnos indere, amplius verò exiguos.] Secũdò ratione lingue (saltem quoad intimos) [ Cũm enim lingua ad radicem oportet esse ampliorẽ, magnos illic dentes adiacere nõ præstulerat.] Præsertim cũm ipsã ad ciborum masticationẽ, læuigationẽq; ( prout antea iam dixerat. *m.*) non minimũ cõferat, vt quæ in star manus cuiusdãm cibos in ore assidue transferat, ac voluit, quò pars ipsõrum omnis itidem cõteratur. Quare sequitur tertio, vt ratione molitionis in medio maiores molares sint, quã in extremis. In medio enim eadem molitio maior fit: cũm aptius lingua in eam partẽ cibos reuoluat, transferatq;. Quarto ratione maioris roboris cõstringendi in medio existentis, ac per hoc melioris ibi faciendæ etiam molitionis. Intus enim tũm propter angustiam oris, tũm quia in extremis cõstrictio ita fortis non fit, sicut in medio; vt experimento cõprobari potest. In medio igitur, vbi aptior, meliorq;, & validior sit molitio, molares ipsas maiores, latiorẽq; esse oportet. Gradatim verò, deceterq; versus extrema cõminuuntur; præsertimq; versus caninos dentes, incisõioiq;, Ne turpis etiam quædam inequalitas insit. Ordinata igitur, cõcinnaq; dentũ positio facta est: vt primi sint incisõij, secundo canini, tertio molares: sicuti masticationis p̄cessus talis est, vt primò scilicet incidamus, & in minima frustula dissecemus:

Dubium.  
 Responso.  
 z. Ibidem.

g. i. d. v. p.  
 cap. 1. post  
 princ.

b. Com. p̄p̄  
 c. i. d. v. p.  
 cap. 0. c. i. a.

princ.  
 d. Ibidem  
 cap. 8. in  
 princ.

τῆμα,  
 τήματος,  
 τήματος.

δυσχερῆς  
 κατὰ τὴν  
 δύσχερῆς.

κνήμις.

γυμναστῆς.

e. 3. de par.  
 1.

κωνιδῶντες  
 f. Tex. lo-  
 quenti.

g. i. d. v. p.  
 cap. 3. c. i. a.  
 princ.

Molares  
 cur asperi.  
 Cur duri.  
 Cur lati.

h. 5. de ge-  
 neratione  
 animal. c. 8.  
 l. 1. de hist.  
 c. 1. & 3. &  
 3. de par.  
 cap. 1.

Cur magni  
 k. Lib. 1.  
 cap. 3.

Cur dier-  
 sa mola-  
 i magnitu-  
 do.

Responso  
 prima.

l. 1. d. v. p.  
 cap. 8. post  
 princ.

m. Ibidem  
 c. 4. versus  
 finem.

Dentium  
 positio con-  
 cinna.

Inferior, &  
caninorum  
detrintra-  
dice

Melariis  
dices

Cetera Ga-  
lenum.

Cetera Ga-  
lenum.

in Cap. 2.  
post princ.  
Cetera Ga-  
lenum

Cur supe-  
riores infe-  
rioribus plu-  
res habeat  
radices ra-  
tio tertia.

Dentium  
eodem sim-  
plex.  
6. de hist.  
animal. ca.  
in fine.

dissecemus: secundum eorum, grossiore quodam modo cotundamus, ac tertio leuigemus. Quod si hunc ordinem mente tua pruerium effingas, vsq; adeo maledicti normam inuenies, vt omnia infeliciter succedere, copertissimum tibi fiat. Sed eorum radices contemplemur. Incisores igitur, caniniq; dentes singuli perpetuo singulis radicibus inhaerent: quanquam caninorum radices longiores, ac per hoc profundius penetrantes existunt. Quanto enim robustiores esse debebant incisores canini, tanto maiore radice hos, quam illos firmari concedens fuit. Quam ob causam inter ipsos quoq; incisores dentes, gradus quidam existit. Maiores enim duo primi sunt, quam laterales, qui caninis proximi sunt, ac per hoc validiores, adeoq; maioribus quoq; radicibus inniuntur. Quonia scilicet primus, validiorq; incidendi occurrit in media, anteriorq; parte colli sit. Molariarum radices diverso numero inueniuntur. Quaedam enim binis, quaedam vero trinis, ac nonnullae demum quaternis radicibus inniuntur. Plurimum vero id obseruatur, qd superiores maxillae superiores dentes vnae radice oppositos inferiores maxillae dentes superant. Quare si quidem superior mola duabus forte radicibus inniatur, sibi opposita inferior vnica duntaxat radice sustentetur. Cuiusmodi frequentissimè duabus molis canino proximo vtrinque; cotingere obseruatum est. Duabus inquam vtrinque; alteri primae, alteri vero secundae, adeo vt quatuor in superiore maxilla duabus radicibus innaxit, quatuorq; aliae in inferiore, simpliciter radice firmatae inueniantur. Tribus vero succedentibus, superiores tribus, inferiores vero duabus manibus se penumero contingat. Quamuis Galenus haec aduerteretur, nullam esse molam simpliciter radici innixam opinatur. Cum tamen se penumero etiam secunda superior vnicae radici in tertio dentitionis tempore (sicuti & secunda inferior) adhaerens reperitur: quemadmodum prima superior interdum vnica, quandoq; vero tres, nondum duas habere copertur: quinimmo in secundo dentitionis tempore secundam inferior em duas, superiorem vero tres obtinuisse visum est: perinde ac alia in vitibus diuersitas repetitur: vt quintus videlicet molatis in quarto dentitionis tempore superior quatuor firmam sepius, inferiore interim duabus, vel tribus innixo: interdum vero etiam quartus dens superior quatuor radicibus inniti inueniatur, quanquam nonnulli tertium quoq; superiorem quatuor habere radices aliquando conspexerint. Quam diuersitatem minime aduertit Galenus; idcoq; huius molares omnes ad minus duas obtinuisse inferiores, superius vero tres radices vnuersum supponit. Quemadmodum & libro de visu partium vndeimo. n. fallentem regulam ponit, parus quidem vnam, duas vero, tresq; maiores, quatuorq; maximis dentibus radices inesse dicens, sic quia primis, & quintis molariis duae, secundis vero, & quartis tres, tertijs autem quatuor perpetuo radices essent. Quinimmo cum superiores vna radice, inferiores superare debeant: primis & quintis superioribus tres, secundis, & quartis quatuor, tertijsq; ad minus quinque; forent. Quorum maxime diuersum inuenimus. Sed mirum profecto non est, si Galenatum modò, sed recentiores quoq; quamplurimos Anatomicos diuersa sensisse, cum talis, tantaq; in his diuersitas inter ipsos etiam homines, nondum in alijs animalibus existat, vt vnusquisq; ea senserat, ex particularibus vniuersalia faceret, quae ipse obseruauit. Dicit autem hic quoq; Galenus, qd superiores sepe cum quaternis radicibus, inferioresq; interim cum ternis; additq; [praesertim quod omnia prima inferiores] Quae verba, si cum nonnullis expositionibus, primos dentes, scilicet caninis proximis intellexerimus, falsissima esse, ex iam iam praedictis deprehenduntur. Sin vero (quod primum magis est, verborumq; tenori congruentius, cum dicat duo primum inferiores) de quarto, & quinto dente intellexisse nobis placuerit, vniuersa esse inueniemus: cum illis duobus maxime ex parte, praesertimq; (vt diximus) quinto radices quatuor superiores copentantur. Perinde ac paulò ante iam declarauimus. Variant autem in magnitudine radices. Quemadmodum vero omnium maxime; longissimaeq; sunt caninorum: ita & omnium minime; geniuorum, tum quia locus horum profundiores radices non admittit, tum secundo quia minus molendo consumuntur, quam aliae molae (praesertim cuiusmodi tanquam natu grandioribus ortu sunt). Ideoq; nec supra gingiuae multum eleuantur. Cuiusmodi superiores molae inferioribus radice numero maxima ex parte prepolleant, triplex assignari quaedam ratio potest. Prima quonia superiores pendunt: vnde et facilius labi, ac decidere possent, nisi validius insisterent: Id quod pluribus innixis radicibus obtineunt. Secunda quonia superior maxilla maximam intus cauitatem habet. Quamobrem si caninorum in ista profundissima radice haberent; intro in eam cauitatem illa penetraret. Radicum igitur multitudine inferiorum; ex trionumq; penetrantium harum stabilitas firmatur. Quod necessarium inferioris maxillae molis non est, cum haec (vt postea videbimus) solidior sit: Tertia quonia superiores dentes destituta nonibus è crebro descendentes obnoxij magis sunt: quae per venas, neruosiq; & arterias in eorum radices prius defluere, atq; in dentes penetrare solent. Cum igitur plures habeant radices, siquidem vna earum affecta, humorq; vitata sit, reliquae dentem sustinebunt. Sed haec de radicibus. Annotandum vero tandem est hominibus, pluribusq; animalibus vnam duntaxat esse dentium ordinem secundum naturam. Ex quo Aristoteles inquit. n. [Genus autem, quod duplicem dentium ordinem habeat, nullum in nostro orbe est. Verum apud Indos (si Cteslae credendum est) bellu-







equitatis opus esse videtur. Nemo sane homo artifex, neq; eorum, qui ligna in clavis inter se adaptat, neq; eorum, qui trahant lapides, atq; elaborant, cavitates excipientes & quales adamussum compactiorum emanentis ad se ferunt, ut dentium radicibus scilicetissimus atomorum concursus comparavit. Sciebat enim (ut opinor) tametsi mentem non habebat, cavitates quidem latiores ossium harmoniam laxiorem effeaturas; angustiores vero non permittitur dentium radices ad fundum usq; pertingere, &c.] Hic Galenus, qui melius profecto duxisset angustiores exitum impedire, ne ad summum dentes pertingerent, quam ad fundum; eum ex fundo emergant, & non in fundum penetrant. Admiratione tamen dignum est, quomodo natura, supereminente quovis dente, ad vltima usq; decrepitate fossulas huiusmodi proportionatas excauat, perfectiq;. Quas in terris, decidete quovis illorum, obsecat, adcoq; consolidat, ut nullum amplius foueae, perforationi sue vestigium appareat. Quam ob causam quibus dentes eruti sunt tenuior multo, angustiorq; fouearum locus redditur. Sed nos ad Galeni presentem contextum reuertamur. *Tripliciter* inquit Galenus q. d. concludunt sunt; quoniam per gomphosium dentes cum suis maxillis (veluti predictum est. *b.*) coartantur; quoniam & per fissuram (gingiviarum ratione, quas ob id Graeci etiam *peristoma* vocant, cum cutis extremae vnguium parti adhaerens instat, has dentes coniungunt) & per fissuram neurosin quoq; quodammodo (ingredientium nervorum, ac fossulas conglutinantium ipsos ligamentorum medio) coalecunt. Quamobrem esse fissio Galenus idem subdit. c. [Atq; etiam q. ligamentis ipsis fortibus pressepibus sint alligati, & potissimum ad radices: vbi & neruis inseruntur: quo pacto non id quisquam admiraretur?] Propter quos quidem in eorum radices inferitos nervos sensus quoq; participes ipsi dentes exiterunt. Quocirca sic statim subdit,

TEXTVS QVINTVS.

*Μερισμῶς δὲ τῶν ἀπὸ τῆς οὐχίας τῆρας τὰς μαλακίας εἰσέρχεται μόνον τὰς ἀλλὰς οὐχίας. ὁδοντὶ καὶ οὐχίας ἀποθνήσκουσι μόνον.*  
 Ex ossibus dentes tantummodo mollium & cerebro nervorum participes fuerunt: ob idq; soli manifeste sentiunt.

COMMENTVM QVINTVM.

**Q**UOD in dentes nerui, hq; tertiae coniugationis cerebri inferantur: quos Anatomici molles nuncupant, ob eorum praecipue multitudinem, capillorumq; modo facta divisionem, nedum ob substantiae molliorem, soliti (Galeno etiam docente. *a.*) fuerunt, sepe sepius a Galeno etiam ipso declaratum est. *z.* Quemadmodum solis dentibus inesse id privilegium, nulliq; alteri ex ossibus, velat alijs quoq; multis particulis ex eorum usu sensum superfisuum fuisse, alijs idem perbellè demonstravit: *f.* quoniam aliorum ossium membranarum dolores profundi, hoc est, in intimo corpore sensum excitantes, ossium ipsorum veluti dolentium inducunt imaginem. Vnde a quampluribus *sententia*; hoc est, ossium labores, siue dolores nuncupantur (vbi Galenus etiam inquit. *g.*) Ipsi quidem magna ex parte ab exercitationibus evenire solent, quantum interdum vel a frigore, vel a plenitudine fieri possunt. Dolentium inquam ossium ducunt imaginem, siue phantasmam: sed vere ossium dolores non sunt, cum ossa minime sentiant, ut speciatim de ossibus capitis, & nati \* aliquando expressit: sed ea circumstita membranarum, quas periosos nuncupant. Solum igitur dentes inter ossa sentiunt. Verum innumerò non modo nerui propter sensum, sed venae quoq; propter nutrimentum, atq; etiam arteriae propter caloris conservationem in dentium radices inferuntur. Quibus deinceps tanquam ligamentis quibusdam, praeter ea, quae ipsos cum pressepulis conglutinant, ipsa natura abutitur. Predictum vero est supra, *b.* quam ob causam dentes necessarò sensus participes exiterent. Vnde & dolent sepe numerò: veluti sepius esse etiam stuporem pati solent. Dolent inquam non solum gingiviarum ratione, aut quia nerui substantia duntaxat panatur: sed secundum propriam substantiam: licet nonnulli oppositò contendat. Quam alterationem ad se rectè, ac dilucide Galenus determinat, ut sit super; sicut eius verba referret: quae ab Alexandro *i.* nonnulla quae transcripta fuerunt, nedum ab Actuario. *k.* comprobata. Quomodo sic videlicet ille testatur prius reliquit. *l.* [Ex dentium affectionibus aliquae sane omnibus eundem apparent; quemadmodum quum perforati sunt, aut denigrati, aut detriti; aut neq; frigida fuerunt, neq; calida: sed ex utriusq; aut altero solo dolor eis contingit. Quaedam vero non manifestè apparent in ipsis affectiones: veluti quum ipse aeger se sentire dicit circa corpus dentis dolorè in profundo obortum. Quidam enim contra dicunt, asserentes eum os se sentire, cum circa laborem afficit.] Veluti quum aliquid prominentiores per lunulam deterere cogimur: aut etiam ob aliam quampiam causam: de quibus paulò post mentionem faciam. Nunc enim circa rationalem, & naturalem demonstrationem testimonij huius perhibere volo, qui ipsum dentem laborare aiunt. Et enim

b. Com prig  
cedenti in  
proemio  
sex. & com.  
20.  
c. 22 d. v. p.  
cap. 3. circa  
mod.

d. Lib. de  
nervorum  
diff. cap. 4.  
e. Vt v. d. v.  
p. cap. 1.  
f. 1. g. & 8.  
g. v. d. de  
v. p. cap. 7.  
h. 3.  
i. de hoc  
afficit. c. 2.  
verfus sine.  
k. Verbis de  
multis. cap.  
circa med.  
l. 2. meth.  
cap. 12.  
m. de instr.  
oss. cap. 3.  
n. Com. 2.  
huius capitis  
in sine.  
o. l. ib. 3.  
cap. 3.  
p. c. meth.  
cap. 7.  
q. 1. de capi  
med. sicut  
in loc. c. 8.  
r. de pnc.  
sicut v. d. v.  
p. cap. 3.

cum ego aliquando dolerem, diligenter superemcipio animaduersionem habui. Vt pote qui iam audieram de hac dubitatione, percepit; manifeste nō dolentem modō, sed pulsantē quoq; dentem: quemadmodū carnosae partes inflammatione vexatae cōsueuerunt. Quare mirū mihi videbatur, q̄ & hęc affectio, quam phlegmonem, siue inflammationē appellamus, in dente oriri posset, qui lapideam, & duram substantiam habet. At qui cum etiam alio tempore dentem dolerem, manifeste sensi nō ipsius dentis, sed ginguarū dolorem cum esse: inflammationis videlicet ipsius, vt etiam citra coartationem dolerent. Quin & ob vicinitatem dētiū: natura durorū aucto dolore ob coartationem. Quapropter vtriusq; doloris sensum expertus aliam quā in ginguae, aliam in ipsius dentis substantia esse clare scio, & id a serenibus testimoniorum p̄beo, q̄ ipsi aliquando dentes dolent.] Hęc Galenus de dolente ipsius dentis propria substantia, seu corpore. Quoniam verō nōnulli sunt, qui aiunt nō dentis corpus, sed in eius radice contentū neruū dolere. Propterea statim subdit Galenus, id etiam aliquando euenire: vt putent aliqui esse dentis substantiam, quae doleret; sed ita nō sit secundū veritatem. Diuersus igitur dolor est in substantia ginguiarum a dolore, qui fit in substantia dentis. Diuersus verō etiam ab vtroq; p̄dictorum est dolor, qui ex nerui inflammatione, siue solutione factus est. Quas ob res sic statim subdit, dicens. [At verō nerui, qui ad radicem dentis enatus, & substratus est, dolorem aliquādo fieri, neruo imaginatōnem consulam, & indiscernitā, incertamue apud plerosq; exhibentē, tanquam ipse dēns doleat, consentaneū rationi est. Nam & huius rei manifestum periculum aliquando loci.] Ecce igitur quomodo ex nerui inflammatione, nō dentis substantia dolor nō nunquā esse potest: cuius iudicium a dentis substantia distinctum euectio subdit, dicens. [Et sane q̄ remaneat adhuc parua doloris portio, exempto dente, inasistit ob nerui inflammationem. Cum dolor nerui leuior tantū reddatur, &c.] Hęc igitur est differentia doloris proprię dētiū substantiæ, vel nerui. Quoniam scilicet si dentis substantiam inflammato, dolorq; p̄hendisset, tunc ablato dente, quantum dolor ille cessat. Sin verō propter nerui inflammationem contigerit: exempto quidem ipso dente, quantum leuior dolor euadat: haud tamen prorsus aboletur. Sed ommissis aliarū partium doloribus: Impresensiarum de ipsis dentis substantia, siue corpore, q̄ dolet, intellexisse sciat est, & quod tres hi dolores propinqui sunt, videlicet ginguiarū, substantię dētiū, & nerui. Quocirca Galenus paulō deinceps ita subdit. *m.* [In dolore dentium, citra ginguiarū inflammationem, aliquando in ipso proprio dentium (velut dixi. *m.*) corpore, aliquando verō in neruo dolore fieri cōtingit.] Gustandi igitur, tangendiq; sensus dentibus inest, vt perbellē Galenus ait. *a.* Quomobrem & ipsi hēmodiā, hoc est, proprię quoq; substantię sporem (eodem alibi auctore. *p.*) patiūtur: prout vniūquisq; in semetipso promptissimē experiri potest, dum austeros, acerbosius, ac acidos cibos masticare conabitur, dentibusue ipsis ingerere. P̄sertim verō dentium sensus in ea quadam membrana, circaq; eam viget: quae intima ipsorū cauitatem sinuue subiungit. P̄ter foramina enim, quae in singulis radicibus existunt: per quae (vt p̄dictum est) nerui, & venae, arteriæq; ingrediuntur: Manifesta etiam intrā cauitas quadam existit, secundum dentis magnitudinem cōspicua: quae quidem tenuissima quadā membrana sublimitur: cuius originem li nō ab omnibus tribus, saltem a neruo in ipsam cauitatem penetrante necessariō fieri cōpertissimo habemus. In ea inquit membrana, & proximis ei partibus p̄cipuē sensum vigere dicimus: Non sicut ē recentioribus nōnulli tenent, quod ea tantūm, & nō dentis substantia sentiat. Vnde calidi, & frigidi tantummodō sensus, nō autē humidū, aut siccū dentibus inesse volunt, sed neq; ea sentiri adhuc, nisi ad eam membranam, tanquā propriū sensoriū penetrant. Sic enim dentis substantiam, corpusue sentire nō est, sed membranam ipsam; totūq; Galeni discursus ad probandam dentium sensum, vt masticanda, ingurgitandaue sentiat, inutilis ē sēt; quoq; p̄r experientiam comprobat, distinguendo dolorem, qui a neruo, ab eo, qui a dentis corpore procedit, necessariō cōruerent, nullūq; valoris forent. Sentire igitur eū Galeno dentes dicemus, magis tamen, aut minus secundum diuersas partes. Maxime enim intrā & in radice, minus verō extra ginguas: sed omnium minimē in extremitate. Ad eū enim obtusū in sine dētiū sensus existit: vt dum lima, vel serra inciditur, nō doleat. quanquā sentire negandum nō est. Quemadmodū ex ipsius etiam Galeni monumentis cerebrum sentire alias determinauimus; quantum discoopertum ipsū tactum, vel incisum non sentire percipiat; quoniam tunc temporis ob aeris intemperecia sensus eius maxime obtunditur. Ita igitur dentibus cōtingit, id quod nōnulli etiā de alijs omnibus ossibus existimant; cum discooperta nō sentiant: omnia tamen verō quodammodō sentire determinantes. Quorum sententiam nos interiri propterea improbamus, quoniam in illa neruus intrā nūquam, vel in dentis, cōspicimus. Ideoq; nō ex propria substantia, nisi membrana (vt p̄dictum est) cooperentū ratione, ossa sentire determinamus. Nec adeo rudis sum Aëtianus. *a.* qui de omnibus ossibus intellexit, cum in ossa inferi neruos dixit. De ossis enim affectibus loquens, solūq; dentibus, per ossa dētes duntaxat intellexisse cōpertissimū habemus: forteq; deprauatus codex est, & pro ossibus dentes legendum: de quibus sum erat propōitum. P̄ter

m. Cap. 9.  
post primo.  
h. Cap. 8.  
o. 6. epi.  
dim. cōp̄-  
mēsurō 2.  
com. 14.  
p. 2. de loc.  
affect. 6. &  
7. & 1. de  
symp. cau.  
cap. 1. circa  
p̄nc.  
Membrana  
cauitatis.

Quorundā  
sententia de  
dentū sen-  
su.  
Impugna-  
tio.

q. 4. meth.  
c. 14. post  
p̄nc.

ipſos igitur dentes, nullū os ſentire concludimus: nō Ariſtoteles .r. quidem ratione, quia ſcilicet terreſtris eorū ſubſtantia ſit. Dentes enim terreſtiores, durioreſq; ſunt: nihilominus tamen vti neruorum, ita & ſenſus participes exiſtunt. Id quod a veritate exactius tandem in problematibus .f. conceſſit: ſentire videlicet dentes, doloremq; ad frigidū magis, quam a calido, magiſq; quā carnes pati, ſupponens. Nec tantū in calidi, & frigidi, ſed humidū, etiam, & ſiccū ſenſum habent: vnde acidi ſucci tepidi etiam dentibus ad motū ſtuporem illis inducunt, ſiccitatis ratione: humiditatisq; eorū ſubſtantia corruptens, dolorem quoq; illis inferit. Sentiant autem dura, & mollia: preſertimq; aſpera, & leuia: rara, & denſa: aliaq; omnia (vt ſummatim dixerim) tangibilia ſentiant, quecumq; ab organo tactus ſenſu preſedit percipi, ſentiriq; ſolent. Verū de his alijs vberius. Impreſentiarum verō ſit ſuper: ſit determinariſſe, qd dentibus ipſis tactus: quinimodō & guſtus quoq; ſenſatio inſit: vnde & dolorem, & ſtuporem, iſtiusmodi pati ſepenumero conſueverunt. Diſta verō hæc ſint pro Galeni verborū expoſitione. Fuſile autē minimè fuerit, pro dentium exquiſitione cognitione, nōnulla in ſuperadiungere: primūq; ex dentibus ſumptum ſentire longitudinis vitę prognoliſci. Inquit enim Ariſtoteles .4. [Mans dentes plures, quam ſeminas, vt in genere hominū, ouium, ſum, caprarūq; patent.] Inde igitur concludere videtur, mares diutius viuere, vt quibus dentes plures inſunt. Generationem nanq; ſtatim ſubdit, dicens .1. [Quibus plures, hæc viuaciora magna ex parte ſunt. Quibus pauciores, & rarioreſ, hæc magna ex parte vitę ſunt breuioſi.] Nec ſolum ex dentū pluralitate, ac denſitate, ſed ex ſurgitū quoq; maiori numero, mares ſeminas longioris eſſe vitę, alibi determinauit: .u. vbi inter maſculos etiā ipſos ob eandē cauſam in longitudine, & breuitate vitę diuerſitatē ſuppoſuit: vt ſcilicet quicumq; plures dētes, plureſq; ſuturas habent, diutius viuunt. Id quod tamen verū eſſe magna ex parte, tam inter homines, quā inter alia eiufdē ſpeciei animalia inueniri ſortitū queat: Minimè tamen inter maſculos homines, ſeminaſq; comprobamus: vt ſcilicet maſculi plures dentes, plureſq; ſuturas habeant: cum idem amborū numerus vtriſq; naturaliter in ſitu illi per accidens aliter moſtroſe cōtingit. Sed de ſuturis, earūq; vſibus preſedit iam ſans ſuper: ad nobis eſt. .r. Nunc igitur ad id, quod ex dentibus ſumitur, prognoliſci, non ſeminas maſculus, ſed quolibet inter ſe comparando, mares inquam maribus, muliereſq; mulieribus rationem vitę huius: cur ſcilicet plures, denſioribuſq; denſibus armati, ijs qui pauciores, rarioreſq; illos habuerint, viuacioreſ, longiorūq; vitę, ſi nō ſemper, magna tamen ex parte ſint. Vnicam nanq; Ariſtoteles cauſam deliquit: Noſq; duas alijs adiungemus. Eſt igitur philoſophi ratio hæc .y. [Quoniam dentium raras inditium eſt denſum os eſſe capitis (quamobrem diſſiciliter erant, compreſſiſq; in anguſtū, tenuēq; reſtringuntur, vnde & rari cadunt.) Ergo cerebrū inualidum eſt, quia minus ſit reſpirationibus oportūnum. Itaq; celeriter putret, vt quod ſua natura humidum ſit. Nam & cetera, cum nō mouentur, neq; exhalant, facile corruptuntur.] Corrupto igitur ob capitis denſitatem ipſo cerebro, membro quidem principaliſſimo, hominem penire neceſſum eſt. Hęc eſt philoſophi ratio. Nos autem ſecundā huic adiungemus, quæ ſi nō iſdem hominibus contingat: cum prædictę quodammodo cerebrum quodammodo cōtraria ſit: in diuerſis tamen hominibus contingere poſſet. Prior enim exceſſeſſem cerebri excrementitū humiditatem ſupponit cerebri denſi, corruptiuam: hæc autem naturalē eius ſiccitatem, totiuſq; ſi mul ariditate, ac radicalis humidū manuſionem præſertit. Taliſ enim raritas a cranei dēſitate, ac per hoc ſiccitate prouenit: ex quo parui, arctatiq;, ac exiles dentes oriuntur. vnde cum alter alteri minimè cohercat ob paruitatem, rari dentes remanent. Si quidem igitur ab initio ſtatim craneum, ac per hoc contentū in eo cerebro alioqui ſuaſpente natura humidiffimū, in hoc tamen homine vincentem habeat ſiccitate, dubio procul omni domināte eadem in vniuerſi corporis habitu ſiccitate, ob radicalis humidū paucitatem, breuem vitam, quantum ad hoc attinet, prænuntiat: velut cōtraria ratione longiorem dentium pluralitas, denſitatēq;. Quibus adhuc tertā haud proſectō negligēdā rationem ad dēre poſſumus: propter imperfectam videlicet maſticationem. Qui enim dentes raros habent, exquilitē cibos atterere, molereq; nō valent: Quemadmodū nec perfectē incidere queunt. Quano breuiſſi illi, tanquam nō bene contriti, maſticiatū concoquantur. Nutrens enim (vt princeps .r. recte ex Galeno .a. etiam ait) maſticatione aliquam habet concoſtionem: Accutus igitur paulatim cruditatibus, raros dentes habentes citius diem ſuum obeunt habētibus denſis: quāſum ad ipſos attinet: modō reliqua paria ſint, veluti præſtatū iam eſt. At aliud ex dentibus prognoliſticum perſedimus. Quam enim dentes aridi apparent omni humiditate proſis deſtituti egrotantem mori proximū eſſe pronuntiant. Quemadmodū ſi quis ſtrideat dētib; (inquit Hippocrates .b.) non cōſuetus a puertia ita eſſicere, inſania ſignificatur, ac mors. Si verō mente cōmotus, inſanien ſue ita eſſicet, ad modum exitioſum iam eſt. Morti enim proximū prænuntiat egrotantem. Aiunt verō demūm Phyſiognomoni caninos dentes vbi longiores fuerint, ac firmi, maximeq; ad exteriora tendentes, gulofum hominem, malūq;, & iraciſſibilem porciſſimum, & canibus præſertit. Priuſquam verō ad alia pertrāſcamus, munimè prætereundū duximus optimē

n. 1. de anima tex. 79. & 3. 66.

l. 1. lib. 34. problem. 2. & 3.

Prognoliſticum ex dētib; primū .t. 1. de hit animal. 3.

n. 10. problem. 48.

x. Cap. 1. com. 1. & 2. Quid dēſiores cur longioris vitę Ratio p. 1. ma.

y. 10. problem. 48.

z. Prime 2. de 4. ca. in prin. .a. Qd poſt naturalib; lib. 3. c. 7. Prognoliſticū dētib; .b. 1. prognoliſticū .2. 1.

optinē à primo omnīū opifice sapientissimo distributos vniuersū; animalī dentes extitisse: vt for-  
 tibz inquam animalibz, rapaces bullz; dentatis acuti multi dēnēs; ac fortes sint comparati (Ga-  
 leno etiā doctē .c.) vt leonibz, pardalibzq; canibz item, ac lupis; & ceteris id genus. Ombz  
 autem, capris, bobz, ac similibz pauiores, hoīq; imbecilliores quoq; inuenimus fuisse distri-  
 butos. Quibz etiā animalibz, & oris magnitudo dentibz, quā nimio & vnguibz proportio-  
 nales est. [ Quo enim pacto (vt inquit .d.) homo paruū os haberet; leones autē ac lupi, atq; vni-  
 uersa (vt in summa dicam) quæ *capripedora*, id est, serratos dentes habentia appellant, longissimē  
 haberēt fissum, nisi hoc quoq; vtilitatis partū nostrī opifex memor fuisset? Ad portioneū enim  
 vnguium, & dentium robur consentaneum fuit oris quoq; esse magnitudinem. Quæmācūm  
 illorum cōmoditas cūm partū esse fuisset? Aut quid homo assequeretur, si multos quidē haberet  
 molares, ad aptertum autē os esse plurimum? Quæ enim de masticatoris musculis paulo ante  
 fuerant dicta, .e. abundē docere possunt, quantum pars ea, quæ est id oris scissurā, ad exactā ubi  
 cōmunitatem confert. Id enim si amplius in hominibz, quæmadmodū in lupis, esse adaper-  
 tum, neq; cibum exactē cōtēreret, neq; ex magnitudine quæmadmodū ad vires eis accederet: vt quā  
 dentes acutos multos nō habiant, sin verō rursū animalibz illis in arctissimum os esse recta-  
 tum, quōmodo, & hominibz periret vtiq; ac acutorū actio. In vniuersū igitur si omnia ani-  
 malia expendis, cōspicis quæ in mordendo viribus pollent, ijs nō modō os esse maximū, verū  
 etiā dentibus eiusmodi resere. Quibus autem potissimum in cibis masticandis, & ipsū planē  
 legitandū dentium consistit vtilitas, eis os esse exiguum, & in eo multos quidem molares, acutos  
 autem aut proxiū mollos, aut singulis maxillæ partibz singulos. Porro quæmadmodū partes hæc  
 ad portioneū inter se fuerūt cōparatæ: ad eundem planē modum, & vngues in animalibz qui-  
 dem masticatis, ac timidis latī, molles, atq; obtusi. Agrestibus autem, aut fortibus acuti; ac validi  
 ceu gladij quidā trānt, magnēq;, ac rotundi, ad incidendū, ac retinendū a cōtōribz. Denimū  
 igitur, vnguiūq;, ac oris magnitudinis sequela quædam proportiois est. ¶ Quibus omnibz  
 iam declaratis, tempēstiuū est, quæmadmodū ab initio statim cum Galeno proposuimus, .f. & cōm-  
 prædētibus quoq; tūm capitis .g. tūm maxillæ superioris .h. ossibus obferuamus; in ipis quoq;  
 dentibus enarrare. Sunt autē imprimis octo illa prædicata, vt singula (scilicet, & secundū tempus,  
 quæla nam sint perspicuēntius, perhibenda. Quauis multa coram tanquā alibi prædicata in me-  
 moriam potius reuocanda veniant. Temperamentū enim idem cum alijs ossibus prædictū iam  
 est, .i. secundū magis duntaxat ab alijs differens: cūm terrestriores, durioresq; dentes sint, ac per  
 hoc siciores, frigidioreq;, quodā intiatū temperamētū; tamen arteriā ingredientū ratione,  
 propter sentium prædictū iam plus spirituum participēs calidiores, siue minus frigidi ceteris  
 ossibus dici queunt. Dentium vītū quoq; plures, tam in procemio, .k. quā in præsentī capite .l.  
 prænarrauimus, vt ipsos repetere superponidū sit. Ad ipsorum igitur magnitudinem accedentes,  
 dicemus inæqualem fuisse ipsorum magnitudinē: cum omnium minimi sint incisores; maximi  
 verō molares; medij verō inter ipsos canini sint. Rursūq; inter molares ipsos gradus extitit, vt  
 medijs omnīū maximi sint, præsertimq; mola tertia, minores verō secūda, & quarta, minime verō  
 inter molas in quā sint prima, & quærtam quinta: prout ex suprascriptis .m. Galeni .n. verō  
 colligi potest. Quod si ex plurimū radicū numero magnitudinē perquisierimus; prout non  
 nulli malant, tūm ex præscripto radicū numero .a. diuerso, diuersam quoq; magnitudinē deter-  
 minabimus. Dicitā verō etiam eorum propria substantia est: .p. quoniam scilicet densissima est; &  
 quæ pars extra gingiuas prominet; omnis cavitatis expert, quæ autē intus forosola maxillarū  
 reconditur, intusq; est, foramen, & sinuū quendā habet: illud quidem, per quod voluula; artē-  
 riolæq;, ac nervi ingrediuntur: hunc verō, in quo mēbra sentiendū dentes præcipua pars intus  
 subingens reconditur. Quamobrem perbellē inquit Aristoteles .q. [Maxillis, hēntū genū in-  
 heret, os parūm caudū, partim solidū, & adēb firmum; vt solū inter ossa ferrē aciem respiciat.]  
 Hæc Aristoteles, quauis Galenus de huiusmodi cavitatē, siue in illo expressē determinaret. Est  
 autem ea in primis quidam annis ad septennium vsq;, paulo plus, cōtū dignā cavitatē, hō mē-  
 dulla (prout antea iam diximus .r.) repleta, sed humore quodā albo, mucosoq;, crasso, lentosq;  
 in ossis deinde substantiā paulatim conuertendo. Ad eō vt tandem cavitatē plurimū cōmuniatur,  
 nihilq; in ea præter membranulam remaneat. Dentium verō forma, quodā colorem quidem, in  
 iuuenibus, nisi morbozū humiditas aduerteret, exquisitē candidens: in senibus autē ob rēremēn-  
 titiam humiditatem caloris, ac vitiū imbecillitatē luescens, ac subobscura, non fecis ac de cō-  
 nibz dicebat Aristoteles .s. Quauis in equis contrarium (eodem auctore .t.) succedat, atq; in  
 ceteris animalibus. Cū enim ceteris senectutē dentes nigrescant, equo candidiores redduntur.  
 Quodā figuram verō in homine triplicem inuenimus: Primum quidem incisurum, qui (Galeno  
 docente .u.) acuti sunt, & lati, vt morsu possint incidere: Acuti in quā, acutiq;, ac lati, ab argu-  
 fiore basi extra gingiuas, anteq;, & retro, crassiore, exordientes, inq;, oblonga deniq; aciem, ac  
 rectam, scalpellorum instar, declinantes: superficie interim foris aliquantulum gibba, in tibus verō  
 modiq;

g. 11. v. p.  
 c. 2. verus  
 sine, & c.  
 d. Cap. 2.  
 ped. princ.

e. Eodē lib.  
 cap. 1. v. q.  
 ad 6.

Digestio.  
 f. In procemio  
 tex. & com.  
 g. Cap. 1.  
 h. Cap. 3.  
 com.  
 Temperamētū  
 l. In procemio  
 tex. & com.  
 1. & cap. 3.  
 com.  
 Vitis  
 k. Com. 4.  
 l. Com. 1.  
 ratione pro  
 sophistis .i.  
 Magnitud.  
 m.  
 n. Com. 1.  
 huius  
 a. r. 1. v. p.  
 cap. 1.  
 o. supra  
 com. 1.  
 Propria  
 substantia  
 p. In procemio  
 cō. 1. & hic  
 cō. 1. & r.  
 q. 7. de hill.  
 animal. c. 1.  
 r. In procemio  
 com. 1.  
 Forma.  
 Color.  
 s. de hist.  
 cap. 2.  
 t. Ibidem  
 cap. 3.  
 Figura.  
 u. 11. de v.  
 p. cap. 1. in  
 princ.

modice sima. Secundam vero figuram comprehendimus caninorū, qui parte quidem inferiore ( de  
 eis extra gingiuas etiam loquitur ) Intuscula, crassioresq; iuue; luperna verò , extremaq; acuti  
 ( Aristotele .x. etiam ante Galenum .y. auctore ) vt eò modè possint, quisquid propter duritiem  
 ab incisoribus scindi nequeant, frangere, eduntatereq;. Adhuc vltimam profecto figuram canini  
 proximè accedunt, nisi q; mole sunt crassiora, sineq; angustiore, ac magis obtusa. Tertia deniq;  
 figuram ipsorū molarum agnoscimus: latos enim magis nosq; de asperos Galenus videm posuit. 2.  
 quodammodo in quadratū superior eorum pars, quam mentum dicunt, vergit; totū cum ed parte,  
 que gingiuas excedit: maximèq; intonarū duarum, quarta scilicet, quantaq; molarum. Sed  
 hæc de ipsorū figura quam breuissimè posuimus. Nūmerus autē in prædictis iam est. .x. Vt circa  
 ipsum nō amplius in notandum veniat. Foramina verò, sinusq; tot quidem constituendi sunt,  
 quot eorū radices. Ad eò vt incisionē, caninūq; singulū singula foramina in radice apicē, ac rēctis  
 singulos quòq; sinus habeant. Molares verò obtusitate singula, nōnullæ verò binæ, vel ternæ, sūt  
 etiam quaternæ cum suis internis sinus foramina obtinuerint. Quemadmodū de radicum nu-  
 mero prædictū iam est. .h. Sentus deniq; ipsorū declaratus iam iam est. .x. Vt ostē ista prædicata  
 statim ab initio propozita. .d. vt qualia nam sint per se singula ossa, denteq; etiā ipsi eū dī, gno-  
 scantur, explesuerunt. Præter que, quā inuicem structuræ eò sinus alij collis habent; & quomòdò  
 per gomphosū coarticulatur, præsentiam quorū est. .x. Reliquū est igitur, vt breuiter eorū  
 morbos percurramus. Omne enim morbi genus, nō sicut ac de capitis ossibus prædictū est, .j.  
 pati dentes queunt, tam per se, quā vt eū vtraq; maxilla coarticulatur. Speciatim verò de  
 hoc est, dentū dolore, .h. .v. quod est, dentū stupore ( vt antea dīximus .g. ) pati eò iue-  
 runt. Præter q; de iustice, de nigritiq;, ac rēndantia, & inopia pati, tumoreq; tandē, ac  
 præ dicta etiā a postema pati, & omnibus de fluxionibus subijci, in nostro de tumorbz præter  
 naturā libro, .h. ex Galena .j. præsertim dōgnate detronstrauimus; ad eò vt eorū etiā, lapides  
 regq;, ac exostiones in eò fieri, vltimū sepe nō uero sit. Quæ quidē omnia nos alibi suis præter  
 naturā libris, Nunc igitur eūm tyronibus stramonem Galeni decreto dedicauimus; ad alia ossa præ  
 stantissimè, pro dictorum intelligentia dentium figuram hic tres tandem apponentes,

a. de hist.  
 c. 3. de  
 part. cap. 1.  
 circa prin.  
 vbi sup.  
 vbi sup.  
 a. Supra  
 coram.  
 b. Supra  
 mom. cuā 1.  
 c. Com pre  
 cedent.  
 d. In proc.  
 com 1.  
 e. Com 4.  
 h. In 8.  
 i. In 10.  
 k. Com. 2.  
 h. Supra  
 cap. 3.



In prima quidem figura sim itæ partis octo superiores, octoq; inferiores dentes ostenduntur.  
 Superiores quatuor, hinc A. A. terminati inferiores autē hinc B. B. Nūmerūq; plerūq; de  
 secundis incisoribus præferunt: quorum radices inæquales sunt longiores chinæ prædicti; priusq;  
 quam secunda habent. Tertius numerus caninos ostendit. Quorūm profectò radices omnino  
 gūstissimæ sunt. Reliqui verò quinq; ad obtusū usq; molares sūt. Notare iūtem molarū radices  
 sunt eo modo, quo maxilla ex parte inuenitur. Præsertim dūe caninis proximè, superiores quā  
 dem binis, inferiores verò simplicitibus radicibus innixæ. Quibus aliter inter dū eorūq; ( prout  
 antea iam de eorūm .x. .j. Vltimū verò tres molares, inferni quidem binis; superi verò ternis  
 tantū radicibus in hac figura depicti sunt. Promississimū verò, facillimèq; vniuersū; est, aliā  
 gūstari, siue in tertio, siue in quarto, aut quinto, radice; vt superius quateris, inferni verò tria  
 innatant. Sunt autē in eade figura tres dentes seorsūm depēdi. Quorū C. molaris dentis inest  
 sam denotat. D; apertus, utriusq; aciem præferat. Sed E. mediū molaris dentis per mediū dū  
 partem conuenit. In qua sinus delineantur, totidē quidē, quot radices existunt. In secunda autē  
 figura inferior maxillæ, cū suis dentibus anteriori facie exprimitur. In tertia verò eadē postē  
 non sed præparat. Superior enim maxilla, vñ cū superioribus dentibus, præsentia quidē in  
 præcedentibus figuris est; præsertim verò in septima proorū figura. Vtraq; autem maxilla præp  
 cū dentibus delineant, antemū quidem in prima eiusdem proorū figura depēta est: secundam  
 latū verò, in secunda, tertiaq; & sexta eiusdē proorū. Itemq; in quatuor omnibus tertijs eorū  
 gūstari præcipit figuris delineata est. Verūm enim erō cum ipsa maxillis dentes omnes in  
 gūstari; præsertim verò sinus, superi, de superiore sit. J. Reliquū est, vt de inferiore Galenūm  
 Annotatum loquamur: sic dicentes

Com. 2.  
 h. Supra  
 cap. 3.  
 Com. 2.  
 h. Supra  
 cap. 3.  
 Com. 2.  
 h. Supra  
 cap. 3.  
 Com. 2.  
 h. Supra  
 cap. 3.

Πηξὶ τοῦ τοῦ κάτω γένους ὄντων, Κορυδαίν. ἔ.

De Maxille inferioris ossibus. Caput Quintum.

Ἐὰν τὸ τοῦ κάτω γένους ὄντων ἔσται ἄνωξ, ὡς ἔσται δὲ γένος, ἐξήμερον γὰρ, καὶ τὸτο διακρίσται καὶ ἄνωξ καὶ ἵκναι, ὡς παρὰ τοῦτο σαφὲς ἔστι ἐπισημασμένον.

TEXTVS PRIMVS.

Neq; maxillę inferioris os simplex est, prout alicui fortassis videatur. Cōdū nanq; id, in summa menti extremitate dissoluitur, ut ipsum coaluit, manifestę apparet.

COMMENTVM PRIMVM.

**A**NC solum Celsus .m. maxillę nomine donauit : supernam interea potius malam appellans, Galenus verò vtrinq; , γένος, hoc est, maxillam vocat, inferiorisq; mediū extremam, γένος, quod nos latine mentam nuncupamus. Ex aliorum verò plerū animalium inspectione adceptus est Galeus, duplicem infernā maxillā esse existimans.

Cūm boum, eq̄uorum, asinorum, canum, caprarū, ac reliquorū id genus multorū maxilla hæc inferior per elixationē facile in duo ossa distinguitur. At hominis ; diuisarimq; ; ac de cetero peccorum inferioris maxillę os tale nō est, sed perpetuū simplex. Ad eōd. ut neq; per elixationē (quanuis hæc ad ossis tabefactionē vsq; fecerimus) Neq; per cariem in antiquissimis coniectetis, vel terra defossis talem separationē in hominis perfecti mento viderē nobis liceat. Quōd si Galenū ē recentioribus nōnulli saluare conatur, dicentes, eam de tenerriam maxilla locutū fuisse. Cūm in pueris antę annum præcipuē sui ortus cōpletam, pauloue plūs interdūm, diuisū esse mentū conspicimus; piē magis, quam verē ipsam ab errore liberare nixi sunt. Et enim de perfectis ossibus hic loquebatur. Aliter & frontis, & occipitis ossa plura etiam diuisa congruebat, similiterq; vertebrae, ac multa quoq; alia ( de quibus nos antea meminimus .m.) ossa nō simplicia, sed duplicia, vel triplicia, aut etiam multiplicia determinasse. Haud verō interea valet quod de appendicibus hi subdant, quōdam scilicet in imperfectis tantum ossibus, nō autem in adultis illę reperitur. Appendices enim viginti, de quibus Galenus ipse meminit, scilicet ossam duodecim magnorum, et humeri supendū, et duarū, infernas; itemq; radū, femoris, tubercū, ac fibula supra, infraq; , vel in ipsi sentum, nōnulli perfectiorū in præcipuis ossibus, tūm multa elixatione, tūm danti casu per terrā acquisita dehiscent, propalanturq; . Vnde velut de appendicibus eas tā tūm epumerant, quæ in adultis etiam apparent : Ita de huiusmodi ossium diuisiōibus obseruasse debuerat Galenus, eas duntaxat annuerans, quæ in adultis etiam perseverant. Quisimodi maxilla quidem inferior nō est : cūm neq; ob elixationem, neq; ob quanuis cariem aduolūtū hominum metum in duo segregari esse; visum vniquā t nobis sit, quemadmodū neq; simiarum. Duplicitatis igitur ratio, quam abibi Galenus assignat .a. ( quia scilicet geminū est corpus) in homine ipso cessat : in quo rotundū, & indiuisam extitisse melius fuit, quemadmodū & duram, capacitatem; perexigua præditam, ob nuditatem. Nisi enim ( eodem quoq; auctore .p.) ex propria sui substantia patenti difficultate esset adceptum, facile vtiq; prominens ad eō, ad nūdū expositorium, contunderetur, ac cōpriueneretur. Quam etiam ob rem neq; cōcauum ad eō apertū, inmoduliosūq; in homine ipso, quemadmodū in brutis, quadrupedibusue multis, præsertimq; in posterionibus eius partibus cuiusmodi os est, quanuis ad latera, mentūq; , versus, quēdam enaritas, leuiteris cuiusdam (ob musculorū inouētum eōmoditatem) gratiā ipsi insint ; in modū inferam infaret : ut in modullosorū ossi numero iam in præcipio locarimus .a. Inferam verō nec ad eō densam, ac durum vcluti leonibus est. Cūm enim duos scopos natura sibi proposuerit. Alterum quidem diaphatiam .a. Alterum verō facilem, promptūq; motum. Ad verūq; simul in hominē ipsā attendit, mediocri quadam duritie, ac densitate, quibusdam paruulis interpositis ad leuitatem cauernis. Cūm tamen leoni densissimū inferens mandibulę os sit, ut cui fortiores iuuiculi donati fuerunt, Leonis enim inuolanda vires potissimū consistunt; ideōq; fortē habet maxillam necesse est. Nō enim in eō dentes validos natura fixisset, vel melius dixerimq; , in eius infernis partibus ad eō validos dentes natura genuisset, neq; gignere potuisset, forasq; extraxisset. Nisi talem quoq; ipsam maxillam effecisset. At homo, qui polyticus est animal, ac mansuetum, maxillam ad eō fortem nō requirit. Sat igitur fuit diaphatiam ei cōparasse, tūm mediocri duritie, ac densitate, tali quōdam, tāq; , ne musculis nimium pondus inferat, tūm vnitate. Nullam enim diuisiōnem habere ex eiuſdem Galeni .r. monumentis probari melius potest. Quia natura

m. Lib. 8. cap. 1. & 7.

Cōtra Galenū.

Quorūdam expositio.

Impugnatio.

n. in proc. com. 1. cōcluf. 4.

\* Ibidem 824.

Cōtra Galenū. 8. 1. d. v. p. 5. 10. circa med. & 19. post princ. p. ibidem cap. 1. c. 1. ca. finem.

q. Tex. & com. 7.

cap. 1. c. 1.

cap. 1. c. 1.

cap. 1. c. 1. in med.



(ni fallor) metuerit maxillam inferiorem in multa ossa diuidere, ne in vehementissimis motibus dissoluatur facile, ac coteratur. Magni autem, ac fortes erant futuræ maxillæ huius in mordendo, corporaq; dura cõminuendo, cõterendoq; motus. Non rectè igitur Celsus molle os esse maxillã ait: s. quinquã rectius, quæ Galenus eam vnã esse, hoc est, vnũ os, cuius eadem, & media, & etiã ima pars mentum est. Sed huius extremas partes consideremus.

Cõma Cel-  
sum.  
f. Lib. 3. c. 1.  
note 174.

## TEXTVS SECVNDVS.

Τὴ δὲ ἀνωτέρωθεν ἐν τῇ τῆς κεφαλῆς ἀπὸ μέρους, εἰς δύο τιλαντὰ σφῆρα, καὶ τὴν ἑκάστην, ἢ τὴν ἑξ ἑκ τῆς κροταρῆς μὲν καθόλου διέχεται τίνοντα, καὶ ἑξ ἑκ τῆς κροταρῆς τῆς τὸ τῆς κεφαλῆς ἐξ ἑκ τῆς ἀνωτέρωθεν τῆς κεφαλῆς, καθόλου τῆς κροταρῆς, καὶ τῆς ἐξ ἑκ τῆς κεφαλῆς καθόλου καθόλου καθόλου.

Pars autem eius quasi ad caput sursum vergens in duos terminatur fines. Atq; horum finium, Acuto quidem tendentem ex temporali musculo descendentem suscipit: Altero autem, condylõs quadam rotunditate ad capitis os, sub mammillari processu articulat: in glenoidem, oculi lacrimæ cavitatem ibi sese infrens.

## COMMENTVM SECVNDVM.

**D**VO sunt fines, siue extrema vtrinq; maxillæ superioris: veluti supra iam declarauit, per hæc verba .x. [ Sed ex eius extremis partibus: quæ infra est, .x. per symphysim vnitur: Quæ autem supra duos processus habet, coronen .B. videlicet, ac vruicent .x. tantum ] Dicit autè tam hic, quàm ibi Græcè [ τέρμα ] hoc est, fines, siue extrema, aut si maius dicere, extremitates. Balamius autem vel legit, vel legendum putauit [ κίρμα ] quod est [ cornua ] Celsum imitari volens scribentem .x. [ Verùm ipsius maxillæ partes extremæ quasi bicornes sunt. ] Idcirco ait [ duobus quasi cornibus terminatur ] Qui minis etiã rectè verba illa [ ἀνωτέρωθεν ἐν τῇ τῆς κεφαλῆς ] Latinè interpretatus est [ quæ quasi capitulata est ] Ex duobus enim finibus, alter tãtam capitulatus est, ceruicemq; habet: Alter verò acutus est, quem coronen appellauit. Nõ igitur superior illa pars capitulata magis, quã sine capite esse, vel si maius, coronata dici potest. Rectius igitur nos vertimus [ quasi ad caput sursum vergens ] Ad capitis enim os vergit. Ex duobus autè finibus, processibusq; alter acutus est ( κεραία Græci vocant ) quo quidem inferior ipsa maxilla tendentem à temporali musculo .A. descendente suscipit, obq; hanc insertionem factus huiusmodi processus est. Alter verò in ceruicè, demòq; in caput quoddam terminatur. Quod caput, siue capitulũ καθόλου κροταρῆς, hoc est ( vt nos vertimus ) condylom, siue cõdylorum instar rotunditatem nominat ( latino enim nomine earemus, nisi circum scribere velimus ) Quamobrè pro huius nominis [ condyli ] intelligentia aduertendũ quoq; hic sedulo est, qd variam habet apud ipsũ etiam Galenũ, nodũ Græcos alios, significationem. Adeò vt nõnulli ( Galeno metipso referente .x. ) artuum capita omnia generatim tum cõdylos, tum epiphyses nuncuparint. Sed alius omnis, quæ in nostro de tumonibus præter naturam commentario .y. ( vt antea quoq; inuimus .z. ) præstensa iam sunt, ea duntaxat, quæ ad nostrũ propositum faciunt, duo significata, primũ videlicet, ac secundũ ibi enucleata nunc perpendamus. Quorũ primũ est, vt pro digitorũ extremitatibus capiatur: cum scilicet illi flexantur, eo modo, quo Hippocrates libro de articulis primo .x. accepit, quẽm ait [ Insectis enim condylis alterius manus sub alam articuli sursum propellunt. ] Galenũq; statim in cõmento subdit [ Primus repositionis modus hic est, quàm vel ipse æger, vel medicus aliquis cõdylos manus sub caput brachij subijcit, &c. ] Vbi ad maiorem declarationem interpres addit [ nodos digitorũ ] E' qua condylorum significatione, condylomatũ in sede, atq; vteri ceruicæ existentũ quorundam tumorũ nomen deuenire ostendimus: quoniã scilicet instar nodorum digitorũ manus plicatorũ tumores quidam sunt. Ad hunc igitur sensũ, primũmque significatũ, in ferioris maxillæ tubercula, seu capitula cõdyli nunc assimilata. Quoniã si exquisitiũs perpendas, mirum immodum illorũ predictos nodos, oblonga sua quadã rotunditate, finis alter vtrinq; representat. Alterũ verò eiusdẽ nominis cõdyli significatũ à Galeno declaratum retulimus libro de motu musculorũ primo, .B. dum sic ait. [ Vocatur autem cavitatis ( quæ scilicet manet, sedetq; ac recipit ) & glene, & cotyle: concuuitas verò ( quæ scilicet mouetur, & à cavitatis recipitur ) caput, & condylus. Tamò autem cotyle, quam glene est profundior, quãtò caput condylo est longius. Vtrinq; enim vtriq; velut cardini locũ aptum natura cõparauit. ] Ecce igitur quomodo differentiã ponit inter caput, quod Græcè κεφαλή, seu κεφάλιον dicitur, q. d. capitulum, & cõdylon: quoniã illud est magnũ, hic verò paruum, illiq; respondet κροτά, latinè acetabulũ: Huic verò γλήνη, superficialis quẽdã, obliquatq; cavitatis.

cauitas. Vnde sicuti caput cum cotyle per enarthrosin, ita condylus cum glene per arthrodi-  
 articuli, iam antea declarauimus. Cum igitur condylus quoddam rotunditate in glenem, si per-  
 ficiamusque cauitatem sese inferi dixerit hic Galenus; apertissimè per arthrodi dearticulationem in-  
 nuat. Id quod (salus interim pace tanti viri) falsissima est. Quoniam & exoptens cuius profundum  
 est, & caput ingrediens oblongum, ex eademissima ceruice protruberans. Nò sicut in arthrodi  
 ancipitis sunt distinctionis, sed manifestissimè, quod nam ingrediens, quodue suscipiens sit, de-  
 terminationis. Nec minùs ab euidèntissima veritate decauit esse, quod Galenus hic subdit, huius-  
 modi scilicet dearticulationem sub mamillari vocato processu fieri. Cum ab eo plurimum in homi-  
 ne distet, auditoriùq; anulus interfit, posterioriq; nò superior mamillaris dicitur processus esse sit.  
 Rectius igitur fuerat, ad iugalis ossis inferiorem; posterioremq; finit radice huiusmodi de-  
 articulationem designare, loco scilicet ossis temporum, inter iugale, ac auditoriu meatus, medio.  
 In homine inquam, in sinujs enim, quas frequentius, presertimq; dicit hæc scribent, Galenus,  
 quam homines cõtemplabatur, ad veritatem magis eius sermo accedit. Cùm huiusmodi mamil-  
 larem processum zygomatici aduinctu ille habeant, medium quidem interstantem zygomaticum, &  
 auditoriu meatus. Sub ipso igitur mamillari processu in sinujs, presertim quòd caput in terram  
 declinat, vt quadrupes habeat, dearticulationem fieri, docere possumus. Factus igitur secun-  
 dus hic inferioris maxillæ processus est, propter euidenti cù capite dearticulationem in mon-  
 suis necessariam. Cur autem maxilla hæc appendicibus careat, cum antea declaratu à nobis sit, ã  
 non est, cuius frustra repetendum veniat. Quoddam vero [ inquit ] ædifices erant futuri maxilla  
 huius in mordendo, ac corpora dura cominendo motus [ inquit Galenus. s. ] ob id natura arti-  
 culi eius acuitate prospexit. Alteri quidè [ scilicet processui, largè enim hic euis articuli nomi-  
 ne donatur ] qui orone nuncupatur, os iugale circumponens, in maxillamq; multum temporalis  
 tendens emittens; Alteri vero [ scilicet processui, atq; etiã articulo verius dicto ] quos ueriusq;  
 hosti est mamillaris capitis processus appellant, tutum circumponens præsidium, ne quoddam mo-  
 tentis motibus à subiecta cauitate prolaberetur. ] Hæc Galenus. Quisquidem mamillarem dicitur  
 processum tutum esse circumpositi præsidium maxillæ articulo voluit. Minus aduictus parte  
 duntaxat posteriori præsidium id esse, nec ad eum cõmodum in homine ob id substantiam [ sicut aliter,  
 vti diximus, in simijs ] Cõuenientius igitur præsidium eius articuli est superiora quidè, antenorq;  
 in parte circumposita ipsius zygomatici iugalisue ossis radix : quæ totum articuli anterius, superi-  
 oriq; cooperit defenditq; posterior autem auditorius meatus mamillari prædicto processui in-  
 sinujs. [ Merito autem (vt rectius subdit idem Galenus. s. ) hunc articulum ex posterioribus par-  
 tibus habuit corone (q. d. merito coronen anterius, articulum verò posterius natura posuit, so-  
 cauitq;) ipsa autem corone fursum tendit. Nam quòd os claudatur, soli huic corone, ac musculo  
 temporali. s. ferendū est acceptum : qui totam maxillã fursum trahit. Maximè hæ claudendi  
 vim incisæ intelligi, in Galenū condennare velimus, non parum nano; conserunt musculatorius  
 musculus vocatus, s. ac ordine eua tertius, s. quem in tñs litescentè dicimus. Aperiunt autem  
 ipsum, tñm posterior articulus, qui est ad mamillares processus, tñm musculi articulum mouen-  
 tes, quos musculis temporibus oppositos esse diximus. g. ] ( Vt sunt quarti ordinis musculi bi-  
 uentres. s. os ipsiū, inferiorem maxillam deorsum contrahendo, aperientes ) sed ne hæc quidem  
 munimenta tantum contenta est pro hoc articulo natura: Alia enim adhuc consideranda reman-  
 ent. [ Habet enim (vt euelligit Galenus idem subdit. s. ) dearticulatio hæc circum se ipsam  
 sortia quedam ligamenta, ac præterea chartilaginea multa in orbem circumsulca. ] De ea intellexit  
 chartilagie Galenus omnibus articulis cõmuni, quæ tam recipienti cauitati, quàm ingredienti  
 capitulo crusta modo obducitur. Ne os ossi, vt durum duro, abiq; in remedia substantia, appo-  
 situm in motibus coneratur vt rugis, ac infanscentur. Præter hæc autem cõmuniem chartilagi-  
 nem, alia quedã inter sinum, & capitulū mirabilis visu, peculiaris huic articulo chartilago in-  
 terposita est (cuius figurã hic in margine depictã habes) rotunda, leuis, terius, ac mollis, ligamentū  
 potius, quam chartilaginei, siue chartilaginei ligamenti naturæ representans, ligamentum duntaxat  
 articulo vndiq; cõprehendentibus, non ossibus adnascens. Cuius visus est, tñm vt facilior, la-  
 bricusue magis huiusmodi articuli motus, tam mandendo, quàm mordendo, ac præcipuè in ho-  
 mine loquendo fiat: tñm vt validus, assiduus; his in motibus ossa defendantur, ne ex cõnuat-  
 tritione inflantur, cõterantur, aut fortasè frangantur. Maiori enim circa hunc articulo  
 diligentia naturæ opus fuit, ob cerebri vicinitatem, cui quicquid in articulo nocuerit cõmuni-  
 carentur: Idcirco præter omnibus articulis cõmuniem chartilagineam, in hoc prædictam sapien-  
 tissima natura excogitavit. Sed nescio quomodo à nostro proposito digressi quadatenus ad char-  
 tilagines sumus. Ad os igitur maxillæ inferiorem reuertamur, octo illa statim ab initio proposita  
 prædicata in eo perpendicularis, Quoad temperamentū igitur nil noui dicendū occurrit, nisi quod  
 aliorum instar frigidū, siccumq; est, terrefactū, ac durum. Vius ex præsentis pernoti iam sunt,  
 nò solum ad faciei cõplementū, sed inferiorū quoq; dentiu cõprehensionem, ac per hoc ad edẽ  
 vsum

c. In proc.  
 scilicet com.  
 1. s. & 147.  
 Cõtra Ga-  
 lenum.

Cõtra Ga-  
 lenum.

Galenus ex-  
 cursio.

d. In proc.  
 com.  
 e. r. s. p. p.  
 cap. 10. cir-  
 ca med.

Cõtra Ga-  
 lenum.

f. Ibidem.

g. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

h. Eodem  
 cap. 10. cir-  
 ca finem.

i. Ibidem.

k. Ibidem.

l. Ibidem.

m. Ibidem.

n. Ibidem.

o. Ibidem.

p. Ibidem.

q. Ibidem.

r. Ibidem.

s. Ibidem.

Digestio,  
 Tempera-  
 mentum,  
 Vius.

visum executionem. Quid enim facere possent superiores dentes, nisi oppositos sibi haberent inferiores? sicuti de molendinis quoque; mollis dicere possumus. Cum igitur inferior hæc maxilla in omnibus præter Crocodylum, a nantibus moueatur, prædicat .i. omnes dentium vsus maxime ad eam referendi veniunt. Quorum ratione tibi motu; tiam validos ei datos esse musculos, prædictum quoque iam iam est. *k.* Crocodylum verò \* nõ hanc, sed supernam: velut Psysctacus vtrinq; mouent. Magnitudo eius in homine, pro totius corporis mole, cæterorumq; animalium respectu (Galeno etiam docente \*) breuissima est: cum facies eius rotunda sit, noui autem vt reliquis animalibus cibum inclinãdo assium pturis oblonga. Duram verò substantiã eius medicoriter esse, atq; vitam, cum paruis interim ob leuitatem cauernis, ac per hoc medullosam, prædictum iam est. *l.* (cuius tubercula quedã, asperitaciã; honnullas, atq; eorum simul vsus annotabimus \*) Bicorenariq; vtrinq; ac in medio rotundam eius figuram fuisse, prædictum quoque est, vnicamq; in homine, non duplicem esse, vt numerum partium disquirere, superuacaneum sit. Quocirca tempestiuum est ad eius foramina pertransire, quæ quidem paria duo sunt: Alterum quidem, ac primum interius sub prædictis processibus in medio, amplius quidem, asperitaciã; & inæquale. Per quod quidem foramen tertij neruorũ patris ea per quartum sphenoidis foramen emergens tertij omnium maxime propaginis portio in maxilla penetrat, pertransitq; suis dentibus distribuenda. Cum qua quidem, vena etiam, & arteria similiter distribuendæ ingrediuntur. Alterum verò par est, quod exterius ad vtrinq; menti partem attingit, iãtioris quide longè minus. Per quod euadit portio nis neruorũ aliquod residuũ in humilis, inferiusque labium, eiusq; musculosam substantiã distribuendum egreditur. Quamuis autem distincta foramina hæc à primis sint, inuicemq; ac diuersi eorũ vsus: vnicus tamen meatus est; per quẽ ingrediens prius, postea tãdem egreditur. Quam quidem vnionem non modò maxillæ ossis effracto confirmabimus, sed per quã seta prius interno foramini indita, foras per secundũ exeunte. Cõiuncta igitur quatuor hæc foramina prædictis capitis foraminibus quinquaginta, superioribq; maxillæ duodecim; erunt omnia in prima sceleti parte foramina sexaginta sex. Quibus expeditis, sensum quoque; contemplantis, eo carere maxillam hanc ( præterquam in dentibus ) aliorũ omnium ossium instar, cõpertissimũ habemus. Eapropter ( vt in alijs quoque; prædictis obseruauimus ) alia quoque; disquiramus. Anteriorq; tanquam nullis hinc existibus omissis, duos sinus inferiores hæc in maxilla sub primo præscripto foraminũ coniugio intus existentes perlibrare possumus. Quorum vsus est, vt intus latefcentiũ musculorũ inferionem cõmodius ea maxilla suscipiat. Qui capitis præscripti septem sinibus adiuncti, nouem in prima sceleti parte resulant, præter dentium iniquã superioris, nedum huius in senioris multos radicum multitudini responddentes sinus. Quibus etiam fossulas addere debemus ( prout antea .m. diximus ) quibus dentes infiguntur ad summũ sexdecim magna ex parte, rarissime autẽ duodeviginti: si dentes duntaxat cõsideremus. Quamquam si exquisitius perpendiderimus, longè plures pro radicum cuiuslibet dentis numero fossulæ sint. Cum radix qualibet suam habeat, in quam inseratur, fossulam. Vnde cum in radicibus suis dentes differant, ita & in fossularum numero. Quod ad appendices, epiphytise, prædictum iam est, .m. nullam maxillæ inferiori inesse: Apophyses verò, processusque quatuor, duos videlicet vtrinq;, iam iam posuimus .o. Hæc igitur omnia quodã ipsium maxillæ inferioris os per se, ac secundũ seipsum, quale nam sit, dicta intantum sint. Reliquum est, vt eius cum capitis ossibus firmiter quam habeat, perpendamus, eõ modo, quo iam in processu generatim: prius .p. ad diarthrosim, dein verò lpeuatiã ad enarthrosim .q. quinimodò ex Celsio tandem ad ginglymon .r. reduximus: quam capite rursus primo suppositimus: .f. vbi morbos quoque; quibus vesari solet, enucleauimus. Vt ea nunc repetere, superponendum sit. Cum reuolutis quibusdã chartis facillimè percurrere vnusquisq; possit. In prædicti autem capite nouas repetere tabulas, figurase, superstruimus fuisse nobis visum est: cum illas præcedenti capite satis superq; ad nostrum propositum idoneas, secundam scilicet, tertiamq; habeamus. In quibus quidem perlibrandum est, quod littera A. capitulum illum processum præferret, quem capitis ossi dicto temporum dearticulati prædicimus B. verò eiusdem processus continuationem ostendit. Sed C. alterũ processum indigitat, quem coronam appellauimus. In vtraq; autẽ figura idem significant, in secunda inquam, tertiã; figura: in secunda quidem exterius, in tertia verò interius F. autem tertiã figurã primum foramen intus: veluti G. secundã secundum foramen, siue secundam par exterius connotat. Præter quas, in secunda figura littera E. asperitatem quandã præferebat exterius in inferiore maxillæ sede factã, vt in eam maioricatus musculus .a. inferatur D. autem tertiã figurã sinum interius sub foramine existentem à nobis antea declaratum annotat, in quem inferi musculũ intus latefcentem .h. prædicimus. Demum littera H. tertiã figurã tubercula quedã parte interna inferius præferret, in quã maxillam detrahentes quartum quidem ordinis musculũ .i. cõplantantur. Indeq; Velalij ordine nonus musculus .x. linguę motui deserviens exortur: quem Faloppus, & Valuerda nõ vt vnicum, sed vt duplicem annumerant, quauis ille primum par, hic verò nonum, & decimum musculum statuat. Exterius autem

i. In proce.  
com. 1. & c.  
precedenti  
com. 1.  
k. in spheni  
cap. com. 1.  
& hoc 2.  
l. ad anat.  
adm. cap. 1.  
ch. ca. princ.  
Magnitud.  
do.  
Substantia.  
m. ad anat.  
adm. cap. 3.  
post princ.  
Figura.  
Com. precedens,  
& in proce.  
com. 1.  
n. in sine  
com. 1.  
lun. com.  
Nuncius.  
Forensia.  
V. S.  
Sentis.  
Anat.  
Sinas.  
V. S.  
Fossula.  
m. Cap. 3.  
com. 1. v.  
verus sint.  
Epiphytes.  
n. in proce.  
com. 1.  
Apophy.  
ses.  
o. ibid. &  
ex. p. com.  
Structura.  
p. com. 1. 2.  
q. com. 1. 3.  
r. com. 1. 4.  
s. com. 1.  
t. circa. h. o.  
u. tab. 1. C.  
f. D. C.  
4. D.  
g. tab. 6. D.  
i. tab. 5. n.  
I. & tab.  
4. Q.  
k. tab. 15.  
fig. 2. 4. C.  
25. n.

Tubercula.  
A. tab. 4. n.  
1. in pr.  
com. 6. 12.  
13. 24. & 16.

eiudem loci litera I. secundae figurae tuberculum alterum ostendit: vnde labrum inferius motum musculis A. vtriusq; enascatur. Hęc autem in prima sceleti parte desita hucusq; sint, prout antea non semel distinximus. A. Ad secundam igitur partem pertranscimus; ab ipsa spina, tanquam totius carina cum Galeno exordium sumentes.

De Spina. Caput Sextum.

TEXTVS PRIMVS.

Tota hęc spina, & articuli ipsius, tota sunt in parte superioris, & inferioris, & lateralis, & posterioris, & anterioris, & mediana.

Totius spinę vertebrae quatuor supra viginti sunt. Pręter naturam enim quod plus, minusq; est, quemadmodum acuminata capita sunt.

COMMENTVM PRIMVM.



**S**PINAM natura animalibus (Galeno docente. A.) veluti carina in quondam corporis ad vitam necessariam molata (Eius enim beneficium nos quidem recti ambulare possumus: Aliorum vero animalium quodq; gradiuntur ea figura, qua ambulare ipsa prestiterat, quemadmodum in tertio libro docuimus. X.) non cum solum eius vsum esse voluit: sed (quod illa studioso facere solet.) vna constructione partis ad multas alias simul utilitates vti. Recti quidem igitur nos ambulamus; aut etiam stamus, quoties secundum rectitudinem crurū est spina. Id quod cum soli homini contingat. y. Ideo solus homo rectus stare dicitur. Quibus enim, & quadrupedibus angulū rectum spina cum cruribus efficiunt. Siles autē hominibus vna recta linea extenduntur: Tale enim igitur figuram crura ad spinā habent in quadrupedibus, & volatilibus animalibus, dum ambulant, quale in hominibus sedētibus. Ob eam causam nullam eorum stare vnaquā rectum potest. Sedere etiam solus homo potest, & quoniam oportet curua ischijs copulata, in femoris ad tibiam dearticulatione, retrorsum flecti. Spina igitur cum femore, dum sedemus, angulū rectum efficit: Femur vero rursus nisi ad tibiam alio talem efficiat angulū, nequaquam recta ad terram tibia foret. Ob idē, secūptas sessionis corrumpetur. Si igitur quādo flectuntur in genua sola ischijs cōiuncta, tunc sedere animal accidit: Manifestum est, nulli quadrupedū posse contingere. Omnia enim anteriorū posteriorū e rurū habent flexiones, quāuis crura eum spina rectū angulū cōstituant. Quāuis hęc Galeni dogmata Vesalio. A. minime satisfaciunt longius brutorū pedē perpendēti: ab ea scilicet articulatione, quę anteriorū in posteriorū erubus flectitur; quam partem vulgō nostri garronem appellant. Verū non in solis ossibus, eorumq; constructionibus, at in musculorū quoq; positionibus, inferioribusq; diverſitatis ratio, propter diverſos interea fines cōstitit, penneacē aliās vberius ostendemus. Ad spinę vſus cōverti nos tempeſtiuum est. Primus igitur spinę vſus est, .b. vt veluti reliquorum omnium in nauī fabricatorū carina: Ita & hęc in animalis corpore velut sedes quedam sit, & fundamentum instrumentorū omnīū ad vitam necessariorū. Pręter hunc autem, alij quoq; spinę vſus existunt. Secundus igitur est, .s. vt via quedam spinalis medullę sit. Principij enim neruorū omnīū, ac per hoc sensus, & motus cerebrū est, in ipsūmq; , velut in aruam quoddam, anima ratiocinatrix (in homine) vel saltem sensitiva (vt in omnibus brutis) semen ment. Germen verō inde, velut truncus quidā in arborem exurgens spinalis est medulla. A' quo trunco per totam spinam extenso nerui quāplurimū deducū, iustarū ramorū quorundā, in sexcentos propagines distribuntur. Corpus autem vniuerſum per eos sumit primū quidem, & maximē, motū, post eam autem sensum. Itē igitur totius corporis partes vniuerſę, pręsertimq; remotę vel neruis, ac per hoc sensū, motuq; expertes remanent. vel si ab ipſo cerebro lingule proprioſitates reciperent, tūm hos gracillimos, ac per hoc inbecillimos, facilesq; frāgibiles, & minime tutos reciperent, tūm & ipsū cerebrū, continensq; cranium innumens in locis, ac serē per totū, perforatū necessarium fuisset. Velū omnia dubio procul omni absurdissima forent: proinde fatius erit, spinalem medullam, quā fluxum quondā ex cerebro tanquā fontem manātem locis omnibus, quę preterent, neruū semper immutare, tanquā sensus, ac motus riuulum. Secundus igitur spinę vſus est, vt viam huic spinali medullę præbeat. Tertius verō est, vt tutū præſidiū eiudem sit, eandemq; ab extrinsecus occurrentibus defendat. Quartus est, vt instrumentū motus sit, quē dorſo, ac spina animalia ipsa obeant. Quibus & ex abundantia quintus accidit: viscerum in partem

12. 1. v. p. 2.  
5. 10. ante  
med. & c. 1.  
versus finē.  
2. etiā ibi.  
art. med.  
10. 17.  
2. Cap. 1. 1.  
& 5.  
y. 1. de v. p.  
c. 2. versus  
finem.  
Solut homo  
mo fiat.  
Solut homo  
mo fides.  
2. libidena  
cap. 3. in  
pino.

4. Lib. 7.  
cap. 1. 3. in  
pino.  
Brucorum  
pes apud  
Vesalio.  
Spine vſus  
primus.  
1. 2. 1. v. p.  
c. 1. 1. versus  
finem.  
Secundus.  
c. libidena  
stam.  
Cerebrū vt  
arum.  
Spinalis  
medulla vt  
trunco.  
Nerui ve-  
lut ram.

Alia cere-  
bei, & spina-  
lisq; medul-  
lę compa-  
ratio.  
Tertius.  
Quartus.  
Quintus.

intrafectis spinæ incumbenti munimentū. Verūm id quidem erat necessariō secuturū. Scopī verō, in quos natura intusita omnem eius constructionem est molita, quatuor sūnt prædicti: atq; etiam sigillatim propriū quiddam ipsi sūnt tributū. Nam quōd velut carina est, & totius animalis stabilimentū, ob eam causam esse ossibus cōstituta est, & his duris. Quōd verō spinalis medullæ est via, ob id intus est causa. Quōd autē ipsi, ac visceribus etiam instar muri est; ob id multis propugnaculis in orbem est munita: quæ paulō post explicabo. Quōd verō motus est instrumentū: ob id ex pluribus ossibus per articulos cōmissis inter se cōstitit. Verū enim verō singulos huiusmodi scopos, vñsq; repetendū elucidemus. In primis igitur spinā totius corporis stabilimentū esse, ac per hoc ossēam, & duram necessariō factam esse ostēdimus. Nisi enim talis fuisset, quomodo reliqua omnia totius corporis membra sustinere potuisset? Præsertimq; in homine, qui rectus incedere, ac stare debuerat? Quinimō reliqua omnia ossa ita spinæ adherent, in nitunturq; veluti omnia navis ligna carinæ: Ad eū vt Aristoteles. d. omniū ossium principū spinā, veluti cor venturam, esse potuerit: videlicet in omnibus ijs, quæ ossa habent. Hinc enim cetera ossa oriri, & constāri voluit. Quæ enim longitudinem, ac resistuntinem continet animalū, spinā est, similem quoq; naturam esse ossibus, & venis inquit; eū vtraq; ex vno orīā continua sūt. Quod tamen Aristoteles decreuit, nisi largē continuā pro contiguo sumptissemus, a pertissimā haberet falsitatem.

Quocirca itam & ipse subdit, rursus [ Neq; os vllum scorfum per se habetur, sed aut pars continua est, aut tangit, atq; annectitur. ] Ecce igitur, quomodo improprie continuum sumptisferat. Quōd si excursus promptē id potuit: Non minus quoq; defendi valebit, omnia ossa spinæ quodammodo annecti, quantum ab ea distare videantur. Quemadmodū v. g. os hyoides nō simplex, sed multiplex existens, quantum stylois processum, siue potius appēdit, mentōsq; & posteriori ossi primo, atq; etiam scapulae cōnectitur; vt à spinā semotum esse apparet; ad ipsam tamen secundandū reducitur, cum ea, quibus annectitur, spinæ coniuncta, colligataq; sūt. Solum de cordis ossē difficultas, cōtra prædictā Aristotelis determinationē est. De quo tamen ossē tanquā sibi incognito, minimeq; vñquā viso, sed ab alijs potius sibi relato nonnunquā meminit. x. Verūm id, quantum ossi proportionale quoddā in homine, alijq; parīs, aut etiā maioris, nedūm minoris magnitudinis animalibus existit, nec nisi in elephantis, antiquisq; moleq; grandioribus bobus (vt nos vidimus) veterinūsq; certis, atq; equis verū os inuentū: In illis tamen vel cartilago, vel ea adhūc minus dura, cōcretaq; substantia est. Cuius substantiæ, quæcumq; sit, vñum in calce huius libri declarandū referuamus. Vbi rationem Aristotelis si, nequaquā valere ostendimus scilicet quōd nec officio fungi valerēt, cuius gratiā natura ossum habetur, & quōd ledere posset, perinde quasi vel spinā, vel stipiculum carni affixum. Cūm tamen de hoc ossē posterior loquens, cordi magno datum esse contēctur, vt eius quasi adminiculū subditū sit: Quomodo totum etiam corpus ossibus sustentatur, & continetur, quasiq; fideiā intentā robūmū totum, nedūm cor ipsam euadat. Ecce igitur os aliqūod spinæ minime continuū, vel contiguū, sed cordis carni affixum: quod tamen interea ossium officio scilicet sustentādi fungitur, neq; perinde vt spinā, seu stipiculum lædit. Sed hæc de primo spinæ vñ. Secūndam autē erat, vt via quædam spinali medullæ sit. Quamobrem intus causam esse oportuit. Verūm circa huiusmodi causatē, nonnulla cū Galeno g. consideranda occurrūt. Etenim cūm spinalis medullæ grossities sensim ad caudā vsq; minuat, attenuatq; quantū in neruorū propagines paulatim quoq; cōsumitur, sic quidem iuste, appōsiteq; vt ne quid nimis, vel dūmūctū sit: Idcirco maiorem in superioribus vertebis cūctatē, in inferioribus verō minorē esse concedens (vt rursus postea videbimus. h.) fuit. Locus enim locato proportionari debet. Nisi interdūm alicuius necessitas vñus gradū huiusmodi ordo perturbetur ( Id quod nō aduertit Galenus, recentiorumq; anatomicorum procerū nōnulli ) Quemadmodum apertissimā apparet in quinta, sexta, & septima cervicis, ac prima, & secūda thoracis vertebis. Vnde cūm nerui effatu digni: qui per brachia ad extremā vsq; manū distribūda feruntur, originem inde habeant; partes illæ spinalis medullæ grossiores euaferunt, ne in tali neruorum propagationē nimium fortasse cōsumantur. Idem verō & in ipsis etiā tertia, quartaq; & quinta lumborū vertebis. Præterea in prima, secūda, & tertiā sacri ossis partibus. Vnde nerui per crura distribūdi oriuntur. In prædictis enim veluti crassior spinalis medulla sit; Ita & vertebularum foramina maiora esse oportuit. In cæteris verō semper attenuadō spinalis medullæ, foraminaq; semper arctandō procedunt. Præterea quoniā quod gestatur manus esse oportet eo, quod gestat ( prout perbellē Galenus. i. testatur ) Inde succedit, vt natura omnīū spinæ ossium in hūm fecerit maximū, ipsum veūt fundamentū quoddā spondyliis omnibus subiiciens, quod sacrum, siue latum os Anatomici nūcupant, ossibus illiū tanquā superiorū basiū in hūrens. Secundum verō magnitudinis locum habet spondylus illi cōiectus, quartus quidem, & vige simus post primum, lumbi autem spondylorū ordine quintus. Hi autē ipsi, cūm alijs rursus sibi subiecti, merito sūnt maximi, & potissimū eorum quintus (vt nuper diximus). Reliqui autem quantū sūnt ab infimo discedunt, tantū & magnitudine cædunt. Quō sit, vt quinq; sūnt spondylorū primus

k. 13. de v.  
p. cap. 4. in  
fine.  
l. Cap. 5.  
quæti cō-3.  
post princ.

M. Tab. 14.  
n. 1.

v. Ibidem  
K. L.

ξ. Tab. 13.  
Q. 10. 14.

11. Tab. C.

Cur supio-  
riores verte-  
bræ viciosa-  
te.

m. Lib. 12.  
cap. 14.

n. Ex c. 11.  
in fine.

Tertius spi-  
nae visio-  
n. Ex c. 11.  
eiusdem in  
fine.

p. Cap. 11.  
post princ.

Spinales  
procciffæ.

Charilago  
illorum.

q. Lib. 11  
cap. 17. in  
princ. 4. 3.

circa princ.  
7. 21. post  
princ. & c.

3. & 4. 1. 5.  
circa med.  
12. 3. in  
princ. & 13.

7. in fine.  
& 9. circa  
princ.

Quartus  
vitus.

n. 12. v. p.  
ca. p. 1. ver-  
sus finem.

Cur spina  
nō ex vno  
offic. sed plu-  
ribus.

f. Ibidem  
cap. 10. cir-  
ca med.

1. Ibidem  
11. de v. p.  
cap. 18. cir-  
ca med. &  
22. 11. ver-  
sus med.

Cur spina  
nō ex inde-  
terminatis  
pluribus.

u. Vbi su-  
per fasciæ  
11. cap. 10.  
versus finem.

fit minimus, & eo rursus minor fit dorſi poſtremus, qui cum eo eſt cōmiſſus: atq; hōc rursus qui ipſum antecedit. Idēq; ipſum fit ſemper vſq; ad ipſum caput. Nuſi forte aliquis paulo maior adiacentibus ſit interſectus: idēq; cum magna vtilitate: quemadmodum in prima vertebrā contingit. Craſſities enim maxima illis partibus, vnde neruſi oriuntur, a natura ſunt comparata, non oſioſe neq; temere: ſed primā vt ibi tutō (Galeni dogmate .k.) perforaretur (quanquā de huiusmodi perforatione, quōd hominis vertebrā hanc pertinet, rursus infra ſermo futurus eſt .d. Deinde, ac verius, vt parte infera ſecundū ſpondyli cōiunctas, ſuperna verō capitis emiſſentis exciperet. Qua enim ſpondyli ipſius partes maxime erant elaboratae, has præter ceteras, ſatis ſunt fortes efflicere. Sic igitur primā vertebrā ſecundā latiore eſſe, propter cōmodas eum capite dearticulationes, gratiaq; cōmodē quinti, .n. & ſexti .v. caput mouentiū muſculorū inſertionis, atq; etiā tertij .ξ. ſcapulā attollentis muſculi exortus. Pariterq; deinceps ſecundā ceruicis vertebrā validiorem, grandioſioremq; tertā factā eſſe cōmodē articulationis eum primo ſpondylo, colligantiaq; etiā cum capite perdētē gratiā inuenimus. In his igitur duabus magnitudinis vertebrarum ordo interrumpitur, maximē (vt dictū eſt) vtilitatis cauſa: Ex his igitur præſentis, tū quōd ſuperiorū cauitates maiores eſſe debeant, ſenſim diminūdo vt procedēt: tū quōd ſuperiorū vertebrarū magnitudinē minore eſſe conueniat; paulatimq; angēdo, & in grōſſiores ſubſtantia vergendo procedere, neceſſariō cōſequatur, ſuperiores vertebras. m. tertiorū corporis, quam inferiores eſſe. Qui enim auerſit naturę in ſpina excauitate craſſitiem ſpinalis in dulle pro ſcopo fuiſſe propoſitā: cuiusq; ſpondyli differentiā nō diſſicillimē inueniet. Nam cūm (vt monuimus antea .u.) ob nullā aliam cauſam natura ſpondylos ſic excolpſerit: niſi vt viam quādam hanc tutam ſpinali medullæ cōpararet, oportuit ſanē cāpācitatem iſpōrū internam ſpinalis medullæ craſſitiei eſſe equalē: Quæ cūm in ſpondylis omnibus non ſit equalis, ſicut in primis maxima; conſentaneū eſt, vt horum etiā ſpondylorū latitudo aliorū ſit maxima: iam verō ſi latoſ quidem hos, ob ſpinalis medullæ, quæ illic eſt, craſſitiem leues autē, quōd omnibus ſuperioretant, efflicī par erat: perſpicuū eſt, quōd ſtatim tenues quōq; eſſe; erat acceſſe. Nam qui ſien poſſet, vt leues eſſent, ſi lati ſimul, ac craſſi fuiſſent facti. Primi igitur ſpondyli ob hanc vtilitatē lati quidem internis ſuis cauitatibus, tenues autem corporis mole exiterunt. Sed tertium ſpinae vſum repetamus: qui erat, .o. vt tutum ſpinalis medullæ præſidiū ſit, eamq; ab extrinſecis occurrentibus defendat. Ad eō vt inſtar muri ſit: ob idq; multis propugnaculis in orbē eſt munita. Ob eam igitur cauſam (Galenus idē ait .p.) natura tū alia multa, atq; admirabilia in ſpōdylo eſt machinata, tum autē & quam dicitur, id eſt ſpinam, ſeu ſpinā picem vocatū ex medijs partibus poſtremis produxit: quæ eſt veluti vallum quōdam ante ſpinam totum oppoſitū: quōd prius ipſum cōtunderetur, ac cōminueretur, modiq; omnibus aſſicerebatur; quam ad vllum ſpondyli noxa perueniret, vſq; ad poſteriores ſanē ſines ſpina ipſa eſt os: ibi verō eſt charilago quam plura eī circumiacet. Demonstratū enim id nobis antea .q. ſuit etiā, charilaginis ſubſtantiam ad ſubſtāta inſtrumēta tegenda, ac defendenda, maxime eſſe idoneā: vt quæ neq; cōminui, neq; trumpi, quemadmodū dura, atq; friabilia, neq; in caſi, neq; contundi, quemadmodū mollia, ac carnea, queat. Quartus deniq; ipſę vſus propoſitus eſt .p. vt inſtrumētū motus ſit, quem dorſo, ac ſpina animalia obeūt: ob idq; ex pluribus oſſibus per articulos cōmiſſis inter ſe cōſtruit. Haud enim ex vno oſſe ſimplici (Galeno etiā docente .f.) atq; incompoſito totam ſpinam efficeret: quāquā ad ſedē tutā id eſſet vtilis: cuius neq; luxari, neq; diſtorqueri, neq; eius generis affectū quemus incurere, ſine varia (vt vnus) dearticulatione poſſet. Et quid ſi tantū & diſſiciliter pareretur, rationem habuiſſet, neq; ſcopū alū in partibus conſtruendis haberet antiquiorem, haudquaquā aliter, quā ſimplicē ipſam effecit, aut omnino incompoſitam. Neq; enim ſi lapideū vel lignū animal effingere velis, aliter ipſum ſeceris. Satis enim eſt ſtabilitatē vnū eſſe per totā ſpinam porrectū, quam plurima eſſe exigua, & ea articulata diuiſa. Atq; etiā artus cuiusmodi in animalibus lapideis, aut lignis exiſtmo eſſe longē antepoſendos. Reliquū corpus totū cuiusmodi ſimulachrorū, ſi vno lapide ſit conſtatū, multo aduerſus iniurias eſt tutius, quā ſi ex multis fit cōpoſitum. Animal verō, quod membrum ſuis eſſet vſurū, pedibusq; ſuis ambulaturū, ac manibus apprehenſurum, dorſumq; inclinaturū, ac erecturum, nō erat melius in pedibus, aut in manibus, totaq; ſpina os vnū habere. Sed cum multis, ac vanis motibus eſſet vſurū: fatius fuit ipſum ita cōparare, quā ad motū inceptū illud efflicere. Quæcūq; enim ipſius parte animal motu deſtituitur: Ea nihil omnino videtur a lapideo diſcrepare, eoq; modo animal amplius non eſt. Quapropter cūm motus animal, ſecundū ipſius ſubſtantia maximē inſit: .i. ſi autē ſien ſine articulis nequeat. Ob id ſatis ſunt, ipſum ex multis partibus eſſe conſtatū. Sed neq; ex ijs in deſinito numero, ſed certa quadā multitudinē, determinatōq; oſſium cumulo. Nō enim ſi erus multis indiget partibus, protinus etiā & mille indiget (vt ſubdit Galenus .u.) ſed alterū natura habet ſcopum: quo diſſectis cuiusq; numerus propius indicatur. Eſt autem ſcopus is, totius inſtrumēti patientiū difficultas. Duo igitur ſcopi a natura ſimul perſpetuō conſiderantur. Primus ſcilicet ad motus

promptitudo; Secundus verò, diffinitio, patiendie difficultas. At tu quidē forte scopi vtrunq; non similes; sed alterutrū vicissim considerans, cum motus partium omnium necessarios, ac varios mente inquebens, naturā accusabis, quæ tam magnum os cruris, ac brachij sit fabricata. Facilius enim parvū, quā magnū membrū musculi movebunt. Cum autem contra, securitatē solam spectaueris, spinae os esse vicinū oportere, iudicabis: nō quot nunc sunt, plura quā viginti. At natura non vicissim, sed vtrunq; simul perpetuū considerat: priorem quidē dignitate actionem. Post illam autem, securitatem. Ad sanitatis verò diuturnitatem, securitatem quidē esse priorem. Post illam autem actionem. Quod si tu quoq; expēdere ita volueris, spero me nunc quoq; in spinae spondylis cōprobaturū (quomodo in manibus, ac cruribus prius ostendī) ne ex cogitari quidem posse exactiorem, ac iustorem actionis simul, ac diffinitio in istionem. Nam si os vicinū totius spinæ fuisset, x. q; ipsa partibus animal immobile fuisset, velut verū quodā cōstruxim, aut pallo affixum, nihil verbes est opus. Id enim ne nos quidē (ni fallor) si Promothei loco fuissetus, latuisset. Verū quod neq; ego, neq; tu, neq; alius quisvis homo amplius animaduertisset, non tamen Promothei ipsūm preterisset, id protinus dicam. Car nō duo scilicet, vel tres, aut quatuor, aut omnino pauci facti sunt spine spondyli: sed ita multi simul, ac multis modis quomodo nunc inter se cōmixti? Ostendam enim omne ipsorū numerū optimā habere mensurā, processus, atq; articuloſū cōpositiones, & connexiones. Causam igitur, cur nō ex duobus, aut tribus ossibus longis, neq; ac in manibus quidē est brachiū, & cubitus: in cruribus autem tibia, & femur, sed ex quatuor quidē & viginti in hominibus, preter os latū, quod extremē ipsi subiacerit, an reliquis autē animahabes ex pluribus, ego docebo, ostendamq; hic quoq; artem nature in his capitibus disputationē totam cōplexus. Primo quidē, quo mihi maxime ad presens institutum est opus: q; scilicet spondylos multos spine omnino esse, ac paruos oporteat. Secūdo, q; quatuor quidē, ac maxime eius sint partes: collum, metaphrenū, id est dorsū; lumbus, & os, quod à quibusdā *ἑπί*, id est sacrū; ab alijs verò *πλάτη*, hoc est, latus nuncupatur. Tertio verò, q; in collo septem spondylos esse oportebat, in dorso duodecim, in lūbo quinque. Quod verò ad os magnum atinet, ostendam & ipsūm fuisse melius ex quatuor consisti. Primum igitur caput, quo maxime ad presentia indigeo, q; ex multis, ac valde paruis ossibus spinā consistere erat melius, euidenter demonstratum fuerit: quū spinalis medullæ naturā repetemus, & affectus, in quos animal incidit, quū spondyli sede sua dimouētus. Nā ipsius natura cerebro est assimilis, & symptomatica, quib; animal apprehenditur, eis symptomatibus sunt similia, quæ affecto cerebro nobis accidunt. Motus enim & sensus omnium partium, quæ sub affecto spondylo sunt, perduntur. Verū nemo hæc quidem ignorat. Quod verò ait

1) Hippocrates. x. [Si multi quidem spondyli ordine se se cōsequentes

2) emoti fuerint: malum id est: sin verò vnus quiuvis ex ceterorū harmonia, ac cōpage exierit, exitiosum.] Non omnes itidem intelligunt. Estq; id ipsum, quo nunc maxime ad presentia egemus, scribit itaq; Hippocrates, symptomatis causam nos edocens, quod si multi simul emoti fuerint, singuli paululū distiti, tunc circularis, non autē angularis spinalis medullæ sit cōtorſio. Quod si vnus aliquis spondylus exierit, spinalis medullæ ex loco exiguo deficiens dolebit, spondylusq; qui exiit, ipsam comprimet: nisi sanē etiā pertruperit. Quod si hæc ita se habent, spinalisq; medulla magnā, camq; simultaneam flexionem sustinere non potest: spina verò ipsa per magnos, ac laxos articulos, multamq; distitos moueri sine molestia non poterat, melius fuit ex multis paruis singulis paululū cōferentibus totam ipsam consistere. Sic enim flexio fiet, non angularis, sed secundū circuli circumferentiam, ac rotunditatem, noxamq; ex spinali medulla compressa, aut cōtusa, aut rupta effugit. Itaq; q; ex multis ossibus motus exiguos habētib; spinā fieri preterit, nō est duobus, aut tribus, quatuorve, perspicue iam ostēdimus. Hæc ex Galeni decretis ad presentia et castus eius editionem transcripta iam sunt. Vt autē exquisitius quod hic intenditur in ioribus enucleatū sit, in margine hanc totius spinæ figuram cōtēplare. In qua vertebrae viginti quatuor habes, vt in presentibus textu proposiit; sunt, à litera scilicet A. numeroq; primo, vñ; ad F. nunc.



x. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Cur nō ex duob; aut tribus, ex plurib; determinatis. p. libidem cap. 11. in princ.

Tria capitula declaranda.

Caput primum cum ex multis, & paruis.

x. 3. de articulo: 110 46.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

numerumq; vigesimū quartū, post quas, os sacrum est: à litera G. vsq; ad H. videlicet à numero vigesimo quinto, vsq; ad trigestimū. A quo deinceps coccygis os sequitur, ab I. vsq; ad K. videlicet à numero trigestimū primo, vsq; ad trigestimū quartū. Distinguitur autem vertebrarū spina in tres partes: videlicet collum, ab A. vsq; B. hoc est à numero primo, vsq; ad septimum: Dorsumq;, à C. vsq; ad D. numero octauo, ad vndeuigesimū vsq; Tertiamq;, ipsos lumbos, à litera videlicet E. vsq; ad F. numeroe vigesimo, ad quartum, & vigesimū vsq;. Quibus quidem quarta succedit pars: ipsū videlicet os sacrum, à litera G. vsq; ad H. à numero scilicet vigesimo quinto, ad trigestimū vsq;. Hęc igitur ad præsens propositū (alijs omisiss, de quibus postea sermo fiet) annotata sint. De præternaturalibus autem acuinatis capitisbus, supra, in primo huius capite fermocinatī sumus, & ad quem locum recurrere potestis. Nūc igitur ad specialem quatuor dictarum spinarū partium enucleationē pertransēamus: quā sic Galenus cœcligū subdit.

## TEXTVS SECVNDVS.

*Ἐπισημασθε δὲ τὴν ὀπίσθιαν στήθεος κοίτην ἰνὴ ἀπὸ τῆς ῥάχης, καὶ ἐκείνη, καὶ ὁ ἀπὸ τοῦ ἀπὸ τῆς ῥάχης  
ῥάχης τῆς κοίτης, ἡ δὲ ῥάχης τῆς ῥάχης, καὶ τῆς ῥάχης, καὶ τῆς ῥάχης, καὶ τῆς ῥάχης, καὶ τῆς ῥάχης,  
ὅπου δὲ ἄλλοι καὶ ἄλλοι, καὶ τῆς ῥάχης τῆς ῥάχης, καὶ τῆς ῥάχης, καὶ τῆς ῥάχης, καὶ τῆς ῥάχης,  
τὸ πρὸς τῆς ῥάχης, καὶ τῆς ῥάχης, καὶ τῆς ῥάχης, καὶ τῆς ῥάχης, καὶ τῆς ῥάχης, καὶ τῆς ῥάχης.*

Harum verò contextus in ceruicem, dorsum, lumbos, & sacrum os diuiditur. Ceruix igitur capiti annectitur: Huic deinceps dorsum ordine succedit longitudine tantū existens, quantum ipse thorax fuerit. Quod verò subest reliquum, lumbi nominantur. In sui quidem extremo vocatum sacrum os habentes: quod nonnulli latum appellant.

## COMMENTVM SECVNDVM.



SECVNDVM caput, quod à Galeno iam libro de vſu partū duodecimo: à propositum fuerat, hoc erat. Quare scilicet ex quatuor, ac maximis partibus spinæ constat: collo scilicet, metaphreno, dorsoe, lumbisq;, ac ossē sacro, seu litō? Cum enim thorax medius sit, eunūq; vtrinq; circumstent, & supra quidem: collum, infra verò lumbi: cōmuniter autem quæ singulatim diximus omnia os latū suffulciat; quatuor maxime partes spinę totius necessariū cōstentur. Sed vt hęc exquisitius liquant: sciendū quatuor fuisse nature scopos. d. (vt capite proprio vberius infra declarabimus. &c.) dum thoracem fabricaretur: vocem videlicet, respiratione; cordis, ac pulmonis magnitudinē. Est enim thorax propter pulmonem, vt ipsum cōtineat, ac moueat: hic autem propter respirationem, ac vocem: respirationē autem propter cor. Inde igitur ad pulmonis, cordisq; magnitudinem, thoracis etiam magnitudo vanatur. Necessarius ergo thorax fuit. Ceruix autem supra thoracem, mediāq; inter hunc, & caput necessariū posita est, ob duplicem in homine vſum: Alterum quidem priorem propter laryngem, huiusq; cōstitutionem, ac locum: Alterum verò veluti sustentanū quoddam propter brachij, sepisq; neruorū generationem. Oportebat enim partes eas, quæ ad humerū, ac brachiū, tūc autem cubitum, & manum extrēmā pertinent, postremō etiā diaphragma à spinali medulla collī nervos recipere (vt alias ostēdemus). Quocirca & propter horū neruorū generationem necessarius sinus in spatio inter caput, & thoracem medio alios collocari spōdylos, ex quibus collū est cōspicuum. Præsertim verò his animalibus, in quibus tertius collī vſus existit: vt scilicet loco manuum alijs deseruiat. Veluti longius esse consuevit ungulas habentibus solidas, & aut bestidas: Longissimū verò habentibus crura longiora: vt gruibus, ac ciconijs. Lumborum verò necessitas fuit, vt naturalibus membris sulciment præberent, & neruorū inde orientur productiones, quæ ad hypogastriū musculos, crurāq; etiā distribuendę sūt. Demumq;, os sacrum necessariū sequitur, cuius vſus quadruplex (Galeno etiā docente. g.) existit. Primus, vt sit quoddā veluti fundamentū spinę. Secundus, vt ossa ischiōriū, ac ilium incumbētia sibi exciperet, sine quibus neq; pubis ossa cōnsilario poterant, quæ vſus necessarios animali erant præstatura, cruriumq; ad ischiōnem dextriculationi omnino nõ fuisset. Tertius est, vt vten, vesicę, ac intestini recti sustentandū sit. Quartusq; demum est, vt ne ruorū coniugationes aliquæ ad crura distribuendę originem acule à spinali medulla suscipiant. Ecce igitur secundę spinę probationem, quod scilicet, & quare ex quatuor partibus maximis necessario spina cōstituitur, ceruicē inquam, dorsū, lumbisq;, ac ossē sacro. In qua tamen probatione sub lato coccygem intellexit Galenus, vtriusq; interim numerū nõ bene cōnumerans. De quibus tamen ambobus postea locis proprijs sermo fiet. Nunc sūt superę, fuerit ex Galeno spinā in quatuor partes maximas distinxisse, talisq; distinctionis rationē assignasse. Quibus si quintā tanquā verū à quarta distinctā addiderimus, huiusq; necessitate, & vſum: in quinq;



quinq; partes distingui spinā tunc determinabimus. Fuit enim homini necessariū coccyx os primū, vt musculi .a. nates facientes, qui sunt omnium primi, quodam partē inferiōrē, huic ossi vtrinq; alligentur: indeq; principiū duxerint: qui quidē musculi cōxæ, semurē mouentes dicuntur, & à quibusdā natum musculi nuncupantur. Secundō vt ani musculus, .v. totaq; sedes, intestini iue recti extremū illi alligetur. Quia enim ob natiū necessariā ad sedendū amplitudinē, intestiniū reditū producendū vtrō fuerat: quō cōmodior faciem egestio fieret: propterea huiusmodi os esse, tanquam sulcro quodam, cui inuiteretur, defensorioq; indiguit. Tertiusq; sit hic coccyx vsus. Quartusq; statim ei succedens, vt eandem intestini partē ab extrinsecis occurrētibus tueatur: præsertimq; in pueris, siепенemur in sedem cadentibus: quibus etiam vt echartilagineū existens coccyx cōmodius ad huiusmodi vsū fuit. Quintus verō demū coccyx vsus est, ad tutelā extremitatis medullæ spinalis. Haud enim cōdecens fuerat spinalis medullæ terminū sic discoperitū, & indefensū remansisse: vt à quouis extrinsecis aduenientē pati facillimē poterit: præsertim cum alterū cerebrū, vel cerebrī vicinā sit ( perindeaq; antea iam diximus ) vix enim super lapidē sedere posset homo, quin euertigū vel frangeret, vel calciferet, neclum varijs modis contunderetur. Ideoq; natura non solum quatuor ossiculis, tribulæ vt minus id os cōplegit: sed chartilagine quoq; multa ipsū oblinat: de quo tamen postea specialius capite proprio loquemur. \* In quinq; igitur partes ( vt in proposita figura patet ) spina verius, quā in quatuor distingenda fuerat. Quoniam coccyx omnino ab osse sacro distinguitur, nec eius pars est. Quamquā pro Galeni saluatione, dicere nō ineptē possumus: cum præcessibus illis spinam representantibus coccyx careat, modullamq; minime contineat: spinę proprię dictę partem esse tam minime computandam: nisi largius spinæ nomen suspensimus, pro tota vertebra canina, quæ à puppi ad prorā extremū vsq; deducitur. Quod verō dignius admirationē est, adiungemus: nam cum spinam ex quatuor, & viginti vertebis præcedenti textū consistare prædixerit: in præsentī nihilominus vertebraum earundem contextū nō solum in ceruicem, thoracemq; & lumbos diuidi voluit, quæ prædictū numerū cōplent: sed os sacrum insuper adiunxit, cuius ossa cum sex, vel ad minus quinq; sint, non amplius viginti quatuor, sed nouem, & viginti, vel etiā triginta erunt ossa, quæ huiusmodi cōstructionem ingrediuntur. Sed huiusmodi professō difficultatē dissoluere, Galeni verba perpendentibus promptissimū est. \* Quia enim vertebra necessariū cū osse sacro tanquā omnium basi, ac fundamentō ( veluti prædictū iam est ) præteritūq; lumborū inuicem contextuntur, velut prima ceruicis cū capite: ideoq; eū de vertebraū coccyx locutus esset, necessariū de extremis scilicet capite, ossiq; sacro, sermoneinādu fuerat. Vnde cum de quibus primis partibus sermoneinādu habuisset, statim subdit dicens [ Quod verō subest reliquis lumbi nominantur, in sui quidem extremo vocatū sacrum os habent. ] Non igitur de osse sacro tūquam partē spinæ quartę meminit ( lumbus enim scilicet residū totius vertebraū erat ) sed tanquā ipius vertę spinæ ex vertebis cōtextę quodā adiuncto, atq; apposito, quemadmodū antea de capite tanquā primę ceruicis vertebę articulatōis meminerat. Idcircoq; in textū ( prout videbimus ) sequenti tres illas dicitur partes, & earū ossium lorū numerū, quę ad quatuor & viginti dōtāre abēdunt scilicet ceruicē, dorsū, & lumbos, & nō os sacrum, siue latū enucleauit. Quoniam enim spinę partē os sacrum sit, nō tamen ex vertebis, sed ossibus vertebra quodāmodo referentibus, similibusq; cōstat. \* Quas vt exquisitiōis pernoctatis ab ipsomet Galeno intelligas, quibz euertigū sūdit:

## TEXTVS TERTIVS.

Vertebrae autem in ceruice quatuor numero septem existunt. In dorso vero duodecim, sed in lumbis quinque.

Vertebrae autem in ceruice quatuor numero septem existunt. In dorso vero duodecim, sed in lumbis quinque.

Vertebrae autem in ceruice quatuor numero septem existunt. In dorso vero duodecim, sed in lumbis quinque.

Vertebrae autem in ceruice quatuor numero septem existunt. In dorso vero duodecim, sed in lumbis quinque.

## COMMENTVM TERTIVM.

**TERTIVM** à Galeno .i. propositū examinandū caput erat, cur in homine collum ex septem: thorax verō ex duodecim: lumbiq; demū ex quinq; vertebis, nō pluribus, neq; paucioribus consistat? Quibus addere hic etiā possumus: cur os sacrum ex quatuor, vel rectius dixerimus ex quinq; aut sex? Coccyxq; demū cur ex tribus, aut quatuor ossibus: nō pluribus, neq; paucioribus constituantur? Ad que sigillatim in vna cum Galeno .i. respondēbimus, docentes primō de ceruicē. Homini videlicet ex septē spondylis parte compactam esse. Cum eius magnitudo laryngi conueniat, partēq; omnes (quas à spinali ceruicis eundem medulla nervos recipere præstiterat) quod sanis est recipient. Duos enim in homine vsus ex ipso collo monstrauimus: .i. priorem quidem, propter laryngis cōstructionem: alterum

Coccygii  
necessitas.  
c. tab. 9.  
Pl. 10. K.  
v. tab 15.  
fig. 29. E.

... ab. 17. m.  
... ab. 17. m.  
... ab. 17. m.

infra cap.  
12.

Obiectio.

Solutio.  
\* Vide in-  
rū pro his  
infra c. 10. v.  
com. 3. & 4.  
com. 1. in c.  
fina.  
Coccyx  
ex tribus  
quatuor

\* Vide cap.  
10. com. 1.

i. 11. d. v. p.  
c. 12. post  
prima.

k. 13. de v.  
p. c. 6. & 7.  
Colli vsus  
triplex.  
1. 8. c. 11.  
dem.

verò propter nervorù, qui ad manus, septimq; transversum distentiaendi orant, in generationem: omisso eo, qui alijs multis animalibus cõgruit: ut scilicet manus loco pro cibi ad suspensionem collis longitudo sibi deseruiat. Deus autè, & natura neq; in superfluis abundat, neq; deficit: in necessarijs. Offensum verò in cõmentarijs de voce concipiens est, larynx (qui prima est vocis instrumentum, necessariumq; in collo habet positionem, quo quidem tempore extenditur longiore, quam ante, videt). Quam verò summe flechitur, æquatur exactè sic, ut nullus relinquatur locus vacuus, neq; vltiq; ossibus impegat: supernè quidem maxilla, infernè verò clauis. Non erat igitur cur paucioribus, aut pluribus humana ceruix vertebris cõstitueretur: quoniam nouè illas simia, licet in multis alijs hominũ similitudine, ceruix habeat. Eadem autem ratione Gibrus thoracis, lumborumq; & ossis sacri, æquus quoq; demum coccygis sufficiens, & omnino congruam magnitudinem, ac spondyloret numerum probare Galenus existit. Harum omnium partium vsus considerans, pro quibus vnaquaq; pars ad eã concinnata est, ut si quid addas, vel minus, auferas, statim vsus lædi cogniturus sit. Speciatim verò de thorace sic subdit. Cum igitur partes omnes corporis respondentẽ proportionem iã habeant inter se magnitudinẽ: oportet utiq; & thoracem habere magnitudinem alijs etiã, non sibi soli, cõuenientem, si in modò demonstratum rectè fuit neq; respiracionem, neq; vocem posse sine eo fieri. Quia & cor ipsum primò, ac cum ipso pulmones illius etiã p̄grediũ indigere ostendimus. Quas ob causis necesse fuit naturam, dum thoracem fabricaretur, hos quatuor scopos sibi proposuisse: vocem seu locum respiracionem, cordis, ac pulmonis magnitudinem. Licet autem sibi primò considerare pulmones magnitudinẽ: qui neq; maior, neq; minor aspectu arteriarũ festione fieri poterit. Quosq; enim ipsa diuisa progrediatur, cœtibus pulmonis carnem ei circumtexti oportet, atq; illa latitudinẽ habuit, ac longitudinem, quanta ad respiracionem, ac vocem fat erat. Quemadmodum res ipsa inducit. Sequēbatur autem arteriarum pulmonis generatio, ac huius magnitudinem thoracis magnitudo. Si quidem omnem eius capacitatem a pulmone repleri erat melius, quẽmodò in alijs cõmentarijs de respiracione probauimus. Quia & cor positionem, ac magnitudinem in thorace sibi ipsi habuit cõuenientem: si tenes memorata ea, quæ antea de ipso præcepimus. Quod igitur thorax cõuenientem habeat magnitudinem, ex dictis patere iam arbitror. Si quidem igitur spondyliũ vnum addas, superfluet. Quod si demas, angustus erit cõtentiũ partiu locus, vnde illius tota proportioalem corpori magnitudinẽ vitari necesse fuit. Duodecim igitur vertebras cõstrui oportuit: quibus duodecim quoq; vtrinq; costæ articulantur. Qui verò deinceps has sequuntur partes, quinque lumborum spondyli eadem ratione in istum habuerit in homine numerum: Cum & viscera alligata, desponderet, & nervorũ exortus sufficiens inter ab alijs sitis, ut nec pes, neq; pauciores esse debeant. Nec aliter de sacro osse descendit, perpenis ossis vltibus: quoniam scilicet decenter illi explentur quinque ossibus: in longioribus verò non nunquã sex. Quemadmodum coccyx deniq; ex tribus, vel ad summũ quatuor. Præsertim cum obseruati sint semper sit, vt vbi sex sacri ossis partes sunt, coccygis tres cõsequantur: vbi verò illius quinque fuerint, coccygis quatuor cõsequantur. Adde vt magis ex parte nouem omnia inueniantur. Cõuenientissimus igitur cuiuslibet partis numerus est. Cum ad id vsus (de quibus specialiter deinde sermo fiet) exactè compleant. Quod si tamen aliquid ex prædictis officibus, siue spondyliis immutaueris, augendo, vel minuendo, statim & aliquis carnis vsus vitabitur. Sed hæc de spondyliis vsibus, ac diuisione, paruumq; etiam ipsius eiusdem vsibus generatim cum Galeno præbata iam sint. Speciatim namq; singula proprijs in capitulis de dẽrãbuntur. Idcirco ad specialem singulorum sermonem se accingens Galenus, quamprimum subdit, dicens.

## TEXTVS QVARTVS.

De primis itaq; dicitur his, qui in collo existunt. Nihil enim differet siue hoc est ceruicem: siue *axilla*, hoc est, collum ipsum appellemus.

De primis itaq; dicitur his, qui in collo existunt. Nihil enim differet siue hoc est ceruicem: siue *axilla*, hoc est, collum ipsum appellemus.

De primis itaq; dicitur his, qui in collo existunt. Nihil enim differet siue hoc est ceruicem: siue *axilla*, hoc est, collum ipsum appellemus.

De primis itaq; dicitur his, qui in collo existunt. Nihil enim differet siue hoc est ceruicem: siue *axilla*, hoc est, collum ipsum appellemus.

De primis itaq; dicitur his, qui in collo existunt. Nihil enim differet siue hoc est ceruicem: siue *axilla*, hoc est, collum ipsum appellemus.

De primis itaq; dicitur his, qui in collo existunt. Nihil enim differet siue hoc est ceruicem: siue *axilla*, hoc est, collum ipsum appellemus.

De primis itaq; dicitur his, qui in collo existunt. Nihil enim differet siue hoc est ceruicem: siue *axilla*, hoc est, collum ipsum appellemus.

dictis enī synonymis *κεφαλή*, & *κεφαλή*. Sed enim uerō prætermisissimè præsentiarū ab initio statim  
propositus in quolibet capite contemplandis prædicatis ( prout in præcedentibus obseruauimus )  
cum aptius sigillatim in singulis partibus perpendenda ueniant, paucis his generalibus cōtenti,  
ad partium declarationem descendamus, à colli ceruicisue spondylis septem exordientes.

Κεφαλή κατὰ τὴν ἀρχὴν σπονδυλίου, Κεφαλήν, &c.

De Vertebris Cervicis. Caput Septimum.

TEXTVS PRIMVS.

Τὴν κατὰ τὴν ἀρχὴν σπονδυλίου ἐκ ἀριστερῆς ἔχει δύο διεσπόμεναι πύλας, τὰς δ' ἄλλας τὰς πύλας, τὴν ἄριστην μίαν  
ἐκ τῆς ἀριστερῆς διεσπόμεναι, ἢ κατὰ τὴν ἀρχὴν σπονδυλίου, καὶ τὴν δεξιὰν τῆς δεξιᾶς ἢ τὴν πύλας διεσπόμεναι  
ἐκ τῆς δεξιᾶς παρακλιθεῖσιν ἄριστη, ἢ ἐκ τῆς δεξιᾶς χεῖρας ἀριστερῆς, καὶ ἀριστερῆς γίνεται διεσπόμεναι  
ἴσην δὲ κατὰ τὴν ἀρχὴν τῆς σπονδυλίου, τὰς δ' ἄλλας δύο, ἢ ἐκ τῆς δεξιᾶς.

Ex colli vertebris, primæ quidem duæ vndiq; dearticulantur. Reliquorum verò quinq; ante-  
riorem partem forte ligamentum coalescit facit. Haud enim per chartilaginem coalescunt ( vt  
nonnulli putant ) sed ea membrana, quæ geminas dorsalis medullæ tunicas extrinsecus ambit,  
sefe in mediam ipsarum sedem in sinuans, cōmune utriq; ligamentum fit. Similiter autem & se-  
cundum omnes vertebræ se habet, duabus primis exceptis ( vt dicemus.)

COMMENTVM PRIMVM.

**V** O D in fine præcedentis capitis prædixit: Nil scilicet differre, siue *κεφαλή*, id est,  
**Q** uæ ceruicem: siue *κεφαλή*, hoc est, collum pronuntiarimus, statim confirmat: Dum in ti-  
tulo *κεφαλή*, hoc est ceruicem in principio autem capitis statim *κεφαλή*, id est collū no-  
minauerit: quæsi modo vno, modo altero nomine indifferenter vteris. Sed hæc de no-  
minibus contēplatio quæ minimi momenti est. Ad ea igitur pertranseamus, quæ necessaria sunt.  
Primæ quidē duæ vertebræ vndiq; ( Græcè *πύλας*, q. d. ex omni parte) dearticulantur. Quod ve-  
rum quidē est de dextra, & sinistra, atq; etiam interdū anteriore, non autem posteriore parte,  
tām inter se, quām cum capite. Prima enim duplici ( vt videbimus ) scilicet dextro, ac sinistro ar-  
ticulo cum capitis, occipitibus tuberculis dearticulat. Secūda etiam cum prima tribus in locis  
scilicet dextro, & sinistro, atq; etiā anteriore per dentem: non autem posteriore. Dextro inquit,  
& sinistro, cum nō secus ac occipitis: ita & secūda vertebræ tuberculo prima suscipiat, quanquā  
illos per anarthrosin: hos verò per arthrosidā. Quomodo igitur Galenus ait ex omni parte dearti-  
culari? Ad hoc respondemus præ magis Galeni monumenta pro viribus defendentes, quā in se  
condemnantes: videlicet intentionem eius esse, non de veris modis articulis, articulationibus  
loqui: Sed vt contra symphyssim quōd offium constructio distinguitur, sitq; propter motum, & nō  
propter quietem. Vult igitur, tāis primæ duæ vertebræ nulli coalescant propter quietem: sed  
vndiq; tām inter se, quām cū capite ita cōiunguntur, dearticulanturq;: vt manifesto motu mo-  
ueantur: quoniam proprio articulo prima cū capite utriq; scilicet in dextra, & sinistra parte: se-  
cundaq; cum prima præter dextram, & sinistram, in anteriore etiam parte per dentiformē pro-  
cessum construatur. Verum est tamen interea, quōd laterales earum quatuor dearticulationes  
prædictæ ampliores, quidē tioresq; existunt. Aliæ verò omnes vertebræ inter se: quinimod & se-  
cūda etiam cum tertia, & vigesima quarta cum ossē sacro: multoq; magis huius sacri ossis partes  
inter se, & cum coccygē, tandemq; ipsius eum coccygis particule inter se ad symphyssim ante-  
riore in parte deueniunt: nō immediatam quidem, nec per se, at per synchondrosim, seu maus  
dicere per synneurosim, hoc est, per mediā quandā chartilaginem, seu ( rectius dixerimus ) char-  
tilagineum ligamentum: Non ( vt Galenus p. minis quidem rectē ait ) pro tertia etiam membra-  
na, quæ geminas spinialis medullæ tunicas extrinsecus ambit. Ea enim membrana ad spinalis  
medullæ ob varios huius motus dissipandæ tutelam facta est: ideoq; nervosa ( Galeno etiā rectius  
id edocente. q. ) crassaq;: & fortis: intus tamen vertebrarū, ossiq; sacri cauitatē oblines: vt me-  
rito penosissis appellari queat: Nō quōd sefe inter vertebrarū sedes, in chartilaginem, quæ illas  
inungit, Galeni modo, ad earum colligationem, inserat. Cur autē vertebræ omnes, præter duas  
primas, ossaq; prædicta, parte anteriore prætactō modo coalescant, firmeturq;, & retrosum  
se hēsi multū possint, à Galeo nō discamur: quōm sic testatū reliquit. [ Cum enim spōdylos oportet  
teret simul quidem spinam efficiere, velut vnum corpus stabile, ac firmum: simul autem ad motū  
expeditum: naturam ob id par est admirari, quam artificiosissimè ad utriq; vsū, tametsi con-

Obiectio.

Responsio.

Cōtra Gale-  
num.

p. Tām in  
pessenti tex-  
tu, quā 23.  
de v.p. cap.  
8. in princ.  
q. 23. de v.  
par. c. 8. ver-  
bis sacris.  
p. 23. v.p.  
c. 16. post  
med.

Cur spondylus  
h. anterior  
sua ligati.

trarium spinam rectè cõparatur. Nam spondylus omnes, præter duos primos, pariter quidem in-  
ter se spondylibus tuè inter se colligati, posteriore vero de articulatione spondylorum quidè in posterioribus  
figeris propter anteriorem harmoniam, ac cõpagem sunt adepti. Ad aliam autem nõ sicut un-  
pediti, quòd coaluerit, et sic licet per se, sed per intermedium illud etiam ligamentum, quidè  
extendi, contrahi, potest. Et parte posteriore articulis non mediocribus sunt distincti. Ob eam  
sanè causam anteriorum quidem plurimum flexi possunt: retrorsum vero nõ item. Perruinas  
enim si vim feceris, vinculum anterior. Quod ita exactè ipsos inter se ita coniungit, ut credas  
iplos coaluisse (veluti nonnulli credidèrunt, ut postea dicemus) ligamentumq; in dulget exiguum  
in spang posteriora reclinantibus. Fieri enim nõ poterat, ut simul quidè forte esset, simul autem  
multum extenderetur. Quanquam id quoq; , quòd licuit, mirabiliter a natura fuit cõparatum.

Exterioris li-  
gamentum  
musculorũ.  
f. Lib. 3. de  
an. 10. 10.  
c. 11. 1. p.  
cap. 11. post  
med.  
u. 15. et af-  
dem cap. 11.  
in princ.  
x. 11. et af-  
dem cap. 11.  
veteri sine.  
y. 13. et af-  
dem cap. 11.  
in princ.

Mucosum enim ligamentum hoc ( sic enim Hippocrates appellauit. f. ) efficit: mediocribusq; ac  
symmetræ duritiæ ad vnguem existit, prout antea dictum iam est: Ad id tamen v alidum est,  
u. exactèq; adeo anteriores omnium partes ipsorum colligat, ut mediocribus plerisque; ne colligati quidè  
ea parte, sed coalere spondyli inter se videantur. Spinam verò .x. cum nõ similes quidem in  
partes vtraq; flexi esset melius ( infirma enim sic, laxaq; penitus esset ) oportuit naturã eligere  
id, quod erat vitius. Potes hic quoc; vsum cõsiderare, qd ad omnes vitæ hominis actiones melius  
erat spinam anteriorum flexi, qd etiam vasis parte anteriore spine incumberebus, magis scilicet  
retroacta, ac venæ eiaz longe minus erat molestum. Rupta enim visissent, si extensa plurimè, ac  
refracta, dum spinã totam retrorsum flexeremus, fuissent. Iure igitur cum eam parte anteriore  
spondylis cõnstitam exactè esse oportere: de articulatione parte posteriore extiterant. Cùm  
igitur spondylorum locas ( vt post pauca subdit Galenus. y. ) posteriore in tres partes diuidatur: primam  
scilicet quæ exactè posterior est, quo loco est acantha, seu spinæ duas verò, quæ vtraq; eius  
parte sunt, vsus productionũ transuersalium radices terminant. Quod ea parte, quæ omnino est  
meda, non modo non prestiterat, sed ne licebat quidem ipsarum de articulationes efficere, cum  
ea ab acanthis iam esset occupata, arbitror id omnibus esse percipiendum. Ex duobus vero locis, quæ  
relinquuntur: si in altero ipsorum spondyli inter se fuissent de articulatione, nisi aliò autè tunc nõ esset.  
Primum quidem natura sũ equitate fuisse oblita, quæ locis similibus in quibuslibet, tunc  
autem de ipsam ipsam totam in partem alteram propensa affecisset. Postremo motum, qui ipsã  
in partem alteram necessariò impedisset, ac viciasset. Neq; eam in vtraq; partem vitium  
agere ipsam in eadem possimus, cum parte altera claudicaret. Nutantibus autè spondylis pars spæ  
sæ, quæ non dearticulatur, seu dearticulata non posset, liliusq; motu offenderet. Quò fieret,  
vt non dimidia modo pars, sed paulò minis actio tota periret. Hos quidè vsus ex spondylis omni-  
bus vtroq; posteriore loco inter se dearticulatis percipimus. ] Sic vterq; secundum omnes spon-  
dylos articulo sic fitur. Ossis verò facti partes ( vt videbimus ) coalescunt ætatis progressu  
subiuncent, vt separari vel per longam elixationè nequeant. Idem si durities carne sub terra cor-  
rumpantur. Duarum autem vertebrarũ primarũ ligameta, & de articulationes, qualiter fiant,  
postea cum ipso etiam Galieno declarabimus. x. ] Posterior spondyli omnes ( vt alii idem at. a. ) ab  
ea connectione, qua in parte anteriore habent retrò progressi, paulatim à se se diducunt, locum  
omnem mediũ occupati habentes humiditate alba, crassa, & viscosa simili est, quæ per alios propo-  
modam omnes articulos est dispersa: Idcirco succi eiusmodi vtilitas partibus omnibus expedire  
mouendus est cõmunis ( vt prius enã ostendimus. b. ) ] Quæ quidè humiditas, velut oleum quod-  
dam terrie quoq; spualis medullæ tunice circumfusa est: quæ modo dicitur & articulis omnibus ( vt  
subdit postea Galenus. c. ) & lingue, & laryngi, & meatu vrinario, & oculis pinguedinis: & ( vt  
summam dicam ) omnibus ijs, quæ moueri assidue oportet. Metuendum enim erat, ne exo-  
cata quidè ipsa dolerent, ac tandem actiones ipsorum labefactarent. Quod homines iuuitati  
curru axes, atq; plantarũ inungunt prius succo humido, ac viscoso, quò nihil aliud parant, &  
mouentur cõlentis. ] Sic etiã & habenas, & lora inungunt ( vt alii inquit. d. ) qui eis ad vehicula,  
& subugia vtuntur. Eandem ob causam huiusmodi mucosum humorẽ in omnibus articulis vi-  
dere licet. At nos distinctè primas duas vertebras, earq; de articulationes, ac motus, cum ex Ga-  
leni prius dogmate, tunc subdit deinde iuxta vram naturæ historiam, cõtemplamur. Ex Galeni  
inquam prius dogmate. Rebutit enim Galenus statim; sic dicitur: *et alia quædam* . . . . .  
subditum

B. Com. lo-  
quendi.  
u. 13. 1. p.  
cap. 3. circa  
princ.  
b. Lib. 1.  
c. 11. ante  
med.  
c. Lib. 13.  
c. 8. verus  
sine.

d. 1. de art.  
som. 10.  
A. 10.  
B. 10.  
C. 10.  
D. 10.

TEXTVS SECVNDVS.


Διὰ τὴν δὲ εὐὴν ἀνάσταν τὰς κεφαλὰς, τὴν δὲ ἐπιπέδωσαν, καὶ ἀναπέδωσαν; τὰ δὲ ἐν τῇ στήθεϊ ἐν ἑα-  
στῆς τὰς δὲ πρὸς τὰς ἑτέρας ἢ τὸ διπλοῦν σφαιρῶν περιπερικτῶν ἀκρότητες ἰσχυρίζεται μάλα; τὰς δὲ ἐν τῇ πρὸς  
στῆθος τὰς κεφαλὰς τὰς κεφαλὰς διασφαιρῶν. ἀλλὰ ἄλλα δὲ δὴ τὰ ἀλλήλων γίνονται μέγιστον τῶν σφαιρῶν σφαιρῶν.  
( καὶ ἄλλα τὰς κεφαλὰς, ἀλλὰ σφαιρῶν ἀκρότητες ἰσχυρίζεται δὲ ἐν τῇ πρὸς τῆς ἀκρότητες ἀκρότητες ἐν τῇ  
σφαιρῶν, σφαιρῶν τῇ κεφαλῇ δὴ τῶν ἰσχυρίζεται ἄλλα, καὶ πρὸς τῶν σφαιρῶν. καὶ δὲ ἄλλα γίνονται ἐπιπέδωσαν ἐν

πρῶτος σπείδων ἀπὸ παρῶν, καὶ ἐν ἀσφαλεὶ κερκίται, καὶ τῶν ἑταίρων ἐξάρτησις ἐπιπέδη ἐν ἀσφῶν τῆς πρώτης  
 σπείδων ἁπλοῦς ἐπιπέδεται καὶ ἀπὸ τῶν ἑταίρων ἐξάρτησις ἐπιπέδη ἐπιπέδεται, ἵστανται δὲ  
 καὶ ἴσως πρὸς δίσκους σπείδων, ἔδιστα προσηρῶνται ἐπ' αὐτῶν. ἔχει δὲ καὶ ἄλλαι ἐπὶ πρώτου σπείδου δύο δι-  
 ἀστασεὶ ἐπιπέδεται, ἁπλοῦς ἐν τῆς κάτω μέρει ἀπὸ παραπλοίας τῆς ἑταίρας διὰ δ' ἑταίρας ἀπὸ ἑταίρας  
 μίξου, καὶ ἐπὶ κερκίται διαφύραται, μετῆρα δὲ ἐν κερκίται, καὶ περιβόλαια τῶν δίσκων σπείδων.

Cum autē capitis motus duplex sit: Alter quidē tūm annuendo, tūm abnuendo factus: Alter  
 verō in vtranq; latus circumagendo, priorem quidem secundæ vertebræ pyrenoides processus  
 potissimum præstat: Alterum verò primæ vertebræ ad capitis coronas dearticulationes. Sed hæc  
 quidem à transuersis tūm primæ vertebræ, tūm ipsius capitis partibus sit. Pyrenoides autē pro-  
 cessus sursūm spectans est. Ab anterioribus autem secundæ vertebræ partibus ineipiens, valido  
 quodam, rotundōq; ligamento capiti colligatur, cui; prima vertebra locum idoneum præbet, in  
 quo tuto firmetur: In eademq; prima vertebra quoddam alterum transuersum ligamentū obor-  
 tum intus illi quoq; aduoluitur. Nonnulli quidem hunc processum dentiformē vocant. Hippo-  
 crates autem ab hoc totam etiam secundam vertebram dentem appellauit. Habet autem prima  
 vertebra in inferioribus sui partibus duas alias equitates superficiares oculares superioribus simi-  
 les. Sunt autem iure quidem superiores maiores tanquā capiti dearticulatione: Minores autem in-  
 feriores, quibus secundam vertebram complectitur.

## COMMENTVM SECVNDVM.

**T** quæ dicenda hic de ceruicæ, eiusq; partibus, ac præsertim primæ, & secundæ verte-  
 bræ, exquilitus intelligantur: quatuor sequentes figuras proposuimus. Quarum pri-  
 ma anteriorem: Secunda lateralem: Terciaq; posteriorem ceruicis vertebrarum om-  
 nium partem præsert. Quartaq; demū primæ, & secundæ vertebræ duntaxat pos-  
 sibi ex parte conexum indigat.



Pro his autem, quæ in præsentē contextu declarantur, duo in his figuris annoanda præ cæteris  
 sunt: Alterum quidem est secundæ vertebræ dentiformis dictus processus, seu dens quoq; nuncu-  
 patus in prima, secūda, & tertia figura litera D. in quarta autem litera H. signatus: Alterum ve-  
 rō est, prænarratum quoq; primæ vertebræ ligamentū transuersum, quod prænotatum dentem com-  
 plectitur, litera a. in secūda, & tertia figura, in quarta verò litera K. connotatum. Sed ad capitis  
 articulum explicandum Galeni dogmate .s. accedentes, nature in eo fabricam expendamus. Cōuenit enim ipsū (vt arbitror) quomodo & alios omnes, pro dignitate fuisse exornatū. Quan-  
 doquidem articulus iste animalibus magni adeo est momenti, vt omnium solus, non dico luxatio-  
 nem magnam, sed ne deflexionem quidem, vel temporis momento ferre queat. Repente enim  
 respiratione, ac voce, motuq; omni, ac sensu totum animal priuatur: ipsa nimirū in neruorū ca-  
 dice affecta. Principium enim horum omnium est cerebrum, velut arbor quoddam, siue in arborū  
 radices: Germen verò velut truncus in arborem exurgens spinalis medulla: Ramiq; tandē neci  
 sunt: per quos vitæ cuiq; parti motus, ac sensus distribuuntur. Capitis igitur artusculus tum summam  
 omnium

Tripliciter  
ticali capiti-  
bus sicuri-  
tate

A. musculus

Ab ossium

structura.

f. fig. 7.

A. B.

r. fig. 5.

F. G.

r. fig. 7.

H. I.

v. Ibidem

K. L.

f. Cap. 1.

omnium merito habet constructionem: ut quod in seipso nervorum omnium partes inferiores mo-  
uentium radicem continet. Accedit autem ei & securitas a ligamentorum crassitie; musculorum  
multitudine, & ossium exacta compositione. Fortissimum enim tria ligamenta ossa inter se conne-  
quentium vnum maximum, ac latum totam dearticulationem in orbem complectitur (sub hoc aliud  
secundum eum prima dearticulationem complectens intellexi (sic Galenus velle simile est.) Alia autem  
sunt duo in latera nervorum medio inter tertiam. Quorum alterum quidem in quarta figura litera L. cono-  
tatum ligamentum finem productionis prelonge (scilicet dentis) vertebrae secundae cum capitis dis-  
tione: Alterum vero transuersum velut angulum rectum efficiens a partibus primae spondyli  
dextris ad leuam pertingit. (Haece vltimo duo ligamenta sunt, de quibus in praesenti contextu me-  
minimus) Ossa autem musculi, ex ipsis duntaxat partibus posterioribus dearticulationis in umboni-  
ipsum tegentes simul, ac moventes, ut sunt iuxta Velalij ordinem paria, quatuor scilicet tertium, &  
quartum, & quintum, & sextum. Ossium autem ipsorum figura, ac exacta compositio, etiam  
si quis eam solum intueatur, admirabilis videtur. Sin vero non modo intuearis, sed etiam partu-  
cularum, quae ipsis insunt, omnium utilitatem animo reputassis, non arte in solum miraberis: ve-  
rum etiam officis nostrae prouidentiam hymnis celebrabis. Cum enim capitis totus motus duos  
generatione esse oportere, necesse fuit, aut duplicem facere dearticulationem, aut ex duobus obli-  
quis motibus simplicibus rectum vnaque compositum efficere: quemadmodum in manibus, tarsis, &  
plerisque alijs partibus parum distantes habentibus rectos motus ab obliquis, comprobauimus. Qui-  
nimmo (ut paulo post Galenus idem ait f.) cum motus obliquus a rectis distare plurimum praes-  
taret, duorum alterum accidit, necesse est, aut scilicet duplices esse dearticulationes (quemad-  
modum in cubito, & radio duplicem in gubbo cubiti dearticulationem conspicimus, propter mo-  
tum genere duplicem, rectum scilicet & obliquum, ac rectum ab obliquo plurimum distare necessa-  
rium) aut locum vnum vnaque; admodum rotundum. Vt enim quocumque uersum articulus facile cre-  
cume retret, simile vnaque; esse oportet ipsius formam. Velut in humeri, isehijq; articulo con-  
spicimus simul quidem rotundissimo, ac laxissimo. Quod fit, ut omnium maxime articulorum laxa-  
tioni assidue humeri articulus sit obnoxius. Quod naturam non latuit: sed (ut antea dictum nullus  
est) quando constructionis securitas cum motu yanetate pugnat, quod in quoque articulo est vti-  
lius, id ipsa eligit. In manu vero constructio, quae motuum agitatem praestaret, fuit oppositior.  
Capitis autem articulus luxationem non tolerat, quia principalis admodum fit: animalq; ipsum  
prostratus labi scilicet, alioqui profecto ne huic quidem motus yanetate inuideret. Nihil enim esse  
oberat in vtraque partem caput eodem; circumagere, ut non modo quae iuxta latera, sed etiam  
posteriora videre possit. Verum haec non poterat, vel sine laxa dearticulatione motum esse quod deo  
essideret. Maluit igitur natura paucissimos capiti motus, eorumque uarietatem quam uarietatem, non uarietatem  
tribuere. Quare non simplicem, neque laxam eius fecit articulum, sed duplicem simul, ac robu-  
stam. Ob eam igitur causam, haec in capite quidem factus fuit ex obliquis motibus rectos comparare,  
sed vnaque; priusquam praestaret musculis, atq; dearticulatione efficere. Atque adeo dearticula-  
tiones ipsae duplices, musculorumq; eas mouentium genera duplicia extiterunt, ac generationis vtraque;  
differentia duae. Dico autem genera quidem duplicia: rectorum scilicet & obliquorum. Haec Galenus  
vix adeo vera, & sancta, ut non omnium quidem reprehendi, corrigere possint. Eius ad vnaque;  
generationis differentias delectans obliquos capitis motus declararet. Eos scilicet esse, qui ad  
dextram, leuamque; sunt. Hi enim motus, tametsi obliqui sint, non tamen proprii capitis, sed  
conuicis per se, nisi secundario, quatenus in quoque; occurrunt proprio motum, caput quoque; tanquam  
praestitum necessarium mouentur. Et duobus igitur propriis capitis motibus rectos quidem oportet  
Galenus descripsit: Eos videlicet esse dicent, qui annuendo, ac renuendo sunt. Obliquos vero non  
recte interpretatus est. Etenim ad dextram, ac leuam in gyrum voluendo faciem hi sunt, capite  
interim ipso semper ab humeris equae distanti: Non in dextram ac leuam inclinante. Quam obrem  
frustra deinceps multa (licet perbellè aduersis naturae calamitatores interim digrediantur) circa  
huiusmodi motuum articuli factam distributionem, conuacuando laborat: Rectos videlicet  
secundae vertebrae cum prima dearticulationi attribuens, obliquos autem, qui scilicet in latera pri-  
mae vertebrae cum capitis coronae dearticulationi ascribens. Veritas enim longe ab his diuersa est.  
Etenim (ut bene primus haec, ne quempiam propria de fraudem laude, Velalij aduertit) alter  
duo sunt capitis euidentes proprii motus. Qui quidem quiescentes ceruice solius capitis existunt.  
Alter quidem rectus ad annuendum, renuendumque; Alter vero in gyrum. Primus autem rectus  
in anteriora ad annuendum, posterioraque; ad renuendum, per primae vertebrae cum capite, non cum  
secunda vertebra dearticulationem, fit. Secundus autem in gyrum obliquus per secundae vertebrae  
cum prima dearticulationem, expletur. Quam ventatem tum ossium constructionem, dearticula-  
tioneque; ambe predictae, tum musculorum situs summo opere comprobant. Constructiones inquam,  
dearticulationeque; praesertim. Etenim primae vertebrae cum capite dearticulatio vel cepis ipsis  
ostendit, tanquam super quos sese inuicem adiuuantibus, comitantibusque lateralibus cardinibus  
antorsum,

f. Cap. 1.

Ex ossium

constructio-

ne.

Responso

prima.

antorsum, ac retrorsum, siue annuendo, & abnuendo capitis motum fieri nullo vniq[ue] interposito vacuo spacio: quod tamen ( si adeo euidēter in latera moueri caput deberet ) necessarium contingeret: prout carne, ligamentisq[ue] prorsus denudatis in ossibus conspicui facillimē potest. Hanc enim verum est Galeni argumentū, quom̄ ait. b. [ Quod si natura cavitates primę vertebree, atq[ue] eminentias occipitis rectorū ( vtj nos dicimus ) grata fecisset: omnino aliam quidem cavitatem, & eminentiam in partibus anterioribus, aliam verō in posterioribus posuisset. Oppositum namq[ue] lippis, atq[ue] ronforib[us] apparet. Quod scilicet si anterior, ac posterior illas locasset, omnino rectus antorsum, ac retrorsum motus impiret[ur]: Statum verō promissimus lateralis esset. Verūm si prædicta dearticulatio docuisse nequirit: cum tamen excitare mirum immo id ipsius dentiformis processus cū prima vertebra dearticulatio debuerat. Hic enim ( si rectus motus euidens super secunda vertebra fieret ) necessarium in annuendo, caputue antorsum flexendo, spinalem medullam comprimeret. Abnuendo autem, caputue retrorsum inclinando, primæ vertebree partem anteriorem frangeret; vel saltem illi multā vim induceret. Quj tamen dens ad primę vertebree simul cum capite super secunda vertebra gyrum firmandum, tuendumq[ue] velut axis quidā summopere valet. At quis, nisi sponte refractasius, circa hec ambigeret, primę vertebree oblongas ab anterioribus retrorsum, & nō laterales, cavitates, hasq[ue] interea profundas, capitūq[ue] rursus correspondentes eminentias illis per enarthrosim dearticulatas perpendens? tanquam scilicet ad rectum motum unā; imē idoneas? Interum verō simul euidē primę vertebree infernas; & superficinas, lateriq[ue] cavitates, sibiq[ue] respondentes obicuras secunda vertebree tuberositates illas per arthrodiā dearticulatas; tanquam ad cervicalē potius; siue in gyrum facitidē motū summopere aptas contemplatus? Quem tamen motū, si caput super prima vertebra faceret, necessario egrēditiōis & propria cavitante ambobus tuberositatibus laterali[us] processibus; animalib[us] quod absurdū iustū fuisse. Super secundam verō vertebree gyrum fieri, lepōrum, agnōrumq[ue] vel ad donam, aut caniculorū constructū primę vertebree cum secunda cōperussimū fieri. Quod si neq[ue] his persuaderi, opusm̄q[ue] vel Galenus, vel quicunq[ue] alius poterat. Musculorū saltem sicut; atq[ue] actiones cōfundere illis necessariō debebant. Vt restat veteres; nouam sententiam implestantur. Bterim quartū musculorū par in quinta sitam sibi insēda huius cōmentū figura literis E. G. notatū: quod a posteriorē primę vertebree sede exordians; occipitū inseritur, frustū fixū a natura fuisse, occiput tamen ipsum, ac penitus totū caput retrahens, ac retrorsum rectē inclinans. Nisi prima dearticulatio capitis cū prima vertebra, ad huiusmodi testū totum deseruaret.

Galeni argumentū. In 2. d. v. p. cap. 5. circa princ. Impugnatio. Responsio secunda. Ex denotatōe postea.

Responso quarta. Ex insuetudine iocum sim.

Responso quarta. Ex insuetudine iocum sim.



Similiter & septimū par musculorū primis etiam tubus; necnā quarto oppositū ( quod in sexta quidē hic potest figura litera X. autq[ue] extrema litera XI. V. Z. signatus fuisse ) sinistra in maioriā rem temporis ossis processū a posteriori obliquē clauiculisq[ue] exortum; carnoso, crassiq[ue] ad modum sine infecerit; sed capū vā motus vertebree terminaretur? siquidem illis cum secunda dearticulatione moueri erat. Sed quod omnimō hoc ambiguitatem remoueri debet; est quintū & sextū musculorū pars. primum ( Quintū inquit literis H. In septima figura notatū ) Sextū verō parū a secunde vertebree spinam inferiorem primę processum inferi[us] literis K. L. ibide designatū ) cum ambob[us] hęc obliquos trans hęcant; propter motum capitū; vñ eum primā vertebra in gyrū super secunda vertebra ( vt cuiusq[ue] oculos habenti cōperussimū est ) Hanc enim est, vñ Galenus imaginabatur, & quæsiuit quanti pars quod a transverso primæ cervicalis vertebree processu exordians, obliquè in occiput inseritur, obliquè singulis partē ad latera caput detrahāt; neq[ue]

Responso quarta. Ex insuetudine iocum sim.

Responso quarta. Ex insuetudine iocum sim.

Cetera Galeni; in 2. d. v. p. ad m. 2. ad m. 2.

neq; quod ad posteriora flectat, nisi cum suo pari adiunctus eque simul utraq; moueat. Sic enim ad abnuendum, posterioremq; reflexionem, cooperant, preteritum eū primo, & secūdo, tertioq; & quarto pari, valebit. Obliquè autem sensibilibiter caput mouere, primè vertebres eū capite articulatione minime suffert. Obliquè inquam ad latera. In gyrum enim (vñ predictū iam est) singuli predictōrum parium coadiuuabunt. Est autem primū par (vt singula exquisitè dignoscatur) quod literis A. r. B. C. in octaua figura signatum est, à quinte, sæpèq; etiā sextæ thoracis aliarumq; deinceps superiorū vertebrarū, ad ceruicis tertiam vsq;, originem intereā sumens, inde obliquè ascendens in occiput implantatum. Secundum verò par quadruplici principio (secundū Vesaliū nanq; descriptionem hæc impresentiarū clarioris doctrinæ gratiā numerare placuit) à quibusdam thoracis, ac ceruicis vertebrarum lateralibus, spinosiq; processibus exordiens, in occiput quoq; duæris quatuor insertionibus implantatū nona figura literis A. B. C. D. G. F. E. G. præfert. Quemadmodū par tertium septima literis A. B. indicat. Sed neq; (vt ad propositū nostrū cōuertamur) solū sextū par in gyrum caput mouere sine quinto sufficeret (quanquā Falloppius id asserit) Nisi à quinto præ ceteris adiuuetur. Non quòd simul qui in dextris sunt, sibi inuicem simulètur (quemadmodū Vesalius inuicem) pariterq; in oppositum simul qui sunt in sinistris. At motum talem in gyrum faciunt paralleli musculi sibi ipsis æquidistanter oppositi: quorum alter quinti, alter verò sexti paris existunt. Dum enim sexti paris musculus dexter, qui à secunde vertebræ spina primū sumens, in transuersum dextrū primæ vertebræ processum inseritur, secundam ipsam vertebram obliquè, ac in gyrum, retrorsūm; sinistrorsumq; simul retrahit, hęcq; reuoluitur: Necessariò eiu sèd primæ vertebræ oppositus transuersus processus, puta sinister in gyrum antorsum conuertitur. Qua de causa obliquè magis ab occipitio distaret, nisi quinti paris sinister musculus vnā cōtractus secum occiput retraheret, dextro sexti paris musculo suppetias ferens. Eodem modo se habent predictis oppositi: videlicet sinister sexti paris musculus cū dextro quinti paris. Sic igitur paralleli musculi (v.g. qui in septima figura signatur literis H. & L. aliq; ibidem signati literis I. & K.) sibi ipsis inuicem in huiusmodi capitis in gyrum cōrotatione auxiliantur. Quòd si quinti munus à ligamento quopiā musculi voce posito fieri potuisset cōtenderis fecias interim perfectius ab huiusmodi quinto musculo sexti motū iuari, & abq; illius hinc laborè gyrum cōplecti, quam à ligamēto nil per se mouente, nisi duntaxat quatenus id à sexti paris musculo moueretur. Sed ne his quidem solis duobus muscūlīs paruis, scilicet quinto, & sexto tantum motum in gyrum natura cōmisit. Maximè enim cōserunt primū par, ac secūdi, tertiæ portio (seu maus cum Falloppio tertium muscūlum appellare) quæ in mamillaribus processibus posteriorum radicē à transuersis processibus quibusdā thoracis, pluribus verò ceruicis obliquè fursum ascendens inseritur. Gyrationem in quā hi quoq; adiuuant, dum non totum par, sed alterius partis singuli operantur. Sinister enim in dextrum, dextrūq; in sinistrū cōserunt. Dupl. tamen hic sub silentio prætereunda non sunt. Primum quidem; quoniam si ex quibuscūq; cuncta pendente voluerimus, motus in gyrum capiti proprius v. g. est; quemadmodū rater, quo antinuis, abnuimulq; Cum in gyratione prima eam vertebram necessariò super secūda tanquā super axi reuoluatur. In altero autem solū caput super prima vertebra antorsum, retrorsumq; reuoluitur. Cum tamen eorūdem motus dicere nequeamus (vñca enim vertebra per se non est) huiusmodi capiti tanquā propriū designamus. Secundò aduertendū quoq; eadem ratione est, tres dextris capiti proprios esse muscūlos, qui ceteris motibus capiti, nulla alia parte mota, ebreantur, duos inquam flectentes, videlicet quartum ad posteriora, septimūq; antorsum ceterisq; motibus predictū muscūlum quintum. Alij verò ceteris etiam nonnullas vertebres tāgentes, quidam verò & thoracis quoq; nonnullas, non adeò capiti proprii (exquisitis contemplan-do) dici possunt. Quoniam verò solū caput mouere iuis partibus superioribus, immota interim existente ceruice, queunt: Eapropter inter capitis proprios motores ab anatomicis enumerati sunt: præter eos, qui ceruicem aliquo modo mouentes, secūdarīo caput eodem motu agitant. Hi nanq; nō solum annuendo, reuolūdoq; (vt ceruicis motorū primū .s. quartūq;. ¶ par existunt) sed ad latera, dextrum inquam, & sinistrum (vt eorūdem muscūlorū secundū, ¶ tertiatq;. ¶ coniūctio est) & in gyrum quoq; caput ipsam secūdarīo cōmouent, predictisq; capitis motoribus auxiliantur. Alia tamen ratione, quam cum sexto quintus musculus, alijs predictis siue capiti proprijs, siue ceruicis musculis caput in gyrum reuolūnt, siue reuolūtionē adiuuant. Duo enim illi propriè tanquam superfixo aliquo immobili axe, secūda inquam vertebra, circūgyrationem proficiunt. Ceteri verò improprī, tanquam siuecūsiue sibi inuicem in motu consequentes: quemadmodū in brachiali, humeroq;, ac femore, alijsq; multis articulis partibus in gyrum circūuolui solitis contingit. Quanuis autem principales, mandē istis musq;, motus capitis super prima vertebra sit annuendo, reuolūdoq;, & ad alios motus sensibilibiter patrādos (vt antea diximus) articulationis minime sufficit: occulte tamen (cum vera, exquisitèq; primæ speciei superius declaratæ, ¶ gingy-mos nō sit, sed apertissima enarthrosis) in latera fieri motum quandam obliquū, velut etiam in

secundū

Cōtra Falloppium.  
Cōtra Vesaliū, &  
Valerūdā.

Notandum  
primum.

Notandum  
secundum.

¶ tab. 7.  
C. D. 8.  
A. B.  
¶ fig. 7. a.  
¶ Ibidem  
N. tab. 7.  
G. C. 8.  
tab. C.  
¶ fig. 9. n.

¶ in proc.  
c. 1. 4. post  
p. 100.





internis prima inuachatur, qui non id etiā iure laudabitur? Tumor enim locis hic erat posterior, ipsaq; spinalis medulla minis habitura erat negotij. Constat igitur ex his, qd non solum primam vertebra[m] oportet cum capite esse dearticulatam: verum etiā secundam cum prima. Quod si simul hæc cōmissæ fuissent, altera alterius motus impedisset: cum quæ quiesceret, agentem ad eam retraheret, ac coherceret. Nunc autem vtraq; vicissim motū suū in sola potest obire, quæ cōiecte altera. Si igitur primas vertebra[s] inter se dearticularetur erant melius: formā dearticulationis cōuenientissimā natura omnino eis dedit. Quenam est conuenientissima? Mansi sane ne iniquissimas quidem quispiam aliam, præter eam, quæ nūc est videtur esse dicturus. Nam primæ vertebræ cauitatibus supernis, quæ capitis eminentias excipit, aliq[ue] quædā cauitates parte inferiori cōiūmilis iubiocent: quæ secundæ vertebræ cōuexitates obplectuntur. Quarum beneficio neq; vertebræ secundæ cum capite cōnexio (cuius actio erat, caput in gyru[m] voluere) à prima quicquid habet negotij, quantum ea sit interiecta: Neq; motus reliquus tollēdi, ac depriemēdi, siue inhiecti, & remuēdi, propter dearticulationem cum prima, impeditur quicquam à secunda. Habet igitur prima ver[tebra] (vt subdit in textu præsentis Galenus) duas alias cauitates in inferioribus sui partibus. Id quod ei peculiare est: vtraq; scilicet suscipere, ac nullibi receptam esse: Quænamodū thoracis (vt videbitur .i.) duodecima vtrinq; suscipitur, tuberculaq; habet: Reliquæ verò omnes, vel superiores quidem in parte recipiuntur, infra verò recipiunt: quia supra tuberositates habent, infra verò cas utat: vt reliquæ cervicis, ac thoracis vertebræ. Vel econtra, supra quidem caua sunt, infra vero extuberantes, vt lumborum vertebræ. Sed prima quidem cervicis ver[tebra] supra, infraq; cæcavata est. Quatuor igitur habet cauitates: quarum superiores nō modo maiores inferioribus sunt, sed etiam magis à se invicem distantes, ob eandem rationem: quia scilicet hæc capiti protuberantes processus recipiunt: Qui non maiores modò, sed distantes magis à se, quam secundæ vertebræ processus sunt, quos inferius primæ vertebræ cauitates recipiūt. Etenim recipiens, & resceptū sibi inuicem proportionari debent. Ne si minor cauitas recipiēdo tubere sit, totus illud in unū comprehensum remaneat: vel si maior ea existat, laza nimium, ac falax dearticulatio fiat. Cui igitur cauitates eminentissimæ inque equabiles esse debeant, sunt autē occupis eminentissimæ, distantioreq; (vt dictum iam est) Ideo & primæ vertebræ cauitates superiores occupat in inferioribus & maiores, & à se inuicem distantiore extuberant, tantum enim intervalli esse inter recipientes cauitates debet, quantum inter ipsas recipiēdas cōuexitates, siue eminentias existit. Quamuis autem glenoides, superfixiæ, siue oculares infernas primæ vertebræ cauitates namque occupans superioribus assimilat. Nō tamen propter glenoidianas, glenoidesq; superioribus intellexit, dicens illa has esse similes. Cum illæ superiores maiores sint, ideoq; ceteris potius dicend[is]: ex quo per arthrodia secundæ vertebræ, per enarthrosia verò capiti primam vertebram dearticulanti profereūdū venit. Similitudo igitur quoad cauitatem stat, quomā scilicet vtrinq; cōcaua est, recipiensq; non quoad magnitudinem, profunditatēq;. Quoad autem labia cauitatum externa sunt altiore simul, & ad internam capacitatē cōueria, interna verò humiliā, ac veluti effluxum quendam ab externa capacitate ad internam habētia ratio nabitur à natura (Galeno etiā erudiente .ii.) factū est. Respicuū enim qd natura in partibus cōformandis prouida propterea labia cuiusmodi cauitatibus est machinata: vt si quādo ingradientes ipsas cōuexitates in motibus vehementioribus exiguū quiddam abeberat congerit, foras tamen nō exiēdat. Sed quōd toti dearticulationi est tutissimū. Sed hæc de duabus capitis cum prima, & secunda ver[tebra] dearticulationibus, propter proprios eiusdem motus, distantiōnē vna cu[m] ipsa etiam Galeno sunt. Ad reliqua igitur, pro vertebrarum conformatiōe, ac substantia, permigremus, quā subdit.

TEXTVS TERTIVS.

Est autem prima latissima, tenuissimāq; sed que hanc sequitur, angustior quiddē, et vna validior. Sic autem & reliquæ omnes huic succedentes. Quōd enim dorsalis medulla in nervorū productionibus cōsumpta scilicet gracilior sit: eō in feriorū vertebrarū spatia magis manifestatur. Vnāquodq; enim dorsali quā corporectur, crassitudo equalis est. Id igitur vertebris omnibus cōmune est: quænamodū & tranquilli processus, & præter hos illi, qui fursim deorsumq; spectante

40V 207  
 41107  
 42107  
 43107  
 44107  
 45107  
 46107  
 47107  
 48107  
 49107  
 50107  
 51107  
 52107  
 53107  
 54107  
 55107  
 56107  
 57107  
 58107  
 59107  
 60107  
 61107  
 62107  
 63107  
 64107  
 65107  
 66107  
 67107  
 68107  
 69107  
 70107  
 71107  
 72107  
 73107  
 74107  
 75107  
 76107  
 77107  
 78107  
 79107  
 80107  
 81107  
 82107  
 83107  
 84107  
 85107  
 86107  
 87107  
 88107  
 89107  
 90107  
 91107  
 92107  
 93107  
 94107  
 95107  
 96107  
 97107  
 98107  
 99107

per quos ad iuuicem dearticulantur. Ex alijs autem plurima quidem cōmunia, pauca verò differētia sunt: de quibus postea dicam. Posteriorem processum, quē spinam vocat, omnes habent vertebres, prima excepta. Huic autem soli anteriore in parte paruus inest processus.

## COMMENTVM TERTIVM.

**I** ATISSIMA M intellige primā vertebrem, nō quod substantiam eius: sed quod capacitatem, capacitatemque. Latissima igitur, amplissimaque est omnium vertebRARVM: quia spinalem medullam propē originem suam grossiorem existentem amplecti debuerat. Reliquis tamen in vertebribus omnibus solidior, densiorque: quauis tenduntur anteriores partes tenuissima vtrinq; circa processum anteriorem (de quo postea loquemur) sit. Quod posteriores enim, grossior alijs in ipso homine est: presertim verò quinq; præter secundam infernis collis dorsiq; vertebribus (quanquā tenuissima in simijs hæc prima est) Ad latera quoque vbi cavitates prædictæ, sinuosæ quatuor existunt, omnium crassissima, validissimaque prima hæc vertebra facta est. Licet non Galeni. x. ratione prima: vt scilicet ibi tūto ad primas partes neruorum è spinali medulla procedentium transitum, exitumq; perforaretur. Cum nō foramen in homine, canum in star. (à quibus fortassis delusus fuit Galenus) sed quiddā sinus, ac in parte positus ipsius vertebres tenuiore, postiororeq; insculptus ob prædictū vsum sit: Ex quo quidem sinus, cum alio occipitis ossis sinu, quauis minore hoc illo verò maiore, cōmune quoddā foramen in homine ipso resultat. Verum secunda veniūs Galeni ratione: vt scilicet parte quidem inferna secundi spondyli conuexitates, superna verò capitis eminentias exciperet: hoc est, vt quatuor prædictæ cavitates apte, ac tūto, & præter vllam fallaciā siue periculum insculpi queant. Quā enim spondyli ipsius partes maximè erant elaboraturæ, has præter ceteras fatius fuit sortes efficere. An verò equaliter vertebRARVM foramina, siue interna ipatia cōmuniuendo procedant. An alicubi ordo hic interumpatur, antea iam declarati à nobis est. y. Subdit autem Galenus [quemadmodum & transuersi processus, &c.] Bisariam verbā hæc intelligi possunt. Prīmō videlicet sic, qd transuerſi processus id cōmune per totam spinam cum ipsis quoque vertebRARVM iam iam dictis corporibus habeant, vt inferiores tanquam gestates superioribus tanquā gestatis, ac per hoc necessario, ratiōnabilerq; leuioribus maiores sint [quemadmodū vberius antea x. præstentium quoque de ipsis vertebribus ex Galeno. a. est] Haudquā secus & illi, qui sursūm deorūmque, spectant processus (per quos vertebres ad iuuicem dearticulantur, & per quōsdam ginglyma speciem ordine tertiam, improprianāq; superius à nobis declarata cōiunguntur) eandem seruent proportionē: vt scilicet ordine quodam successiuo inferiores gestates superioribus gestatis maiores sint: Ad eō vt in hoc omnes vertebres (prima grossiores hos habente excepta) eandem seruent in huiusmodi lateralibus processibus proportione. Hęc itaq; primā esse postea expositio: quā in innuere videtur Balamij interpretatio addens verba illa [communis est ratio] sic prædicta verba transferens [quemadmodū transuersi quoque processus, qui deorūm, sursūmque, versusm spectant, quibus inter se conuēctuntur, cōmune est ratio.] Sed quoniam ventian hæc in nimis respondent. Cū enim nulla in his processibus eiusmodi fuerit proportio, tamē in homine, quā in simijs etiā (quædā enim inferiores superioribus maiores, quædam verò maiores inueniuntur) Idcirco ad aliam perueniamus expositionem, quæ rei naturæ, ac veritati, Galeniq; menti respondeat. Quod scilicet voluerit dicere Galenus, nō solum cōmune omnibus vertebribus esse, intus foramen habere spinalem medullæ cōtinentē: Idq; in superioribus maior, in inferioribus verò minus successfulē semper angustandō: sed aliud etiā cōmune habere: vt scilicet processus transuersi, atq; illi etiā, quibus inuicem dearticulantur, omnibus cōmuni ratione insint. Alqua enim sunt, in quibus nō omnes vertebres cōmunicant (vt sigillatim in vertebribus dorsū, & lumborū dicit) presertim de posterioribus processibus, quos omnes habent excepta prima. Quemadmodum quōd laterales quoque; transuersosque processus longitudine ab alijs cuticibus vertebRARVM transuersi etiā processibus, primæ vertebres laterales processus differunt. Cum proceriores, transuioresq;, ac exerti magis hi sint (duplici quidem ratione tales, tantiq; primō, vt quanti. a. & sexti. b. mulculorū caput gyrantū parium, illius principium huius verò infertionem recipiant, secundo vt tertij scapulam mouentū pars y. principium habeant) Illi verò anteriorū potius vergant, quā rectē ad latera dirigantur, nedum breuiore tenuiorē; sint. Secus igitur de ipsō posterioribus earundē vertebRARVM processibus, quod eorum crassitiem est. Secūdie enim posterior processus tamen reliquis sese infertionibus, quæ iniquā sub quarta existunt, breuior sit. His tamen omnibus, qui in ceruice, ac ipso etiā dorſo sunt, crassior est. Verūm enī numerō nō crassior modō, sed longior quoque; secūdie vertebres posterior hic processus est, quā tertie, & quartæ posterioribus processibus existunt. Quos quidē siue tenues, siue crassos vertebres omnes habent, prima excepta, quemadmodum rectē Galenus subdit. Huic enim soli inter omnes vertebres nō posteriore, sed anteriore in parte paruus quiddā

Cōtra Galenū  
x. 11. de v.  
p. cap. a. id  
line

y. Cap. præ  
cedenti cō  
1. post prim  
1. spondyli  
duplex.  
a. Ibidem  
a. 1. d. v. p.  
cap. 13. d. 7  
Inuolūti a  
1. 2

impugna  
no.

primæ ver  
tebre trans  
uersi post  
sus car lō  
giores

a. fig. 7.  
cō. præce  
denti H. I.  
b. Ibidem  
K. L.

y. tab. 7.  
H. fig. 9.  
cō. præce  
denti Q.



simis, canabufq; obferuauit. Id, quod tamen, quoad hanc feptimam, in homine faliffimum est. Cum ea nõ fecus ac alie sex fuos processus perpensõ foratos etiam habeat. Per quæ quidem foramina tunc veni, tunc arteria quedã vtriq; fursim in cerebrũ perentes afcendunt, fpinalis prius medullæ originæ, ac deinceps ipfi etiã cerebro nutritiuenti, ac i spiritus allaturæ. Secundum verò dictum Galeni, quod est de eorundem tranfuerforũ processũ bipartitione, præter duas primas vertebra, instantiã quoq; de feptima habet. Etenim vel nullam, vel obfcuriffimã feptimæ tranfuerforũ processũ bipartitionem habent. Idcirco Galeni verba ad bonum fentium redducere facillimum est, dicendo [ Hæc autem ipfos ] scilicet præter feptimã dictos [ processus folæ ceruicis vertebra bipartitos gerunt. ] Præter feptimam, namq; de ipsis antea locutus fuerat, q̃ perforati videntur esse. Quæquidem bifurcatio cõmunis etiã omnibus pofterioribus, [ spinalibusq; ] processibus est, prout in sine præcedentis cõmenti præfatu iam est. Est autem (vt Galenus hic ait) tranfuerforũ processũ bifurcatorũ alter, qui scilicet interior est, in omnibus latior, & elatius interiori pofteriore effertur. Tertium verò dictum per se clarũ est, hoc duntaxat annotando : quomã in simis non modo ceruicis, sed thoracis etiam, lumborumq; vertebraũ longitudine præ cæteris manifestior est, ceruicis autem vertebra proprium est deorsum prominere, ac in subiectæ cauitatem quandam manifestè recipi præter primam, vt in prima, & secunda figura cõmenti secundi liquet. Cur autem tranfuerforũ, pofteriorũq; processũ bifurcatio facta sit rationem assignare operæpretium est. Quare nõ ellẽ aliam inuenimus, nisi vt musculi ad eas partes attinentes, præferunt; ceruicis, atq; capitis motores, commodam siue originem inde, siue insertionem in illos lucra possent. Maxime autẽ quoad tranfuerforũ pertinet, vt secundus, 3. tertiusq; 4. ceruicem ad latera mouent musculi in ipsos inferantur, secundus quidẽ in interiores, tertius verò in exteriores, posteriorẽsue. Sed de lateralibus vertebraũ ob neruorum distributionem factis foraminibus cum Galeno fermocinemur : Quomã videlicet sic subdit.

## TEXTVS QVINTVS.

¶ Nervis autem ex spine medulla oriens, ac iuxta vertebraũ cõpages procedentibus vtraq; ceruicis vertebra æqualem ferè forami operam confert. In cæteris autem omnibus, quæ superiacens est, aut plurimum, aut totum illi præstat.

## COMMENTVM QVINTVM.

**A**ERVO R.V.M. paria septem per ipsã vertebraũ ceruicis foramina ex spinali medulla, tanquam ex magno flumine riuuli egrediuntur varias (vt videbimus) partes irrigantur. Eademq; ratione sex inferiora foramina facta sunt : quomã scilicet semicircularis quibusdam vtriq; vertebrae tametsi inæqualibus circularẽ foramen in vertebraũ medio singulum resistit. Primum autem neruorum coniugationi peculiare aliud est, vt scilicet (in homine inquam) sinu potius, non foramine in prima post caurum superiorum processum cum capite dexteriorũ radicem in scapulo progrediatum; quanquam Galeno id minime cognitũ sit, a canum vertebra prima secundũ proportionem, quam in homine, grauidiori foramen decurrit. d. Dicit autẽ & hic idem Galenus ceruicis vertebrae foramen, hoc est, æqualem ferè, siue quodammodo, siue (vt Balamius traducit) quasi æqualem forami operam conferre. Quamvis enim æqualis prima fronte appareat: ex quibus tamen perspicienti vertebra inferior magis, quam superior; quemadmodũ in lumbis e contra scilicet superior magis, quã inferior ad circuli foraminis cõplementũ præstat. In thoracis autẽ vertebra medio contingit modo: quomiam scilicet in superioribus eius partibus, cõmice versũ inferior magis; descendendo autem paulatim eadem inferior minuitur, superiorq; augetur. Adeo vt eadem que iuxta lumbos vertebra cõstitant, illis assimilentur: vt scilicet inferior magis ad foraminis circuli conferat. Vnde non parũ deinde hic de Galeno admirandum est, cur scilicet vt notatur, hoc est totum aliquando circulum in alijs à ceruice superiorum vertebraũ præstare. \* Cum nullibi quidem sic reperiat. Quanquam in lumbis (vt iam prædictũ est) maxima ex parte, siue plurimum conferre superiorum, verum sic. Quamobrem & a vero quoq; prorsus alienũ est, in cæteris superiorum plurimum facere. Cum (perindeq; prædictũ quoq; est) in superioribus thoracis vertebra, inferiorum adhuc magis: in medio verò eundem, equaliter vtraq; cõferre ad foramen, liqueat. Ne autẽ que verberellẽ à Galeno prædicta sunt inuide reticemus, nõ nulla eius dicta in mediũ afferamus: quomã scilicet ita scripsit. e. [ In alijs siquidẽ omnibus (excepto primo) spondylis, qua sibi inter se con-

l. tab. 7.  
G. B. C. &  
fig. 7. id.  
2. N.  
p. fig. 7.  
N.

Cõtra Galenum.  
d. r. 1. v. p.  
cap. 3. & 4.

Cõtra Galenum.  
\* Ibidẽ inuenit 13. de v. p. cap. 3. post med.

e. 13. d. v. p. cap. 3. post med.

se con-

3 Spodilori  
 30 foramina  
 31 pro neruis  
 32 ex emicula  
 33 Primi spon  
 34 dyli fora  
 35 men huius  
 36 modi nul  
 37 lum.  
 38 Foramina  
 39 locustapif  
 40 simas vbi  
 41 est.  
 42 Non ad po  
 43 steriors.  
 44 Non ad an  
 45 teriora.  
 46  
 47 Non in cor  
 48 pore spon  
 49 dyli.  
 50 f. Lib. 2.  
 51 cap. 1.  
 52 g. Cap. 4.  
 53 & 1.  
 54  
 55 Colli sex  
 56 spondyli  
 57 pentis bi  
 58 fis.  
 59 Huius ner  
 60 uorum cau  
 61 itates sunt  
 62 aquales.  
 63 In lumbis  
 64 superiores  
 65 magis ca  
 66 ue.  
 67 Galeni ex  
 68 cusatio qu  
 69 ad liberis  
 70 foramina.  
 71  
 72 In collo v  
 73 bi femur  
 74 palis.  
 75  
 76 sc coniunguntur, ad latera foramen incit semicirculo simile, oblongum intro, vsq; ad spinalem  
 77 medullam penetrans: vt ex ambobus locus vnus fiat tam latus, quam crassus est is neruus, qui per  
 78 ipsum est preteriens. Primus verò spondylus neq; in suis partibus, quibus cum secundo dearti  
 79 culatur, ac multò minus in superioribus, quibus cum capite etiã dearticulatur, foramen vltim  
 80 habuit cuiusmodi: Sapienter hic quoq; arte ea, quæ animalia conformant, prouidete simul, ac in  
 81 neruis omnibus, qui à spinali medulla proficiuntur, noxam declinante, quæ tùm neruos ipsos,  
 82 tùm spondylus etiã, si aliunde emergent, manebant. Licet igitur hic quoq; vbi foramina fue  
 83 ris conspicatus, reputare, quo pacto spondylis ex vsu magis sint hæc solum esse perforatis, neruis  
 84 autem id ipsum fuit tutissimum. Nam foramina hæc, ac nerui, qui per ipsa emergunt, sub produ  
 85 ctionum accliusum, ac declinum radicibus sita vndiq; mununtur, vt collatam alibi melius non  
 86 potuerint. Ad posteriores namq; productiones ipsos relegari nõ erat tutum, tùm qd nullum illic  
 87 haberent munimentum, tùm etiã qd prius, quam ad partes anteriores peruenirent, longum eis  
 88 iter esset emittendum. Quòd si a posteriorum magis, quam nunc sunt, eisẽnt transpositi, & spondy  
 89 lus ipsos lædente, foraminibus tunc profundis excavatis, & ipsorũ ligamentum imbecillius effi  
 90 cerent, atq; instrumentis, quæ illic spinæ incumbunt, incòmodarent; quòrum nullum erat aliq̄ per  
 91 nandum, neq; dignum qd à sapiente opifice negligeretur. Nam si quis neruus partibus anteriori  
 92 bus, ob viæ periculũ esset offensus, id animali fraudi esset. Si quidem ipsum sensus ac motus par  
 93 ticeps erat futurũ. Quòd si spondyli qua parte ipsi sunt crassissimi, ac si ibi ipsi matuò incubunt,  
 94 ea essent perituli, secutas cõpõsitiois ipsorum necessariò læsã non nisi il fuisset nõ aliter, quam  
 95 si parietem crebris, ac latis foraminibus perforatis. Ligamentum verò, quòd eos cõnectit, quòd  
 96 (vt ante diximus f. & postea dicemus g.) fortius esse oportebat: inualidius omnino redderetur,  
 97 neq; amplicius totum libi ipsi cõtinuaretur: sed multis locis plerunq; velut diuideretur, ac erode  
 98 retur: que ad modũ quid cuiusmodi ipsi nunc sunt; accidat. Porro quæ parte anterioris spon  
 99 dyli incumbunt, in dorso quidem, veng quædam sunt, quæ thoracẽ nutriunt, ac maxima omnũ  
 100 arteria, & stomachus: In lumbis verò spondylis incubant tùm in memorate arterie pars inferior,  
 101 tùm veng caue loci illius portus, ac musculi maximi, quos <sup>Phis</sup> nominant: In colli autẽ spondy  
 102 lis sunt musculi caput inclinantes, ac stomachi pars superior. Quæ partes omnes (à quibus par  
 103 tem spinæ anteriorẽ diximus esse occupatam) haudquaquam constitui alibi melius poterant.  
 104 Recte igitur natura medium preteriens: vbi primũ ipsorum spondylorũ latera desinunt, alline à  
 105 spinali medulla neruos produxit, tùm ne quid ipsa allinere, tùm ne spinæ compositio redder  
 106 retur imbecillior, tùm etiã ne ligamentorũ continuatio intercederet, aut neq; si per longum,  
 107 ac periculosũ iter nerui ferrentur, pati aliquid pertularentur. Quo loco verò ipsi nunc sunt siti,  
 108 is vndiq; planè est tutus. Reliqui enim colli spondyli neruorũ productiones habent à transuersis  
 109 productionibus (quas bifidas esse diximus) tectas ac bene stipatas. Nam omnibus istis præter pri  
 110 mum spondylum, in vtroq; laterali ipsorũ sine neruorũ productione exterrunt: In collo quidẽ  
 111 vtriq; spondyli, qui inter se sunt cõiuncti, atq; æquales vt docuimus antea (intellige velut dictũ  
 112 est [708]) scilicet quodam modo, vel ferè, seu quasi: cum verè æquales nõ sint) ad foramina, quòd  
 113 neruũ deducit, generationem, quòd maxime licet, conferunt. In lumbis verò totius spondylis  
 114 neruus inuicem ferè, ac vt maxie superiores spondyli, quòd illud quidẽ productio ipsam in  
 115 niens inuergat (vbi ad verbum [709] latine ferè, tẽu quòdã modo notandũ: vt glossa hæc  
 116 pateat eius, quòd hæc dicitur [710] latine [tutum] qd scilicet non verè totũ in lumbis sup  
 117 iorem vertebram cõplere intellexit. Nũ quatenus eius processũ neruos munientia, amplex  
 118 stentiumq; excavationes, circulationsq; ferè totæ sint: inferior enim solum quandã basim non  
 119 munimentũ eorum neruorũ præstant. Cur autem in lumborũ vertebis ita cõtingat, vt quasi sola  
 120 superior neruũ amplecti valeat, in inferiorũ auxilio non indigens, rationem statim subdit, earũ m  
 121 gnitudine attonuens, quibus ea subdit) [Præterea cum spondyli ipsius sint magni, alter ipsorum  
 122 solus neruo loci istis præbere potest. At in collo spondylorũ paruitas sola neruo viã præbere nõ  
 123 poterat. Ob id certè ipsum ad finem cuiusq; natura velut semicirculo quendam exculpit: Cũ  
 124 mollet spondylos ipsos perforare: propterea qd si id fecisset, ostendisset, quam sint tenues, eosq;  
 125 imbecillissimos esse cõfesse. Ob eam certè causã, ipsorũ corpora alia alijs matuò infidentia, præ  
 126 longa quidẽ manũta, caua verò partibus superius effecit, quòd subiectorũ spondylorũ acclius  
 127 productiones, quæ & cauitatem ipsorũ generant, & finem superioris prælongũ complẽntur: non  
 128 nihil etiã ad cõmunis foraminis generationem conferant. Parte enim horũ externa est ipse velut  
 129 semicirculus, & post ipsum sunt spondylorũ articuli: medius autem inter vtroq; neruus emig  
 130 git, simul quidẽ ab omnibus circumfusus eminentius munitus. Simul autẽ ex vtroq; spondylo  
 131 exiguũ quidpiã exculpens. Quæ sculptura haudquaquam tibi appareat, si spondylosa se se om  
 132 nino deduxeris, ac separaris: sed dixers ipsam secutam necessariò vtriusq; productiones. Tantã  
 133 natura dispositã habuit rationem cùm aliorum omnũ spondylorũ, tùm verò eorum, qui collo  
 134 insunt, quòd ipsi essent minui. Et omnia effecit, ne ipsorũ corpora perforaret, neue imbecillus  
 135 ipis

ipsos efficeret, aut ( vt in summa dicam ) spinæ cōpositionem, quod ipsa esset velut animalis to-  
 nus cōpaginis carina quedam, ac veluti fundamentum. Quod verò ad lumbi spondylos attinet,  
 admonendus ante, videlicet nos aperit posse neruū lateribus partium in ferarum inueni. In dorſu  
 verò spondyli inuehitur quidē hic quoq; fini sup̄erni spondyli euidenter, non tamen similitur;  
 sed vt etiam spondyli in infernum attingere videtur. In colli autem spondyli, q; ipsi omniaum  
 essent minimi vterq; spondylius equalem portioneē ad viam neruū cōtulit. Cūm natura cavitatem  
 quandam inter vtriuq; productiones effecerit obscurē aded, vt nulla ipsorum pars excipula esse  
 videatur, sed necessariō ad secuta. Num igitur solas prædatorū foraminum generationis natura  
 p̄cōtans, p̄longa quidē infernē, caua verò superne corpora colli duntaxat spondylorū efficit?  
 An & aliud quiddam vtilius prouidit? Ac cur tandem omnes alios spondylos in planū, sequēti  
 atq; vādiq; equalem, omni noq; solidum circulū terminauit, eaq; parte ipsos inter se connectit  
 solidum autem colli spondylorū non eandem fecit syntaxin? Quia cum spondyli singulū priuū  
 constructionis scopum haberent duplicem: sedem scilicet totam spinę totius, q; ea esset velut ca-  
 rina quedam, ac fundamentū; ac motum, cūm animalis essent partes: aliorum quidem omnium,  
 qui sunt sub colli spondylorū vsus in securitate est maior, superiorum verò in motione. Nam li  
 animo reputans, quod ad plures actiones necesse est collum variē, celeriter, ac multum nunc in-  
 clinemus, nunc attollamus, atq; ad latera circumagamus, quam totam spinam moueamus. Nati-  
 ram ( vt ego arbitror ) iudicabis, quæ vtrq; inferi parti quod ex vsu erat elegerit: colli quodē motionem,  
 reliquæ verò spinæ sedem. At neq; in spondyli alij incumbere alijs tantū poterant,  
 sine lata basi, ac forti vinculo: neq; iuperiū moueri facile poterant sine longo processu, aut laxo  
 ligamento. Quis ergo quidē ( vt ante ostendimus ) articuli omnes, qui variē mouentur, in capita  
 rotunda delinunt. Et quidē si natura nullam prorsus se dissecuraē spondylorū colli habuisset  
 ratione; sed ipsos duntaxat ad motus velocitatem, vt brachium & semur, cōparasset, in capita ro-  
 tunda: vt hos artus terminasset. At verò secunde ipsorum utilitatis non sunt oblita: sed ob id eos  
 fecit longos eousq; quantum ipsi postulabant, non modò ad motum facilem, verum etiam datum.  
 Sumit autem ad securitatem & alia non continentia: quorū alia quidē spondyli omniū sunt  
 cōmunia, alia autem eximia, soliq; colli spondylius peculiaria. Verū enim uerò cum de forami-  
 nibus facta mentio sit, per quæ neruū in vertebrarū medio, quodam reliquis, quodam primam verò  
 super eā neruū a spinali medulla tanquā a flumine riuuli ( vt diximus ) procediuntur. Eapropter  
 inuile non fuerit obiter, hic de illis aliquantisper meminisse, Galenum vbi poterimus consecrati  
 nisi a veritate non nunquam ille diuerterit. [ Sic igitur ( vt ipse inquit .b. ) natura cum alia omnia;  
 quæ ad spondylos totus spinæ pertinent tūto exornauit, tūm autē neruorū productiones, quo-  
 modo maxime conueniebat, effecit. In primo autē spondylio ( qui si ipsius dearticulationū, quas  
 libro superiore exposuimus, meminimus, multū m ab alijs diuerpat ) neq; ex partibus supernis,  
 quibus cum capite est dearticulatus, neq; ex infernis, quibus secundo spondylio inuehitur, neq;  
 ex lateralibus, quomodo in alijs, tūto erit neruū producere. ] Motus enim ipsius capitis in ipsam  
 primam vertebram, primæq; vertebrę in secundā vehementer, dum vertebræ ipsa prima quidē  
 ad vnguem amplectitur, aut capitis eminentias, aut secundę vertebrę cōuexitates. Quamobrem  
 cum ista illa, superius iniquā, in sensū; ac amplius illis cavitatibus necessariō p̄occupetur, non  
 erat, vt ibi aliarum vertebrarū insister per femicirculos cæleri possit. Nec in lateribus quoq; cum  
 transuerſi processus alias propter dictos vsus necessarij ex illis locis oriri necesse m fuerit. His igitur  
 ( & non a Galeno dictis ) rationibus, in radicem grossioris illius partis propter cavitates factę  
 retrorsum magis, non foramen cōplerum, sed quasi duas circuli partes ( ternā enim in occipitia  
 ossē ) cęlaui. Aded vt aliorum omnium foraminum in lateribus dicatorū, id quoq; cōmune  
 ex inferiore, superioreq; ossē factū sit, reliquis interim foraminibus inferioribus minus, arcūū s̄q;  
 veluti & neruū quoq; per illud egredientem natura graciliorem produxit, ac ob inuicem illius  
 loci excavationem imbecillima prior dicta vertebra redderet. [ Num igitur hęc quidē omnia  
 ( vt Galenus etiam subdit .k. ) a natura facta fuerunt: vtrunq; verò neruorū excidētiū m, in quas  
 non oportuit, partes distribuit? An in eō etiā admirari eām conuenit, quæ vtrunq; in msculos  
 primo spondylio incumbentes, atq; adiacētes distribuit? Cūm enim mouens ipsos oportuerit, con-  
 sentaneum fuit ex propinquis spinalis medullę partibus neruū recipere. ] In duas diuidit par-  
 tes neruus hic posteriozem scilicet anterioremq;. Posterior ergo pars est, quā in msculos primo  
 spondylio inuicumbentes Galenus hic refert, quartū videlicet, .a. ac quintum, .c. eorum, q; caput  
 mouent. Quartum iniquā retroſcēdentem, extendentemue caput ipsūm, & renuere facientem  
 quantum verò in gyrum ( vt antea diximus .l. ) circumuoluetem. Præter quoq; etiam in scapulum  
 mouentem tertium, .a. qui eam sursum attollit, inseritur. Anterior autem eiusdem neruū portio  
 in msculum ceruicem ſcēdentē primūm, .m. quem stomacho subſtrātū dicitur, implantatur.  
 I Quid reliquos omnes msculos ( subdit Galenus .m. ) qui collo sunt circumfusī, caputq; moy-  
 uent? Nō ne ipsos quoq; satis sunt illinc aliunde ex spinali medulla colli, neruorum principia  
 ſumere?

secundū ner-  
 uū dicitur.  
 1. fig. 7.  
 A. B.  
 e. Ibidem  
 K. L.  
 Secundū ner-  
 uū egressus  
 7. 7. tab.  
 C. D. 8.  
 A. B.  
 n. Ibidem.  
 Tertij ner-  
 uū egressus  
 & inferius.  
 9. tab. 1. F.  
 9. tab. 10.  
 I. I. B.  
 7. tab. 14.  
 O.  
 7. tab. 8.  
 A. B. 7.  
 C. D.  
 a. fig. 7.  
 N. 8. tab.  
 C.  
 a. fig. 9.  
 Q. 7. tab.  
 N.  
 8. tab. 10.  
 F.  
 7. fig. 9.  
 com. 2. A.  
 B. C. D.  
 8. fig. 8.  
 com. 2. F.  
 9. tab. 1. G.  
 7. tab. 8.  
 A. B. 7.  
 C. D.  
 8. fig. 7. N.  
 8. tab. C.  
 8. fig. 9. H.  
 8. fig. 9. Q.  
 7. tab. 7. H.  
 a. De qui-  
 bus paulū  
 ante.  
 8. tab. 1. F.  
 11. tab. 8.  
 A. B.  
 5. tab. 4. N.  
 5. 7.  
 8. fig. 9.  
 Q. 7. tab.  
 H.  
 9. tab. 12.  
 H. 13. X.  
 9. tab. 4.  
 V. V. 6.  
 16. 5. R. 5.

sumere? Cum enim prima coniugatio sit tenuis, ob idq; ex ipsa potius capiti distribui nequeat, ex  
 secunda coniugatione id efficit, ac per supernos musculos nervus vtriq; perlabitur, obliquus quide-  
 mum primū in partem posteriorem, ac superiorem, obliquus autem rursus post hæc prorsus,  
 ac sursum progressus (& à tertij neruorū dicendi pars tamulo quodāmodo auctus) in capite to-  
 tum demū dispergitur, tum ad partes ad aures attinentes, tum ad posteriores, vsq; ad verticem,  
 ac bregmatū inquit. Quod neruorū secundæ coniugationis infra luperat, in propinquos omnes  
 musculos est distributum, à quibus primorū spondylorū motus tum inter sese, tum cum capite  
 fiunt.) In duas igitur partes hic quoq; nervus dividitur, posteriorem scilicet, anterioremq;. Pos-  
 teriorq; partim ascendens in capitis vniuersam cutem distribuitur, partim verò in tenui & lex-  
 tumq; .i. capitis motores in usculos inseritur: Anterior autem in musculorū cetracem quoq; & so-  
 cietium primū .i. cōplantatur. [ Emergunt autem hi ( vt addit idem Galenus .n.) nerui non  
 ex laterali bus foraminibus, vt in tertia, ac quarta coniugatione, nec; ex ipso perforato spondylo  
 secundo, quomodo est primus ( dic tu sinuato, ac exciuato in homine, vt primū esse diximus).  
 Nam ex laterali bus non poterat, propter causam, quā in primo atulimus ( dic tu nostrā causam  
 eum scilicet amplā quidē dearticulatio fieri eo in loco debent secundæ vertebrae eum primū,  
 vt super hæc secunda, tanquā super stabili quodam, prima vnā cū capite in gyrum circūuoluun-  
 tur, diuersā igitur à sequentibus necessariō dearticulatio neruorū transiunt per eum locum, so-  
 queptium inflat, præpediunt: cū verò in necessarijs natura non deficiat.) Vbi igitur solam leuit,  
 ibi natura locum quendam cōparauit, in vtraq; scilicet acanthæ parte inter primū, ac secundū  
 spondylum, per quem secunda neruorū coniugatio egreditur: quæ nihil ab ipso motu distat.)  
 In acanthæ parte, intellige non posteriore, sed laterali, post tuberculorū scilicet eum primæ ver-  
 tebræ cauitatis dearticulorū radices: vbi tametsi obicurus, quidā tamen sinus designari pos-  
 test à natura quodāmodo propter hos nervos cæctus. [ Tertia verò neruorū coniugatio, quæ  
 spinali medulla oriuntur, ex communi foramine secundi & tertij spondyli emittit; musculorūq;  
 buccas mouentibus ( primo .v. videlicet pari ) & illis, qui collum totū eum capite toto retrō eri-  
 gunt ( capitis scilicet secundo, .i. ac ceruicis quarto .x.) distribuitur ( hæc; posterior pars est )  
 pars verò ipsius, quæ prorsū fertur, vtriq; coniugationi, secundæ scilicet, cuius iam memini-  
 mus, & quartæ, de qua verba mox faciemus, permittetur, & neruorū cōmuni bus colli, & capitis  
 musculus ( ceruicis scilicet primo .x. & secundo .x. pari ) suppediuit ( quibus adde scapulam tol-  
 lentium tertium .x. ) quemadmodū ceruæ & partibus omnibus, quæ sunt post aures. ] Vt præter  
 prædictos musculos, vniuersā infimū ceruicis ipsius cutis est, Specialibus autem quæritas cōiuga-  
 tionem describentes, dicamus eam ex cōmuni foramine tertie, & quartæ vertebrae emergentem  
 posterius quidem in musculorū ceruicis quartū par, .8. atq; etiam capitis motores secundum, .x.  
 ac primū, .8. in buccam deniq; mouētium .x. inseritur: Anterius autem vnā eum tertij neruorū  
 prædicti pars portione quadam cōmissus, cōiunctusq; in ceruicem antorsūm flexiles primū  
 paris .8. musculus, necnon & in secundum, .x. tertiumq; .8. par, quæ in latera ceruicis primū  
 mouent, ac simul in scapulam sursū attollentium tertium .x. digeritur. Cuius demū quartæ ner-  
 uorum coniugationis propago quædam deorsū cum quintæ, ac sextæ dicendæ cōiugationis  
 quibusdam propaginibus admittit in septimū deniq; transierunt, præcipuū respirationis muscu-  
 lum inferendā descendit. [ Quinta verò coniugatio, quæ prædictas quatuor sequitur, productio-  
 nem habet, qua quartus spondylus cū quinto coniungitur: distribuitur autē simul, atq; emerit,  
 quomodo prædictæ. Pars enim ipsius quædam retrō per profundū fertur, in cōmunes colli & ca-  
 pitis musculos. ] Eisdem scilicet, .x. in quos posterior quartæ coniugationis propago distribu-  
 batur. [ Alia verò pars antorsūm in musculorū buccas mouentes ( scilicet primū par .x. ) & caput  
 inclinantes ] Ceruicis scilicet motorem primū, .x. qui caput etiam secundā ratione deorsū  
 cōmouet annuere faciens. [ Alia verò, ac tertia in medio prædictarū ipsius partiū sursū versū  
 scapulae summitatē fertur. Verūm hæc quidem in musculis eius loci, ac cuti circūsumfusa distri-  
 buitur; quemadmodū à prædictis omnibus ad cutim aliquē peruenit. ] In epomide igitur muscu-  
 lum, .x. eiusq; cutem superiacentem, simulq; & eum, quem scapulam attolere, numeroq; inter  
 scapulæ motores tertium .8. prædiximus, distribuitur, quibus adde brachij motorū par .x. quintū  
 deinceps autem vnā eum in sequentiū sextæ, ac septimæ dicendarū portionibus quibusdam  
 aduētā in brachium totum ad extremā vsq; manū musculus omnibus, tum cubiti, tum radij,  
 carpiq; ac metacarpi, omniumq; tandem digitorum motoribus sensum, & motum, in sinulq;  
 omnibus superpositæ brachij totius ad extremā vsq; manū cuti, ac vnguib; deniq; sensum  
 exhibet, per prædictas scilicet cūctas huiusmodi partes distributa. Antè quas nihilominus in ma-  
 sculum ossi vides referēti proprium ordinē scilicet quartum .x. portiuicula quædam sensum &  
 motum distributura cōplantantur. [ Ad radicem autem neruorum ( huius scilicet quintæ cōiuga-  
 tionis ) pars quædam vtriq; vicinarum coniugationū, sextæ scilicet & quartæ miscetur, & qui  
 neruus à quarta ad ipsam descendit tenuis, is manifestē cernitur parti eius permittēti, quæ motū



mam portione ex eius loci spondylis neruus diaphragmatis collecta habet, vtrinq; vnus: qui sub  
 membrana thoracem forment, fertur. Sexte vero post hanc cōiugationis sub quinto spondylo  
 (cōmuni videlicet foramine quinte, & sexte vertebrę) excideti mistio fit magna (intellige quōd-  
 ad pattē eius anteriorē) cū propinquē vtrinq; Sed plurima eius pars ad sima scapularū extendit-  
 tur.] Portione scilicet quanda in scapula muscularū secūdum, .p. tertiuq; , & .s. & quartū .x. distri-  
 buens, & cū septima, octauaq; , nequā quā p̄dīctā nequōd cōiugatione adacta in brachiū  
 totū distribuitur. [Auger autē quōdammodo partibus anteriorib; & diaphragmatis neruū: quem-  
 admodū & alijs omnibus eius loci spondylis propazines quasdam exiguas admittit; quomodo &  
 reliq̄ cōiugationes neruorū, qui sunt in collo.] Sed hęc de anterioribus sextę cōiugationis pro-  
 paginibus à Galeno dicta sunt. Posterius enim ad ceruicis posteriores musculos (quartū .v. scilicet  
 par, corū) lateralesq; (hoc est secundū, .p. tertiuq; , .x. par) necnō caput retrahentiū, abgrec-  
 req; facientū par quoq; primū, .v. & secundū, .s. ac thoracē deniq; mouentiū tertiu .m. huncq;  
 sextę neruorū ceruicis cōiugationis propazines alię inferuntur. [Septimę, tandē cōiugationis  
 (quę post sextū spondylū, ex cōmuni ipsius, & septimi spondylī foramine vtraq;) magna fit cum  
 vtraq; propinquā cōmissio, partēq; sui maximā extendit in brachiū.] Cū vtraq; propinquā intelli-  
 gē, videlicet cū p̄cedente nō solum sexta, sed etiā quinta: sic etiā cū cōsequente nō solum octa-  
 ua, sed etiā nona: p̄cipue tamen cū sexta, & octaua tanquā sibi propinquioribus immediatē cō-  
 mīscitur. Nōnūquā verō & huius septimę cōiugationis sūperius p̄dīctis ex quarta, quintaq; ,  
 & sexta descendētibus cōiūctus in septimā tranuersum descendit. Perpetuo tamen parte poste-  
 riore in capitis motores musculos primū, .s. & secundū, .s. colliq; tertiu, .p. & quartū, .x. p̄cipu-  
 eiq; in buccas mouentiū primū .z. inferunt. Sed hęc obiter de his neruis dicta iam hic sint: vt  
 foraminū ceruicis vsum & planatimus. Sunt autē & neruorū ceruicis partē septem, scilicet & sexta  
 minū partē septē sunt: primę vertebrę sinis p̄q; foraminibus numerando. Quibus omnibus ex-  
 quisite percussis, processuum ceruicis numerū ex Galeni dogmate .m. perpendamus. Vnde cum  
 nanq; processus in qualibet ceruicis vertebra posuit ipse. [P̄ter mediā illā anteriorē, magisq;  
 ac declinē: hęc enim corpus ipsū spondylorū est. Verū insignis ipsorū productiones sunt, tūcū  
 illa, quę acanthā efficit (diciturq; hęc prima) tūc tranuerſarū vtraq; , quę vt docuimus etiam  
 est bifida (sicq; cū prima alie quatuor erunt, vt sint omnes hucusq; dictę, tum quinq; , tum qua-  
 tuor, quę articulis sunt dicatę (duę inq; ascendentes, quę ascendentem subeunt vertebra  
 duęq; descendentes, quę in subditę vertebrę ascendētē processū recipiunt): Sicq; sūc nōdū].  
 Ex abundanti verō duę alię accedunt superioribus ipsorū sinibus vtraq; parte subiecte, quę cōiū-  
 ctatē spondylorū declinū corpus excipientē adaugent.] Quę supradictis adiūctę ad vnderariū  
 numerum perueniant. In quibus autē laterales processus, tranuerſarū bifidū nō huc sunt: quemad-  
 modū prima, secundaq; , & septima existunt: in his nouē duntaxat processus existēnt. Omnia  
 igitur ceruicis vertebrarū processus hac ratione simul erunt numero septuaginta & vnus. Quōd  
 si spinales processus (vt lex inferioribus inſunt) duplices numeramus, tunc parū sex vertebrarū  
 processus duodecim numerari nō temetē poterit. Sicq; omnes erunt septuaginta & septē ceru-  
 icis vertebrarū processus. Verū quid obſtare poterit: quō oblongū vertebrarū omniū, excepta  
 prima, corpus, quod in subiectę vertebrę cōiūctatē subet; processum nominarimus? Sicq; trede-  
 cim harū vertebrarū processus sint? Similēq; tunc omniū processus dicatur decotoginta tres? Quibus  
 si anteriorē primę vertebrę processum addiderimus, octoginta quatuor erunt: Sic; tandē nō  
 vt appēdicem (vt nos secūmus) sed vt processum ipsū dentē numeramus tunc erunt quatuor  
 ceruicis processus numero octoginta quinq; . Sed hęc de ceruicis vertebrarū processibus, de alijs  
 enim postea loquemur. Quauis autem foramina sunt vnderariū cōmunia pro neruorū transitu  
 posuerimus: Alia tamen quatuordecim adſenda sunt tranſuerſarū processū, p̄o venarū, arteri-  
 arūq; transitū iam p̄dīctā. Quibus ex septem principalissima, omniumq; maxima, propter  
 spinalis medullę transitū, atq; tutelam foramina cōnumera hnda omnino sunt. Quinq; igitur  
 & triginta effatu digna foramina in ceruicis vertebis connumeranda veniant; p̄ter terrū hnt  
 paruulis ferē inuenimus, quę pro eorum nutritione, ac spiritū cōseruatione deseruiunt: vt in  
 quę tūc venę, tūc arterię penetrēt. Quauis autem vertebrarū figura verē multiformis  
 dicenda sit: largius tamen, crassiorq; , minores cōsiderantes, easad triangulares reducemus, ne  
 tam exquisitē singula perpendendā, maiorem induxerimus tyronibus confusionem. Cum igitur  
 ex p̄dīctis, octo stant in abinitio p̄p̄osita .p. p̄dīcata iam liqueant; eorumq; constructio:  
 primę inquam cum occipite, & cum secūda vertebra per diarthrosim (licet cum illo per enar-  
 throsim, cum hoc verō per arthrodiam) aliatū verō inter se per synarthrosim (vbi in p̄cedentiō .q.  
 declaratum satis, superq; est) morbiq; similes alijs p̄dīctis omnibus cōmunes sint. Reliquū est,  
 vt thoracis, seu dorsī vertebras, cum ipso etiam Galeno, perpendamus. Quū sic subdit.

Sexti nerui  
 egressus, &  
 inferior.  
 p. tab. 9. F  
 s. tab. 7. H  
 13. Q.  
 v. tab. 10.

s. fig. 7. O  
 p. fig. 7. H  
 s. tab. C. 1  
 v. fig. 9. H. 1  
 v. 12. tab.

A.  
 a. fig. 9.  
 A. B. C.  
 D. G.

a. tab. 11.  
 s. 1. 1.  
 s. 1. 1.  
 s. 1. 1.  
 s. 1. 1.  
 s. 1. 1.  
 s. 1. 1.  
 s. 1. 1.

y. tab. 9.  
 A. B. C.  
 D. G.

s. fig. 9. H.  
 s. fig. 7. O.  
 s. 1. 1.  
 Processus.  
 o. 13. de v.  
 p. c. 2. post  
 princ.

C. 1.  
 C. 1.  
 C. 1.  
 C. 1.

Foramina.

Figura.

p. in proce.  
 com. 1.

q. cōm. 12.  
 13. & 24.

... quibusdam... *Πασι τὸν κατὰ τὴν ἰσχυρὰν ἐκείνην, καὶ ἄλλοις...*

De vertebris dors. Caput Octauum. **TEXTVS PRIMVS.**

Quod thoracis quidem vertebræ duodecim numero sint, dictum prius est. Præterquam quod aliquando tamen tardè deficient una, vel superesse inueniuntur. Horum autem ipsorum superesse, quam deesse rarius.

**COMMENTVM PRIMVM.**

**V**R. ex duodecim vertebris, nō pluribus, neq; paucioribus thorax cōstruitur in hominē hō, præstentur quidem à nobis, & ex Galenī in quōq; monumentis, est. Nō pluribus inq; neq; paucioribus, nisi in ea parte. Interdum nanq; vel superesse (vt decem sint) vel deesse (vt undecim) inueniri solet. Rarius verò superesse, hie inquit, cuius tamen oppositum libro de anatomicis administrationibus ostendit. Galenus idem ipertissime testatus est, deesse videlicet rarius inueniari, per hæc verba: [Rarissime siquidē decem materia costarū numero inueniuntur. In totum verò omnibus animalibus, de quibus in hoc opere verba facimus, duodecim in sum epistolæ.] Verba autem in eo libro sicut de hominibus, præsertim verò propter hominē ipsos, de simijs, ac cercopithecis. Idem autem est siue de vertebris, siue de costarum numero loquaris; Cum sibi inuicem necessarier coniungantur vertebrae vtrinque, altera costæ respondet. Libro de anatomicis administrationibus quodammodo in anatomicis exercitijs experientia cōsequitur. Quam Valsarius quoq; inuenerit suis dissertationibus cōprobat. A. de Fallopius quoq; duo interim in his in quibus decim materia visitur hæc peresse obseruans. Alterū quidem, quomā costarū, quæ decimaterm vertebra vtrinque dearticulabuntur, vix videri potuerant, vt costarum in potius rudimenta dicenda essent, quam vere costæ. Alterum verò quod notabilius, & magis ad propostum id vertebra faciens erat; quomā vertebrae thoracis vix cum lumbis numero inuicem perturbatus est; quæ enim in thorace superfluebat, in lumbis ipsi deficiebat: vt quatuor dumtaxat lumborum vertebrae in illis existerent. Quam tertiam decimam illarū vertebrarū non thoracis teratificamus, sed lumborum prima fuisse: cui costarum illa primordia monstruose potius inquam superfluens quedam, numeroq; peccantes particulae aligante fuerint; hisq; seipam deinde transfuersum, sicut alijs etiam costis adhaerens; Sed nostrū persequimur intentum. Pro contradictionis igitur sedatione dicendum, quod vel illi potius loco de anatomicis administrationibus tanquā positentis scriptor credendus, vel in hoc loco (prouit duobus magis certis) cogitendus est. Vt legatur [ad oses de vertebrae vtrinque] quod est hinc verbum verbo reddentibus [Horum autem ipsorum deesse, qui superesse rarius] quod est ipso excessu, si non superfluitate defectus error est. Sed de vertebrarum numero dictum satis superque. Ad eorum igitur processum cum Galeno conuertatur, sic statim subditur:

**TEXTVS SECVNDVS.**

Omnibus autem hæc spinæ processus maximi existunt ad decimam vltimam. Non minus tamen verò magni sunt etiam transfuersi, quibus ad costas dearticulantur.

**COMMENTVM SECVNDVM.**

**M**AXIMOS intellige processus (iuxta aphorismum Hippocraticum, & Galeni sicuti exponitur, quum ille dicebat [Magnitudo corporis in vertebrae quidem, & Longissimos, ac si duxisset] Quamuis enim decessu videlicet, & de duodecim vertebrarum processus spinæ superiores longi magis sint Magnitudine tamen per latum, & profundum perpenā, longitudinemq; supplete prædictis superioribus minimè cedunt.

Handwritten marginal notes on the left side, including references to various parts of the text and other works.

Handwritten marginal notes on the right side, including references to various parts of the text and other works.

cedunt. Quin potius, si exquisitè perhrans, maiores dicere tres vltimas, maximè verò omnium duodecimam, poteris. Intelligit enim vsq; ad decimam, exclusiue. Quæ quidem longitudo nõ temerè in illis, caq; inæqualis facta est: vt id quoq; natura admirabili quadam prouidentia fabricante factum (Galenò enarrante. &c.) sit. [ Neq; enim vt idem perbellè subdit ] quibus locis partem quædam princeps situm eundem cum medulla habebat, in ijs cõsentaneum erat nullam ipsarum magnitudinis habere rationem: Neq; in quibus medulla erat sola, in ijs prælongas efficere erat æquum. ( Est autem hæc ratio momenti subiectarum, defensarumq; partium ) sed ne à partibus quidam spondylis acantham producere longam, neq; à magnis breuiem ( secundaq; hæc à vertebrarum magnitudine sumpta ratio est ) Merito igitur cum in thorace cor effet locatù, magnaq; arteria spine incumbere, natura longissimas ibi fecit productiones: quæ acantham constituunt, in alijs verò partibus omnibus breuissimas. Porrò aliæ spine partes sunt, lumbus, os sacrum, & collus quantum lumbus quidem, & collum ex vtraq; parte thoracis spondylorum sunt. Sacrum verò os est, quod tum maximum est, tum infernum: quod etiam velut fundamentum quoddam spondylorum cõpaginæ naturam subiecte, in emirabamus. In lumbis verò spondylorum moles est memorabilis, ac parte interna vena caua, ac magna arteria eis incumbant. ( Duplici igitur prædicta ratione, tum videlicet ratione subiectarum, defendendarumq; partium, tum ratione magnitudinis vertebrarum processuum eorum nõ longi tantùm, sed altitudine quoq; , ac latitudine magni fuerunt. ) Porrò ad os magnum moles corporis est memorabilior: verùm instrumentũ nullum princeps ei subiacet ( Deficiet igitur priore, ac potissima ratione in huiusmodi osse magni processus minimè fuerunt. Eoq; magis, quoniam pars illa extrinsecus occurrentibus adeò obnoxia nõ est, sint aliæ superiores. Adde qd cum solus homo sedeat eius ossis processũ magnitudo ad sessionem impedimento fuisse. Sed postrema hæc ratio in solis hominibus, & aliquatenus etiam in simijs valet. ) Merito igitur secundum thoracis spondylorum ( subdit Galenus ) que in lumbis retrò sunt, productiones maxime factæ fuerunt. ( Nos autem in homine nõ post thoracis spondylorum lumborum processus locamus, nisi in simijs, at in homine tam longitudine, quam latitudine etiã, ac profunditate maiores obseruauimus. ) Qui verò in collo sunt, spodyli, cum omnĩ essent tenuissimi, longas simul, ac tutas productiones habere nõ potuerunt. Rumpentur enim facillè hæc propter tenuitatem. Rectè igitur dictũ paulò ante à nobis fuit, naturam in molem spondylorum intuitam, atq; inlumentorum spine incumbentũ discrimen, inæquales ipsarum in spina scisse productiones. .a. Non igitur amplius opinor dubitamus, quid sit, cur duodecim omnibus dorli spondylorum productiones omnes non sint æquales. Nam etiam si omnes potissimũ sint in thorace, nõ tamen ij sunt propè eos, qui sunt infra ad diaphragma, sed iam longius ab sunt: quemadmodũ qui sunt in lumbis. ] Hinc Galenus qui simiarum lumbos contemplantus, eorum vertebrarum spinales processus breuiores esse determinauit. Cum tamè in homine veritas secũse habeat, veluti prædictũ iam est. Ad decimam igitur vsq; exclusiue, thoracis vertebre, quæ nouem sunt superiores, longos, acutioreq; , ac triangulares quodammodo processus habent. Sensim verò deinceps in quatuordecim potius, latiq; , ac obtusiores, minusq; interni ex porrectos. Sed hæc quoad spinaliũ processuum magnitudinem, & paruitatem, longitudinem, aut breuitatem, dictũ sunt. Hoc addit, qd biddi, inftar eorum, qui in ceruice sunt, minimè inueniuntur, sed simplices. [ Quemadmodũ verò productio cuiusq; spondyli parte posteriore, quæ acanthã efficit, propugnaculi vsũ prestare ostendebamus: Ita & alię productiones transuersę spondylis sunt duæ. Quæ simul quidem lateralibus ipsorum partibus simile præbent præsidium: simul autem velut sedes quædã sunt musculis spine internis, atq; externis subdite. His enim omnibus incumbit vnã cũ arterijs, venisq; , ac neruis: quæ partim ad ipsos, partim per ipsos feruntur. Est porro & alia quoq; tertia carũ spondylis thoracis vtilitas, ad costarum videlicet articulationem; quæ maxime ad respirationis actionem est necessaria. Cur autem crassæ sint laterales spondylorum thoracis productiones, tenues autem in spondylis lumborum, & ossis magni, in colli verò spondylis crassæ, & bifidæ? An quia thoracis eius costę nõ solum eis sint articulatę: verũ etiã per totum incumbent: ob id conq; sentaneum fuit firmas, ac stabiles in eo facere productiones: lumborum verò, & ossis magni productionibus, cum vas solum, ac musculi incumbere, nihil robore erat opus. Quæ verò sentinæ collo meritissimò extulerunt bifidæ: ac sinuæ alter quidem, isq; maior ad aliorũ partem deorsum, alter verò, ac minor sursum spectat. Ceterũ id solis ipsis ex abundantia accessit, qd productionem posteriorem omnium minimam habuerunt, quanquam spinalis medulla ea parte plurimum pollet: demonstauimus enim partes ipsius primas alijs esse principales. Ob eã causam crassas simul transuersas productiones ipsi fecit, ac bifidas: vt quod securitatis, propter eã causam breuitatem illius loci spondylis deerat, id ex transuersis cõpensetur. ] Quauis alias principalis causa sit eorum transuersorum grossitie: videlicet quia perforari propter artenarum, venarumq; , transitum, & sinuam, seu bifidas fieri propter musculorum cõcentem adherentiam scilicet intentionum, & tenorumq; ; secunda verò ratio ea, quæ Galenus posuit securitatis gratia succedit. Sed

a. l. d. v. p. c. r. r. vertes fiam.

o. l. d. v. p. c. r. r. vertes fiam.

Cõtra Galenium.

a. l. d. v. p. c. r. r. vertes fiam.

a. l. d. v. p. c. r. r. vertes fiam.

a. l. d. v. p. c. r. r. vertes fiam.

a. l. d. v. p. c. r. r. vertes fiam.

a. l. d. v. p. c. r. r. vertes fiam.

a. l. d. v. p. c. r. r. vertes fiam.

a. l. d. v. p. c. r. r. vertes fiam.

a. l. d. v. p. c. r. r. vertes fiam.

a. l. d. v. p. c. r. r. vertes fiam.

a. l. d. v. p. c. r. r. vertes fiam.

his ossibus, quæ in ceruice sunt, vertebra, ad dorsū vertebrae reuertantur, quas impresentiarum  
 intendimus. Earum igitur transferrū processus, quibus ipsæ ad costas dearticulantur, nō parum  
 magni sunt; præsertimq; in nouem superioribus; in quibus parua magnitudinis differentia est.  
 Manifeste autem minores sunt in decima, magisq; in undecima, maximeq; in duodecima, velut  
 tres prædictæ costæ superioribus minores sunt, ac ante se in iuicem dimittendo procedunt; adeo  
 ut in finis undecimæ, duodecimæq; vertebrae his transferris processibus præsertim carere oblect  
 uantur. Sunt autem in superioribus nouem spondyli nouem transferris processibus characteratissimi  
 quidam incertitanti finis; quibus postiora costarū, capitulā connectuntur, atque hactenus quos  
 nōnunquam decimæ quoq; spondyli transferris processus habent: In ius quidem apertissimis, parte  
 in omnibus anteriore, sed in prima thoracis vertebra deorsum spondantes: in nona veropertissimis  
 in ceteris autem intermedijs, medio modo. Quamquā Galenus .b. finis hos omnes deorsum spon  
 dare perperam credidit. De quibus iterum miraque, sermocinam finis: Negligendū verō ut  
 verum omnino est, Cur duabus vltimis thoracis vertebra transferris processus desunt rationem  
 cum Galeno .d. vestigare. Cum in sumis duntaxat hi desint, solitiq; in illis declines; quibusdam  
 proximis lumbi spondyli assimilati ( vt postea videlicet .e. ) à natura facti horum vice processus  
 fuerint. Sed omnis vertebra thoracis processibus, ad earum corpora contenta planā cuius Gal  
 leno conuertatur, sic scribens: *omnibus autem vertebrae thoracis, quibus non sunt costae, sunt processus*

b. Infra c.  
 22. & l. de  
 anat. adm.  
 cap. 1.  
 Contra Ga  
 lenum.  
 e. Cap. 12.  
 d. 13. de v.  
 p. cap. 2. in  
 fine.  
 Contra Ga  
 lenum.  
 c. Cap. fe  
 quenti.

f. Cap. pre  
 cedens co.  
 4. versus fi  
 nem.  
 Contra Ga  
 lenum.

Magnitu  
 do.

g. Cap. 6.  
 huius co. l.  
 Figura.

Sinus.

Proprij  
 Communis.

Quatuor  
 proprii li  
 gamentorū  
 sinus.

TEXTVS TERTIVS

Corpus autem ipsarum in prima quide leuiter quodammodo est oblongū ad inferiōra. Sentit  
 verō cessat id ijs, quæ deinceps; *de quibus nonnulli dicunt, quod in superioribus vertebrae sunt costae, quibus non sunt costae, sunt processus*

COMMENTVM TERTIVM

**Q**UAE VANVS. prima quidem thoracis vertebrae corpus parte inferiore, quā sepe cer  
 uicis vertebrae oblongum, dorsūq; prominens corpus in se recipit; y modice vtrinq;  
 ad latus prosuberat, seruata sex vertebrarū sibi cōiunctarū corpora quodæ superiorem  
 sed ea quo quomodo impositos ( prout de illis antea tetigitur, f. ) Haudquaquam tamen  
 in alijs thoracis vertebrae verum est, quod Galenus hic asserit, neq; in ipis eadē finis: sed in reli  
 quis quidem omnibus superioribus, inferioribusq;, in prima verō si non superioribus, in finis tamen plane  
 superficie corpus vertebrae cōstat, neq; prominens alterum, vt recipiens alterum cauum existat.  
 Galenus tamen minus exquisitè perpendens thoracis vertebrae, eas ceruicis vertebrae dissimilari  
 credidit, sensimq; interum inferiore prominētia, superioreq; cauitate deficere. Quam ab initio pos  
 tū sitam deficere vtrinq; præter primæ cauitatem, determinasse debuerit. Quoniam verō de  
 thoracis vertebrae corporibus, quāsi obiter tetigit Galenus: Eapropter ab eo quidem non fuerit  
 nonnulla hic de iisdem ad iungere. Peris igitur dicimus earum corpoream magnitudinem ( vt  
 generatim de vertebrae omnibus antea tetigitur, g. ) paulatim deorsum cōducendo augeri: cū gestantes  
 inferiores gestas superioribus maiores esse merito debet. Præterea figura ab initio in cōstante,  
 quoniam primæ dug non ad obrotulationem pertinet, vt femurculum expleant, nisi quoddam  
 veluti parentiam; sensim verō deinceps eorum prominētia minoribus excedit, vt nō tenent  
 culum modò præfertat, sed illud demū excedat. Rursus verō prima, undecimæq;, & duode  
 cima vertebrae sinus quendam sibi peculiarē ab alijs differentiam singule habent, quibus nisi  
 vertebrae primæ costæ, undecimæq; undecimæ, ac duodecima tandem duodecimæ costæ dearticu  
 lantur. Sunt igitur hi proprii sinus trium prædictarū vertebrarū numero sex in supræma earū cor  
 porum solum solum. Præter quos vtrinq; communes ab nouem sinus sunt. Communes in quibusdam  
 in medijs interstitijs primæ cum secunda, huiusq; cum tertia, necnon & aliarum deinceps ad non  
 nam vsq; cum decima. Sunt enim inter decem costas intermedia spaciā nouem, Nō secus igitur  
 ac neruorū solumina superiores, inferioribusq; vertebrae cōmuna: sic & hic quoq; sinus vtrinq; nouem  
 sunt, simul autem in undecimæ cōmunes superioresibus, & inferioribus ( quantum magis in fe  
 rioribus ) vertebrarū corporibus existunt. Quibus nouem costæ dearticulantur vtrinq;. Adde  
 si totum vniuersūq; dearticulationis sinum cōtēplemur, superiori inquam, inferioribusq; com  
 munem, vt diximus nouem vtrinq; sinus dicentur. Sicq; omnes in simul undecimæ: & cum sex  
 prædictis propriis erunt omnes quatuor & viginti. Sin verō distinet sinus hos in qualibet ver  
 bra proprios duntaxat inspicere, perpendereq; velimus: tu sic sex & triginta dicendi potius ve  
 nient, & cū prædictis sex omnino, ac secundum totum proprijs, quadraginta duo cōputabuntur.  
 Quibus quidē omnibus si duos alios primæ, quosq; duos duodecimæ vertebrae proprios nō de  
 articula

articulationis, sed colligationis sinus, predictis quidem proprijs earū articulationis sinibus pro-  
ximè subiectos addere volumus, è quibus quidem extremarū costarū validissima quædam liga-  
menta cū vertebriis scilicet eadem firmiter annexa enascuntur; tunc firmos dicere possumus  
in thoracis vertebriis esse numero sex & quadraginta. Sed aliud deniq; circa vertebrarū corpora,  
eorumq; substantiam sedulo pernotandū est. Quoniam scilicet quantò vertebrarū corpora gran-  
diora sunt, eo pluribus, maiorbūq;, & eundem modum foraminibus perforata sunt: per quæ tum  
venæ, tum arteriæ intrinsecus substantiam ingrediuntur, nutrimentū illis necessaria, ipsitellūq;  
deserentes. Maximè igitur talia foramina in extremis thoracis vertebriis; videlicet scilicet; æt  
duodecima apparent, & determinato interim numero, ac magnitudine; sed in diversis homini-  
bus, nedum animalibus numero, magnitudineq; diversis: præceteris autē in posteriore corporis  
vertebrarū regione: quæ spinalem respicit medullā: Quoniam foramina hæc posteriora in lumbis  
tantum effatu dignæ magnitudinis esse, manifestiq; cōspicua Galenus infra .b. declaraturus est.  
Sed de vertebrarum thoracis corporibus quasi (vt diximus) obiter dictū hæc sunt: Ad processus  
igitur revertamur, primiq; spinales vna cum Galeno sic subdentes.

Foramina.  
et  
et  
et  
Cōtra Ga-  
lenum.  
h. Cap. 11.  
quæd.

TEXTVS QVARTVS

Kai eis de eis tis dicitur. Sed et ipsam quoq; spinam, ad decimam vsq; vertebram, spine cervicis per similes habent;  
et summo scilicet deorsum tendentes. Vice autem versa post decimam, ab imo insulam vergent;  
fertur. In duabus quidem hanc subsequens, bus obscuræ: In cæteris verò manifestæ.

COMMENTVM QVARTVM

**I**N canibus, & canis, leporibusq;, ac alijs ferè omnibus quadrupedibus hæc Galeni  
historia verè loquitur: quæ scilicet pennis dorsū vertebriæ vocat; ad decimam vsq;  
exclusivè, deorsum ab imo tendentem spinam habent: decimam verò neq; deorsum;  
neq; sursum vergentem, sed rectam in oppositorū modo positā possidet; videlicet  
vero, & quod decima obfusca sursum protendentem: Quæ verò deinceps cōsequuntur lumborū  
vertebræ omnes manifestas ab imo sursum porrectas obnervant: Quam quidem Galenus hi-  
storiam, prout in prædictis brutis obscurat, claritas libro de vitæ partibus duodecimo per hæc ver-  
ba sic declarat. [ Porro spina præterea, quæ data sibi ad securitatem memòramus (charitū  
gincm scilicet, validaq; ligamentū) figuram quoq; productionū omnium cōsistentem ad imo  
dum est ad præterea quantum quæ supra illum habent, deorsum; quæ infra, sursum spectant: vt ipsius  
forma edificijs illis sit similitudo. quæ in altitudine, deorsum formæ, ac stultitiam non occupant. Quorū  
formam sæpe numero iam diximus figurarum omnium ad patiendū esse distillatam. Non igitur  
amplius est mirū, si sola spondylo, qui in medio est, spinæ productio posterior; quæ spinā effectū  
in neutram partem inclinat, id est neq; in collium, neq; in lumbos: sed omnino est recta, atq; in  
nullam partem propensa, retrò exprocedat. Nam id quoq; ab eadem in parte procedit: Aut quæ  
pacto similitudinem ipsam totam fornici effusisset, nisi penitus quidæ productiones omnes parte in-  
terna enatas sursum adduxisset, quemadmodū certè & superius deorsum: secundū autem in textū  
minimū quandam cōmune rectum, ac nisi quæ inclināntem coniu-  
xisset, qui velut fornix summitas quædam esset futurus? ] R. Et idē in-  
quam hæc a Galeno in brutis quadrupedibus dicta sunt: vti in quibus  
spina nō rectā sursum, sed tanquam potius quædam animalis cōoper-  
mentum, ac viscerum omnium tutamen futura erat. Homini autem  
recto statū, atq; incedenti decentius, atq; vtilius, necnō & securus  
suis deorsum omnes spinosus processus tendere, non cervicis modō,  
ipsiusq; dorsū, sed ipsorū quoq; lumborum, perinde ac de cervicis spi-  
na præcedenti capite, in secunda, & quinta figura iam loquit. De tho-  
race autem in præsentī figura, de lumbis autē in ea, quæ sequenti ca-  
pite depingitur. Quod hominem igitur, deceptum fuisse Galenū  
dubio procul omni decernendū est. Quamquam minis inclināntem  
esse decimam superioribus, proferendū venit: sed hæc minis interim  
videlicet in thoracis, deorsum; hoc est, minis deorsum vergens duo-  
decima est. Id quod successivè de lumborū hominis vertebriis deter-  
minandū quoq; eadem ratione est. Omnium enim spinosū processus  
deorsum

Cōtra  
Galenum.  
I. Cap. 11.  
vultus sicut,

Cōtra Ga-  
lenum.



Cōtra Galenum.

deorsum protendantur. Quod antennis autem, & a vera hominis historia declinat Galenus circa transversos dorsii vertebrarum processus; quanquam in prædictis quoque brutis quadrupedibus verum apertius scribit: sic subdens.

TEXTVS QVINTVS.

Idipsum verò idem transuersi quoque processus patiuntur: deorsum quidem earum, quæ supra decimam: fursum verò, earum, quæ infra hanc sunt, vergere. Solius enim decimæ vertebræ processus in neutram partem inclinant.

COMMENTVM QVINTVM.



**I**N homine (vt diximus) diuersa historia est. Cum laterales omnium vertebrarum processus fursum magis vergere, siue occultè, siue mani fèste, diligentius perpendèn appareant. Si enim laterales vertebrarum ceruicis productiones cõtempniti fuerint, in istis quide ma pertissima eorũ ad inferiõa inclinatio, vel ipsi quidem cæcis est: In homine autem ambigua talis inclinatio est. Exquisitis enim singula pertibrantibus: quæ in his quinq; eorum sint: quauis tertie, quartæq; , ac quintæ vertebrarũ processus posteriori eorum latere, eorũ; minore, deorsum aperte respiciant: Anteriore tamen hocq; iam latiore; maioreq; fursum magis tendere videtur. Sextæ autè laterales idem processus vtraq; parte fursum vergit. Clariũq; id conspicimus in septima: tamen primæ; ac secundæ simplices existens deorsum apertius tendant. Mediæ tamen anteriorũ, posteriorumq; partũ in his processibus deorsum quoq; perpetim vergunt. Quod si thoracis vertebræ cõtemplati fuerint, nouem superiorum transuersos quoq; processus, quanquam quodam extremum eorum terminũ declinare potius conspicimus: eorum tamen principũ apertissimè fursum vberit, retrorsũ vñ procedendo: ad eũ vt gibba eorũ media pars superius appareat, inferius autem cõcaua, quad antenuq; sinuata. Manifestus autem accliuus: fursumq; vergentes sunt decima, & undecima, ceteriq; , claris duodecima (quanvis Galenus .k. transuersis processibus undecimã, duodecimãq; vertebræ destitit ad singularem seculo deceptus nõ rectè protulerit) veluti & lumborũ quinta: Reliquæ enim lumborum vertebræ quatuor suas laterales, transuersosue processus fursum vergentes obsecutus obtinuerunt. Cum tamen clarissimũ id in iuuu, canibalq; leporebus, ac alijs propemodũ omnibus quadrupedibus in quibus quidem Galeni posita hæc descriptio, appositissimè quadrat, ob diuersam ab homine musculorũ dorsum præcipuè momentum formationem. Cum alio modo bronã, quasiq; cubantia moueri, quam hominem ipsum rectum stantem, sedentemq; necessum fuerit. De quibus tamen alijs vberius sermo constitutendus est. Est autem huiusmodi transuersorũ processuum viũ (Galeno etiã Didacalo .i.) triplex. Primus quidem, vt laterales ipsorũ partibus simile ipsi sping præstitũ præstitũ (vt scilicet propugnaculi cuiusdã vicem suppleant) Secundus vero est, vt veluti sedes quorũ a sint musculis sping internas, atq; externis subdit. His enim omnibus incumbit vna cũ arterijs, veuis, ac neruis, quæ partim ad ipsos, partim per ipsos feruntur. Est porò & alia quoq; tertã eorum spondyliũ thoracis vtilitas, ad costarum videlicet hæritionem, quæ maxime ad respirandiõnem actionem est necessaria. Est autem in hominẽ & fidi ximus) horum processuum in thorace fursum ponũ vergentia; maximõq; in decima; undecimaq; , & duodecima: quauis in prædictis quadrupedibus decimã vertebrã cõtempniti Galenus, hanc neq; fursum, neq; deorsum, quodam transuersos eorum processus vergere determinarit. Quam etiã ob causã de ipsa decima subiungere voluit Galenus, eiusdẽ, quibus articulatũ, tubercula perpendens, siq; eũ fugio subdens.

Cōtra Galenum. l. 13. de v. p. c. c. circa med. & in fine.

L. 13. de v. cap. 10. p. c. c. circa med. & in fine.

TEXTVS SEXTVS.

Hæc enim sola vertebra non accliuus modò, sed decliuus quoque processus in eodysiosas extremitates finientes habet: quemadmodum prima ceruicis vtraq; oculares. Aliam verò, his quidem, quæ decimæ superpositæ sunt, accliuus quidem condylosæ insunt, decliuus autè oculares: His verò, quæ suppositæ sunt, eontra.



spondylos motū predicto contrariū habere oportebat, ſuperius ſcilicet deorsum, inferius autē  
 ſursum (quaquam recentiorū nonnulli oppositū ſu ſtiterant.) Porro ſi figurē vtriuſq; terminus eſt,  
 vti cūm ſectimur, ſpondyli quāmpoſunt, longiſſimē mutuo à ſe diſtendant; perinde ac ſi lon-  
 gior tunc ſpina eſſe deberet. Cūm verō erigimur, contra: vt cūſta coſtāt ut viciū ſpondylum  
 accedentes, ac ſi ſpina in totam tunc breuiorem eſſe oporteret. Quod verō cauſas quæ circum  
 oſſium inter ſe dearticulorū conuicitates vtroq; vertuntur, ad motus obliquos ſint aptiſſima,  
 ſi memoria tenes radij motum, atq; dearticulationem, quam habet cum brachio, aut eſtpe cum  
 tenui cubiti proceſſu (quem nonnulli à columnæ figura *stans* nominant) tertio ad viciū intelli-  
 gendi non amplius opinor tibi opus erit exemplo. Quod ſi opus fuerit, redi in memoriam articu-  
 lationis nauiformis cum aſtragalo, & aſtragali cū tarſo, quōmodo patijs omnibus motus obliqui  
 ſiunt. Cūm cauſas vtroq; curū conuicitates manentes immotas ſeruant. Cūm enim cauſas  
 vna circū vnā emittentiam vtritur ſolos motus obliquos ad latera efficit. Quod autē ex duobus  
 obliquis, ſi poſiti ſimul fuerint, partim à motu medio partem vtroq; circumagētēs eſt cōpoſitū,  
 ſepē iam demonſtrauimus rectū vnāq; necariū eſſicū, ſi vtroq; agatur. Quin & ipſi ſtatim  
 erat ex obliquis rectos efficere, id quoq; demonſtratam ante ſuit. Quorum omnium ſi recorda-  
 ris, arbitror te naturæ artem, ac cōpoſitionem optimā magnoperē admirari, quæ ſpondylis inuen-  
 nit motum aptiſſimū, ac productiōnū multitudinem, ac magnitudinē, & (vt ſummam dicam)  
 omnia tūm inter ſe, tam ipſing vbius omnibus conſequentia. ] Hæc Galenus, ſed nos ad præſentem  
 cōuertimur textum: condyloſas extremitates, Græcè *σπονδυλοειδῆς*, intelligimus eminentes  
 tuberoſitates, iuxta primam à nobis antea ſ. declaratū condylorū ſignificationem. Verūm ſi  
 diſcretiam à Galeno libro de motu mūſculorū ſ. obſeruatam cuſtodire nos quoq; impregnentia-  
 rum voluerimus. ſuperiorem duodecimę thoracis vertebrę proceſſum extremitatem duntaxat  
 condyloſam nuncupabimus, inferiorem verō capitulum dicemus, ſiue primam condylū; ſecun-  
 dam verō caput, aut capitulum appellabimus eam ſuperior obſcurior ſit, inferioſ autē mani-  
 feſtiū oblongā, rotundāq; & capitulata. Sic & lumborum proceſſuum cauſitates rectius *vertebrę*  
 latinè acetabulares, ſiue *σπονδυλοειδῆς*, hoc eſt, acetabulares nuncupare deberemus, *παρθῆρας*  
 ſuperiorem. Reliquarūq; tam ſeruias, quā thoracis vertebrarū accliuas proceſſus condyloſos,  
 lumborum verō decliuas capitulos appellare congruentis eſſet, Galenus tamen hic generatim  
 ſubintrantes omnes proceſſus condyloſos, recipientes autem gleooides (latinè dicunt oculares,  
 ſiue pupillares) nuncupat: ſed vt cuncta exquilitiſ dignoſcantur, proceſſuum quoq; numerūm  
 ſpecificum ipſo cum Galeno perpendamus: eo modo, quo de ceruicis vertebrarū proceſſibus ſuis  
 precedenti capite obſeruauimus: deindeq; ad ipſa etiam neruorum foramina deſcendemus [ Doſſi  
 igitur ſpondylis ſingulis (inquit Galenus ſ.) productiōnes ſeptem extorunt: tamen ſi non om-  
 nes formam habent ſimilem.] Sunt autem hi ſeptem proceſſus: duo videlicet accliuas, duoq; de-  
 cliuas, quibus cum alijs articulatur, duoq; præterea laterales, quibus eō coltis dearticulati con-  
 ſpiciuntur. Addita igitur hiſ ſpinali productiōne: ſeptem omnino erunt. Cūm verō duodecim  
 thoracis vertebrę ſint, reliquum eſt, vt earum omniu ſimul ſint proceſſus octoginta; & quatuor.  
 Foramina verō, per quæ doſſialis medullæ nerui pertranſeunt, totidem vtriuſq; quot vertebrę  
 exiſtunt. Cūm igitur duodecim vertebrę thoracis ſint: Reliquum eſt, vt quatuor & videntiſ for-  
 mina eſſe dicantur. Præter quæ ipſorum quoq; corporum vertebrarū foramina duodecim ſunt:  
 per quæ ſpinalis ipſa medulla deſcēdens a cerebro pertranſiit. Itaq; ſex ſu præ triginta vertebrarū  
 doſſi foramina dūceda ſunt. Omniſſa interim iſ tanquam vix effatu dignis, certumq; natorum,  
 aut ordinem minime ſeruantibus: per quæ tūm venæ, tūm arteriæ, nutrimenti, ac ſpiritus gra-  
 tiæ in oſſium intima ingredientis, penetrant; deſeruntur. Quod ſi cuiuſlibet vertebrę ſinus  
 proprios laterales cōſiderauerimus, prout ſcilicet maiorem, vel minorem, aut æqualem fortalſ  
 foraminis partem cōplent, tunc non videntiſ quatuor hi, ſed quadraginta, & octo deſcēdi potius  
 ſunt, cuiuſlibet inquam vertebrę quatuor. Sed tanquam cōmunia foramina detegunt; ac  
 bina in ſingulis vertebrarū interſicijs perlabrantes, eorum vſus quoq; declaramus, prout in cer-  
 uicis foraminibus obſeruauimus. Eſt igitur primū foramen (quod ordine octauū totius ſpī-  
 ci poteſt) primæ doſſi vertebrę, ac ceruicis ſeptimæ cōmune, per quod neruus vtriuſq; octauus  
 egreditur, in duas ſtatim partes diuiſus, anteriorem ſcilicet, ac poſteriorem. Eſt autem antero-  
 longe inferior quidam portio, quæ ſeptimæ, ac ſepē etiā non cōiugationis nō minimis por-  
 tionibus adacta, maxima ſu parte vniuerſum in brachium diſtribuitur. Minore autem ſu ſur-  
 culo in mūſculorū thoracis primū, ſ. capitū; ſeptimū, ſ. yoidū; primū, .a. ac laryngis deniq;  
 cōmuniū par ſecundū ſ. .a. Poſterioſ autem anteriore iam dicta portione longē minor in capitiſ  
 moſtorum mūſculorū par primū, .a. ſecundūq; .a. ac doſſi quoq; ſecundū, .a. tertiamq; .e. &  
 quartam .a. cōiugationem, necnon ſcapulę ſecundū, .a. tertiamq; .a. ac thoracis deniq; tertū  
 diſſeminatur. Secundū verō foramen primæ, ac ſcōdę thoracis vertebrarū cōmune eſt, per quod  
 nonus quidem ſpinalis medullæ neruus egreditur, in duas hic quoq; ſtatim ab initio diſciſus;

Cōtra Ve-  
 ſaliū lib. 1.  
 cap. 16. in  
 fine.

Quomodo  
 vertebrę ad  
 obliquos  
 motus aptę  
 ſint.  
 Excremētū  
 primum.

i. libid. ſi-  
 licet 11. 4.  
 & 1.

[Supra ed.  
 1. cap. 1.  
 1. lib. 1. c. 1.  
 poſt princ.

Proceſſus  
 u. 1. d. v. p.  
 cap. 1. ante  
 meſ.

Foramina.  
 Sinus.  
 Foraminū  
 vſus.

s. tab. 4. d.

5. 2.

s. tab. 4. 0

s. tab. 4.

S. 7.

x. tab. 5.

P. 2. G.

s. tab. 12.

T.

u. tab. 13.

A. 8.

v. tab. 14.

N. 7. G.

s. tab. 14.

H.

s. tab. 14.

O.

s. tab. 9. T.

P. tab. 7.

H. 13. Q.

s. tab. 11. F.



Cuius anterior pars in musculos intercostales primos .7. antorsu producitur ad pectus vsq; , musculis octavo sexti paris .8. ipsius thoracis motum , ac sensum prebens. Posterior autē pars partium eam octavo nervo mastus in brachium descendit , partim in eosdem musculos scilicet capitis primam , .8. & secundam .9. coniugationem , scapulaeq; secundā , .10. & tertiā , .11. thoracis tertiā , .12. ac dorſi deniq; secundam , .13. tertiāq; , .14. & quartā .15. distribuitur. Tertium foramen secundū , ac teretū thoracis vertebrae cōmune , deincepsq; foramen quartū , quintū , sextū , aliāq; ad duodecimum vsq; , consequentia , quod vitium cōmune vndecimae , ac duodecimae thoracis vertebrae existit eadem pariter omnia nervos foras eructant , quasi eadē serie singulos distribuendos : bifariam scilicet diuisos in anteriorem , posterioremq; videlicet portionem. Quorū posteriorē cuiuslibet pars graciliores , in minorē ; retrorsum ad vertebraū spinas contorta in multos posteriores musculos , vt capitis primum , & secundumq; .1. par , dorſiq; tertium , .2. quartum , .3. sextum , .4. & octauū , .5. ac thoracis etiā quartū : .6. vltraq; progrediens in scapulae secundū , .7. quartumq; .8. par , & thoracis quintū , .9. brachijq; etiam quartum , .10. ac totus deniq; dorſi posteriorē eadem distribuitur ; vnaqueq; inq; ad partem sibi è regione respondētē. Anterior autem singulorum pars , vbi surculum tertie neruorū sexti paris propagini per omnia tandem naturalia vitia distribuendē cōmunicant , vltra progrediens , perq; collae interuallum singula procurrens venę , arterię , eōiū neta , simulq; in inferioris costę sede sinum sibi lucrata antorsū , in septem quidem venis , legitimisq; costis ad pectoris os vsq; , sextumq; thoracis musculum .16. pertingens , sensum , & motū illi , ac intercostalibus omnibus distribuens , thoracisq; interea secundo .17. pari , brachijq; primo , .18. & quarto , .19. necnō scapulae secundo , .20. & abdominis primo .21. In ceteras verō quinque ; spinae costis , nō intercostalibus modō musculus , sed adominis etiā primo .22. pari , atq; ipsi demum thoracis vniuersę anteriori cuti. In quibus duo tantū nōnullis peculiaria pernotanda sunt. Alterum quidem , quod à nervo quartum costarum interuallum perreptante ( qui dorſi quintus est , spinalis autem totius medullę duodecimus ) in papillas exactum illis sensum distributura propago quedam per brachij musculorū par secundū .23. pertransiens procedit. Alterum verō , quod à spinalis medullę duodecimesimo , ac vndecimesimo nervi ( qui decimus , & vndecimus percurreunt costarū interuallum : ideorūq; thoracis vndecimus , & duodecimus existunt ) principio sex à sensu mouentū musculi .24. vtrinq; surculi quiddā offeruntur. De quibus iterum capite sequenti . habedus sermo est. Obiter enim præstatum de his imperſentiarum sit. E quibus præsentis patet in thorace sinus numero septuaginta duos designari posse , in costarum scilicet inferius sedibus , pro venis , arterijsq; , ac neruis ibi locandis numero viginti quatuor , abiq; vertebraū lateribus quadraginta & octo , ex quibus ( vt diximus ) viginti quatuor communia foramina sunt. Octo autem in præcæmio statim ab initio proposita capita iam ex prescriptis adeo pernota esse opinamur : vt vitulus fore opinemur , ad lumborum vertebrae cum Galeno pertransire , sic subdente.

vtab. 8. D  
e. tab. 8. B  
e. tab. 12.  
Γ.  
F. tab. 13.  
A. B.  
e. tab. 9. Γ  
e. tab. 7. γ  
H. 13. Q.  
F. tab. 11.  
F.  
γ. tab. 14.  
N.  
F. tab. 13.  
H. 13. Q.  
Q. 13. 14.  
F. tab. 13.  
Γ.  
e. tab. 13.  
A. B. γ. γ.  
e. B. γ.  
F. tab. 13.  
H. 13. Q.  
e. tab. 14.  
O. 13. 14.  
e. tab. 13.  
N. 13. Γ.  
A. tab. 14.  
T.  
e. tab. 14.  
Δ. 14.  
e. tab. 9. Γ.  
F. tab. 14.  
e. tab. 11. Δ  
e. tab. 2. Γ  
10. B. Δ  
e. tab. 8. B.  
e. tab. 7. L  
3. 0. 0.  
e. tab. 12.  
e. tab. 3. L.  
e. tab. 2. Γ  
10. B.  
e. tab. 9. Γ  
e. tab. 1. B  
γ. ibid.  
e. tab. 9.  
e. tab. 8. B

De lumborum vertebrae. Caput Nonum.

TEXTVS PRIMVS.

De lumborū vertebrae reliqua quidē ferē iam dicta sunt. Nam q̄ quinque , quodq; maximae , & crassissimę omnium sunt , intusq; cuiuslibet foramē angustū , quemadmodū & in ipsis spinalis medulla tenuis . Item q̄ sursum vergentes productiones habent . Ergo per solam propositā vertebrae neruus exiit . Quodq; acciuium , declinū mō ; processū , quibus intersensuac dearticulantur , superpositorum quidem extrema condyloia , suppositiorū verō pupillaria sunt , dictū pridē est . Si quid autem adhuc præter cætera superest his propriū , in hęc sequē , in hoc explicabitur .

COMMENTVM PRIMVM.



RO clānore huius textus elucidatione , ad nouē Galeni dicta ipsiū reducemus . Primum quidem , q̄ de lumborū vertebrae reliqua ( scilicet omnia , præter ea , quę paulō post aduentur ) ferē iam dicta sunt . Modum loquēdi perperda : dicit enim [ e. tab. 13. ] itūne ferē , propē , prope modum , quasi , parum deest : & huiusmodi similia . Quod aduerbis basinam referri potest : vno quidem modo ad τὸ ἄλλω , hoc est , ad [ reliqua ] siue vt Ba-

Nonē Galeni dicta.

lamus non inepè traduxit) [ omnia ] q. d. non simpliciter omnia dicta sunt: sed serè, siue quæ omnia: quoniam scilicet plura dicta sunt; nonnulla enim hic dependa remanserunt, quæ in fine proponuntur explicanda, quæ scilicet insignia, propriaq; lumbis sunt. Aliter autè referri aduerbium id potest, ad sequens verbû scilicet [ *quæ ipsæ* ] latine [ dicta sunt ] q. d. non abundanter, & còplete, sed quasi prædicta iam sunt, ac si diceret prædictâ nōn hîc de reliquis, quasiq; obiter, esse. Id quod pro tyronibus, ad quos hic scribit, sat superq; fuit. Secundû verò, quod statim subdit, est, quoniam lumborum vertebrae quinque; (nō sicut in simijs septem) esse, prædictû iam est, capite videlicet secundû hanc nostram còputationem sexto; .x. quo in loco nos quoq; ex eiusdè dogmate, rationem assignamus, cur ex quinque, tantum, non pluribus, neq; paucioribus hominum lumbi facti sunt. Tertium autem, quod prædixisse iam innuit, est, qd omnium vertebrarum maximæ, crassissimæq; lumborum vertebrae existunt. Id quod si non expressè vt primum, capite nihilominus septimo .j. colligi promptissimè potest, quum sic videlicet inquit [ Sed quæ hanc (scilicet primam) sequitur, angustior quidem, at vna validior: sic autem & reliquæ omnes hinc succedentes. ] Validiores enim quæ còsequuntur esse nō possent, nisi maiores mole, crassioresq; sint. Clarius autem id à nobis præstentur iam est supra, capite quidè sexto, .z. ex ipsiusmet Galeni dogmate .a. tanquam superiorum enim bases illis gestatis has gestantes maiores, crassioresq; esse oportuit. Quartum deinde sequitur, quod scilicet intrinsecum huiusmodi vertebrarû lumborum foramen superioribus angustius est: Quibus rationem, vt quintum eius decretû à summissimus: quoniam scilicet in ipsi contenta spinalis medulla tenuior est. Dicta verò ambo hæc sunt antè capite septimo, .b. quum sic Galenus ipse scripserat [ Quò enim dorsalis medulla in perosum productionibus consumpta scilicet gracilior sit: eò inferiorum vertebrarum spatia magis minuuntur: vnumquodq; enim dorsali, quam còplectitur, æquale est. Id igitur vertebris omnibus còmune est. ] Sed quam habeat huiusmodi sermo instantiâ, præserimq; in vertebris tertia, quartaq; & quinta, indè; his contenta medulla, prædictum iam à nobis est: .c. ob nervos enim in crura distribuendos ( vt postea videbimus .d. ) grossior aliqua tulo in his vertebris medulla facta est; ac per hoc & eorum foramen proportione latiusculum. Sextum verò Galeni dictum est, quoniam lumborû vertebrae suas habere productiones, siue processus sursùm vergentes, præscriptû quoq; fuerit. Id quod præcedenti quidem capite prædictum quoq; est, .e. dum scilicet eas, quæ infra decimam thoracis vertebrae sunt, sursùm vergere determinavit: Non modò enim reliquas duas tantum ipsius thoracis, sed quæ lumborum quoq; sunt omnes intellexit. Ad eò vt simijs etiam sacri ossis spinales processus ( vt postea videbimus .f. ) voluerit, sursùm scilicet vergere. Id quod cum in canibus, & simijs, non autem in homine verum esse, declaratum à nobis sit, .g. non est, vt amplius eadem frustra repetamus. Septimû verò sequitur Galeni decretum, quod est: quoniam scilicet per solam propòitam, superiorum lumborû vertebrarum nervus exiliat. Id quod capite quidem septimo tunc inuere visus est: quum sic ait, .b. [ In ceteris autem omnibus ( præter ceruicem ) aut plurimû, aut totum id præstat quæ superiacens est ] Intellexit enim plurimû quòd thoracis vertebrae: totû verò quòd lumbos: vt nunc confirmare videtur. Atq; id ipsum qualem habere veritate, à nobis quoq; ibidem declaratum iam est. .i. Ostendit succedit, quod determinasse iam antè Galenus inquit: videlicet, qd accliuum, decliuumq; processû, quibus adiuuicem dearticulantur: eorum quidem, qui superimpositi sunt ( scilicet decliuum, nō solum lumborum, sed etiam eorum, quæ infra decimâ thoracis vertebrae, secundû ipsum; prout in simijs est, in homine autem lumborû tantum, qui sunt infra duodecimam ) extrema eondylosa, hoc est ( vt antè quoq; declarauimus .k. ) protuberantia. Eorum verò, qui supponuntur, scilicet accliuû processuum ( qui in articulatione sub sunt ) extrema pupillaria, siue ocularia sunt, hoc est lehem quendam, superficialemq; sinum ( prout prius etiam enucleatû à nobis est .l. ) habent. Dictum verò id ipsum antè à Galeno est capite præcedenti. .m. Cum declarato iam, quòd eardè, quæ supra decimam sunt processus accliuæ extuberantes sunt, decliuæ autem sinuati, statim de his subdit, dicens, qd his, quæ suppositæ ipsi decimæ sunt, eontrâ: quoniam scilicet accliuæ sinuati iuxta sunt, decliuæ autem extuberantes. Sub his ergo, quæ post decimam sunt, lumborû vertebrae intellexit, ad quas nunc se remittit. Nonum deniq; de consequentibus propòitum sequitur, quod est de his, quæ in præcènti capite declaranda remanent: vt scilicet quæ lumbis propria, specialiaq; & minime adhuc prædictâ, hic explicanda veniant. Cum igitur septem prædicta in præcedentibus satis superq; à nobis elucidata iam sunt: Non est, cur hic elaborare debeamus. Nisi vt ad hæc lumbis peculiariter enucleanda transmigramus, cum Galeno etiam ipso cuncta perpendam: pro quorum exquisitè còntemplatione, plurimum conferre opinati sumus, lumborum vertebrarû figuram hic annexere. In qua quidem, spinales lumborum processus in homine sursùm minime,

x. Tex. 3.

7. Tex. 3.

z. Com. 1. utz med. a. 11. de v. p. 323

b. Tex. 3.

c. Cap. 6. com. 1. d. Com. huius cap. 3.

e. Tex. 4. & 5.

f. Cap. sequenti. g. Cap. precedentis com. 4. & 1. h. Tex. 5.

i. Com. 5. circa princ.

k. Cap. precedentis com. 1. & c. 5. com. 1. l. ibidem. m. Tex. 11.



sed

sed dorsum potius vergere (quanuis Galeno sumig, canesq; patrocinentur) eo pertussum simpliciter inspectione quamprimum fiet. Sed Galenum audiamus ita statim subdentem.

TEXTVS SECVNDVS.

*Τριμυτα τῶν ἀγκυλῶν εἰς τὸ ἴδιον μέρος ἐν ἑκάστῃ τῇ ἀπὸ ἐξῆς σπονδύλου εἶσει, ἕως ἂν καθαρῶτατος γὰρ εἴη, ἕως ἂν μὲν τῆς ἀλλῆς ἢ εἰς ἑλάνη, ἢ παρὰ τῆσσι ἐν ἴδιον μέρος, καὶ εἰς τούτοι, καὶ αὐτῶν, καὶ πάλιν ἕλται.*

Foramina igitur præter ordinem disposita interiore in parte cuiuslibet lumborum vertebræ insunt: In quæ inscruuntur venæ: quæq; in cæteris quidem vel nulla prorsus, vel omnino per exigua spectabis: In his autem manifesta, multiq; apparent.

COMMENTVM SECVNDVM.



**L**ORAMINA hæc effata dignæ, euidentiq; magnitudinis, veluti & alia in parte corporis vertebrarum regione, quæ spinalem respicit medullam posita sunt propria, insigniq; ac peculiaris lumborum vertebris non esse, at nonnullis etiâ thoracis, præsertimq; duabus extremis, vnde citæ scilicet, ac duodecimæ communia prædictâ iam a nobis est, cum de thoracis vertebris fermocinaremur. Id quod cum in simijs etiam obseruauerimus, nullam Galeni verba hæc excusationem admittere possunt: Nisi dixerimus plura, maioraq; in his esse, ob maiorem corpori huiusmodi vertebrarum crassitiem. Proprium verò lumborum vertebris, ac peculiare potius dicitur: quod transuersi eorum processus longè tenuiores, procerioresq; transuersis vertebrarum thoracis processibus existunt, costarumq; instar extremi breuiores: Medij autem longiores: ac tandem latiores eorundem spinales processus apparent. Nonnullam tamen excusationem admittent Galeni verba de lateralibus quibusdam processibus lumborum figurarum proprijs: de quibus sic statim subdit.

TEXTVS TERTIVS.

*Καὶ μὲν διὰ καὶ ἄλλο τις ἐστὶ κῆρυξ ἀποκρινῶν ἐν ἀπὸ τῆς ἐξῆς, ἐκ τῆσιν, παρὰ τὴν ἑλάνη τὴν ἑλάνη τῆσιν, καὶ ἕως τῆσιν ἢ ἐν ἀπὸ τῆσιν, καὶ εἰς τὴν ἑλάνη, ἢ παρὰ τῆσιν ἐν ἴδιον μέρος, καὶ εἰς τούτοι, καὶ αὐτῶν, καὶ πάλιν ἕλται.*

Est autem & alius decliues processus in his ex abundanti, iuxta nerui exortum extensus. Atq; is nonnunquâ in omnibus est: nõ nunquâ vero in vltimis vel quæminimis, vel omnino nullus est: supraposite autem vertebræ perpetim hunc habent, quæ in modum & duo dorsii postremi.

COMMENTVM TERTIVM.



**N**OS etiam decliues alios lumborum, ac duarum vltimarum thoracis vertebrarum processus, suis cum vltimo libro de vlti partium tertio decimo possit Galenus. Quos cum in homine semper, & ubiq; deesse conspexerimus, nonnullam tamen recipere Galeni verba excusationem prædicamus: quoniam scilicet in simijs, canibusq; reperiantur: propter quorundam in eis inuentorum ab homine duersorum interiorum musculorum, tam longiores eorum lumbos, quam thoracis infimam partem deestenti tutionem, firmamentumq; atq; ligamentorum quorundam exortum, & articularum deniq; earundem partium defensionem. A simijs igitur, canibusq; ac ceteris id genus animalibus (in quorum lumbis perquam bellè scripta hæc quadrant) deceptus Galenus hos processus descripsit. Cum igitur his homo careat. Non est, cur in eorum elucidatione longius elaborare debeamus, in nostrum tædium, atq; legentium tyronum confusionem. Verum ad ea potius digrediamur, quæ in præcedentibus quoq; tam cervicis, quam thoracis vertebris obseruauimus: vt præsertim processuum numerum, & foraminum quoq; lateralem vltim explancemus. Verè igitur in homine lumborum vertebræ, instar eorum, quæ in thorace sunt, septem duntaxat processus habent, duos inquam acclius coccauos, sinuatosq; ac duos posterea decliues capitatos, protuberantesq; præter quos, & alios quoq; duos transuersos: nuncq; tandem spinalem: qui septem sunt: Quanquam Galenus nouem potius, p. duos prædictos iam finiarum, canumq; decliues processus addens. Et quibus lumborum vertebris triginta quinq; processus inesse, cõperimus est. Qui tamen iuxta Galeni cõputatione esse deberent quadraginta quinq; sed in simijs septem lumborum vertebras habentibus sexaginta tres

Cõtra Galenum.  
n. Cap. p. de q. com. 3. in fin.  
Cõtra Galenum.  
n. Cap. p. de q. com. 3. in fin.  
Cõtra Galenum.  
n. Cap. p. de q. com. 3. in fin.

Digestio.  
Processus



plura oportet. [ Quod simul quidem (vt ad eius quoq; vsum Galeni dogmate A. conuertitur) vult fundamentu quoddam spinae esse futurum; simul autem ossa ischioerum, ac ilium ischioerum] ubi sibi exciperet, sipe quibus neq; pubis ossa constare poterant: quae vltus necessarios emittuntur. magis praestantur: eruntq; ad ischion dearticulatione omnino no fuisse. Horum enim priorum grauita, cum autem vterq; reflexe, ac inestum recti os natura est molita, quod vltus, idest; lateris, alij hinc, idest; sacrum nominat. Porro quemadmodu neruus ortus ex primo spatio intercostali, totus prope modum ad manus accedit: ad eundem modum hic quoq; neruus is, qui per primum foramen ex osse lato excidit, is, qui ad crus feruntur, commiscetur. ] Hi sunt quatuor ossis sacri vltus antea quoq; a nobis enarrati. .a. Latum verò, amplumue, seu magnam os id diximus: non tamen vbiq; equalis: sed superioris quidem, velu ampla quadam superiacentia vertebrarum basi, deorsum procededo, in anctonem dicitur: vt singulorum ossium in eo contentora magnitudor eo minor reddatur, quo deorsum magis descendens sit. Duplex verò huius ossis, simul scilicet totius assumpti ad superiacetes vertebrae proportionem Galenus hic subdit: Alteram videlicet, ac primam, quoad articulationem: Alteram verò, ac secundam, quoad spinales processus. Ductum autem propter primam prius est (.x.) quomodo eorum, quae infra decimam thoracis vertebrae (in sumis) in homine autem, infra duodecimam.) acclius processus, quibus cum superioribus articulatur, concavos esse: declius autem, quibus cum inferioribus quoq; conestuntur, profuberantes, còdylotòsij; existere: vt superioribus quidem lumborũ vertebrae suscipiant, inferioribus verò suscipiantur: contra quam in thoracis vertebrae, supra duodecimam quidem in homine, ac cervicalis omnibus excepta prima se habet. In osse igitur sacro similem esse alijs lumborum vertebrae dearticulatione cum lumborũ in sumis, recte Galenus inquit. Suprema igitur huius ossis sacri pars, seu maulis dicere su premũ eius; quoad corpus suũ, accliusq; processus, suprapositũ vertebrae, scilicet lumborum, effigiem representat. Quoad spinam verò (in qua secunda proportio, siue similitudo consistebat) huius ossis, pernotandum est, qd duo in sumis scilicet sextum, & quantum hac de structura sunt: quin potius posteriori in parte, in qua spina adnatae debuerat, in homine desinant, aperta; ossa sint, infima quide omnino, penultima verò pro maiori sui parte, quantum plus minusue diuerso inquam, in diuersis hominibus ossibus eorũ sacris, modo. In reliquis verò superioribus eiusdem ossis partibus, spina maior quide in primo est, in inferioribus tantò, quãtò eorum ossis forũ corpora minora descendendo sunt. Quae quidem similes ipsorũ lumborũ spinae est, non vt canibus, ac simijs (perinde vt Galenus ipse existimabat) iursũ vergens, at in hominibus deorsum, velut in lumborum quoq; spina praedicta est, id quod praesens figura, cum praecedentis capituli commentu primi alia figura manifestissime praesentunt. Quamquam in simijs quoq; ipsis vlt; adeò obscura, ambiguaq; eius iursũ vergentia sepe numero est, vt mea quidem sententia in plurius etiam deorsum potius vergere, clarissime appareat. Quisq; autem primum eius os iursũ tendere aperissime conpleximus. Sed hec de ossis sacri accliuibus, posterioribusq; siue spinalibus processibus: quorũ ratione vertebres assimilatur; quantum verq; in eo vertebrae non sint.

Sacri ossis vltus quadruplex. t. 11. d. v. p. cap. 7. ante med.

Sacri ossis figura. a. Cap. 4. huius ob. 1. post princ. Ossis sacri ad vertebrae coparatio duplex. x. Cap. 8. tex. vltimo & cap. praecedenti tex. 1.

... in inferioribus tantò, quãtò eorum ossis forũ corpora minora descendendo sunt. Quae quidem similes ipsorũ lumborũ spinae est, non vt canibus, ac simijs (perinde vt Galenus ipse existimabat) iursũ vergens, at in hominibus deorsum, velut in lumborum quoq; spina praedicta est, id quod praesens figura, cum praecedentis capituli commentu primi alia figura manifestissime praesentunt. Quamquam in simijs quoq; ipsis vlt; adeò obscura, ambiguaq; eius iursũ vergentia sepe numero est, vt mea quidem sententia in plurius etiam deorsum potius vergere, clarissime appareat. Quisq; autem primum eius os iursũ tendere aperissime conpleximus. Sed hec de ossis sacri accliuibus, posterioribusq; siue spinalibus processibus: quorũ ratione vertebres assimilatur; quantum verq; in eo vertebrae non sint.

Cõtra Galenũ.

... 11. d. v. p. cap. 7. ante med.

Vide cap. 6. ante 11. circa finem.

TEXTVS SECVNDVS.

... in homine suor, Galenus determinauit: Quamuis libro de vlt partium duodecimo qu tenues esse (si natiuè fortassis inter os sacru os praemanibus habens) minus recte quoad hominem spectat, determinarit, huiusq; tenuitatis à thoracis vertebrae lateralibus processibus diueris rationem assignare conatus frustra fuit. In homine igitur (de quo nunc loquimur) transueros amborũ processuũ magnitudor, latitudorq; magnitudinẽ, latitudinẽq; corporis cuiuslibet partis ossis sacri ferè equalis est: quinimmo duo processus cuiuslibet simul sumti, praesertimq; scõdũ ossis magnitudine, amplitudinẽq; sub os, cuius sunt processus, excedunt.

COMMENTVM SECVNDVM.

**G**RANDES, ampliosq; esse transueros ipsius ossis sacri processus verissime nũc, velut in homine suor, Galenus determinauit: Quamuis libro de vlt partium duodecimo qu tenues esse (si natiuè fortassis inter os sacru os praemanibus habens) minus recte quoad hominem spectat, determinarit, huiusq; tenuitatis à thoracis vertebrae lateralibus processibus diueris rationem assignare conatus frustra fuit. In homine igitur (de quo nunc loquimur) transueros amborũ processuũ magnitudor, latitudorq; magnitudinẽ, latitudinẽq; corporis cuiuslibet partis ossis sacri ferè equalis est: quinimmo duo processus cuiuslibet simul sumti, praesertimq; scõdũ ossis magnitudine, amplitudinẽq; sub os, cuius sunt processus, excedunt.

... 11. d. v. p. cap. 7. ante med. ... 11. d. v. p. cap. 7. ante med. ... 11. d. v. p. cap. 7. ante med.

Præter

Præterquam quidem processum amplitudinem, tria eorum in fine partis exterioris, pauloq; inferiorum posteriorum, cauitatem non simplicem quidem, sed in duentis locis, maximeq; superioris, inferiusq; variam nec adeo superficialem, ocularemq; quā, quāsi alibi esset dignā conspiciatibus, in quam vario quoq; modo extuberantia illum ossa inseruntur, nō per articulū, sed per synchondrosim, chartilagineæ ligamēta quedam, appendicū cum suis ossibus instar, per synchondrosim dicere possemus. Cū verō nonnullæ lateralis processū partes in sinū medio prætercauitate sint, correspondentesq; habeant in illum ossibus cauitates: Eapropter ginglymo similes quædam coniunctio facta est. Similis inquam ginglymo: vera enim ginglymos non est. Cū non ad articulum, sed ad symphytum, tamenq; non immediatam, reduenda huiusmodi ossium coniunctio veniat. Forteq; similior suturis fuerit. Tria sunt inq; superiora sacri ossa huiusmodi transierat processibus habentia latos admodū, amplosq; cum quibus illum ossa cōnectuntur. Reliquæ enim deinceps duo, vel tria, tametsi quoquomodo latos habeant laterales processus, hos tamen tenues obtinuerunt: à quibus femur mouetur inuicem securū par quartū: exoritur. Coalescunt autē processus in laterales, vel in eorūdem ossū corpora interueniunt viq; addō tēporis processu, ut in vnum reducantur, intermedia scilicet quavis chartilaginea substantia in os degenerante, quantum in etate adhuc tenera per synchondrosim vnita esse, proferrī possit: præsertimq; primū cō secundo: in quibus manifestior eorū separatio notari potest: viq; adeo quidem, ut nō nunquam in etate etiam processus primū à ceteris segregatū, corrupta intermedia chartilaginea, inuocatum in cūmteris sit. Sed vt hæc exequitibus pendemus, ad eorum partes, connexuramq; vnā cum ipso etiam Galeno, conuertamur, sic subdente.

7. tab. 11.  
9. 12. 10.

TEXTVS TERTIVS.

Ἐξ τριῶν αὐτῶν ἐκ τῆς προῖρας, ἄλλοι τῶν ἰδίων ἐπιπέδων, ἅς κέραιον ἐπίπετον ἐστὶ τὸ ἄριστον τῶν ἰδίων, ἡ δὲ κέρατος ἀπέκλιμα, διακλιματὸν δὲ ἐπιπέδον ἀπέκλιμα δὲ ἀναστρέφεται τοῖς τῶν ἰδίων ἐπιπέδων, ἡ δὲ κέρατος ἀπέκλιμα, διακλιματὸν δὲ ἐπιπέδον ἀπέκλιμα δὲ ἀναστρέφεται τοῖς τῶν ἰδίων ἐπιπέδων.

Ex tribus autem particulis, tanquam ex proprijs vertebribus constructū est. Quibus aliud quartum in ossis extremo appositū est, quod coccygem vocant. Dissolutorum verō per elixationem cunctōrum constructio similis eis, quæ in vertebribus sunt, apparet.

COMMENTV TERTIVM.

In proc. cō. 1. & c. com. 2. Cōtra Galenū. a. Vt ib. de v. p. 11. c. 12. circa princ. Apparētis contradi- ctionis solutio. b. Vt ibidē & lib. 13. cap. 7. c. Vt in præ sent. textu. d. 2. v. p. cap. 1. 15. & 16. Cōtra Galenū. e. Vt lib. 43. cap. 7. f. Text. 2. g. Solūto. nos. præcē. & cap. 169. h. Cap. 169. com. 2.



**A** MPLVM, sacrum os ( ut antea iam diximus. r. ) in homine sex, vel ad minus quinque ex ossibus cōstat. Galenus tamen simiarum, caninū, sceleretos dūficans, interdūm quatuor ex ossibus cōponi inquit. Sub ossē inquam sacro largū sumpto coccygem quoq; cōprehēdens ( quem coccygem pro vno ossē, ut in præsentē textū facit, tanquam quartum adiungens assūmptū: sed sacro interitū distinguit: ) Sēptimū autem tribus dūtaxat ex ossibus proprijs sumptū, os sacrum a coccyge distinctū expressit, vel nunc etiam facit: vnde tribus ex partibus cōstructū esse ait, tanquam ex proprijs vertebribus: quasi de ipso tanquam propriē dicto locutū se esse inueniat. Nulla igitur in Galeni dictis contradictio est ( prout nonnulli nūns rectē existimant ) siquidem scilicet sacrum os modō ex quatuor, b. modō ex tribus & c. constare ossibus, dicitur: vbi cūm ex quatuor cōponi testatur ossē, eorum os ex propriē dicto sacro, & coccyge aggregantur in simijs intellexit. Quamobrem nō ex quinque, sed quatuor ex partibus cōstituto rotam spinam determinauit: ut quōsdā scilicet sub sacro coccygem intellexerat: Maximeq; in homine, in quo quidem, coccyx spinales processus nō habens, ipse verius dicte pars dici non debet: in quo etiam, coccygis vltus a spine partium vltibus, ipsūq; etiā ossis sacri, duentis sunt. Nō enim corporis, vertebriarūq; fundamentū coccyx, vel os sacrum est, neq; in se spinalem cōtinet medullā, sicuti quatuor spine partes. Anterior verō dubio procul omni tenendum est; qd̄ dum libros de partium vltū cōponebat Galenus, coccygis exquisitam cōtentionem nimis, in ipsīs etiā sibi similia simijs, canibusq; nēdūm in homine, habebat.

Quatuor enim ibi. e. neruū paria ossis illi quatuor partibus, nullam de coccyge mentionem faciēns, attribuebat. Cū tamen ( se sequenti capite facit f. ) alios neruōs ossi in coccygis simiarū minibus nō temerē ( prout in simijs, & canibus obseruamus ) ascribat. Sed neq; hic g. vltū hōminis coccygem adhuc pernotat. Cū nullus ( vt videbimus. h. ) ab eo nerus in homine aggre diatur, neq; in eo spinalis medulla cōnectatur. Neq; sacrē eiusdē ( quod sex, vel ad minus quatuor; ossa, non autem quatuor, multoq; minus tria possidet ) pernotasse Galenus apparet. Sed omnissō coccyge, ad Galeni verba de ossē sacro conuertamur. Qui quidem cūm prædixisset iam id sibi ex particulis ( quocunq; sint ) tanquam ex proprijs vertebribus constructū esse, talem cōstructionē cōprobare volens, subdit quidem dicens; qd̄ si per elixationem ossis sacri partes dissolutū,

cuncta.

cunctarum constructio similis vertebrarū cōstructionibus esse apparebit : vsq; adeo enim coal-  
 scere, præsertimq; in senioribus inueniuntur: vt nisi dissoluatur talibus vertebrarū constructio-  
 nibus similis compactio in his sacri ossis partibus minime conspicitur, vel saltem difficillime queat.  
 Quam profecto dissolutionem, siue per elixationem, siue per cōturbationem quandā in cimit-  
 terijs factam rarissimē, præterquam in tenellis, cōspexisse nobis licuit. Verūm quæmouēdo cum in  
 quocumq; bet ossium ipsius etiam sacri cōstructioni interstitijs foramina quedam remaneant,  
 per quæ non secus, ac ex cervicali, dorsiq; & lumborū vertebriis profiliere solent: Idcirco ad for-  
 am quosq; eluqidationem ex Galeno prius in simijs, ac deinceps iuxta verā humani corporis hi-  
 storiam transmigramus: vt quōm sic Galenus ipse subdit.

## TEXTVS QVARTVS.

Τὰ δὲ ἀπὸ τῆς σπονδυλῆς ἀπὸ τῆς ἀνωτέρω ἀπὸ τῆς ἀνωτέρω σπονδυλῆς, καὶ ἀπὸ τῆς ἀνωτέρω τῆς ὑποσπονδυλῆς ἀπὸ τῆς ἀνωτέρω, καὶ ἀπὸ τῆς ἀνωτέρω τῆς ὑποσπονδυλῆς, καὶ ἀπὸ τῆς ἀνωτέρω τῆς ὑποσπονδυλῆς, καὶ ἀπὸ τῆς ἀνωτέρω τῆς ὑποσπονδυλῆς.

Nerui autem à spinali medulla per huius foramina profiliētes, iuxta suarū veluti vertebrarū  
 cōpages, quemadmodū per vnuerfam quosq; spīnā excidunt. Nō quidē ex transuersis partibus,  
 sed intrinsecis, extrinsecisq; sunt autem vnuerse, tres horū coniugationes.

## COMMENTVM QVARTVM.

V. E. in presenti contextu de foraminum situ Galenus ait, per se clara, & tam in homi-  
 ne, quam in simijs quam ipsi verissima sunt. Quod autem subdit, tres esse horum ner-  
 uorum vnuerſas coniugationes, quæquam in simiarum sacro osse verum est, in homi-  
 ne tamen falsissimum: non enim: Sex enim paria perpetuo serē sunt, etiā si ossis sacri  
 officula spenuneroq; quinq; sint. Eo enim casu deficiente simul quinto eiusdē ossis anteriore for-  
 amine, in posteriore tamen sede, sex quinti ossis decliuibus quibusdā processibus, ad latera ma-  
 gis iter exculptum est, per quod sexta nervorum coniugatio ab initio interim trigelima non me-  
 randa egreditur, Quorum neruorū, ac per hoc foraminū vsus, veluti in præcedentibus obseruaui-  
 mus, ita hic etiam adiungere, operepretū fore, arbitrati sumus. Sunt igitur ossis sacri foramina,  
 per quæ spinalis medulla pertransit, numero sex, aut quinq; per ipsorū ossium eius partium nu-  
 mero. Sed rectius dixerimus quinq; aut quatuor: Quinq; quidē, in quibus sex ossa insunt; qua-  
 tuor autem in quibus quinq;. Cū omnino vltimum os parte posteriore deluscat: penultimum  
 verō magna ex parte ( prout in septima sequētis capitis figura patebit ) Nisi cauitatem illam pro  
 foraminē sumperimus, per quam scilicet spinalis medulla pertransit. Alia autem ratione, cū  
 inter se ( vt prædictum iam est. f. ) vsq; adeo coaluerit, vt vnus rationem habeant, ipsorū quosq;  
 foramina, per quæ spinalis medulla descendit, vnus rationem habere dici poterunt. Alia verō,  
 per quæ nerui profiliunt, sex vtrinque, vel ad minus quinq; sicq; duodecim, vel saltem decem nu-  
 merari queunt. Quōd si externū duntaxat cōsiderentur ( excepto primo foramine cōmuni quin-  
 te lumborū vertebre, ac sacri ossis primo, quod superiorū instar in lateribus est ) alia inferiora for-  
 amina, quæquam duplicia numerari possunt, quauis intus simplicia sint: præter vltimū quoq; in  
 his, quæ ossibus ex quinq; constant, sicq; alia ratione, cū hæc intermedia foramina anteriorū,  
 posteriorūq; perpenſa non quatuor, sed octo vtrinque sint, simulq; sexdecim, cum duobus primis  
 erunt omnia duodeuiginti. In his verō sacris ossibus, quæ sex ex particulis cōstant, dici poterunt  
 duo, ac viginti. Cum alijs igitur, per quæ spinalis medulla pertransit, ad summū viginti & octo  
 dicendi veniunt: ad minus per quæ foramina vnde cum profertur possunt: varijsq; intermedijs nume-  
 ris, iuxta variā merandā rationem. Sed omnissis ijs, per quæ spinalis medulla descendit, alio-  
 rum foraminū per quæ nerui pertranscunt vsū contemplerur, quæ duabus sequentibus figu-  
 ris scilicet prima, & septima proprijs numeris designata apparebit. Primum igitur est verteb-  
 lumborū quintæ, ac ossis sacri primo officulo cōmune foramen: per quod vtrinque, primū par ner-  
 uorum sacro ossi attributorum foras egreditur, in duas quoq;, aliorum superiorū instar, ab initio  
 statim dissocium, anteriore scilicet, ac posteriore. Anterior itaq; maior primi ( veluti & secun-  
 dū, tertijq;, & quartū paris ) portio in vnum cum prædictis tribus inferioribus coallescent quartum  
 neruū omnium maximū corum, qui ad crus descendunt, constituit, nonnullos interim rami-  
 los in abdominis musculos, præcipuè, secundū .f. par, & tertiu, .s. atq; in femur mouentū par  
 septimū .s. distribucens. Posterior autē pars, præpositorū neruorū instar, in musculos ibi existen-  
 tes distribuitur: speciatim verò in abdominū per secundū .s. ac dorsū quintū, .s. & femoris pri-  
 mum, .7. secundum, .s. tertiumq;, .8. & decimū: .x. necnon & tibie prinū, .v. sextumq;, .s. ac  
 nonum,

Cōtra Ga-  
lenum.Foraminū  
sacri ossis  
numerus.I. Com. præ-  
cedenti.Foraminū  
vni.

Et tab. 4. II  
 Et tab. 5. A  
 Et tab. 8. A  
 Et tab. 4. II  
 Et tab. 7. H  
 Et tab. 9. II  
 Et tab. 10.  
 Et tab. 11.  
 Et tab. 12.  
 Et tab. 10. A  
 Et tab. 1. Z  
 Et tab. 1. q  
 nonum,

\* tab. 4. 9  
 # tab. 15.  
 fig. 29. B.  
 C. E.  
 # tab. 16.  
 fig. 14. 15.  
 # tab. 16.  
 fig. 17. X  
 # tab. 17. F  
 # tab. 14.  
 Z.  
 # tab. 2. F  
 # tab. 12.  
 Δ.  
 # tab. 9. Π  
 # tab. 10.  
 Σ.  
 # tab. 11. X  
 # tab. 11. φ  
 k. Com. 2  
 & præfati.

nonum, .x. atq; ipsam deniq; natium cutim inferunt. Secundum verò, tertiumq;, & quartum, ossibus primo cum secundo, secundiq;, cum tertio, ac tertio demum cum quarto cõmuniã foramina neruorũ paria secundũ quoq;, tertiumq;, & quartũ eructant: quorũ anteriores partes (velut prædictũ est) cum primo coalescentes quartũ omnium maximũ in ortu deducendũ seruũm constituunt: Sequentiũ verò, scilicet quintũ, & sextũ, foraminũ, quantũ quoq;, ac sextũm neruorum paria trãmittentiũ, & anteriores quoq; partes in tres aut musculorũ, & vtriq;, deriuicem in foraminis, in masculis autẽ in penis quatuor musculorũ, .x. itemq;, in ceruicis vesicæ vniũm musculũ, .x. iæpõq;, in ipsam quoq; totam vesicæ ceruicem, ac vniũm quoq; penem frequenq; sãbole distriũuuntur. Posteriores verò partes quinq; panum inferiori in dordi sextũm, .x. septimũm, .x. musculorũ par, brachijq;, quartũ, .x. ac thoracis quoq;, quartũ, .x. & femoris deniq; primũ, .x. secundũ, .x. tertiumq;, .x. & quartũ .x. musculorũ par disseminantur; motũ illis sensũm; distriũuunt. Est verò quantũ foramen quarto, & quinto sacri officulis cõmune; Sextum verò deniq;, vbi sacri officula sunt, quinto, & sexto cõmune est. Vbi verò quinq; duntaxat officula sunt, verũ foramen non est, sed (vt antea .x. declarauimus) sinus potius vtriq; sub deorsũbus quinti ossis posterioribus appendicibus nominandi venient. Verum de sacro osse, cuiq; parti-



De Coccyge. Caput Vnderium.

### TEXTVS PRIMVS.

" Ἐπὶ τῆρας τῆ πλατῆρας, ἕτερας δὲ τῆ καλλίμενος κιναιτῆ ἐκ τῆρας τῆ πῆρας συλλέγουται ἰδίῃ ἰσχυρῶς χονδρῶδες, ἃ καλεῖται τῆ μέγιστος τῆ τῆρας ὑπερμεγιστος.

" In extremo lati alperũ os est vocatũ coccyx. Ex tribus quoq; id ipsum proprijs particulis compositũ chartilaginis magis, quæ in lato sunt. Maxime, id, quod in extremo sitũ est.

### COMMENTVM PRIMVM.


**R. A. C. E.** coccyx, latinè Cuculus, vulgõq; apud nostros Cuccus, nominibus his tam lacuis, quam vulgari ex Græco deductis; auis est: à cuius rostri figure similitudine ostenditur, siue rectius dixerimus; horũ ossium conuersus nuncupatus est. Intorsũm enim, siue aq̄orsũm tale ossilius auis rostri semitans incuruatur; & in acutũ deniq; terãdenis est. In homine quidem septis prout in primis figuris quatuor, septimaq; patet, ex quatuor, nonnunquam verò ex tribus officulis, tanquam proprijs partibus cõstit (prout antea .x. dictũm autũ est) vsq; adeo intẽm chartilaginis, vbi tenellis adhuc infanibus ex ossium numero dẽdẽdẽ partes hæc cunctæ, siue tres, siue quatuor, veniant (velut supra etiã declarauimus .m.) Magis verò secunda, quatuor prima, unãq; aduicã tertia, quam secõda, atq; omniũ maximè quarta. Quæ magis enim deorsũm præcipiant, eõ minõra, tenerrorãq; ossa sunt, magisq; in chartilaginẽ vrgentia. E qua quidem nomenclandi ratione exquisitissimè perpensa, in brutis verum coccygẽ deesse, cõperuissimum est. Tra enim inferiora ossa in illis ad rostri, Calorũ figurẽ similitudinem minimè intorsũm cõtortentur (prout in quinta, & sexta figuris hic positis clarissimè apparet, quarum

l. In proo-  
 com. 1. &  
 c. c. c. c. l.  
 min proo-  
 c. 1. in q̄  
 te cõclusio-  
 nis cõspic-  
 uatõne.

quarum



quarum quinta anteriorem, sexta verò  
posteriorem simiarū sacri partem ostendit.  
Sed extrorsum potius quadantenus  
vergentia, suos vsus, præcipueq; in cau-  
datis caudæ basim firmantia, complent;  
cumq; in illis etiā perforata sint, spinali  
medullæ iter præbentia, sacri potius ossis  
vicem supplere, siue rectius cõplere, di-  
cendum venit. Vnde motū esse Galenū  
opinor, in libris de partū vsu, cum quator  
ex ossibus cõstare sacri os scribens  
(vt qui simiarum ossa contemplantur)  
nullam de coccyge mentionem habuit,  
sed tãquam sacri quartum pro vno illud  
capiens, intellexit. Cùm verò deinceps  
in veterum anatomicorum de hominis  
sceletio loquentū libris sub sacro coccygem esse perlegerit, simiarū illud os subdivisum: vt  
quartum os ex tribus adhuc compositum coccygem hominis instar vocaret: sicq; hominis sacrum, &  
coccygem, cum brutorū, præsertimq; simiarū sacro confunderet. Solus igitur homo (si exqui-  
sitius singula perpeuderimus) tanquam solus sedens, coccyge donatus esse inuenietur. Caudatis  
autē animalibus coccygi respondens (hect illius vsus nõ habens) cauda quodãmodo dici possit.  
Quot autē, & qui coccygis veri vsus in homine sint, declaratū prius à nobis est, .n. vt hic eos re-  
petere superpondu sit, cum reuolutis quibusdã chartis relegere facillimū fuerit. Sed pro Galeni  
verborū interpretatone, nõ ad simiã coccygis, siue potius (vt diximus) secunde partis ossis sa-  
cri, siue tñ inferiorū ossiculorū neruos, ipso cū Galeno, transigremur, quàm sic subdit.



TEXTVS SECVNDVS.

Διζήσεται δὲ καὶ τὸ πρῶτον ἐπιπέδιον, ἐκ τῶν ὀστέων ἑαυτοῦ, ὅτι οὐκ ἔστιν ἄλλο, καὶ ἂν μὴν ἴσως τὸ  
πλατὴν δέξ. Διζήσεται δὲ καὶ τὸ δεύτερον ἢ ἐν τῶνδε ὀστέων τὸ δεύτερον ἐπιπέδιον, καὶ τῶν καὶ τῶν καὶ τῶν  
ὀστέων τῶν ὀστέων, ὅτι οὐκ ἔστιν ἄλλο, καὶ ἂν μὴν ἴσως τὸ πρῶτον ἐπιπέδιον, καὶ τῶν καὶ τῶν καὶ τῶν

Profilunt verò iuxta horū quoq; cõpages, posterioribus ex partibus neruū. Prima quidē coniuga-  
tio ex ea parte, qua latū os attingit. Secunda verò iuxta primū ad secundū eorum, quæ in ipso  
sunt ossium constructionem. Tertiaq; vbi secundū cum tertio cõmittitur. Quod verò reliquum  
spinalis medullæ est, in huius tertij extremo solum coniugis ex pers profilit.

COMMENTVM SECVNDVM.

V. Hic Galenus de coccygis neruis prodit, in vero ipfius hominis coccyge proxis  
desunt: vt cuius ossicula, neq; perforata, cõcauæ sunt, neq; spinalis medullæ contena-  
tia, neq; tandē alicuius nerui productiua: Sed in simijs vera sunt. In quibus (vt paulò  
ante diximus.) ossicula hæc sacri ossis partes potius determināda forēt: prout in quin-  
ta quidem anterioris, in sextaq; posterioris cõmenti præcedentis figuris liquere potest. Quanus in-  
terim excusare Galenū (vel in ipfius simijs) nequeamus: dum libro de vsu partū tertio decimo. p.  
quatuor neruorū paria ex ossis sacri medulla progredi determinat. Si enim ab inferiorib; ossicu-  
lis, tanquam à coccyge in simia separemus, tunc nõ qua-  
tuor, sed tria neruorū paria ex osse sacro oriū (quemad-  
modū hic dixit) proferendū relinquitur. Quòd si totū si-  
mul sumperimus, tunc sex, non quatuor paria neruorum  
profilire dicendū est: quemadmodū in hominis etiā osse  
sacro determinandum venit. Quod verò de eodem in ossis  
sacri extremo, siue (vt claris, generatimq; in omnibus  
loquamur) in sex ossium termino reliquū est, neruus esse  
non apparet, quanus neruū quidem coniugis ex pers esse  
Galenus insinuet. Neruorū enim ritu minamē digerunt.  
Nisi q; interdum (præsertimq; vbi quinq; duntaxat sacri  
ossis particule sunt) in tres partes distingui solet. Ad eò vt  
duæ laterales partes sexti paris neruorum ab initio autem



7. tab. 11.  
9.  
Coccyus  
vlt.

ingulimi vicem suppleant, vbi tamen vna duntaxat augea, simple vq; particula remanet, nempe rationem manifeste non obseruans, nisi ramificulos quosdam in quarta femoris musculum, & scapulae os illamq; vicinam, et in transfuersis. Est autem coccyus vltis, presertimq; in hominibus, vltimus ossificus, totusq; vltis, recte in ista pars extrema ipsi alligata fuisse videtur, ut ossa licet in caput, aliorumq; omnium extremitatum egressi, Verum expedita iam totius corporis, necesse est, scilicet, carina, ipsa videbitur. Tempus est, vt ad thoracis, tanquam ipsius natus, ossa conuertantur, cum Galeno sic scribente.



De Thoracis ossibus, Caput Duodecimum.

TEXTVS PRIMVS.

Στήθος, καὶ πλοῦρα τῆς θώρακος ἐστὶ τὰ πέντε στήθους, τὸ γὰρ ὄργανόν τινος ἐστὶ δὲ ἀπὸ τοῦ ἑξῆς ἑκαστοῦ ἐστὶ πλοῦρον, καθάπερ καὶ ἐν στήθους. ἀποφύεται γὰρ ἕκαστον ὅπως ἐστὶ τὰ δὲ πέντε ὅργανα στήθους. ὁ δὲ ἀπὸ τοῦ ἑξῆς ἑκαστοῦ ἐστὶ πλοῦρον, καθάπερ καὶ ἐν στήθους. ἀποφύεται γὰρ ἕκαστον ὅπως ἐστὶ τὰ δὲ πέντε ὅργανα στήθους.

Pectoris ossa costarum, & spinae vertebrae, quae in dorso, thoracis ossa sunt. Duodecim quidem vtrinq; costae, quemadmodum, & vertebrae deorsum vtriusque enim quibus ad vnam; pectoris autem ossa in uide oblique sunt. Septem uero numero sunt, quot costae ipsam dearticulat existunt. Infimae autem huius extremitati charisago triangulo adnascitur.

COMMENTVM PRIMVM.

Thorax  
στήθος  
9. lib. 1.  
de hist. ani-  
mal. cap. 7.  
circ. princ.  
r. ibidem  
cap. 12.  
circ.  
med.  
l. Cap. 13.  
in princ.

**T**HORACIS nomen huiusmodi usurpauit Aristoteles, Primò quidem latius, sic dicens. q. [ τὸ ἀπὸ τοῦ ἑξῆς ἑκαστοῦ ἐστὶ πλοῦρον, καθάπερ καὶ ἐν στήθους. ἀποφύεται γὰρ ἕκαστον ὅπως ἐστὶ τὰ δὲ πέντε ὅργανα στήθους. ὁ δὲ ἀπὸ τοῦ ἑξῆς ἑκαστοῦ ἐστὶ πλοῦρον, καθάπερ καὶ ἐν στήθους. ἀποφύεται γὰρ ἕκαστον ὅπως ἐστὶ τὰ δὲ πέντε ὅργανα στήθους. ] quod est [ latitudo à ceruice ad pectus vq; ], que vocatur thorax. Totù igitur, quod dempta ceruice cù capite, brachijq; , ac cruribus remanet thorax ab Aristotele edicatur, nònulli Græcè ἑξῆς quoc; Alij uero latius transò appellati. Deinceps autem finitús thoracè author idem sumpfit. Cù enim simpliciter ex parte costarum thoracè prædixerit. r. parte scilicet anteriore, ac posteriore, paulò post, sic subdit. f. [ τὸ γὰρ ὄργανόν τινος ἐστὶ δὲ ἀπὸ τοῦ ἑξῆς ἑκαστοῦ ἐστὶ πλοῦρον, καθάπερ καὶ ἐν στήθους. ἀποφύεται γὰρ ἕκαστον ὅπως ἐστὶ τὰ δὲ πέντε ὅργανα στήθους. ] hoc est [ Post thoracè uero in pectus uenter est; atq; huius radij symbolicus. ] Hec igitur quomodo thoracè nunc artibus caput Aristoteles, vt scilicet ab inferiore uentre, qui abdominè cõspicitur, distinctus sit. Vbi Theodorus Gaza æquiuocationem euitare uolens, loco thoracis pectus latine traducit. Galenus igitur finitiorem hunc sumendi modum imitatus est, dicens. x. [ Quod igitur à costis vtrinq; circũscribitur, pertinetq; , anteriore quidẽ parte ad pectorale os, ac septum transfuersum; declinat uerò posteriore ad spinam, ac respicitur; hoc totum spatium mediçi cõsueuerunt appellare thoracem. Cuius interni spinus quanta sit magnitudo, intelligi sanè potest ex ea periodo, quæ extrinsecis cõspicitur; Paulò minus enim interna amplitudo ei, quæ foris apparet; thoracis magnitudinẽ ei equauit; ipso uidelicet costarum corpore, quod tenue omninò est, de ipsa amplitudine exiguum quiddam abscindente. ] Hæc de thoracis circũscriptiõne Galenus. Qui perbellè alibi etiam sic inquit. x. [ Quemadmodù igitur qui loci; regionisue naturam charactere, ostensis partibus ipsius circũscribentibus, deinde ad cuiuslibet particulari huius discipulam accedunt; Iti ego quoc; fines, qui thoracem circũscribunt, prius declarabo. Vt igitur breui fermonis cõpendio tunc cõplectar, thoracem nominant quod à costis cõprehenditur. ] Sunt autem hæc omnia, quæ prius retuli animantibus in duodenum numerum porrectæ. Rarissimò siquidẽ decimatertia costa uisitur, atq; hæc adhuc rariss; vndecima. Atq; hæc ita rara sũt, vt inter mille vix vnum talis costarũ numero inuenias. In totũ uerò omnibus animalibus de quibus in hoc opere verba facimus, duodecim insunt costæ. Et præterea in ijs, quæ clauicula obtinent elatior thoracis finis, clauicula existunt quemadmodò demissior omni animantũ generũ septũ transfuersum, quod Græci ἑξῆς, & ἑξῆς nominant. Sedes omnibus costis duplex. Prior est, id est pectoris oss; posterior, vertebrae sunt; quæ totidem numero planè, quot & costæ habentur. ] Hæc de thoracis nomine, ac circũscriptiõne. Dicitur autem ἑξῆς Græcè, latineq; est thorax, ἀπὸ τοῦ ἑξῆς, quod est, alio, ob cordis (vt nonnulli augeat) motum, vel melius ob propriũ respirationis saltum; quia scilicet continuo salt, resiltq;. Vel ἑξῆς τοῦ θώρακος, hoc est, diuans custodiare, seu cõtinere: animam scilicet ipsam, eam in eo radice alter existeret calor ratione utriq; alibi ueritate declarauerimus. x. Anteriorem huius thoracis partem ex Galeno, cæterisq; anatomis proceris, ἑξῆς, hinc, pectus, nuncupabimus; Huiusq; mediã partem, siue mediã oss;

1. d. de v. p.  
cap. 1. in princ.

1. d. de v. p.  
cap. 1. in princ.

1. d. de v. p.  
cap. 1. in princ.

1. d. de v. p.  
cap. 1. in princ.

1. d. de v. p.  
cap. 1. in princ.

1. d. de v. p.  
cap. 1. in princ.

1. d. de v. p.  
cap. 1. in princ.

1. d. de v. p.  
cap. 1. in princ.

1. d. de v. p.  
cap. 1. in princ.

1. d. de v. p.  
cap. 1. in princ.

1. d. de v. p.  
cap. 1. in princ.

1. d. de v. p.  
cap. 1. in princ.

1. d. de v. p.  
cap. 1. in princ.

1. d. de v. p.  
cap. 1. in princ.

1. d. de v. p.  
cap. 1. in princ.

1. d. de v. p.  
cap. 1. in princ.

1. d. de v. p.  
cap. 1. in princ.

1. d. de v. p.  
cap. 1. in princ.

1. d. de v. p.  
cap. 1. in princ.

Thorax in de organ.  
x. l. 1. art. med. col. 21.  
Pectus hinc.

*signis*, cui scilicet legitimas costas articulan dicemus. Ad eod vt tria hæc nomina per magis, & minus, seu vt totū & partes, siue vt continens & contentum, differant. Thoracis enim pars sola anterior est, *sternū*, hoc est, pectus: Huiusq; pectoris media pars, quæ ossa tantum est, *signis* dicitur, quamuis nonnulli *signis* pro ipsâ etiâ toto pectore sumant. Vnde *signis*. Sophocles eum vocat, qui spiritum vitæ in pectore continet, tanquam oraculum quoddam, responsa interrogantibus dantem. Sed his præmissis, ad Galeni verba conuertamur: Quinq; igitur in præfenti contextu Galenus habet partes. Prima, quæ partes sunt ipsius thoracis. Has enim tres esse possit: scilicet sternon, costas, ac dorſi vertebra. Solæ enim hæc ossæ thoracis partes sunt. Iugula enim cum in plurib; animalibus desint (vt postea videbimus .y.) thoracis à Galeno minime ponuntur, sed tamquam huius exteriore terminus scorsim declarantur. Secundò Galenus costarum, ac dorſi vertebra: numerū determinat. Duodecim enim costas vtrinq; esse ait: quemadmodū & duodecim vertebrae sunt, quibus illæ costæ vtrinq; dearticulantur. Diximus autem de his non paulò prius modò: & sed antea, quum de dorſi vertebra loqueremur. Et propter ad tertiam transcedamus partem, in qua quidem voluit, qd ossicula, quæ partes sterni sunt, interseuicem per synarthrosim copulari. Dicit enim Græcè *συνάρθρωσις*, latine vertimus ad verbū coarticulantur. Cuius sensus est, qd per synarthrosim coniunguntur. Quartò inquit, septē has sterni partes esse, septemque ossa: sicut & septem costæ existunt, quæ vtrobiq; cum prædictis ossibus articulantur. Quintòq; demum de enisiformi chartilagine meminit, quæ vltimo sterni ossiculo coalescens, siue adpalcos est. Quas partes exquisitis peribram, opere peritum fore decreuimus. Ex prima igitur apud Galenum quadraginta tria esse thoracis ossa concluditur: videlicet duodecim vtrinq; costas: quæ sunt simul vigintiquatuor: duodecimq; deinceps, quibus dearticulantur, vertebra: sicq; cū costis sunt triginta sex. Præter quæ, sunt sterni ossa septem: vt in quarta parte dictum est. Igitur omnia simul iuncta erunt numero quadraginta tria. Quæ tamen apud Vesaliū dicenda duplaxat sunt triginta nouem, vel triginta & octo. Cū sterni ossa tria tantum ille posuerit, quemadmodū nos antea ( prout in projectionibus inueniuntur ) supposuimus, .b. vel vt plurimū duo: quatenus scilicet reliqua per synchondrosim prius, ac intermedia chartilagine deinceps in os degenerante, per symphysiam coalescant ( vt postea videbimus ) iuxta nostrā verò supradictū copotum .e. ( cum octo in infantibus sint ) numero quadraginta quatuor esse thoracis ossa, præferendum venit. Sunt enim octo in principiis sterni ossa, deinceps verò, dum aliqui iuuenes coalescant, vsq; ad eod pauciores, vt in vnum sepe inuero tandem reducuntur. Quo tempore thoracis ossa duplaxat triginta septem remanebunt. Quod si eadem verò, paulò antea iam dictum est, de vertebra, costarumq; numero. Dearticulationem in quolibet, scilicet costa, ad vnā, scilicet vertebra: intellige quamlibet vtrinq;. Ad eod vt nō vnā, sed duæ costæ ad vnā vertebra dearticulentur. Dicit autem dearticulant, hoc est, per diarthrosim, videlicet propter motum manifestū, articulan prout ( ex Galeni etiam dogmate .d. ) pēdiximus. Quod tertii verò partem, annotandum sedulo est: quoniam per synarthrosim copulari interseuicem sterni ossa inquit. Idipsum verò falsissimum esse, quibusdam visum est. Cū non propter motum, sed propter quietē iam iuuenes coniungantur. Vnde omni nō coalescant, siue per synchondrosim, siue etiam per immediatā symphysiam. Quibus Galeno nascigibus respondebimus, Galenum ipsum, tamen nō propterea calūmnia liberantis, aliquatenus tamen excusantes. Non enim eam synarthrosim intellexit, quæ propter motū fit, sed aliam, quæ propter quietem. Duplicem namq; synarthrosim supra declarauimus: .f. alteram quidem propter motum factam, licet obscure, distinctamq; quæ in enarthrosim, arthrodiamq;, & ginglymon, sicut diarthrosim etiam, subdistinguitur: alteram verò propter quietem, siue quæ sine vilo motu est: quam in futurā, harmoniamq;, & gomphosim, ipsius etiam Galeni dogmate subdiuisimus. g. Cū igitur per harmoniā copulari ossa sterni inter se, libro de anatomicis administrationibus octauo .b. determinari: Harmonia verò synarthrosos scilicet illius, quæ sine motu est, species declarata iam est. Ideo ex specie in genus hic transiit per synarthrosim cōiungi ea dicens. Quod si potius hunc locum merito præterlegeris, ibi ex genere ad speciem nomen deuēnisse, profunderit est. Est autem excusatio quedā hæc, quod id scilicet qd minime obstat, sine motu talem ossium cōiunctionem esse, ac per synarthrosim dicere. Velut antea quos, huiusmodi excusationem pro ipso Galeno attulimus: .z. quoniam interim excusari nequeat, qd generatim per synarthrosim, speciatim verò per harmoniā cōiungantur ea, quæ per synchondrosim potius, demumq;, chartilagine illa intermedia in os degenerante, iam modiate per symphysiam coalescere videtur. In quarta deinceps huius textus parte ait, septem numero sterni ossa esse, ac se ptem quoq; costas, quæ ad eadem ossa singulatim dearticulantur. Circa quæ quidem verba, tria pernotanda veniunt: primū est, sterni ossa secundū verò costarū numerus, tertiumq; demū est verbum [ *συνάρθρωσις* ] latine [ dearticulatio ] vbi per diarthrosim, costas cum sterno articulan significat. Quò ad primū scilicet sterni ossium numerum, Galeni verba alibi cōscripta prius in medium afferamus: quam sic ait \* [ Sternon vnum

Quinq; partes reaf præfentis. 7. Cap. 14.

z. In præfenti cōtento, a Cap. 8. com. 1.

4. In præfenti

Prima pars

b. In præfenti com. 5.

c. Ibidem in declarat. 4. 5. & cōclusiones, Secunda pars.

d. 3. 3. anat. adu. c. 1. & 7.

e. In præfenti com. 11. & 17.

Tertia pars Galeni de sensu.

f. In præfenti com. 19.

g. Ibidem com. 17. h. Cap. 1.

i. In præfenti com. 11. post mod.

Quarta pars.

\* 3. anat. adu. c. 1. post princ.

quidem os esse apparet ob harmoniæ perfectionem, quam ipsius particule in cõtextu fortuantur; Membranis autem derasis, quæ & plura ossa sint, & numero totidem, quot cum eo costæ coarticulantur, palam innotescat. Nam antennis cuiusq; costæ extremiti inferiori ossium singulorũ, quibus pectoris os cõstat, extremo coarticulatur, & costæ simp attenuatis in mediâ pectoris ossium harmoniæ regionem demergitur: vt in quibusdã animantibus non magis clarior ossium extremitas, quàm humiliorũ capitibus, sed vtriusq; pari modo costæ coarticulantur. Septem itaq; priores thoracis costæ in hunc modum coarticulantur. ] Hæc Galenus. Quibus ex verbis istud nõ habemus, nisi eorum, quæ hic dicuntur, confirmationem. Nos autem in minore quidem ætate, quæ est chartilaginis in ossis iam degenerant, ad septennium vsq; non septem, sed octo ossa determinauimus, additõ quidem eo, tanquam octauo, quod reuera vt xiphoidis chartilaginis fundamentum à natura fabricatũ est: Cũ verò durescente ætate nonnulla eorũ coalescant, successiue paucificari numero solent: vt septẽ prius, dein sex, postea quinq; moxq; quatuor, deinceps tria, longiorẽq; post tempore duo, ac demum vnum in senectute reuertent. Septem igitur ossa sterni sunt. Quibus ( vt secundo etiã latius fecerimus ) septẽ quoq; legitime costæ coarticulantur. Octauũ autem os mucronatũ chartilaginis fundamentũ est: Cui octauam costam adherere ( quẽmadmodum in simijs obseruat ) Galenus subdit, dicens [ Octaua ad radicem chartilaginis, quæ in mæronem gladij modo exatuitur, cõsistit. ] Hinc opinor motum esse Aristotelem, & quos octo tantũ vtrinq; costas, vel gentis Turdorum hominibus septenas ex quoruãdã sententia inesse ait. Veras costas, legitimasq; intelligens, quæ sterno, vel simili etiã in simijs chartilaginis copulantur. De his enim duntaxat locutos esse credẽdum eos, à quibus ipse transcripsit: omisiss interea spurios, de quibus postea loquemur. Adde vt in senectem partem pectoris, anterioremq; simplicem, quæ eũm sterno terminatur, de pectoris enim, non thoracis partibus loquebatur. Quod si de thorace locutus esset, nõ primo, sed secundo modo thoracem in intellexisse, determinandũ veniret. Tertiuũ verò, quod notandũ hic proposuimus, est, quoniam cũ sterno costas dearticulati nõgntur. Cuius oppositũ veritati conformius legitimus libro de anatomicis administrationibus octauo. Vbi expressẽ pluries cũ sterno costas coarticulati, siue per synarthrosim, cũ vertebris verò dearticulati, siue per diarthrosim vepolari, expressẽ determinauit. Cui quidẽ eundẽdẽm inie cõtradictioni bẽsariam satisfacere conabimur. Primo quidẽ deprauatã esse hanc literarũ suspicatas, legendũm q; loco dictionis [ *synarthrosim* ] hoc est [ dearticulata ] potius [ *diarthrosim* ] latine [ articulate ] seu maus legere [ *synarthrosim* ] id est [ coarticulate. ] Secundo dicere possemus, largius hic sumptẽ esse dearticulationẽ: quã postea ( vt videbimus. ) determinauit, dicens [ Quaru motus exiguus adeo est, vt synarthrosim appellari queat. ] Sed quinta deniq; partẽ cõtemplamur. In qua mucronatam chartilaginem sterni vltimũ partũ adnasci ait. Cuius quidẽ vsus esse Galenus. n. rectẽ inquit, vt propugnaculu foret oris ventriculi, & partis septi tranquerũ, quæ illic est: iam autẽ & cordis. Demonstratũ enim nõ semel ab eo fuit, o. chartilagineam substantiã ad subiecta instrumẽta tegenda, ac defendenda maximẽ esse idoneam. Vt quæ neq; cõmuni, neq; rumpi, quemadmodũ dura, atq; friabilia. Neq; incidi, neq; cõtundi, quemadmodũ mollia, ac carnosa, queat. Dicitur autẽ hæc Malũ, siue Pomũ Granatũ apud vulgares, Barbaro latinosq; plurimos auctores: quonia scilicet triangula huiusmodi chartilago existens, balustiarũ granati apicibus figura, imaginẽq; responderet. Epiglottalem chartilaginem alij nuncupant, ab epiglottidis laryngis orificiũ operiens alterius chartilaginis simili quoq; figura. Græci verò passim *επιστάλη*, latine eni formẽ, siue mucronatã, ab ensis, mucronisue similitudine appellat: quonia laporis in homine, in simijs verò angustioris epulis mucrone, acutius extrematẽ representat. Verũ de nomine hoc vltimo, quoniam apud impositores Græcos primò, rursus deinde sermo fiet. p. Nunc verò propositis, clarioris dẽstrinq; granã trib<sup>9</sup> figuris thoracis ossia tã anterũ, quã posterũ, atq; secũdũ latũ representãtib<sup>9</sup>, prima scilicet anterũ, secundãq; posterũ, ac tertia demũ per latera. Galeni reliqua verba perpendamus, quã ipsarũ ad vertebras diarthrosim, dearticulationemue enucleatã sic dicens.

Azifloria defensio. k. 1. & hist. animab. c. 1. in prin. que Plinius transcripsit 7. cap. 37.

Cõtra Galenũ. l. Cap. 1. & p. 1. & c. 7. circa med. Soluio da phx.

m. Tex. 3. huius. Quinta pars. Chartilaginis mucronatæ vltimũ. n. 7. de v. p. cap. 21. o. 12. eiusdẽ cap. 11. vers<sup>9</sup> med. 11. 17. circa primo, & cap. 11. circa primo. c. 1. & 2. & alibi sup. p. Tex. 100. 111. 4.





ΚΑΙ ἐν αὐτῷ τὸ εἶναι αὐτὸ διαφύσει ἀναρτήσθαι ἢ ἄρα, ἢ μὴ ἀναρτῆσθαι ἢ ἄρα τὸ ἐκείνου ἢ ἐκείνου  
 συνδύσασθαι ἀναρτῆσθαι διαφύσει γὰρ ἵκασθαι ἐκείνου τὸ ἐκείνου μὴ ἐκ ἐκείνου ἐκείνου ἐκείνου  
 ἢ ἢ τὸ εἶναι ἐκείνου ἐκείνου ἐκείνου ἐκείνου ἐκείνου ἐκείνου ἐκείνου ἐκείνου ἐκείνου ἐκείνου  
 αὐτὸ συνδύσασθαι ἐκείνου ἐκείνου ἐκείνου ἐκείνου ἐκείνου ἐκείνου ἐκείνου ἐκείνου ἐκείνου  
 αὐτὸ ἐκείνου ἐκείνου ἐκείνου ἐκείνου ἐκείνου ἐκείνου ἐκείνου ἐκείνου ἐκείνου ἐκείνου

Rursus autē cōstarū ad sternon dearticulatio sensui oculior quidē est, minimē tamēn latens  
 hæc cum, qui circūposita membrana nœca ligamenta detraherit. Diarthrosarū enim i bi cuiuslibet  
 cōstæ chartilaginea pars in cōdylosum caput finientis singulis sterni ossibus superficiariā quam-  
 dam cavitatem adeptis. Verē autē breuis horūm motus est, ut synarthrosis appellari queat. In  
 multis verō alijs corporis partibus ossium compositiones adeo ambigæ sunt, ut siue dearticulati  
 adinutem has, siue coarticulati, profereudum sit, dubitetur.

COMMENTVM TERTIVM

a. Com. h. ius cap. 7. p. 2. f. d. anas. admin. c. 1. h. Ibidem. p. 2. Supra in proo. com. 12. & 14.

**D**E RASIS membranis, non solum sterni ossis pluralitas (proū antea, & quæ, ipse  
 somet ex Galeno. a. prædiximus) apparet: sed etiam (vñ huc repetitur) eorum publi-  
 citur coarticulatio. Modum autē eius Galenus subiunxit, sic scribens: b. [ Nam an-  
 terius cuiusq; cōstæ extremū inferiorem ossium singulorū, quibus pectoris ossia cōstitat,  
 extremo coarticulatur, & cōstæ finis attenuatus in medium pectoris ossium regionē de-  
 mergitur, ut in quibusdam animantibus non magis elationū ossium extremo (scilicet inferiori) quam in hu-  
 miliorum capitibus (scilicet extremo superiori) sed utriusq; pari modo eostē coarticulatur. ] q. d.  
 sinus ille, in quem eostē extremum tanquam caput inferitur, aequē cōmunis utriusq; ossi, tam  
 scilicet superiori, quam in inferiori sit. Præter primam intellige eostam, quæ medio dicitur primo  
 ossi connectitur: Ad eodē ut illi potius seipsum coalescat (veluti prædicitur alius est. a.) quam coar-  
 ticuletur. Nobis tamen (ut ibidem quoq; diximus) motus gratiā inter articulationes numeratæ  
 placuit. Dicit autē huc Galenus, cuiuslibet eostæ in cōdylosum caput finientis chartilagineam  
 partem (quod aliud nō est, quam ipsam eartilagineam partem in extremo positam in cōdy-  
 losum caput finientem) dearticulati sterni ossibus superficiariā quamdam cavitatem adeptis. Quod  
 quidem cōdylosum caput, seu dixisse malimus capitulū id nō exquiri sed rotundum velut nec  
 sibi respondens sinus etiam exatē rotundus est. Sed tanquā obtusior trianguli vertex, illud quē-  
 dam protuberans est: huc autē tanquā obtusior angulus exapertus. Similis verō digitorū flexis  
 articulis huiusmodi cōstarū eminentia est, secundum exterius, interiorisq; quadrantenū videlicet  
 oblonga: adeo ut nō secundo tantūm, sed primo etiam, modis superius declaratis: d. cōdyli no-  
 menelaturam merita sit. Sunt autē hæ harū capita sine ceruicibus: nisi totam fursūm cōuer-  
 sam eartilaginē pro ceruice sumptierimus. Cū verō superficiariā sterni ossi euitas dicta sit,  
 cōstarum verō protuberantiā cōdylosa: Idcirco ad synarthroses eas speciem reducendā hanc  
 anteriorem cōstarum coarticulationem ex Galeno eō pertissimū sit, quæ arthrodia nūcupatur.  
 Nos autē exquirimus inuenientes solum primarū cōstarum cum primo sterni ossē ad  
 arthrodiam a teā reduximus, .e. reliquarū verō sex cōstarum coarticulationem ad enarthrosim  
 potius referendam præstendimus: f. Ut cōstarū extuberantiæ capitula, ossium verō sinus, ac-  
 tabula ab his, qui Galeni distinctionē libro de motu musculorū. g. positam obseruare voluerint,  
 nuncupandā potius veniant. Quomam verō Galenus ab initio huius textus diarthrosim nuncu-  
 parat: eūm verus synarthrosi dicēda veniret: eapropter statim subdit, adeo breuem hunc mo-  
 tum esse, ut synarthrosi appellari queat, quæ modico antea pro solutione contradictionis em-  
 cleuimus. b. Quod verō subdit, in multis alijs corporis partibus ambiguis compositionis esse, an  
 dearticulati, an coarticulati profereudū sit, in vertebris ipsi verificari inuenimus. In alijs enim  
 omnibus determinatum iam à nobis est, quæcumq; per diarthrosim, .i. & quæcumq; per synar-  
 throsim .k. copulantur: In his autē alijs diarthrosim, dearticulationem esse aiunt, totus spine  
 manifestissimum inueni perpendetes: Nos verō ligularum potius vertebrarum oculum  
 motum eoni derantes, synarthrosim, coarticulationem esse determinauimus. A. Sed antequā  
 ultra progrediamur, tam prædictorum, quam prædicendorū elucidatione præcedenti contextui  
 præpositas tres figuras suis characteribus enucleamus.

Cōtra Gale-  
 lenum.  
 c. In proo.  
 com. 14.  
 f. Ibidem  
 com. 15.  
 g. Lib. 1.  
 ap. 5.  
 h. Com. hu-  
 ius 1.  
 i. In proo.  
 com. 12. 13.  
 14. 16.  
 k. Ibidem,  
 & com. 12.  
 & 10.  
 l. Ibidem  
 com. 12. &  
 sequenti.

Ab O. ad P. in prima & tertia figura sternon ostenditur, Quod septē ex ossibus cōstare nume-  
 rus in singulis partibus designatus præfert. Latera autē O. primū os designat P. verō mueron-  
 tam chartilagineā, sub qua tāquam eius basi octauum in puculis ossiculum subintelligi potest.  
 Quod

Quod quidem in natu maioribus in idem cũ septimo, vel hoc in vna cũ cum secundo, tertio, quarto, quinto, & sexto simul coalescentibus redacta, pro tertio esse remanebet.

Costarum anterior cũ sterno coarticulatio ex prima, & tertia quæ cõpõrtissima fiet: Earundem verò cũ vertebris dearticulatio ex secunda figura quadantenus innotescere potest. Quarum ordinem in spũs eadẽm designatus non minus adigunt.

Sicut patem & in prima figura notatæ quædam linee in singulis costis, quæ locum, in quo in chartilagine illæ degenerant, annotantur.

Quæ verò ad iugula, scapulasq; ac alia quædã pertinent, locis deinde proprijs declarabuntur. Nunc igitur ad sterni, costarûq; figuras cõtempnandas vnã cũ Galeno cõuertantur, sic subdente.

## TEXTVS QVARTVS.

30

Τὸ δὲ στήθος ἄρθρον τῶν ἑπτά ἐστὶν παρακλιθεὶς ἀπὸ τοῦ ἀριστεροῦ ἔστιν ἀπὸ τοῦ δεξινοῦ ἀντὶ τοῦ ἐκ τῆς ἀριστερῆς ἀλλὰ τὸν ἐκ τῆς δεξιᾶς ἄρθρον ἵππος ἰσομαχῶν. Ἐ δὲ πλεονεχίᾳ ἐστὶν ἰσὺς πολλῶν τοῦ στήθους, κατὰ τὴν ἀριστερὰν ἐπιπροσώπων, κατὰ τὴν δεξιάν ἐπιπροσώπων, κατὰ τὴν ἀριστερὰν ἐπιπροσώπων, κατὰ τὴν δεξιάν ἐπιπροσώπων. Ἄρθρον τῶν ἑπτά ἐστὶν ἀπὸ τοῦ ἀριστεροῦ ἔστιν ἀπὸ τοῦ δεξινοῦ ἀντὶ τοῦ ἐκ τῆς ἀριστερῆς ἀλλὰ τὸν ἐκ τῆς δεξιᾶς ἄρθρον ἵππος ἰσομαχῶν. Ἐ δὲ πλεονεχίᾳ ἐστὶν ἰσὺς πολλῶν τοῦ στήθους, κατὰ τὴν ἀριστερὰν ἐπιπροσώπων, κατὰ τὴν δεξιάν ἐπιπροσώπων, κατὰ τὴν ἀριστερὰν ἐπιπροσώπων, κατὰ τὴν δεξιάν ἐπιπροσώπων.

Tota verò sterni figura similis ensi existit; Ideoq; id nonnulli ensiforme nuncupant. Quidam autem non totum, sed solam in extremo huius positam chartilagine sic nominant. Costarum verò non vnã; neq; simplex figura est. Namq; post dearticulationem ad vertebra in anteriora, superiora; inferiora prolata; multumq; sic progressæ rursus sursum ad sternon recurvantur. Harum totum non os, sed chartilago est.

## COMMENTVM QVARTVM.

**D**VO sunt, quæ supra dictæ, hoc est ensiformia, siue gladijformia nuncupantur: Alterũ quidem totum ipsum sternon vnã cũ sibi adiuncta mucronata chartilagine: Alterũ verò ipsa in eius extremo adnascenti sola chartilago. *ἵππος* enim ensim, siue gladiũ significat; atq; ipsam aliquando totum mucronẽ, hoc est ensis extremã aciem. Quatenus igitur ensim, siue gladium significat, pectoris ossis, sternone toti cum ipsã etiã chartilagine sibi coniuncta congruit. Quatenus verò mucronem præfereit, soli chartilagini conuenit. Totum igitur sternon epimem præfereit: Siue igitur, secundũq; os ex seipset, sexue ossibus coalescentibus effecta, manubrij loco sumptimur, extremum eius iugã cũ chartilagine, pro incidente ensiformi ferro capiuntur (prout doctissimus Velalus enucleauit) siue primum os cum solo simpliciter sumpto secundo, manubrij loco accipiuntur; reliqua verò vnã cũ extrema chartilagine pro ipso ensi intelligentes (veluti nobis magis artidet.) Chartilago autẽ, quous modo prædictũ os sumptimur perpetuò in homine ensis mucronem præfereit: nisi bisulcus sit, penitendẽ in seculũ esse consuevit: idcirco rectũs sternon ensiforme nuncupandũ. Chartilago autem, mucronata potius in ipso homine dicenda venit. Nonnulli ex Barbaro latinis scutalem, seu clypealem vocant, quoniam in inferiori scuti, seu clypeis extremo similis quoq; est. (Porro ipsum os pectoris siue prout alibi, *m. Galenus* idem inquit) cur quidem ex multis ossibus factum sit, in memoriam rediẽt eius, quod de sinistram manu inueni secundi horum cõmentatorũ eõs ipsi sumunt. (propter distinthiam scilicet, scilicet horũ, motũ eorum, quæ ipsi coarticulantur.) Cur autẽ ex septem numero, costæ ipsi coarticulatæ sunt causa: nam singulis ipsis singula pectoris ossa respondent.] Quibus octauum (vbi prædiximus) adde, quod mucronatæ chartilaginis fundamentum esse debuit. Est autem sterni vñs, vt septem costis legitimus, verũq; nũcupatis, quæ scilicet orbiculatam vniuersam thoracis anteriorem, seu manus dicere pectoris, amplitudinem efformant, stabilimentũ sit; ac interiorum partium, præcipueq; cordis, & pulmonis propugnaculum sit. Vnde *ἵππος* dicitur *ἄρθρον τῶν ἑπτά ἐστὶν*, hoc est, si in similitudine; *κατὰ τὸ ἑπτά*, quod est firmum, & *πλεονεχίᾳ τῶν ἑπτά* dicitur *ἵππος*. Sed de sterno, eiusq; nomine, & vbi prædicta hæc intantum sint. Ad costarũ ergo legitimariũ figuram transecdamus. Non simplex enim, nec vnica earum figura est (vt rectẽ Galenus hic inquit) sed post dearticulationem, quam ad vertebra duplicem, vt in pluribus, vel in postremis simplicẽ habuerunt, in anteriora simul, in inferiora; feruntur, multumq; sic progressæ tandem sursum iterum ascendentes, ad sternon recurvantur, ibiq; (vbi prædictũ est) cum sterni ossibus coarticulantur. Quæ quidem omnia facta exarẽ in tribus iam iam propositis figuris conspici possunt. Subd. tẽ; demũ Galenus dicens. Harum totũ, intellige quod sursum recuruatũ ascendit, nõ os est, sed chartilago. Quam sententiã libro de anatomicis administrationibus octauo. p. clariorẽ Galenus ab eõ, sic scribens ( Hinc autem ( scilicet à duplici de artibũ, quam cũ vertebra; retrò habuerunt ) in priorem, infernamq; regionẽ longius oblique procurunt, & cum

iam antennis fuerint, ab hac latione cessant. Desinunt etiam hac ossæ esse, ac reliqua ipsarū pars in minutionibus natura animantibus chartilago prorsus efficitur: In maiori bus autem, si ossæ chartilaginé ipsam dixeris, nihil erit peccati. Et hæc chartilago nõd ubi initio costæ ex toto porrectæ sunt deorsum vrsus obliquè, hic & ipsa desertur. Sed contra illa verū sursū ad pectoris os portendit, nõnullis quidem animantibus magis in orbem, alijs veluti ab angulo trianguli. At quæ ad pectoris os nõ pertingunt, nothæ Græcè appellantur, q; d; spuris, & illegitimis. Totæ autē chartilagines admodū existunt, multo magis ipsarū finis nõ chartilagineus, sed chartilago exquisita cœnicitur. Ex huius autē chartilaginis partibus intamis septū trāsueris in ducta originē. Elator & demissior sparsæ adhærescit: in medio maximè, qua sedem anteriore vertebrarū conscendit, simul expanditur deorsum versus per duō ligamentā valida imis vertebris iniectū.] Hæc tandem Galenus de nothis costis, è quorū legitimitate terminis in chartilaginem degenerātibus seipsum transfusum originem sumere dicit. Cui sententiæ conformē est quod hic statim subdit, dicens.

TEXTVS QVINTVS.

Αἱ δ' ὀστέων στήθεος καλέσται τ' ὀσθα, συμφορεῖται δὲ πρὸς διαφύρασμα, καὶ ἀλλήλων ἐπὶ ἀκροῦ τῶν ὀσθῶν χεῖρα, καὶ ὀστέων μὲν κατὰ φύσιν, καὶ ὀσθῶν δὲ κατὰ νόσον, καὶ ὀσθῶν ἑκαστοῦ ἐπιπέδον ὅσον αὐτοῦ

Quæ autem superiunt quinque, nothæ quidem appellantur. Coalescunt verò tùm septo transfuerio, tùm sibi inuicem, in exquisitam chartilaginem desinentes. Postrema autem sola in ipsarū sine ab alijs seccatur, ac re vera notha est.

COMMENTVM QVINTVM.

**N**ON temere Galenus inquit, de nothis costis loquens, quin exquisitam chartilaginem desinētes sint. In illis enim septē costis quanas chartilagines (hominis erit adhuc tenella) existant: In natu tamen maioribus exquisitæ chartilagines non sunt: sed vel chartilagines ossæ, vel ossa chartilaginea. Quinimodò ad senectutē accedentibus in exquisita ossa degeneratè summopere durescētia solent. In homine inquam, cæteris enim paribus, quoad ætatem attinet, semper chartilaginea magis, tenerioriq; substantiæ ossa hæc existunt, quam in simijs, canibulq; , ac alijs animalibus. Eoq; teneriora sunt, mollioraq; , quò inferiora magis existunt: præsertimq; , aliæ quinque, quas nothas, hoc est spurias, illegitimasq; veteres nuncuparunt. Vel quia totum vndiq; thoracem minimè cõplectuntur, tanquã à vera costarum magnitudine degenerantes. Vel quia magis chartilaginea, quam ossæ sunt, à vera costarū substantia declinātes. Notha enim ea omnia nuncupare solemus, quæcunq; aliquo modo à propria, veraq; natura, seu magnitudine alicuius instrumēti degenerant. [ Sed quam ob causam ( inquit alibi. q. Galenus ) chartilago multa costarū notharū vnicuiq; extremitatē est circumsusa? An quò tutiores essent ab iniurijs primū, ac potissimū hæc ipsæ costæ, tùm per eas corpora subiecta? Nam contusa chartilago minimè cõminuitur, ac frangitur. Vnde satis sunt partes ossium promissioniores ex tali esse substantia. Ob eam igitur causam & ad partem ossis pectoris vltimã chartilago, quã ab ossis similitudine *χρῆσιμῶς* appellant, adhærescit. Quam certū est propugnaculū esse ossis ventriculi, & partis septi transfueri, quæ illic est, iam autem & cordis.] Ex his igitur, quæ præstensa iam ex Galeno sunt, patet, notharū costarū, cur nothæ faciant, potissimã causã fuisse, ipsius septi transfueri originē cū ( vt cõmentio sequenti videbimus ) obliqua eius ongo, ac positio esse debent: secūdã autē naturalū membrorū libera operationes. Dicit autē in calce Galenus hic, potissimã ab alijs in sine secretã esse. Nothæ enim costæ cū ad sternon pertinere nequeat, sibi inuicè adherēt, colligaturq; præter vltimã (quinimodò interdū quoq; huiusmodi est vndecima) quæ ab alijs separata solum septo trāsuerio colligatur. Verū ennumerò cū de costarū omnium chartilagibus sermo factus sit, earumq; chartilaginis moles, longitudinēq; costarum molem, longitūdinemq; sequatur. Eapropter de ipsarū costarū longitudine statim Galenus subdit, sic dicens:

TEXTVS SEXTVS.

Τὸ μῆκος δὲ τῶν τῶν ὀσθῶν, ὅτι τῶν ἀλλῶν κλειστόν ἴσον ὀστέου ἐστίν, ἀλλὰ τ' ἐκείνηται καὶ κάτοπι θραξὶ περι τουχῆσιν ἴσον μακρῶταρ δὲ αἱ μῆκος.

Longitudo autem neq; his, neq; alijs costis æqualis omnibus est. Sed supernæ quidem, inferæq; breuiores sunt, mediæ verò longiores.

Quare dicitur nothæ ratio duplex. q. 7. de vsp. cap. 11. post princ. Dubium. Responsio.



**E**ANDEM habet sententiâ Galenus libro de anatomicis administrationib<sup>9</sup> cap<sup>o</sup> 1. sic dicens [ Octaua ad radicem chartilaginis, quæ in mucronē glandij modo exacatur, confitit. Reliquæ verò quatuor in thoracis latera de sinunt, tantū priori parte deficientes, quanto etiã alijs breuiiores sunt. Minima inter ipsas est quæ postrema habetur. A lig<sup>o</sup> enim singulari, pro situs ordine, quantum longitudine vineuntur ab elatiore, tantū humiliore in superant. Prima igitur, duodecimaz; omnium breuissimæ costæ sunt. His successiue longiores sunt secunda, & vndecima. Quæ omnes breues proportionabiliter habent chartilagines. Quò enim longiores costæ sunt, eò longiores earum chartilagines eoadunt. Sequuntur igitur tertia, & decima: Quartaq; & quinta, vnaq; etiam nona. Longissimæ igitur omnium remanent sexta, septimaq; & octaua: pariterq; earum chartilagines. Nec longitudine tantum costæ, chartilagineq; earum differunt, sed etiã latitudine. Primæ enim costa omnium amplissima est; licq; & eiusdem chartilago: succesiueq; pariter ad duodecimã vsq; tam costæ, quàm chartilaginis eius latitudo minuitur. A deò vt omni tenuissima costa sit, chartilagisq; ipsa duodecima: Quinq; autē costarum spuriarum chartilagines in capitulum minimè (vt septem superiores) desinant. Cùm articulat ad nullum sinum debeant. Sed in acutum mucronem terminantur. Verum de thoracis partibus dictis ex Galeno hæc enis sit. [ Iam verò quid aliud, nisi admirabile in primis hoc opus naturæ est? Inquit idem alibi p<sup>o</sup> sic scilicet necq; ossium totū, necq; carnosum thoracem efficeret, sed os, & musculum vicissim poluerit: tamen tū quidem epigastrion ex musculis, cranium autem ossium factum est? Quæ propter hoc non obiter est consideranda, quòd eum tunc existit principia, quæ animal ipsum administrant, os quidem immobile sine musculis primo principio circumiacet. Solos autem musculos tertio elargita est: At medio inter utroq; posito & ossa, & musculos. Cerebrū namq; in nullo vsus musculis indiguit. Ipsum enim in omnibus animalibus motus voluntarij alijs partibus est principiu. Quò sit, & vt cranium immobile, quò illi anarus ipsi iure sit circumdatum. Quòd si hepatis; aut venterculo septum eius generis aliq; quod in orbem fuisset circumfusum, vbi cubus & potus exciperetur? Vbi factu molis recònderet? quò deniq; excernerentur superflua? si nullus eis præfret musculis? Quod autem ad thoracem attinet, motum penitus amittet, si ex solis ossibus factus fuisset. Sin verò contrà ex musculis solis; incidere thoracem cordi, nemine eos expellente. Vt igitur simul quidē capietas quodam iates esset, simul autem totum in fructum moueretur; musculi ossibus alternatim fuerint interpositi. Quæ etiã res ad cordis & pulmonis securitatem in momentum habet non mediocrè: Magni enim nunc muniantur, quam illi soli musculi facti fuissent. Quòd autem ossium quòdā, non fuerit ossium, sed vtrinq; quò facile per ea totus thorax moueatur, articulum habeat, quo pacto ad id probidentur indicat? At forte querat aliquis: quid tandem obfuisse, si venter ita habuisset? Nam si thorax et fuisset circumdatus; cuiusmodi cordi etiã est circumiectus; penitus similiter & contrahendo; & extendendo conseruaretur; maiorq; securitas ei accederet. Hæc dubitatione detentus docendus est, fieri non potuisse, vt venter plurimum dilataretur, ac eò primeretur, si e vtriusq; ossa ei apta posita fuissent. Nam si ita fuisset, primū necq; fecerit concipere, deinde ne semel quidem ad turritatem comedere homines possent: sed vt respiratione còtinua, sic esu assiduò indigerent. At illa quidem indigere, nò est adeò absurdū, animali præsertim in aere degenti. Cibis verò si similiter ageremus, vana nostra a musis, ac philosophia esset admodum aliena, & pulcherrimis rebus non vacaret. Atq; vt hoc quoq; ceteris adiciam, quem ex respiratione fructū percipimus, is durturnus esse non potest. At cibo, ac potu semel impleri, diem integrum, ac noctem sine molestia perduramus: vt eò nomine admiranda etiã fuerit natura. ] Hæc Galenus. Quibus ex verbis, propositiq; dubij solutione ratio duplex elicitur: Cur scilicet quinq; inferiores costæ nòthæ sunt, hoc est, imperfèctæ anteriorem circuli partem minimè claudentes. Prima enim est propter fetus conceptionem: vt scilicet incrementum cum sua extensione vterus, contineret; abdomen recipere, contineretq; ac còseruare queant: suaq; deinceps còmpressionem illum tempore partus expellere promptissime queant. Secunda vero propter cibi, ac potus copiosiores vnica vice recipiendi, abdomen etiam extensione, quantitatē, simulq; sua contractione facilem, vbi opus fuerit, propellenda eorundem excrementa: Propter quam excrementorū expulsionem, tanquā tanta ratio addi potest, ipsius septi transversis obliquitas. Necessaria enim hæc (Galenus docente .i.) fuit, vt veluti manus altera abdominis musculis tanquam alteri manus opposita, simul còmpingentes, nò excrementorum modò, sed ipsius etiã fetus expulsionem adiuent. Reliquæ est, vt ea simpliciter, quæ in alijs quoq; capitibus supere còseruimus. Quòd tēperamentū igitur, nò opus est eadem toties frustra repetere. Cùm aliorū omnium ossū instar frigidū, securūq; ac terrèstre sit. Quamuis chartilaginosiora eò minus sicca, & aqueq; substantiæ plus admittit habentia sint, quò magis ab

r. Cap. 1.

Dubium.

[ Cap. 11. post mod.

Cur thorax nec totus ossium, necq; totus musculis.

Responso. T. Vide etiã p. de v. p. 6. l. 2.

Dubium.

Responso.

Cur quinq; costæ inferiores nòthæ.

Vnde dicitur in cap. 1. de v. p. 6. l. 2. Digressio. Tempore partus.

Vitæ quæ  
mor.

1. 2. 3. 4.

¶ Com. 1.

Magnitudo.

2. 1. 3. 4. v. p.

cap. 4. circa

finem.

7. Cap. 4.

huius com.

a. in princ.

Numerus.

Figura.

Substantia

formæ.

Forma.

Codorum

substantia.

amidiæ

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

Signi.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

ossium natura deficiunt, & ad chondraginis substantiâ magis accedunt. Vt autem totius thoracis primus est, ut eor ipsium, cuiusq; ratione pulmonem comprehendere, tractariq; Secundus ut respiratione illud idem, cuiusq; tanquã fontis prius, ac deinceps vnuerſi corporis calidum innatum euentando conferuaret. Tertius verò est vocis efformatio, vñ phrenitid, deficiente enim respiratione, vocem necessario demit, cõpertusimã est. Quartus tandem vitus eius sequenti capite cõcedus \* est, vt firmâdis, stabilitiq; scapulis, periq; eas brachij, totiq; manibus necessario conferat. Thoracis magnitudo iuxta quatuor scopos à Galieno mentio præscriptus. 1. & à nobis iam antea prædictos. 2. diuersificatur, vocem scilicet, respirationem, cordisq; ac pulmonis magnitudinẽ. Partis numerus ab initio statim huius capitis præostensus iam est. Veluti figura ex præscriptis in præsentem etiam capite clarissima est, cum his, quas de dorſi vertebris capite dictâ delectata iam sunt. Corpora verò ipsius substantia secundum diuersas partes diuersa est. Sterna enim substantia admodum fungosa est, molliq; , ac tenuis densiore squama, cornuque munita; posterior autem, interius perforata magis, multis quidẽ, varijsq; foraminibus, maximeq; in primo ossẽ, propter valentiam duntaxat ingroſsum, ad ossis nutritionem, cõtactiq; cõseruationem. Costarum verò substantia cõmunis omnibus est, partim ossis, partim chondraginosa. Osses quidẽ solidiores, durioresq; tantò magis, quanto ad vertebras magis accedunt. Anteriorum autem ad chondraginosem, quanto inferior costis est. Intus leues epistilæ omnes sunt, ne succingentem membranã sibi asperitate legant. Exterioris autem, gibbosq; ipsarum parte, quantum plurima carũ sedẽ liquet quocq; sint, ne supergredientes inuicem quã sua asperitate pungent. Parte tamen, quã costis vertebris alligantur præsertim ubercula, quibus cum vertebris dearticulantur, asperæ etiam sunt; vt apud inde ligamẽta eductantur, inuicenturq; costas necnisi per vertebras colligant. Inferius autẽ omnibus costis sinus quidam vena, arteria, etiamq; , ac neruorum recipiendorũ gratiã dedit sunt. Adeo vt prædictis hisq; sinus, quocostis emittunt, scilicet quantum viginti. Quamvis in primis tribus costis, tribusq; inferioribus quam magna tales existant. In primis quidem tribus, ob valentiam paruas quocq; costas nutriendi prædictatam. In tribus verò inferioribus, ob costarũ tenuitatem, de pressionemq;. In medijs autem costis, ob vtriusq; oppositum, scilicet in ob valentiam, tum costarum magnitudinem eũdemq; modum sinus existunt. Sed ac perforatam quã costis eorum longitudinem sinus quocq; hi celas sunt; ac ea præsertim sedẽ, quã primũ a dorſi vertebris abscedunt, & in thoracis latera ferri iam incipiunt. Sinus autem, quibus posterioribus cum vertebris costis dearticulantur, proprijs quidẽ vertebris quatuor vtriusq; videlicet primæ, decimæ, vndecimæq; , & duodecimæ vertebrarũ (vt antea iam diximus. 2.) quibus sunt octo. Cõmunes autẽ aliarũ octo intermediarũ costarũ vtriusq; simul numero sexdecim. Adeo vt si ut eam octis prædictis numero simul omnes quatuor, & viginti, sin verò speciatim singularũ vertebrarũ in oculos sinus perpendimus; tunc dimidiũ sinus sexdecim vtriusq; simul omnes erunt viginti duo. Quisq; proprijs iam iam prædictis coniuncti cundẽ esse dici poterunt quadraginta. Quamvis inter hæc viginti sinus laterali procedunt (vtriusq; scilicet decem) vel ad minus duodecimum, quibus secundum dearticulatione costarũ cum vertebris fit. Verũ eniuverò quã ad tyrones hæc ferbãtur sic consuetudinem illis huius induxerimus, quibusdã alijs speculationibus omissis, ad alia ossa pertranſimus, scapulamq; iplo etiam cum Galieno perpendamus, quom sic subdit.

Περὶ τῶν σκαπυλῶν Κεφάλαιον. 17.

De Scapulis. Caput Tertiumdecimum.

TEXTVS PRIMVS.

Scapule sitz quidẽ post thoracem sunt, coaliscunt verò per mulsulos cum occipiti capiti ossi, tum spinee spinæ, thoracisq; costis, necnon ossi, quod gutturi præpositum est.

COMMENTVS PRIMVS.

EMPHASTIVVM. scapule est (in quod idem alibi Galenus. 1.) iam scapulae partes explicare, ostenderet, in illis quocq; artem nature. Quod si eas ex animali exemplis quom fixeris, nec, amplius esse, nullam rationem inuenies, quã huius articulum constituit. Nam necesse est monstrare, si brachium erat futurum, ipsius caput camp tatem ingredi, cuius cõditus gratia & ceruix scapularum est eorum, & quædam in eius extremitate insculpta est capacitas magnitudine tãta, quãta capiti brachij dearticulando esset aptissima. Hæc

quidem

quidem vigltis prima est, ac maxima propter quam natura fecit scapulas. Ex abundanti autē alia  
 quedam accedit, nec ipsa quidem exigua partium thoracis, quæ illic sunt, custodia. Nam partes  
 ipsius anteriores tuemur multò ante quæ nocitura sunt, providentes. Aut prius cedendo: vt om-  
 nino eius, quod contra nos sese infert, impetum declinemus. Aut propugnaculum aliquod ante  
 pectorale os opponēdo. Aut in manibus arma quedam sumendo. Plerumq; autē solas ipsas, vel nu-  
 das periculo quærimus, satius esse rati ipsas parte quavis vulnerari, aut frangi, aut cõteri, aut ab-  
 scendi, quàm sinere noxam ipsam pectorali ossi accidere. Ipse enim thorax respiratiõnis est instru-  
 mentum: quemadmodum & pulmo, qui in eo continetur. Cor verò totius vitæ est principium. Pericu-  
 lum igitur imminēbat, sicubi hæc læsa fuissent. Et partibus verò posterioribus periculum quidē  
 erat æquale. Verum cum illic oculi non essent, prævidere æquè quæ erant nocitura non potera-  
 mus. Oportuit igitur hinc naturam æquam ingeniosum quoddam artificium excogitare, neq; loca  
 hæc prostratis negligere. Quocirca primùm quidem quasi multiplex vallum quoddam spinæ spondy-  
 lis infixit, multos illos processus, ac varios extendens: Partes autem, quæ ab utraq; spinæ parte ad  
 costas sunt, scapulis quidem primis, ac præcipuè, deinde verò carniū multitudinem testat. Hæc  
 percellit Galenus: pro quorum cõfirmatione, id quod indies experimur addere hic minimè gra-  
 uabimur. Quàm felicitè quidpiam vel incidens, vel percussiens, siue contundens, vel quomodo-  
 libet alter offendens ad caput, siue pectus irruere periculum aduerterimus. Statim enim per pectoris tu-  
 tela reuoluto corpore scapulas offerimus, ac si clypeum aliquem proponeremus. Pro capitis autē  
 defensione, manibus & brachijs saltem occurrimus: In scapulis ibi, in manibus autē, brachij sic  
 hic damnum potius inferendum eligentes, quam in thorace propter cor, vel in capite propter cere-  
 brum. Quemadmodum si in ventrem inferiorem irruere periculum aduerterimus, propter hepatis  
 nates, corpus totum recolligentes, offerimus: vt ossibus nudum venter operiamus. Id quod totum  
 à natura, siue potius ab ipsa anima fit, partium visus, ac momenti, & pericula prænoscenti-  
 bus. Duobus autem prædictis scapulari visibus, partium succedit. Qui est, vt nouem ab eo musculi ori-  
 ginem sumant: ipsiq; suffulciantur, ac stabiliantur: quinq; in quibus brachij motores scilicet secun-  
 dus, 3. tertius, 4. quintus, 5. sextusq; 6. & septimus: 7. Itemq; cubitum mouentes primus, 8.  
 ac tertius: 9. præterea hyoidis ossis proprium quartus, 6. & thoracis demq; secundus. Hi enim  
 omnes à diuersis scapulæ partibus originem, suamq; principium sumunt. Brachij namq; motorem  
 secundus, non ex media modo claviculæ parte, sed etiam ex superiori scapulæ processu, siue acro-  
 mio, totaq; eiusdem spinæ principium ducit. Tertius verò ex inferiore scapulæ basi angulo parum,  
 multum verò ex inferiore eiusdem costa, laterue inferius originem sumit. At quintus à scapulæ  
 eiusdem basi exiens, totumq; eius sinum replens, qui est inter superiore scapulæ costâ, eius-  
 demq; spinam, vsq; ad scapulæ ossi coanatus est, vt ab ipso tota sinu enacti dici queat. Sextus  
 quoq; concavam, internam scapulæ partem explens ex totius scapulæ basi originem sumpsisse  
 dicitur, septimusq; tandem scapulæ vniuersum gibbum sub ipsius spinæ cõstis implet, ex eius  
 quoq; basi principium sumens. Præter hos brachij quinq; cubitum flectentiū primus duplici prin-  
 cipio à scapula exoritur: Altero quidem à superiore superie huius acetabuli sede: Altero verò  
 à tota inferiori sede, apicèq; interioris processus originē ducens. Sed & alter cubiti motor quoq;  
 muscululus est, extendentiū videlicet primus, sed ordine interim tertius & humiliore scapulæ  
 costa, laterue prope ceruicem eiusdem exiens. At quid de hyoidis ossis propriorum quarto mu-  
 sculo dicendum? qui ex elatioe scapulæ costa, iuxta ipsius ceruicem, ac interioris dicti processus  
 radicem enatus est? Demumq; de thoracis motentiū secundo; qui ex tota scapulæ basi internus  
 exoritur? Nouem igitur prædicti musculi ab ipsa scapula secundò diuersas eius partes oborti  
 tum eius vsum præferunt. Quorum beneficio (vt ad Galeni contextum cõuertamur) tum ipsius  
 thoracis costis, tum ossi, quod gutturi præpositus est, hyoidi nuncupato coalescit: necnon & ipsis  
 etiam humeris, cubitiq; ossibus (quæ Galenus hic omisit.) Cum thoracis inquam costis octo, &  
 interdum nouem quoq; superioribus, prædicti thoracis secundi musculi beneficio. Cum in illas  
 octo, vel nouem superiores costas inseratur. Neq; his solis costis per musculum coalescit scapu-  
 la: sed cum quatuor quoq; aut interdum quinq; videlicet secunda, tertia, quartaq; & quinta,  
 aliquandoq; etiam sexta, per primum eandem scapulam motentiū musculum: 7. à quibus scilicet  
 costis originem sumit. Præter hæc verò cum occipitis ossi coalescere prius dixerat, per se-  
 cundum 9. inquam eiusdem scapulæ motorem musculum. Quid quòd cum spinæ apicibus etiã  
 vniui musculorum beneficio protulit? Intellige quidecim vertebrarum spinæ apices: videlicet  
 omnium ceruicis, quæ septem sunt: thoracisq; primarum octo, eiusdem secundi scapulam ean-  
 dem motenti musculi beneficio: à quibus omnibus vertebis principium suæ originis assumit.  
 Quemadmodum quarti 9. suorum quoq; motorū musculorū opem, cui infernis quatuor ceruicis, alijsq;  
 etiã quatuor, aut interdum quinq; primis thoracis vertebrarū spinis coalescit. Cui lateralibus verò  
 processibus primæ, terciæ, quartæq; & quintæ vertebrarū ceruicis, tertij 8. musculi ope copulatur,  
 coalescensq;. Est igitur talis coalescētia per fissuriosam facta: quemadmodum supra .b. satis, si perq;  
 com. 13.

primus  
 ab ipso  
 totum  
 vniuersum

Vniuersum

§ tab. 4. #

5. 7.

tab. 13.

S. 12. R.

tab. 12.

N. 13. X.

tab. 7. T.

8. N.

tab. 11. T.

tab. 6. O.

tab. 11. f.

tab. 5.

R. 5.

X. tab. 3.

4. 0. 0. 0.

tab. 11. T.

tab. 14.

tab. 9.

tab. 9.

tab. 10.

tab. 10.

tab. 13.

N.

b. in proc.

com. 13.

198  
 declaratum à nobis est. Sed alia Galeni verba contemplemur; quibus de admiranda partis ipsius  
 scapulae inaequalitate, ac difformitate loquitur, sic dicens.

TEXTVS SECVNDVS.

Ἐπίσης δὲ ἐστὶν ἰσότης. καὶ πλεονεξία μέρος ἀνάγει, κατὰ τὸ γὰρ ἔξωθεν, ἵσθηται δὲ ἄνευ καὶ κατὰ τὸ  
 κῆρυ γὰρ αὐτῆ, καὶ ὑπερέχει; τὸ δὲ ἐν ἄνω μέρος παρέρχεται, καὶ μακρῆ, ἐπιλείπει δὲ ἄνω ὄμοσθα, καὶ ὑπερέχει, καὶ  
 ὄμοσθα τὴν ἰσότην δὲ τὸ ἐξῶθεν τῆς ἰσότητος καὶ μακρῆς ἠρραξιμένη, καὶ τὸ ἔξωθεν ἰσότητος  
 ὄμοσθα, συσπῆρται δὲ αὐτῇ καὶ πλεονεξία.

Inequeles autē satis superq; sunt, & omnibus suis partibus diffimiles. Gibba enim foris: intus  
 verò simp. Tenuisq; harū ima basis, ac longa. Superior autē finis crassius, paruusq; est. Superilli-  
 nit verò has multas in locis chartilago, plurimaq; basim. A qua exordiens humilior pars paulatim  
 adaugetur, donec ad acromij locum ascendit: ibiq; huic clauis coarticulatur.

COMMENTVM SECVNDVM.



ADMIRANDAM diximus partium in scapulae inaequalitatem, difformitatemq;  
 cum ob diuersos vniუს quelibet pars maximo artificio, incredibiliq; industria diuer-  
 simodè constructa sit. Quauis autē multa circa scapulas consideranda, plurimiq;  
 in partibus earū differentisq; perpendicularē veniant; Galenus tamen hic quinque dū-  
 taxat diuersitates declarat. Quarū prima quidem est inter partes internas, ac teno-  
 resque, ac externas, siue postiores; gibbas esse dicens externas: internas verò simas. Secunda  
 verò ponit differentiam inter imam basim, partēque inferiores, & superiores, vsq; ad ipsam ceruicem,  
 acetabulumq;, quo cū brachij capite coarticulatur. Tenuis enim ima basis est, ac longa: superior  
 verò extremitas crassa, & parua, seu breuis. Quibus ex verbis duplex eligi differentia potest.  
 Altera quidem quoad tenuitatem, & grossitiem: Altera verò quoad longitudinem, & breuitatem,  
 siue paucitatem. Sed cum inter easdem partes inferiores, superioresq;, siue ideo pro vna ponentes  
 nos, secundam differentiam statuimus. Tertia succedit quoad chartilaginem. Plures enim partes  
 chartilagine incurrentur, vt quae totam ipsam circumant: Quaedam verò ea desistiuntur: quae scilicet  
 in medio sunt: haec; pauciores. Quaedam interea multam habens chartilaginem: vt basis,  
 presertimq; ad inferiorem eius angulum. Addeq; tu, & acetabulum ipsam, quod hūmori caput  
 in se recipit. Plurimam namq; chartilaginem in se habet, ad iugendam ipsius cavitatem. Quarta  
 differentia est, quoad ipsius spingē partes. Inferior enim eiusdem pars angustior est: paulatim verò  
 magis, ac magis dilatescit, quò magis ascendens ad summū humeri, Graece ἀκρόμιον dictū, per-  
 uenit. Quinta; demū differentia colligitur, quoad acromium in ipsam, & alas partes. Acro-  
 mion enim cum clauicula: velut acetabulum cum humero articulantur. Quauis acromion per  
 synarthrosim, illud verò per diarthrosim, copuletur. Ideoq; in articulationis modo ab acetabo-  
 lo acromion differt, ab alijs verò partibus quoad articulū simpliciter. Cum ex alijs partibus nulla  
 patiatur articulū. At exquisitis singulas has differentias enunciate aggrediamur, à prima trior-  
 dientes. Scapulae igitur figura tamenū inequalissima est, largius tamen eam perpendicularē, ad trian-  
 gulem reducere anato-  
 mes professores nō temere  
 consueuerunt. Cuius latus  
 primū ceteris longius, basis  
 dicitur, in prima, secundaq;,  
 & tertia figura, à litera Z.  
 vsq; ad Y. per X. notatum.  
 Secundum verò latus huic  
 oppositum, longitudineq;  
 minus, inferiusq; latus nū-  
 cupatū, à litera B. ad Y. in  
 secunda quoq;, ac prima fi-  
 gura designatū. Tertium  
 deniq; omnium brevissimū la-  
 tus, siue costa est, superior  
 latus appellatū, in prima,  
 secundaq; figura à litera Z. per F. ad A. denotatū est. Adeo vt triangulus scalenus dici queat: qui  
 scilicet trium inaequalium laterum sit. Pars autem quae thoracis costas respicit, anterior dicitur,  
 interiorq;.

Partium  
 scapulae di-  
 versitates  
 quinque.

Differentia  
 prima.



interioris; & quam prima figura præferret. Hanc simam esse, siue cõcauam rectè Galenus ait, mixta quædè summi opificis industria; tum scilicet, vt aptè costarũ cõuexis responderet quocicunq; quæst: tum secundo vt præter offensam super illis moueri possit: tum tertio vt brachij motuorum musculorũ sextus cõmodam sibi sedem nancisceretur. Ideoq; leuis quidè hæc pars est. Pars autè scapulæ exterior, posteriorue, quam secunda figura representat, gibba est, quò extrinsecus occurrentibus iniurijs terendis ac cõmodatior sit. In cuius nõ media, sed tertia propemodũ parte processus quidã est, à basi exordiens in acromion densiq; terminatus, spinam vnã referens: quæ quidẽ in duas sedes totam gibbam partè fecerunt cauitates quãdam præferentes. Quarũ superior quanto, & inferior autem septimo .*A*. brachium mouëtibus muscularis, siue rectius dixerimus circumuolutibus locũ præbeant. Non tamen igitur veteres anatomici partem hanc anteriorem, posterioremq; dorsum, cuiusq; distũ processum spinam nuncuparũt, cum ad spinosum dorsum minimè negligendã similitudinem habeat. Velut autem figurarũ hæc propõsitãrũ prima partem scapulæ internam, a anteriorem: Secunda verò externam, posterioremq; ostendit: Sic tertia in latum depictam eam exprimit: præsertimq; vt gibbæ partis sinũ præferret, qui inter scapulæ spinam, & elationem eiusdem costam, latius repositus est. Secundam scapulæ partiũ differentiam, difformitatẽq; subiuuat Galenus inter basim, parteq; inferiores, ac superiores. Tenuis enim, ac longa, prolixaque basis necessariò fuit. Tenuis quidem ne thoracis costas nimium, inerdq; pondus præbens, animalis tergo deformatem quoq; præter necessitatem induceret. Sufficiens enim grossities fuit; trium prædictorũ brachij musculorũ sustinendorũ gratiã. Oblonga verò, latiq; basis eadem fuit: tum vt maior, amplioq; costarũ de cõsensio ad secũdũ scapularũ viũ pertinens fieret: tum propter cõmodam, minimeq; impeditam, sed distũctam prædictorũ musculorũ sustentationem: tum tertio propter amplum quoq; principiũ musculi thoracis secũdo .*A*. præbendum: quæ duos vitia à ad tertũ scapularũ viũ spectabant. Superius autem in angustius procedere necessũm fuit, tum propter primũ viũ, vt in ceruicem prius, in dõq; in humeri acetabulũ recipiendi humeri capitis gratiã recolligatur, cum quo dearticulãri propter brachij motum oportebat: tum secundo propter tertium viũ, vt videlicet musculi tres prædicti, scilicet quintus, & sextusq; .*A*. & septimus .*B*. humerum circumducentes in suos tendones cõdecenter attenuentur, idõq; in crassius enĩ propter maius robur arctando procedat. Sed ne in his quidẽ solis partibus quodã crassitudinem: sed in tribus quoq; trianguli lateribus diuersam perpendere, pulchrũ est. Quauis enim tenuior ceruicẽ longissimã basis ipsã existat: crassior tamen superna eiusdem scapulæ costa trium costarũ breuissima exsistente est. Cũ hæc nulla indigens crassitudine, aut pondere, sed leuitate potius, intõriũ quinto, & sexto musculis oportunus cedore dõberit. Omniũ verò crassissimum latius inferius, longitudoq; interea medium est. Talem, tãtamq; crassitiẽm adeptum, tum vt inferiori partè ceruicem, cuiusq; dearticulationẽ maximè sustinenti robur adderet, tum vt duas cauitates (internam inquam pro sexto, externamq; pro septimo brachij rotatoribus muscularis) adaugeret: Tum tertio vt inferius propè scilicet inferiorem scapulæ basim angulũ externam sua sede tertio .*A*. brachij musculo sui principij maiore partè præbeat: Superius autè propè ceruicem, interna sui sedè cubitum extendentiũ primo .*A*. totam originẽ exhibeat. Sed tertij contempnemur differentiam à Galeno hæc subiunctam, quodã cartilaginæ scilicet existentem. Plus enim minusue in eptere partibus est: sed in basi plurimam esse os sublinentem, maximãq; circa inferiorem basim angulũ inuenimus. Quæ nihilominus cartilago in homine, quã in quadrupedibus omnibus, seruata intem in eptus proportionẽ, ac etiã magnitudinẽ, breuior, minorq; existens: mollior præterea inuenitur, quã ea, quæ articulandis ossibus incrustatur. Sed eius cartilaginũ generis est, quæ multis ossibus nulli alteri ossi cõmittẽdis adnasci solet. Durius verò his est alterum genus, quo ceruicis acetabulum, supercihaq; (sinuũ aliorũ articuloũ instar) incruantur. Quartam deinde differentiam addit Galenus ad spinẽ ipsius scapulæ partes antèntem. Duo namq; cũ sint effatu digni scapulæ processus: alter quidem superior, exteriorisq; Alter verò inferior, interiorisq; Superior quidem à scapulæ basi nõ dimidia, sed tertia propemodũ parte, quæ scilicet minor appendicis ipsi adnascitur, in prima, secũdãq; ac tertia propõsũ signis litera X. designata. Posteriũ in quã scapulæq; in dorso sensim magis, magisq; in altum aufertens, dilatensq; ad ceruicem vsq; iam accedens, scapulæ dorsi spina hucusq; nominatur. Inde autem in homine, ac simijs, alijq; perpaucis quibusdã animalibus clauicula donatis à scapulæ dorso abscedens (in alijs enim ibi terminatur) nomen aliud lucretur. Non amplius enim spina dicitur, sed acromion, siue firmus humerus. Quò parte scilicet antorsũ modicè fertur supra scapulæ cum humero dearticulationẽ insigniter dilatens: Quo in loco ampla donatur (vt videbimus) appendicẽ, quã Hippocrates, alijq; non pauci acromion vocant. Rectè igitur inquit Galenus, quod à scapulæ basi exordiens, spinæ pars humilior paulatim adaugetur, donec ad acromij locũ ascenderit. Quauis enim vnus, idemq; processus sit: secũdũ diuersas tamen partes prædictas diuersã fortis est nomina: vt aliud non sit dicere, quam quod aufertere, atq; in altum eleuari

Cur interior parsca  
ua ratio ut  
plex.

Cur exterior pars  
gibba est.  
Spina.

Tab. 12.  
N. 13. X.  
Tab. 11.  
I.

Differẽtia  
secunda.  
Cur basis  
tenuis.

Cur oblonga  
est.

Tab. 3.  
N. 4. 0. 0.

Cur superior angustior.

Tab. 12.  
N.

Tab. 7. T  
Tab. 11. T

Lateralis anguli diuersitas.

Cur lateris inferioris operis crassissimus.

Tab. 13. F  
Tab. 11. F

Differẽtia  
tertia.

Differẽtia  
quarta.

scapulę dorso continuis hic processus minimę cessat, quousq; non ampliũ spina, sed acromion  
 appelletur, à scapulę dorso ( vti predictũ iam est ) abscidens. [ Ob id enim ipsũ, spinam vtriq;  
 scapulę proprã produxit natura ( prout alibi Galenus idem scripsit. ) præter thoracis vertebrarũ  
 spinas, secundũ id vallũ ante partes thoracis, quę illic sunt, obijcens. Hac ipsa rursus spina restẽ  
 ad aliud etiã vtitur. Leniter enim finem eius superiorẽ adaugens, & rectũ attollens, atq; ibi clauã  
 cõiungens *ἀκρόμιον*, idest summũ humerũ quod vocant efficit. Quod esset simul quidem operi  
 mentum, ac præsidũ humeri inarticulationis : simul autem & prohiberet, ne caput brachij parte  
 superna excideret : post autem efficere, ne scapula ipsa à thoracę digrederetur. Quod si nihil ibi  
 ante dearticulationem esset locatũ, nullo negotio à quouis extrinsecis incidere læderetur, faciliẽ  
 etiã caput brachij ad scapulę cervicẽ transcēderet : vt quod nec profundã in se habet costylẽm,  
 nec supercilia magna. ] Quintam igitur deniq; differẽtiam subiungit Galenus hic, dicens, quod  
*ἄνω*, q. d. secundũ hoc scilicet acromion, siue per clauicula huic, scilicet spinę coarticu  
 latur. Meritõ enim inquit per acromion clauiculã spinę coarticulãri, deficiente enim acromio,  
 deest etiã & clauis : hæcõq; etiã vice versã exoleta, & acromion aboleri necessum est. In anterio  
 re enim processus huius acromij dicitur sede leuissimã quidã, superficialiq; si nus cęlatus est, cui  
 modicę prominulę clauiculari caputalum coarticulatur, validissimis interim ligamentis astrictũ,  
 leui, lubricaue interueniente cartilagine quadã solis dictis ligamentis continuata : Illius instar,  
 quę maxillę infernõnis cũ capite articulũ intercudit. Cuius figurã hic posita habet. Sed veterũ  
 Anatomicorũ decreta circa huiusmodi acromij vocẽ contēplēmur, à Galeno sic scribente relata.

l. 1. de v.  
 p. cap. 10.  
 post mod.

Differtia  
 quinta.

TEXTVS TERTIVS.

*Καὶ τὸν ἴδιον ἀκρόμιον ἀπὸ τῆς στήθας ἀπὸ ἐπιπέδου ἀκρόμιον ἄνω. Ἰσὺ δὲ οὐκ ἔστιν ἴσους ἀπὸ  
 ἀκρόμιον πρὸς ἐπιπέδου καὶ πρὸς τὴν στήθας ἐκ ἀκρόμιον μὲν ὑπερῆκον, ἐκ στήθας δὲ καὶ ἀκρόμιον  
 ἴσους.*

Hancõq; ipsam horũ constructionẽ nonnulli quidẽ anatomicorũ appellant summũ humoralem  
 cõgredientiam. Nonnulli verõ præter hæc ambo, quę cõiunguntur, tertiuẽ esse alterũ os in solis  
 hominibus inuentum aiunt, quod cataclida, & acromion nuncupant.

l. 1. de v.  
 p. cap. 10.  
 post mod.

COMMENTVM TERTIVM.

**V**ADRVPLEX acromij nominis significatio, diuersis ex authorũ locis colligi so  
 let, præsentis, ex textu triplex. Pro quarũ exquisita cognitione, prænotandũ est, quod  
 ἄνω Græcis, præfertimq; Hippocrati, idem, quod latinis humerus, siue humeri caput  
 præfertur. Quandoq; autem illis etiã & humeri cum scapula articulationem ostēdit.  
 Vnde adiciendũ ἄνω, q. d. humerale, provenire patet. Cũ verõ *ἀκρό* extremũ, summũq;  
 siue altum signifiẽt : Inde acromion prima significatio summũ humerũ, siue super humerũ,  
 q. d. os aliquid, siue os illius processũ altẽ, summũq; super humerũ cõstituentem præfe  
 ferens est. Hancõq; significatioẽ in præcedenti contextu suppositũ Galenus. Secunda verõ signi  
 ficatioẽ (quam ex aliorũ sententia statim ab initio huius textus retulit) summã articulationẽ  
 præferre solet : quę supra humerũ, humeriq; cũ scapula articulũ existit : quasi diceremus sum  
 mũ humoralem : Intelligendo intem per summã hæc articulationem non icapulę cum humero  
 diarthrosin, sed predictã superiotis à scapulę spina præcedentis processus cum clauicula synar  
 throsin. Ad cuius secundã significãtiã clariorem doctrinã, advertendũ est, nõ simpliciter in præ  
 senti contextu legi [ *ἀκρόμιον* ] ( prout interpretes incongruẽtẽ legunt ) sed addi : [ *ἀκρόμιον* ] dicit  
 enim [ *ἀκρόμιον ἄνω* ] q. d. [ summũ humoralem congruentiam ] siue cõpositionem. Ad quem  
 sensũ dixisse verisimile est libro de anatomicis ad ministracionibus quanto. k. [ *ἀπὸ τῆς ἀκρόμιον* ]  
 subintelligẽdo scilicet [ *ἀκρόμιον* ] hoc est [ à summũ humorali constructione ] sicq; vbiũq; *ἀκρόμιον*  
 siue *ἀκρόμιον*, pro articulatione predictã sumit, verisimile est *ἀκρόμιον* subintelligere, siue *ἀκρόμιον*,  
 hoc est, articulationem, siue *στήθας*, hoc est, constructionem, aut *σπῆνδα*, idest cõpositionem,  
 siue quid aliud huiusmodi substantiũ. Quemadmodũ propter primã significatioẽ subintel  
 ligere possimus substantiũ *ἀκρόμιον*, idest processum, q. d. acromion processum, hoc est, sum  
 mũ humoralem, siue superhumoralem, quasi in summo, extremoq; humeri cacumine positũ pro  
 cessum tanquã ipsius subiecte alterius articulationis humeri cũ scapula propugnaculũ. Tertiam  
 verõ acromij significatioẽ subdit ex aliorũ etiã opinioẽ Galenus : tertium scilicet aliud os  
 præferre, cui clauicula coarticulatur. Quã cũ ex Hippocratis l. etiã sententia esse nõ nunquã  
 cognouerit, tanquam verã alibi nõ tẽmerẽ Galenus idem admisisse videtur. .m. Non tẽmerẽ  
 inquam : cũ verũs acromion id sit, quod cũ clauicula coarticulatur, rationeq; huius scapularũ,  
 siue eius spinam, & nõ per se cum dicta clauicula coarticulãri dicendũ veniat. Est autem verẽ id, nõ  
 aliud

Acromij si  
 gnificatio  
 quadrup  
 lica.

k. Cap. 3.  
 in princ.

l. 1. de art.  
 tex. 41. in  
 princ.  
 m. 5. de a.  
 par. ad min.  
 cap. 1. circa  
 prin. & 23.  
 de v. p. cap.  
 21. in fine.

aliud nouum os (vt nonnulli perperam opinati sunt) sed ipſius ſuperioris proceſſus appendix: in cuius anteriore parte ſinus quidã ſu perficiendus eſt, cui clauicula tuberculũ coarticulatur. Verũ igitur eſt id offi culũ in homine reperiri, quanuis negandum non ſit in ſimij: Hippocrates enim cetera omnia conſiderauit animalia, quæ clauicula deſtituta ſunt: ideoq; vniuerſalem protulit propoſitionem animalia omnia præter hominem excipiens. Quam vniuerſalem propoſitionem iuxta medicũ morem pro (maxima ex parte) intelligendo, ſimiam, ſciuros, & glytes danta- cet excipimus. Quartam deniq; ſignificationẽ, ex Hippocratis .u. etiam (Galeno, & Ruſſoq; Ephreſio, ſp. ex Eudemio confirmantibus) dogmate, adungere nõ graũbimus, pro ipſo videlicet articulationis prædictæ ſuperioris ſcapulae proceſſus cum clauiculae ligamento. [ *ἔστι δὲ τὸ τῆς ἐπιπέρας τοῦ ἀνωτέρου, καὶ τοῦ ἀνωτέρου* ] inquit Hippocrates, latine [ Eſt autem id, ſcilicet os ] clauiculæ & ſcapulae ligamentum ] Quanuis autem ligamenti nomine ſubſtãtia illa neruea, char- tilagineaſque intelligi poſſit; quæ oſſa coniungit, cõnectitq; in propoſitõ; Hippocrates tertium offi culum voluit: Nihilominus tamen in cõmentõ Galeni, nõ ſubſtantiam illam, ſed nexum poſitus ipſius, colligationemq; intellexit, dicens [ *συνέχει τὸ ἐπιπέρας τὸ ἀνωτέρον ἴσκιον* ] quod eſt [ Coniugationem acromion eſſe offi dicit ] ſtatim verò & aliam quoq; ſignificationem inuuit, dicens. [ *ἔστι δὲ τὸ τῆς ἐπιπέρας ἀνωτέρου, καὶ τῆς ἐπιπέρας ἴσκιον* ] quod eſt, latine [ Dicit autem ] & os hoc eſſe, ambob; dicta cõnectere. ] Duplex igitur ſignificationem prædictam ſcilicet ſecundam, & tertiam inquit ibi ex Hippocratis intentione Galenus. Quinimodò cum offi culũ illud cartilagineum tanquam ligamenti ſubſtantiam quandam ſuppoſuerit, quartam quoq; ſignifica- tionem cõprehẽdere videtur. Ideoq; nõ ab ipſo huius cõmentũ ſtatim diximus triplicem in præſenti contextu ſignificationem colligi: ſecundam videlicet, quartamq; & tertiam: etenim pri- mam in præcedenti textu (ſi nõ ad Galeni mentem, qui fortaiſis offi culum illud in homine ter- tium cum Hippocrate ſuppoſuerit) in ſimij tamen, in quibus offi culũ illud abeſſe credebat, ex- eius intentione colligere poſſumus. Tantõq; magis vbi appendix illa ſuo cum proceſſu coaluerit; nõ; tertium aut plus offi culum dici queat: ſed vnicũ ſit ab inuito ſpina humerũ, dein verò, cum à ſcapula dilectũ acromion appellatum: Vt autem tertium id offi culũ, ſubdit Galenus (addoq; tu hanc appendicem, vel li coaluerit, & in vñ cõuerſum fuerit) hanc offi proceſſuſue extremitatem *καταλείπει* q. d. ſecundũ clauicũ, ſiue iuxta clauicũ, ſed ad clauem quoniam ſci- licet ad clauem refertur: cum qua coarticulatur. Diximus autem, vbi offi culũ illud cum ſuo pro- ceſſu, cuius appendix eſt, coaluerit. Quanuis enim velut tertioſ aliquid, puta in pugna, vñ; cum ipſo Hippocrate, ipſumq; inſequẽtib; Galeno, Eudemioq; ac Ruſſo Ephreſio, a numeratq; ac declarare poſſimus: nihilominus tamen procedẽte ætate ſuo offi, cuius appendix eſt, coalueſcit adẽ vt non amplius tertio� os, ſed idem exterior, ſuperior proceſſus ſit à ſpina deſtitutus: qui cum clauj coarticulatur. Coalueſcit autem ſua intermedia, qua abundabat, cartilagine in os pro- ceſſu ſtatũ dũgerante. Quoquo extẽriore in parte cartilagineoſum ſemper merito remaneat, cum dõberet (vt Galenus .q. ait) emanare, ac primũ eorum, quæ extrinſecũs incedunt, impetũ excipere, nõq; ſubicitũ humeri cũ ſcapula articulationis propugnaculũ eſſe. Sane autem ſcapu- ratum adhuc tanquã appendix remanent: ſiue iam coaluerit, acromion dicit, & cataclista por- teſt. Cuius quidem vſus multiplex eſt: non modò enim vt propugnaculũ (veluti iam ſan dictũ) eſt) foret, humerũq; ſuperiora ( prout ſtatim poſt hæc dicemus .x.) luxationẽ prohiberet: ſed, etiam vt inde principij pars quẽdã enaſcatur ſecundi .x. brachij atrolentis muſculi, quæ epi- moſis muſculi nomen in & in idem quoq; os portio quẽdam ſecundi .x. ſcapulae eleuantis alte- rius muſculi inſeratur. Necnon & in ipſum ab inferiore proceſſu, interiorẽq; aſcõdens ligamen- tum implantetur. Ex quo non ſuperior modò eius pars, ſed inferior quoq; alpera eſt, ruſũq; ac foraminibus multis imperũs, propter illius extortũ, horamq; inſerionem prædita. Quoruſq; autem modo ex prædictis acromion capiat: Ex nominis vti patet *ἔστι οὐμίον* latine ſuperhumeralẽ dictum locum cum totũ intelligi, qui prædicto offi atq; articulationi ſuper eſt, ad quem deltoides muſculus aliquo modo quõdã ſui principij partem ſpectat. Verũm innumerò q; tres eſſiſtu digni proceſſus ipſius ſcapulae conſiderantur: Primus quidem exterior, ſuperiorq; dictus iam eſt, qui à baſi exordiens, ſcapulae, cuiusdem dorſo in hẽrens, adhuc ſpina dicitur, in fine tandẽ ab eodẽ ſcapulae dorſo abſcedens, acromion, ſiue in acromion deſinens nuncupatur: Secũdus hunc ſuc- cedit declarandus, quem Galenus eueſtigio ſubiungit, dicens. [ *τὸ ἐπιπέρας, ἀνωτέρου, ἴσκιου, τῆς ἐπιπέρας* ]

## TEXTVS QVARTVS.

11 *ἔστι δὲ τὸ τῆς ἐπιπέρας ἀνωτέρου, καὶ τῆς ἐπιπέρας ἴσκιον*

12 *ἔστι δὲ τὸ τῆς ἐπιπέρας ἀνωτέρου, καὶ τῆς ἐπιπέρας ἴσκιον*

13 In hoc autem loco proceſſus quidã ipſi ſcapulae ſub eſt. Vocatur autem ſcapulae: ceruus; cuius

14 extremo in acetabulum deſinenti humeri caput dearticulatur.

COMMENTVM QVARTVM

f. Ten. & com. i. hu. in.



V M de partium scapulae inaequalitate mentionem prius fecerimus, superiorē eius sinem crassum, parvisq; eūc iam diximus: sinem hunc ad ceterū (speciāter intelligentes. Est igitur ceruus reliquis omnibus scapulae lateribus brevior altiorq; interterim, grossiorae multo superne dorsum ( puta in prima, & secūda huius capitis quoq; sinum, siue acetabulum sustinet. Quod si quispiam tanquam scapulae quartum latus annotare voluerit, eam nō triangularem, sed quadrilateram decernens: tunc scapulae laterū id omnū breuissimū, sed interea crassissimū determinabit. Quamquam & hoc acetabulū diuersimū quoq; suis in partibus est. Inferius enim circūlari supercilio conterminatum; superius verō in acutum quodammodo exprorectū, tum vt sexu .s. brachiū mouentis musculi tendo per mediū eam partē pertingantur, tum vt ex tali sinus procedūsa facta extuberatione duo validissima huius articuli pronascentur ligamenta: Tertioq; demū, vt inde caput alterū primi cubitū flexentis musculi, & à superiore in qua acetabulū supercilio enasatur. De humeri autē capite, eiusq; ad scapulae detriticulatione, posterius locuturi sumus. .x. Reliquū est igitur vt ad tertii scapulae processū accēdamus, internū scilicet inferioremq;, ac omniū minimū. De quō sic euefignit Galenus subdit

Cur acetabulum oblongum. f. Tab. 7. f. & Tab. 6. 9

s. Cap. 11. huius.

TEXTVS QVINTVS

Incis autem & alter huius interna in parte processus acutus, ac paruis. Nominant verō hunc nonnulli quidē ancyroidem, nonnulli autem coracoïdem: eo qd finis eius vt coruus prominēt.

COMMENTVM QVINTVM

**X**aliorum opinione duo nomina interno huius processū ascribit, propter duplicē, quā habere videtur, similitudinē. Alterū autē ad vnam anchorae partem, quae in terram affigitur, indeq; ancyroidem, i. d. anchorae formē nuncupant: Alteram verō, quā ad coruū refert. Ad rostrū eius exponunt interpretēs. Quauis enim de rostre an illius Galenus mentionem habeat: sed absolutē ad coruonē, hoc est, coruū comparat: Non temerē tamen interpretēs (velut didūm est) rostrū exprefferunt. Cūm dicat idē coracoïdem, q. d. coruiformē nuncupari; quoniam extremū eius vt coruus prominēt. Extremū verō eius, siue huius rostre simile est. Verū mihi emmero si exquisitis cuncta perpendere volueris, non rostrū tantū, sed totum caput, ac ceruicem, & pectus huiusmodi processū referri inuenies. Quoniam totū deniq; coruū corpus ad eandē vsq;, ac in altum quoq; eleuatū aliam profertur: à tota scapulae conspiciet: siquidē itā eam collocaueris: vt pars interior, anteriorē nobis offeratur, acetabulūq; rotundior, latioq; pars vna eum secūda, inferiorēue triangulā laterē, tanquam basis super nichilā iceat: veriorq; iam iam predictā basis, tanquā eleuatū aliq; terminū totū sit: tertiumq; tandem latus omnīū minimū rectē ab eius termino tanquam alā anteriori principiū, latiusq; cōstituetur; ad semicirculū vsq; descendens, quod in huius processū tergo, propter quinti paris dorsalis medullae furtulo euidam, simulq; a tergo, ac verū posteriorē scapulae sedem ad eum tribus transversū caelatum est. Id enim coruū ceruicem, & alā principiū exprimit: acetabulū verō coruū pectus ostendit. Propter pedes igitur totum coruū scapula sic sitūta profertur. Quis tamē effigiem minimē referret, nisi processū hic interior caput quodammodo quōsdā partem eius posteriorē, quōsdā anteriorē verō finis eius rostrū representaret. Quae tamē scapula sic etiam ipe sitūta potest, vt exterior processū aliternum cras profertat: ( Quae cum vnicuiq; conico promptissime pateant, noua figura talem situm ostendere nō curauimus) Ideoq; absurdū nō esset; pronomen, id est, huius, quā dicit [ *trachea dicitur* ] ad scapulā quoq; referri, eo qd huius scilicet scapulae finis foras prominēt, sicut coruus, hoc est, quoniam scapula ipā hunc processum pro termino, sicut coruus habet. Non modō igitur ad rostrū, sed ad totū coruū corpus comparato fieri potest, Vnum verō circa nomen id [ *scapula dicitur* ] annotatione dignū prius est: quoniam ex dictione scapulae, scapulae dicitur talis processū debent, scapulae autē a nomine [ *scapulae* ] deriuatis est: sed nullus ferē motiō: hoc est, cum vtrūq; nomen idē significet. Quod autē magis perpendendū venit, est: quoniam Galenus hic, & libro etiā de anatomicis ad instructionē bus primo .s. processum hunc duobus nominibus prescriptis insigni determinauit: vt scilicet coracoïdem,

Notandū.

s. Cap. 11. ancyroïd.



condes, & ancyroides idem processus, diuersis interim similitudinū rationibus diceretur. Velut processū alter e exterior, superiorq; primò dictus duob<sup>9</sup> a lijs præterminiuidis nomenclaturis, acromio scilicet & cataclida, insignitius paulò ante fuit. x. Libro tamen de vsu partium tertidecimo interiorē hunc processum altero nomine prouans, illud superiori processū dedicauit scilicet ipsi acromio nuncupato. Ad eò vt hunc coracoidem appellari à quibusdam pronūtiarēt. Sicq; tribus nominibus exterior huiusmodi processū decoratus sit: vt scilicet nuncupetur acromios, cataclida, & coracoides. Alter verò iam iam dictus interior, reddito sibi altero quodam nomine, pro eo, quod ablatum sibi fuerat, quasi cambio nominum factò, sigmoides à Græcæ literæ σ. quæ signa dicitur, similitudine nomenclatur. Ex quo admirantes nonnulli Galenū vt inconstantem reprehendunt: quòd hoc me hercle ipsum impiè contemnantes. Cum ex aliorum placitis tam hęc, quàm ibi locutus sit Galenus: vt mirum non sit aliquos homines coracoidis nomine primū processū (quanuis minus rectè hos) aliquos verò hunc tertiu sic nuncupasse. Perpetuū tamen interea est, vt primus acromios, & cataclida nominetur: Tertius verò hic ancyroides, & sigmoides. Quia idem ratione de hoc loquens tertio processū, loco de vsu partiu prædducto, absolute inquit [ ἀνκυρωδὲς τε, καὶ σημοειδὲς ἰσομαζήματα ] hoc est [ quod ancyroides, & sigmoides nuncupatur. Sed ommissis nominū altere rationibus, ad huius tertij processū multiplicē vsū conuertitur. Interna enim inferiorq; sui sedē cauus, exacteq; leuis est, vt sexti brachiū circūuoluentis musculi. x. tendoni viam præbeat. Diuersus tamen in diuersis sui partibus vsus eius cōpertus est. Primus quidem, vt in totam sui longitudinem scapulæ motorū musculorū primus. x. inseratur. Secundus verò, vt ex loco inter apicem eius, & tuberculū medio ligamētum validissimū exonatur, quod pro forcore articuli ligatura in acromion inferendū venit. Tertius, vt ex loco appendicis eius cubitum flectentiū musculorū primi. r. caput internū exoriatur. Quartus, vt inde etiam peculiaritè lumen articulationis primū ligamētum exorni cōmodè possit. Quintiq; deinceps, vt ex clarissima principij huius processus sede, qua parte crassior, ac tuberosior, gibbosiorq; esse apparet, clauicula innatur, validiq; alligetur. Quibus & sextus succedit vsus, vt scilicet articulationis humeri cum scapula propugnaculū sit. Humeriq; demum ad anteriora luxationem, pro septimo vsu prohibeat. Quorū omnium siue originū, siue insertionū ratione diuersæ asperitates, foraminulaq; imperuia plurima prædictis in locis reperiuntur. De scapulæ autem appendicibus, veluti & osium multorū prædictorū, particularem sermonem omittimus, cum satis superq; de his in proœmio declaratū a nobis sit. y. Quæ autē in basi existunt propter musculorū, quæ verò in processibus propter ligamentorū originem sumit. Hæc de scapulis. Quarum si foramina, & substantiam, cor porēque molem declarauerimus, reliqua iam ex præmissis enucleata etiā cōpertissimū est. Foramina igitur plurima diuersis in scapulæ partibus, nutrimenti, spiritusq; gratiā dispersa cōspiciunt: præsertim verò effatū digniora in cœnicis ambitu superiore, propē acubulū, vnumq; præterea & item alterū in ipsius ipius angulis quos, cū supenore, in sciorq; calculatibus facit, iu penibus magis ad ceruicē accedentibus, & in interna demum ipsius scapulæ sede, qua hæc impensius excavatur, vnum vilitur, quæ non venarū, arteriarūq; modò transitus, ac penetrations, sed ligamentorū quor; nonnullorū producendorū gratiā, efformata sunt. Scapulæ autem substantia, quibus in partibus tenuior fuit, nec fissari densior cōstruenda venit, fungosior autem, ac medulliosior, vbi crassior, vt in processibus, ipsaq; etiā ceruicē, ac inferiore latere, seu costā, fuerat. Tempēstuum verò est, vt toties nominatam clauicm vtrinq; positam declaremus, cum ipso præsertim Galeno sic sequente.

Πρὶ κλειδῶν, κεράτων. αʹ.

De Clauibus. Caput Quartodecimum.

TEXTVS PRIMVS.

Τὸ κλειν τῆ ἀνω στήρας ἢ κλειδῶν δευτέρα διακρίεται.

Sterni superiori extremo clauicm vtraq; dearticulatur.

COMMENTVM PRIMVM.

V M de acromij vsibus alibi. x. locutus esset Galenus, ad clauicularum necessitatem euelligio pertransit, ita subdens. [ Quòd si non ea parte clauis fuisse cōnecta, nihil vtriq; prohiberet, quomōnūs os latum scapularū nisi quā stabilitū thoraci incidere, coarctareq; ibi humeri articulū, multoq; brachij motus impedire: quod vane ob id postulū potest moueri, quòd à thorace absit plurimū. Nam si eius costas tangeret, aut om-

x. Combu-  
tus 3.

Galen de  
fensio.

tab. 7. T.  
Vus sept.  
tab. 5. T

7 tab. 6. O

y. Com. 6.

Foramina.

Substantia.

tab. 7. T. 3

tab. 5. T. 3

tab. 6. O

tab. 7. T. 3

tab. 5. T. 3

tab. 6. O

tab. 7. T. 3

tab. 5. T. 3

tab. 6. O

tab. 7. T. 3

tab. 5. T. 3

tab. 6. O

tab. 7. T. 3

tab. 5. T. 3

tab. 6. O

tab. 7. T. 3

tab. 5. T. 3

nino propè effect locatum, quomodo se habet in quadrupedibus, manus ad pectorale os, opposi-  
 tumq; pectorali ossi humerum, ad epomida præterea, ac ad collum circumagere non possemus;  
 quemadmodum ne nunc quidem, quando luxatum brachium collis accidit. Ad nullam enim par-  
 tium oppositarum in eiusmodi affectibus manus possumus tollere, quòd costarum convexitas in hu-  
 jusmodi affectibus brachio accidat, quæ ipsum extorsum, & ad latera depellat. Qui affectus no-  
 bis acciderent etiam cum secundum naturam haberemus, nisi acromiæ à pectorali ossis plurimum  
 esset distans. In horum enim medio clauum, velut sustentaculum, ac stabilitatem quoddam natu-  
 ræ constituit. Rursus igitur .a. hic quoq; cõsidera artem, quæ animalia effinxit, vt in omnibus  
 est eorū: tametsi certe propositū mihi fuerat solius hominis constructione explicare: fieri tamen  
 sepe non potest, etiam si maxime nolum, quin aliorum etiam animalium constructionem attingam.

a. Ibidem  
 cap. 11.

Cur in ho-  
 mine arti-  
 culus à thro-  
 ace distat.

Non enim temerè, neq; frustra natura in homine humeri articulum longissimè à thorace abduxit,  
 in quadrupedibus verò proximè collocauit. Sed quoniam ille quidem manibus variè effect versus,  
 motum desiderabat: ob eamq; causam positū admodum amplum, ac spatiosum: his verò nõ item.  
 Neq; enim manus habent, sed artus anteriores nõ aliter, quam postiores soli ambulationi sub-  
 ferunt. Quare crura thoraci affixata esse præstitit. Propterea sanè pectoralia ossa hominibus  
 quidem lata: brutis verò acuta; atq; angusta extiterunt. Quòd si contra facta fuissent, in homini-  
 bus quæ prædictas manuum actiones moraretur: Non aliter, quam si nunc medio pectorali distans  
 lignum prælongum in posuissent, quod à collo vsq; ad hypochondria perveniat. Brutis verò si pe-  
 toralia ossa essent lata, impediunt quomodus artus anteriores bellè thoraci affixerentur. Atque  
 thoracem tunc itaq; perspicue, vt in alijs omnibus fuit natura: quæ bipedi quidem, ac restio animalium  
 thoracem tunc itaq; humeri verò articulum exprorectū valde constituit: Quadrupedibus verò  
 rursus acutum quidem thoracem, conuinxit autem ei ossa lata scapularū, crurq; affixauit. Ad  
 eandem autem prouidentiam clauus generatio est reuocanda. Cum enim scapulas extorsum spe-  
 ctare oportet, vtrinq; clauum inter os pectoris, ac spinæ finem, quæ ad scapulas est, natura cõ-  
 stituit. Cum enim pectorale os sit longum (nam à iugulis vsq; ad hypochondria pertinet) locū  
 dearticulationis ad clauus haudquaquã reperias aptiorem, eoq; nunc ipsi adest: Latissimū enim  
 ibi est, ac fortissimū, neq; vlla costa amplius eū dearticulat. Ad eandem autem modū ipsa  
 cum scapulis cõnexionem oportunitatem exitit: tū vt humeri articulus extrè promineat: tū  
 ad municiendum articulum ipsum: tū ad prohibendum ne parte superna excidat. Merito igitur  
 homo, ne si vollet quidem ambulare quatuor artibus, quæ quòd in ipso scapularū articuli lon-  
 gè à thorace sint abduci. Merito etiã simia, vt in cæteris (docuimus enim id antea .b.) hominibus  
 ridicula imitatio in pleriq; est, ita & in artibus. Nam ipsius crura quàm ab humanis cruribus  
 discrepent, cum priuatim de ipis ageremus, monstrauius, quemadmodum ceræ & summe ma-  
 nus constructio. Quod verò ad scapulas, ac clauus attinet, homini maxime est similitudo: quanquã  
 ea parte homini similitudo esse nõ debet: Nam quòd ad ambulationis celeritatem pertinet, simia  
 inter genus vtrinq; ambigit. Neq; enim bipes penitus est, neq; quadrupes: sed quatenus est bi-  
 pes, clauda est, nõ enim rectè planè stare potest: & quatenus est quadrupes, mutua si mul est, ac  
 tarda, quòd humeri articulus à thorace plurimū sit abductus, quemadmodum si idem a reuoluis  
 alio quopiam a nimante à thorace diuallus extrè secessisset. Sunt igitur simiæ crura, qualia homini  
 sunt infanti (prout alius per bellè Galenus idem ait .c.) nunc primò eis vt eonanti. Et enim qua-  
 tuor artibus, quomodo quadrupeda, gressitur, præterea anterioribus tanquã manibus vtitur: A

Clauum  
 visus.

Clauum  
 et scapula  
 oportuna  
 conuexio.  
 Simplici-  
 tudine.  
 b. d. v. p.  
 de 3. & in  
 de 1. de 2.  
 natad min.  
 cap. 1. & 4.  
 eius 1. 2.  
 3. & alibi  
 sepe.

ubi homo iam increuit, non amplius anterioribus artibus vtitur, vt pedibus. Simia verò perpe-  
 tuò inter vtraq; ambigit, quòd ad vtrinq; sit constructa: tū vt in manibus, obuia comprehendenda,  
 non aliter, quam reptula scandat, tū vt in securo vestigio currat, instar pueri. Non enim poterat  
 ad vtraq; rectè constructi. Ideoq; fugiens, currentiq; semper iter ad superiora, vt erigatur, ap-  
 petit. Sepeq; incedens statim sedet, eleuaturq;, quasi cum labore quadrupes maneat, similitudoq;  
 cum labore bipes. [Quemadmodum autem simia (prout antea quoq; apposuissimè subiunxit  
 Galenus .d.) quòd animam habeat ridiculam, corpus ob id habuit ridiculū: Ita homo quòd animam  
 haberet rationalem, ob id etiam corpus solum inter ea, quæ sunt super terram, habuit diuinum,  
 atq; optimè ad anime potentiam, ac facultatem cõparatum. Ceterum quomòdum animam habentem  
 stat rectus, antea ostendimus, .e. nec minus quòd solus manibus rectè vtitur. f. Ex his omnibus nõ  
 modò clauum visus liquet: verum etiam & eorū nominis ratio patet, cur scilicet elapes, siue elap-  
 ticus nomen inter. Et enim clauum instar humeri cum scapula dearticulationem ita eladunt:  
 vt nequitiam ad thoracem illis possit, id. si. h. t. n. q. ipsi firmantes cõseruent, aut omnia ma-  
 numum munera perfectè præter vltimū impedimentum obunda. Quam etiam ob causam in furem  
 Barbaro latinus nuncupatq; iure, quoniam quasi p̄ter quendam furem, hoc est, partia vlcera predicti  
 dearticulationem suspensam sustinet, eleuatamq;, conseruat: vnde nomen hæc duob; ossibus  
 similitudine imposta esse cõpertum est: vter ab alia similitudinis ratione, quæ scilicet ab ossibus  
 figura sumitur, iuguli, siue iugula, quali pariq; iuga, à nostris nuncupari solent: quoniam etiam

c. 11. d. v. p.  
 cap. 1. post  
 prius.

totius,

d. 1. d. v. p.  
 11. post  
 med.  
 e. 1. d. v. p.  
 c. 1. & 3.  
 f. Ibidem, &  
 h. 1. & 2.  
 per totum.  
 Cur dicantur  
 per clauus.  
 Cur dicantur  
 per iugula.  
 Cur dicantur  
 per iugula.

totius,

tonus, femiungi tamen, quod bouum collo superimponitur, similitudinem præferret: vnde verbum iugulare deductū est, etiam si non gladio quempiam iugulemus, sed vi duntaxat morbi ille percat, quasi iugulare sit, strangulare: vnde in antiquorū proverbio dicebatur iugulum videre, hoc est vulneris lethalis locum cōspicere: vbi etiam validissimū quodpiam argumentū in aduersarium infolubile adducimus: quasi lethali quodam vulnere adu ersariū cōfoderemus. Post quod os iugulum nunc patū, macilentis, tabidūq; hominibus, nō fecis ac senibus, quasi lacuna quedam excavari solet, nō vtrinq; modō, sed in medio quoq; inter vtrūq; iugulū loco, quem Græci *σφύριον* appellant, vnde Lucianus. g. [ iugulumq; senilem con fodiā. ] Vnde etiam iugulares vene, artēriq; tam interneq; quā externæ quoniam scilicet sub hoc iugulo vtrinq; pertransiunt; & ab hoc iugulo sursum ascēdentes cōpareant, nomenclari solent. Pro quarum exquisitiore intelligētia, dictorūq; ac dicendorū elucidatione tres hæc earum figuras apponimus. Quarum prima anteriorem, externamque, ac superiorem simul clauiculæ faciem ostendit. Secunda posteriore, internaue, cum superiore eiusdem sedes, clauiculam præferret. Tertiāq; demum inferiorem eiusdem clauiculæ sedem cōmostrat. Cuius duo extrema sunt: Alterum quidem, quo cū pectoris ossē primo dearticulatur, quod litera A. insignitur: Alterum verō quo cū acromio coarticulatur litera Q. annotatū. Reliqua verō in sequentibus, prout exponendū in textu occurreret, annotabuntur. Modō prius id annotamus, qd præter chartilagineas, quibus omniū ossium, nedum huius extrema ad articulationem inseruntur, peculiaris quedam primo articulo ad sternon factio interiecta est, illi similis, quæ priuonem alteram eius cum acromio articulatione intercedit; illamq; aliam, quæ maxillæ inferioris cū capite dearticulationi interponitur, prout antea iam declarauimus, .b. tenus inquam hæc, æquālibq; admodū læuis, & vinctuoso humore persusa, sigamentis duntaxat articulum amplexantibus, non ossibus connata; cuius figura hæc est; quæ in margine litera S. designauimus. Quibus per se singulis exactè perpenis, pro exactiore iuguli motus: substantiam eius, figuramq; cum Galeno etiam contemplerur, sic subdēte, *hæc est pars superior iuguli, quæ in*



.h. Cap. 5.  
com. 1. cir-  
ca med. de  
scap. proce-  
dēt com. 1.  
in fine.

## TEXTVS SECVNDVS.

Cauiernosa existens, figuramq; ac crassitie inæqualis. Inferior enim pars ipsarū, qua sterno dearticulatur, tum crassior, ceteris, tum rotundior est. Quanta verō huius proximè succedit, longè quidem gracilior est, adhuc tamen rotunda. Inæqualis autem quæ post hanc vniuersa est, ad eius cum scapula constructionem vsq; vbi etiā paulatim quodammodo dilatatur. Totus autem eius medię partes extēnis gibbæ sunt, magisq; inter has quæcūq; ad scapulam tendunt.

## COMMENTVM S E C V N D V M.

**R**I A imprensura cū de clauicula pertracta Galēnis. Primò substantiā, secundo figuram, tertioq; crassitudinem. Quoad primā igitur, substantiā eius *σφύριον*, hoc est, cauiernosam; ratamq; ac fungosam esse ait, parte videlicet eius interna, quæ tenui, læuiq; crusta ossis, quasi squamea quadam superficie cōtegitur; ideoq; promississimè frangibilis. Magis autem fungosa, fistulosaq; seu cauiernosa in extremis est, quibus cum sterno, vel scapulæ acromio cōmittitur. In medio enim, quò tenior est, eò insulior, densiorq; inuenitur; humilior quidem in parte velut in lineam quādam protuberans, vt musculis thoracem mouentū primus. Abde principiū cōmōdus recipere. Iuxta cuius linee extrema sinuosè quedam asperitates conspiciuntur, vnde valida innascantur ligamenta, hinc quidem quo clauicula pectoris inde autem quò prius eam interno sca pulæ prope articulum, quo eadem cum acromio validissimè cōnectatur. Et quibus quidem asperitatibus iam dictis, dicendūq; ac nōnullis minimis protuberantibus multiplices clauiculæ rursū colliguntur. Non solum enim ob id facta est, quò suspensam, distentamq; à thorace scapulam suscipere, liberatq; humeri cū scapula dearticulationem, propter innumerā manuū operationes in pectus

Substantia.

02

03

04

scap. mu

scul. 4. d.

Et 5. tab.

Clauiculæ

vniuersa.

scap. mu

scap. mu

conseruet. verum etiam vt à prædicta eius linea primus thoracem pro expiratione mouentiu muscularum exoriat, veluti prædictum iam iam est. ( Non secus ac ab altera linea in anteroe claviculæ parte, prope radicem exordiente, ac ante medium longitudinis eius desinente, muscularus .d. non parua sui parte brachiu mouentiu primus originem ducit ) prope suam verò cum acromio conarticulationem ex alia asperitate ibi manifestissima musculari epomoidis, magna pars principij exornatur. Necnon superiore in eius parte, qua cù scapule acromio cõmunicat, scapule muscularus .f. locundus: velut in alia parte, qua cum pectoris ossis coniungitur, muscularus capitis motoriu sepius .a. originem sumperint: vnde varie aspera, inæqualisq; facta est. [ Ceteri q; omnium animantium solus homo stet erectus ( inquit alibi .r. Galenus ) antea ostendimus, .k. nec minus q; solus manibus rectè vtatur. Verumtamen nunc etiam id tibi apparebit, si humeri articulum, aut totius thoracis formam, aut clausi generationem inspexeris. Sams enim ea esse possunt ad artem naturæ indicendam, quam multo adhibe aptius quæ dicturus sum ostendent. Nam cur non rectè à pectorali ossi ad scapulas clauem prædidit, sed ad scapulam ( iugulum ipsum interpretis vertit, eam scilicet cauitatem, quæ super acromio in medio claviculari est ) conuixâ quidem foris, intus verò cauitati posuit autem contra, extrinsecus quidem cauam leniter, inxâ verò conuexiorem? ] Adeo vt his gibba, bisq; conuexa reddatur nostre literæ ( f ) figuram præferens ( priorem partem, quæ ad sphagm ipsam spectat, prætermissis, q. d. iuxta sphagm nuncupant, alteram verò, quæ ad humerum, prætermissis, q. d. superhumeralem, Polluce etiam teste, appellat. ) [ Nihil enim horu temere, nec frustra à natura institutum. Sed ad sphagm propter eandem cum pectorali esse vitalitatem, quomodo hoc, caua quidem parte interna extitit, quo videlicet locu aptum his instrumentis præberet, quæ supernè deorsum ( vt aspera arteria est, ac stomachus, & lexum cerebri nervorum pars, demumq; à quinta, sextaq; & septima dorsalis medullæ coniugationibus nervoru series, quæ cù octava, & nona ad totum brachium distribuenda venit ) atq; insertè fursum ( vt venę sunt, arteriæq; ) per colliferuntur. ( His enim omnibus appositissime sua curuitate cedens, propugnaculi vicem suplent. ) ] Claua verò à sphagm cepit discedere, tantu paulatim antorsum redit vsq; ad humeri summitatem, quantum sinus particule ipsius clausi intumescens retrò locosera. Quod si restorsum solum tenderet, ad colla latera progrediens, non satis à thorace distaret. ] Cur autem rotunda clauicula sit, quæ re superacromium reor, vbi toties dictu iam sit, figurâ hanc causis omnibus extrinsecus occurrentibus, ledereq; potentiùs magis obstitere, inagisq; cõtamacem esse. In sine autem ad acromion accedens idcirco dilatatur, quonia superior scapule processus acromios ibi dictus, cum quo articulari debebat, latiusculus etiâ est. Dicit autem in sine Galenus totius medias partes exterius gibbas esse, magisq; ex his ( scilicet medijs partibus ) quæcunq; ad scapulam tendunt, priusq; scilicet exterius recuruata, cauaq; fines ad acromion foras reuertens sit. Tunc enim vbi foras reuertî incepit, nõ gibba pars exterior, sed interior est, exterior autè cõcaua sit. In media autem clausi parte, quæ gracilior quidem, sed interim solidior, duriorq; est, versus acromion, in postiore ipsius sede, pluri mû duo, nonnunquã verò etiam tria foraminula videntur, ad hoc deputata, vt venulas admittant clauem enutrituras, ideoq; imperua sunt, proprii autem musculi manum mouentiu, sed à scapule motoribus. Sed etiã de humeri articulo descendentes, aptatibusq; clauiculis, acromioq; satis exactè iam locuti fuimus: Tempellus est de ipso humero sermocinari, cum ipso etiam Galeno, quem attentè audiamus, sic dicentem.

# Tab. i. 2.  
4. A. &  
3. L.  
7 Tab. i. p.  
5. y.  
# Tab. 9. 7  
7. a.  
# Tab. 4. 6  
i. 13. meth.  
cap. 12.  
k. Lib. 3. c.  
1. 2. & 7.  
Dubium.  
Claviculæ  
figura cõ-  
munitas 99-  
re.  
Respondio.

**D**  
Foramina.

M V De Humero. Caput Quindecimum. M O O

**TEXTVS PRIMVS** *ὁμοῖοι τρεῖς εἰσὶν οἱ ὄσσει οὗ τοῦ ἑπιπλάτου, ἡ δὲ ἑκαστὴ τῶν τριῶν ἔχει τὸν ἑαυτῆς ἰσθμὸν καὶ τὸν ἑαυτῆς ἄκρον. ἡ δὲ ἑκαστὴ τῶν τριῶν ἔχει τὸν ἑαυτῆς ἰσθμὸν καὶ τὸν ἑαυτῆς ἄκρον.*  
Humeri os omnium ossium maximum existens, femoris ossi excepto, dearticulatur secundum utrumq; extremum, superius, infraq;

**COMMENTVM PRIMVM.**

**V**M in tres magnas partes tota manus ipsa diuidatur ( Galeno didiscalox. ) vna quidem brachium, humerumue, aliam verò vlnam, siue cubitu, tertiamq; ab his summam, extremamq; manu: de prima nunc, brachio scilicet, humeroue, sermo agendus est. Quod enim Galenus hic *ἑπιπλάτου*, hoc est, brachiu dixit, non latine humerum, Celsum emulato, n. nuncupamus. Qui tamen brachiu dupliciter accepit: cõmunitè inquit

k. a. dev. p.  
cap. 2. ver-  
ba finem.  
Totius me-  
nis partis  
tres.  
m. Lib. 8. p.  
1. 10. & 11.  
& 116 c. 11.

(iuxta ipsius etiā Aristotelis decreta. *s.*) pro toto, quod ex humero, cubitoq; & radio, ipsiq; infimul extrema manu cōpositū est: Ac proprie, pro ea parte tantum, quae cubiti articulo, & carpū interiacet, ex duobus ossibus cōstituta, quorū alterū proprie cubiti, alterū verò radium appellat (quam partem cōpositam, cubiti quoq; Græcè *ῥαδίου* sequenti capite Galenus appellabit *ῥαδίου*, distinctionis gratia vltam vocabimus.) Nonnulli verò nō tenent Græcorū Galeni nomen micentes, sū premū duntaxat os, quod humerū vocamus, brachiū latine appellat. Adeo vt brachij nomen trifariam intelligi queat. Primū secundū Græcos medicos, pro humero, primūq; osse, de quo in presentiarum loquimur. Secundū pro toto iuxta Aristotelem cōmuniter iūmpo, quod simpliciter manū, & Aristoteles, & Galenus appellare cōsueverunt. Tertioq; demū in pro media parte proprie secundū Celsū, veluti p̄dictū iam iam est. (Penne de ea manū aliquid pro extrema duntaxat, summæ manū, accipiunt.) Quamobrē & Celsū ipse distinctionis gratia, summū brachiū, ad differentia totius, docere solet. *s.* Nos igitur ad cautandā omnem æquiuocationis confusionem, totum simul appellabimus brachiū, quod scilicet ex humero, cubitoq; & radio cōpositū est, cum ipsa etiā extrema manū. Superius verò os, de quo in presentiarum loquimur, humerū: Inferius verò, quod ex duobus cōstitutū est, vltam. Cuius manus os cubitum, minus verò radium nuncupabimus. Quamquā & vltæ nomen apud nonnullos totum brachium, apud alios verò quosdam solum cubiti os maius significare, cōperit vobis est. Sed ad humerū reuertamur. Cuius os omnium maximū Galenus, s̄moris osse excepto, protulit. Id quod quantum ad v̄ritatē alienū sit, cōperitissimū euersigō fiet, quamplurimā aliq; ossū humero maiora in quouis animalī pericipietibus. Nullus enim de tibia, quod maior tūm longitudine, tūm crassitate humero sit, ambigere vnq; poterit. Surcū autem, sūbalq; os longius s̄tem est: veluti quæ ossi sacro cōiunguntur ossa, vt in vnum tna simul prouectioēbus cōiūctur, & latitudine, & gravitate humerū sū perare, clarissimū est. Quamobrem v̄de namq; in hac sententiā perueniret Galenus, mirandū omnino est. Haud enim a simis ossibus deceptū eum fuisse exculare possumus: veluti in alijs multis eiuſdem deceptionibus contigit: cū in ipsīs etiā simijs huiusmodi p̄dicta ossa, quantum ad cubiti etiā os humerū magnitudinē, longitudine superent. Alias igitur multānam excusare Galenū conat sumus. Primū inquam scriptorū culpam inculantes, forteq; legendū abiq; dictionibus illis (*ῥαδίου ἢ ῥαδίου*) hoc est [preter seimū] s̄ue [ex eo seimore] dicentes: quoniā scilicet omniū (intelligendū hūmūq; p̄dictorū) ossium, maximū humerū os Galenus proferre voluerit. Forteq; legendū potius, loco illorū eorundem verborū venit [*ῥαδίου ἢ ῥαδίου*] hoc est [p̄dictorū] sicq; clarū sit, omniū p̄dictorū hūcūq; ossium maximū esse os humerū. Vel tertio suspicandū est, scripturā Galenū fuisse, pro v̄s̄is̄dem verbis potius [*ῥαδίου ἢ ῥαδίου*] q. d. [excepto crure] hoc est, omnibus cruris partibus: tibiā, & surā, & ossi sacro cōiuncta ossa, in ipso homine, cruris nomine intelligendū. Alias verò humerū tibiā, ac surā cōiūctū tantis, abiq; proprijs harū (quæ v̄s̄s̄itate cōiūctur) p̄p̄dicibus, humerū aliquantū longiorem, ac s̄tem nō minus longum inuenimus. Quæ mentiendi ratione deceptum fuisse Galenū verisimile est. Deniq; in hac peruenimus excusationē: vt Galenū dicimus ex eo fortassis dū, hæc scriberet deceptum, quoniā in aliquis longioris hominis humerū alterius breuions tibiā, ac s̄ibulā, prout ex coemeterijs tibiā collectis̄se permisissimū s̄ibulā, comparauit. Omniū interim alij s̄met̄s̄ grossioribus ossibus: vt qui magnitudinē pro longitudine, cuius ipso etiā Hippocrate, p. accepisse potuerit. Tūm verò fuit in tam aperta falsitate, preter omniū excusationē, Galenū condemnare. Verū igitur est, q̄ maximū omnium, quæ v̄s̄; ad presentem caput scripta sunt, os humani humerū sit: minus tamen temore, tibiāq; tūm longitudine, tūm grosse, ac pondere; minūq; etiā secundū longitudinem s̄ibulā: veluti secundū pondus latitudinem p̄s̄is̄ ossibus, quæ sacro ossi adn̄ctūtur. Idipsum igitur os per v̄trūq; extremum supra, infraq; dearticulatur: supra quidem, cum scapulā acetabulo, vt in p̄cedentibus iam iam dictū est. *s.* infra verò, cum radio & cubito: vt sequenti capite ostendetur. Dicit autem b̄t̄nē [*ῥαδίου ἢ ῥαδίου*] latine dearticulatur, q. d. per diarthrosim articulatur: quia propter motum manū s̄s̄sum, perq; species eius supra quidem enarthrosim, infra verò cum cubito per ginglymon, cum radio verò per eandem quoq; enarthrosim: vt in delectatione proemij satis superq; expositū a vobis est. *s.* Ex quo malē interpretē v̄r̄s̄s̄e patet, dicendo [aliquid est]. Debēbat enim verbi v̄m iuxta Galeni intentionem interpretari. Venim enim os abluendū hac maxime s̄ubm, cū ipso etiā Galeni quadantenus digredit; quā sic alibi scripsit s̄. [Tempeſtiū videlicet esse ad ipsum humeri articulo s̄m̄t̄nē cōuertēre, atq; in primis ostendere naturā iure caput humerū cōiūctū s̄m̄t̄nē effectū s̄e, & equitatem, quæ scapulæ ceruicibus inest, parūam esse simū, & s̄ s̄ p̄nam, s̄ quæ memoria tenet. quæ libris prioribus dicta nobis fuerūt. *s.* Cū enim manus tota ad multos, ac v̄s̄s̄os motus eſset comparata, caput quidem humeri rotandum habere ipsam oportuit. (Hæc enim figura nullam ad motus celeritatē inuenicimus aptiorem) ipsam autem cōs̄tatem ei s̄ub̄s̄ctam neq; magis operē profundam, neq; in magna superculia desinentem: Si enim

n. de hist.  
animal. p.  
circa princ.  
Cubium du  
pliciter.  
\* Teste.  
Brachiū nō  
placet.

Manus pro  
p̄dic.

Cap. 11.  
circa princ.

Brachiū  
humerū  
cubiti.

Vltæ  
Radium.

Cetera Ga  
leni.

Cap. 11.  
circa princ.

Galeni ex  
p̄dic.

Cap. 11.  
circa princ.

Cap. 11.  
circa princ.

Cap. 11.  
circa princ.

Cap. 11.  
circa princ.

Cap. 11.  
circa princ.

Cap. 11.  
circa princ.

Cap. 11.  
circa princ.

Cap. 11.  
circa princ.

Cap. 11.  
circa princ.

Cap. 11.  
circa princ.

Cap. 11.  
circa princ.

Cap. 11.  
circa princ.

Cap. 11.  
circa princ.

Cap. 11.  
circa princ.

Cap. 11.  
circa princ.

Cap. 11.  
circa princ.

Cap. 11.  
circa princ.

Cap. 11.  
circa princ.

Cap. 11.  
circa princ.

Cap. 11.  
circa princ.



non capitum & appendix, tanquam ab eo diuersa, adnascatur, sed caput ipsum appendix sit, appendixque ipsa caput. Remota enim appendice (vt in tabe factis ossibus patet) nil remanet capitis nomine dignum, quanuis aliquantulum dilatari os inceperit. Quamobrè dictiones illas [ vt scripsit Marcellus ] stantias, & ptuiliq; traducere possemus [ adnascantiam capitis ] quoniã scilicet humeri extremo caput tanquam appendix adnascatur: Ideoq; nõ in eptè Balauius noster vertit [ caput habet coagmentatũ, adnatumq; ] Similis ergo hic sermo est ei, quod antè dixerat, y. nali ossium inferius extremum chartilagineorũ corporum tenuium appendices habere, q. d. eiusmodi chartilaginea corpora, tanquam appendices, talium ossium extremis adnasci. Nec aliter fortè intelligenda fore proxiimij verba credimus, x. grandibus ossibus plurimis aliorũ ossium appendices adnasci dicebat, q. d. alia ossa tanquam appendices adiungi. Sic igitur in proposito sermone, capitis magni coalescentia, siue epiphysis, siue appendix, siue coagmentatio fit, q. d. aliud os tanquam caput adnascitur, coagmentaturq; seu coalescit. Pro cuius, ac dicecatorũ clariore doctrina, duas hic in margine figuras apposuimus; quarũ prima humeri faciem anteriorem, secunda verò posteriorem representat. Appendicem igitur capitatã vide in prima figura literis A. B. F. H. designatã. In secũda autem figura a litera a. vsq; ad b. notatã. Totũ enim quod supra huiusmodi lineam est, caput adnascens est, siue appendix, adnascantiaq; capitata. Dicit autem Galenus hic parũ ceruici caput huiusmodi adnatũ fuisse. Nos autem, prout antea iam diximus, a. ceruicẽ Galeni designatione vespigantes, professõ nullam in humero inuenire potuimus. Cũm non tenuiorem humeri processũ, sed paulatim crassiores euadentem, dilatescentemq; tanto magis, quanto ad predictam appendicem magis accedit, conspicimus; prout in vtraq; figura perspicuũ est: In prima quidem a litera d. sursum ascendendo; simuliterq; in secũda a litera l. maximeq; in vtraq; supra literam o. vnde in caput potius quodammodo degenerare, ipsumq; verius caput tanquam appendicem assumere incipit. Verũ multa sunt alia sine ceruicẽ capitata, quæ Galenus minime aduertit: quemadmodũ nos vberimè in proxiimij expositione prenarrauimus. ß. Quæ ratione fortassis tali loquẽdũ modo vtitur Galenus, dicens [ vt diximus supra ] quod est, siue ceruicis paruo, q. d. super minimo quodam, siue minima quadam parte ceruicis, que designari non imaginatione potest, respectu scilicet capitis gloriosius existens, tenuem, ac per hoc ceruicem non uerpido. In hoc igitur capite sinus quidam, velut ampla quẽdam, parulae fissura, iuxta anteriores, superioresq; partes, nõ antorsũ modò, sed retrosũ quoq; procedens (que in prima figura literis G. F. In secunda autem figura G. B. etiã indicatur) in duo capitula totũ caput dirimit: quorum alterum duplo maius altero existens interius orbiculare, ac leue, chartilagineoq; uerulatum scapulae acetabulo dearticulatur. Alterum verò asperum, & inæquale externum, tribusq; impressiõibus (vt antea diximus) cretatum ad ligamentorũ articuli in seruationem delectans est. Nec vt diximus modò, talis ampla, parulae fissura, sinusue potius scilicet parulae fissuræ ducendus, factus est, sed vt in ipsũ ligamenta, presertimq; cõmune illud, quod tanquam secundũ articulationis humeri prædidũ prenarrauimus, a. inserantur, idẽq; non nihil etiã asperitatis in se habuit. Id ipsum verò secundũ caput siue capitulum, seu maius dicere secundũ capitis predicti pars sursum subsistit igitur: terete quodam, rectoq; & asperiore interum alio siue ligamentum, externumue primi cubitũ delectans musculi caput, a. insipientem, siue tenuissimũ illi parulam, ac liberum prehensum: Qui sinus non in capite modò, siue in appendice, sed in humeri epiam ossẽ multo impressitur, in prima figura literis H. L. designatus: litera quidem H. quodam partem illam, que in appendice est l. verò, quodãz illam, que in humero ossẽ impressitur. Rursus inquam subsistuntur in duo relictũ capitula: Quorum posterius triplo scẽ maius anteriore est. Numeri ergo caput in tria capitula dirimitur. Quorum maximum interũ est, orbiculare illud cum scapulae sinu dearticulatum a. Minimum verò externum, a. quod antereus, Mediusq; tandem c. alius quoq; externum, quod posterius. Quod si vnũ dicere capitulum ueliss, quod scilicet interũ: duos verò externos capitis procellus occupare, integrũ tibi fuerit, quem admodũ nonnullis excelsioribus placuit. Noni autem eandẽ duas esse distansas appendices scilicet, siue obsequere uimus: Alteram quidem internam, que omniũ maximũ caput efformat scapulae acetabulo dearticulandum: Alteram verò externam, cuius partes duo capitula sunt predicta, videlicet antereus omnium minimũ, posteriusq; magnitudine medium: duo proficere capita superiora humeri, absurdum non esse reputamus: Alteram quidem internam propter articulationem



3. Cap. 3.  
sec. 6. in  
fine.

2. Com. 6.  
Secũdo cap.  
fig. com. 2.  
in fine.

omniũ  
com. 11.  
a. In procc.  
com. 11.

3. Com. 11.

c. Com. 11.  
secũdo.

3. Com. 11.  
secũdo.

3. Com. 11.  
secũdo.

3. Com. 11.  
secũdo.

3. Com. 11.  
secũdo.

3. Com. 11.  
secũdo.

3. Com. 11.  
secũdo.

tionem factum: Alterum verò externum: cuius duæ partes, veluti processus quidam sunt. Cum excavari propter prædicti ligamenti transitum, ac manimentum quoq; oportuerit: totumq; hoc secundũ caput, duplicemque ipsius processum, propter ligamentorum præcipuorũ; triũ in insertionẽ, ortumque factũ esse. Inde igitur nõ capita hæc duo, neq; capita Galenus nuncupa: sed totũ caput nominans, in duas diuidi partes condylis similes, subiunxit de quo condylorũ nomine, cum satis exactè in præcedentibus locuti fuerimus: .d. idcirco nõ est cur hic circa ipsum immoremur. Sed ad humeri partes inferiores cum Galeno permigremus, dicentes.

TEXTVS TERTIVS.

Τὸ κατώτερον δὲ τριπλῆς ἢ τετραπλῆς ἀνωτερου τμησθῆναι, καὶ ἕκαστὸν μὲν τῶν ἕξ ἡδὲ ἑπτά τῶν ἀνωτέρων ἀνωτέρω διακρίσθαι, καὶ τὸ ἑκάστην αὐτῶν ἰδίως ἑκάστῳ ἐπιτετακέναι, καὶ διὰ ταῦτα ταῦτά μὲν λέγουσι τῶν ἑπιτετακέναι τὸ ἕξ, καὶ τὰς ἑπτά μὲν ἑπιτετακέναι.

Inferius verò extremum in condylis definit inæquales. Quorum quidem externo radij caput dearticulatus: Interno autem nullum os prorsus committitur. Ob idq; longè maior hic apparet, tametsi paulò maior existens, eo, qui externus.

COMMENTVM TERTIVM.

I rectè, atq; adamussim singula perpendimus, tria sunt inferius tubercula. Quorũ alterum dictũ est interius: cum quo nullum aliud os committitur. Haudquaquã tamen qd id supra factũ est, quia nulli articuletur: multiplex enim eius vñs est. Primus quidem, vt vasorum scilicet venarũ, artieriarumq; ac etiam neruorũ, quæ per eam partem transcuntia in extremã manum distribuenda cuncta deicendunt, non sicuti modo, sed propugnaculũ quoq; sit. Secundus autem, vt hinc plurima musculorũ rectè descendunt: capita suæ originis principiũ duxerint; .a. vt musculus dicit manus extremæ volam subtegens, in latum scilicet, amplumq; tendonem degenerans, .µ. primusq; deinceps digitos floccentium: qui scilicet ad secundos eorũ articulos inferunt, ibiq; terminatur, & aliquatenus etiam, .ν. secundus, qui ad tertios eorundem articulos extensus, ibidem implantatur: præterea duo brachialis articulum floccentes, .σ. primus inquam, .τ. ac secundus: Tandemq; radij musculus .ρ. tertius est, qui ad pronum ipsum mouet. Omnes igitur hi sex musculi ab interno huiusmodi processũ originem suam duxerunt. Ex ipsius demic apice quadantibus amplius primus hic dicitur, quarulq; & quintus: Ex infima verò eiusdem sede, secundus, tertiusq; hic relati, ac demiq; sextus: velut in anteriore iuxta humeri posterius .d. enarratam cum cubito dearticulationem sinus .γ. leuete exculptis est, neruorũ brachij potentium tertio pari dicatus, alterq; in posteriore eiusdem sede, .λ. quinto pari sinus excavatus leuiter est: vt tutam viam (veluti prædictũ est) prædicti nerui; atq; vna cum ipsius venæ, & artierie nanciscantur. Internũ id tuberculũ in prima, & secunda præcedentis committenti figuris litera S. designatũ perbellè conspicere potes. Alterum verò tuberculũ externũ dicitur, quod ibidem litera P. notatũ est, cum quo radij caput dearticulatur, propter maius scilicet in pronum, atq; supinũ diuersos motus. De his igitur ambobus abhi loquens Galenus, .f. testatum sic reliquit [ Porò humeri capitũ alterũ quidem externũ est, & minus, ob radij ad ipsum dearticulationem factũ est. Alterum verò maius, quod interũ spectat, nullum os sibi committit habet: idcirco prominens in manus partem internam; & nudum, & carneũ; apparet vidèntibus simul, & tangèntibus: verũ de hoc quidem capite sermo magis peruenit ad vasorũ expositionem; quæ in toto corpore sunt: nõ artieriarũ modò, aut venarũ; sed etiam deinceps neruorũ .g. Sicuti namq; separatum de omnibus procedente sermone verba facere. Quare etiam de interno humeri capite in illis dicitur: etenim illorum tutelæ gratiã ipsum naturæ creauit: vititur autem & hoc ex abundantia ad aliud quoddam vile, illic adnectens huic capiti musculorũ internorũ eubite: capitũ, qui secundũ rectitudinem in positionem habent. De externo autem, hoc sermone dicendum est, qd radius ipsum ambit oculam cauitate, versorium totius manus gubernator. Quin etiam legitimã quædam membranosa, valida in appendicem locis orientis coniungunt, & obstringunt cicèrum: plecèntia totam dearticulationem in orbem, vt non faciliò humeri caput ex subiecta cauitate excidat (quanquã superficiale tantũ, & sine profunditate) neq; ad actiones impediatur. Si quidem ligamentorũ substantia, vt quæ quamplurimũ cum ijs, quæ trahunt, extendi simul natura nullum remouat motum.] Hæc Galenus: sed nos ad externũ humeri tuberculũ distinetis obtemperandũ reuertamur. Rotundum namq; ac oblongum quodammodo est, leus interim, & hinc triangulq; inersatũ: vbi superiorem radij sinuq; subintrat, propter ipsius radij motum ad pronum, & supinũ. Sed ne ob solam quidem ipsam dearticulationẽ huiusmodi caput effectũ est; at externi ritu, ad multorum quoq; musculorũ principia firmanda cõmodum est. Ab externa enim

Interni processus multiplex vñs.

λ 3. μυβ.  
 tab. 7.  
 α 6. tab. 5. θ  
 σ 6. tab. 5.  
 ε 6. tab. 3. π  
 5. \*.  
 ν 6. tab. 3. ρ  
 4. e.  
 ρ 6. tab. 3. ν.  
 7. 2.  
 ε. Tex. seq.  
 Sinus.  
 γ 1. fig. T.  
 δ 2. fig. T.  
 ε 2. de v. p.  
 c. 15. v. 7. 11.  
 f. in em.

g. Vide lib. 11. cap. 8. & 11.

Externi tuberculi multiplex vñs.



eius tuberculi fede rupis quandam imaginem, asperitatemq; preferente sex musculi principiu duxerunt, a superiore presentium parte in acutam quandam veluti lineam accedente; videlicet radij .x. secundus, & .T. quartus: Brachialisq; .v. tertius, & .f. quarrus, ac digitoru quoq; .x. decimus septimus, & .f. decimus octauus. Per eundem quoq; processum parte posteriore quartus eoru, qui ad brachium descendunt, neruus pertransit. Cuius ratione leuis quidam sinus iuxta externu orbite latus celatus est, quae pars musculi etibet flecentibus intesta est. Preter haec autem duo tubercula ( siue capitula, siue codylos nuncupare maus ) à Galeno hic dicta, tertium quoq; medium, interiori tamen proximu est: quod cum osse cubiti dearticulatur, ad flecentiu, extendendiuq; brachium ipsum circa cubiti articulum. Sunt verò tria hec tubercula, inaequales quidam processus, siue apophyses, eiusdem scilicet humeri partes: non epiphyfes, siue appendices: quia non distincta adnascencia, siue coalescentia humero: veluti de superiore capite predictu est. Idq; maxima ex parte, omninoq; in aetate perfecta: licet in infantibus, vsq; ad aetatis suae annu septimu, saepe huiusmodi appendices vntur; extremum tuberculu, internum scilicet, externuq;, cum trochleari parte cooperentes fitnt, preter tertiam, quae in medio amboru dictoru est ( prout antea tetigimus ). Inde enim vsq; adeo intermedia chartilagine in os degenerante coalescit: vt nulla proxis appendice donari parte inferiore humeru non temere Galenus, aetate prouectiores considerans, dcterminarit. Verum prius, qua ad presentis textus reliqua perpendenda deuenuimus, duo circa Galeni verba in libro de vsu partium secundo. *b.* paulo ante à nobis in mediū adducta, peribrenda sunt. Primum vbi internu tuberculi vsus enaratur: quoniam primu eius vsum esse ait, vsuorum, ac neruoru tutelae gratia fuisse à natura creatu, quodq; ex abundantia in ceceps eo natura vtiq; ad musculorum scilicet inde exortum: cuius vicem potius versam arbitramur, prima scilicet intentione, primoq; vsu propter musculos natura tale tuberculu extudisse: cum neruos, vasq; paulo intus recondens natura eoru tutelae prouidisse ponent. Alterum verò annotatione dignum ad huc est: quoniam oculari quaedam cauitate, pauloq; posteriori superficiali, ac sine profunditate radium tale externum tuberculum ambire, ac in se iulcipere ait. Ex quo ad arthrodiu talis articulatio reducenda veniret. Cum tamen antea nos ad enarthrosim reduxerimus. à Nisi inter enarthroses lenem, ac superficilem, hoc est, minus profundam hanc, vel ex earum numero esse dixerimus, quae parum profundae sunt. Cum apertissima radij cauitas, manifestissimi mumq; predictum externum humeri capitulum, sit quam precipue cauitatem in crustans chartilago non parum adiuget. At haec obiter praeterea iam sint. Quod autem Galenus hic, & libro etiam de vsu partium secundo, & de interno tuberculo loquens, dixit paulo maus; quinimo ibi absolute maus externu esse, tamen multo maus apparet: falsum est in homine cuius perspicitū liquet: internum scilicet externo maus esse. Cum apertissime minus internum in eo sit, quauquā longi maus, nedum maus apparet: quoniam scilicet internu ad nulli ossi dearticulatur, coniungiturque. Sed discoopertū ab omni siue obtundente, siue dura substantia existens, totum tangentibus pro palatur. Ideo longē grandius illo exteriore videtur, quod radio dearticulatu existens, sub illo, musculisq; cubitum extendentibus occultatur. Prouenisse autem hunc errorem, opinamur: quoniam eū de vtriusq; processus magnitudine loqueretur, eos inuicem cōparans Galenus, exteri duntaxat portionem quandam superiore quadantenus eminentem considerabat. Sed ea nō est y quam cū radio dearticulati predicterat. Eum igitur totū processum considerat debuerat, tuberculūque quod radio dearticulati est: sicq; itatim ad longē, ac ferē duplo maus interno inuenisset. Idcoq; dixisse potius debuerat, q̄ quauis interior processus longē minor exteriore sit: ea tamen longē maior apparet: quia discoopertū ad tuber est, nulli ossi coniunctum, articulationiq; illud verò ab altero osse, cui dearticulatum est, y musculisq; predictis absconditū est. Sed haec de duobus humeri extremitate in inferiore processu dicta hucusq; sint. Ad eius igitur mediū processum, inferioreq; sinus: per quos dearticulati cum cubito sit, conuertamur.

**TEXTVS. QVARTVS.** Cuius in humeri extremitate est concavis trochlearū orbitis perfimilis, circa quā cubitus mouetur. Vbi autē cauitas haec desinit, in extremis vntur; lateribus; duae praeterea sunt cauitates; quarū anterior posteriore minor est. Excipiunt autem haec cubiti coronas. In extremitate quidem inflexionibus anteriore, in extensionibus autem; posteriori posteriorem.

**G**ALENI verba hæc humanæ humerû præ manibus haberi statim clarissima apparent, pro his verò, qui ossa desiderant, figura prima anteriorè cavitatè lterea in. Figura autem secunda posteriore m ltera .o. præferunt. Eam verò, quæ condeat trochleari orbis per similibs est, anterioris quidè L. K. M. prima figura; posterioris autem R. K. L. secunda figura ostendunt; speciatim verò ltera K. mediana sinuata indigat R. L. in prima, & L. M. in secunda, eius latera, superciliosè demonstrant. De prima quidè cavitatè in textu dicitur, quæ trochleari orbis per similibs est, loquens Galenus libro de viâ partium secundo, sic inquit. (Hæc méri extrematas hoc modo secundò laterales partes capitis (scilicet inferiores) epiphysim habet; hanc quidem foris, illam autem intus) (epiphysim id est appendicè, pro apophysim, hoc est, processu, quæ ipse intellexit; ut quia in humero veram epiphysim appendicemque superius tantè extiterè, existimarat, .m. quousq; iterè scribentium defectu epiphysim pro apophysim scriptum esse potuerit.) Sunt autem hi processus duo, anterior, & externus, de quibus cõmentò cum textu præcedenti locuti fuimus. [Quousq; in medio cavitatè quædã est læuis, & rotunda, similibs trochlearum vocatè cavitatibus, circa quam cubiti ipsius corone mouentur] Hæc igitur est cavitatè, de qua priùs hic loquitur Galenus. Quod verò hic dicitur [ante hæc trochleari orbis] interpretè vertit [similibs rotarum vocatè cavitatibus] Nos verò non fecimus, quam hic clarius [concauit trochlearum orbis] tradidimus. Hæc enim omnibus rotis per similibs est, sed his, quæ in exteriore articulo cavitatè habent, ut trochlearum rotule sunt, ad habendam æquam, vel uti graue pondus atollendù, idonearum, quousq; vulgò nostri curulas, alij trochlears nũcupant. Subdit autem ibi Galenus, de alijs duabus vtrinq; politis cavitatibus, hæc verba [Vbi autè ipsa (scilicet prædicta cavitatè) definit, vtrinq;] *scilicet sunt* (sic enim Hippocrates humeri cavitatès vocat) quas extendentibus totam manum, & flexionibus cubiti ipsius corone ingrediuntur; fusiõq; hæc (scilicet cavitatès) extremitatibus, & flexionis terminus. Ob id natura tales, tantiq; creatæ, ad eamq; potissimùm humanam partem suam positionem habuerunt. Si quidem eam antèbè corpore non motu ducit, ad hæc tubus quoq; totus circumducitur; & manus flexitur. Motus enim cubiti ad internas partes flexionem manus ipsius efficit. At si ad alteram partem cubitis extrinsecus ducitur (fit autem hoc, cum posteriore corone motus cubiti ductus efficitur) tunc manus extenditur. Quatenus igitur circa impedimentum & liberè circa curuam humeri, corone ipsius cubiti circumferantur, anterior quidè totam deorsum latèpè flexit, extèdit autem posterior. Cùm autem iam ad bathmidas perueniètes ipsæ, antè obiderint, prohibètur vltra procedere. Atq; vniuersi motus earum hic est terminus. Quod si bathmidas omninò non essent, aut si maiores eorù, manoreffiss, quæ nunc sunt, ad multas sinthones manus impedirent. Et enim si factè omninò non essent, omnis extensio, ac flexio omninò periret, cù curuam cubiti corone incidere. Sed si minores eõtigissent, quam nunc sunt, tantum vtrq; perfectè manus extensio, & flexio impedirentur, quanto citius, quam cõuenit, bathmides ipse corone occurrere præuenire. Quod verò si etiã maiores, quam nunc sunt, fuissent eorù, vel si humeros omninò etiam postuissè esset, qd reflexe dicitur sic cubitis in posteriorem partem, vltra perigèt extensionem, cuius notum est. At qui si hoc ita euentisset, nihil ei volentis, ac vehementioribus actionibus, in quibus manus prorsus extensio indigebat, fortiter periret possemus. Quippe cùm sic in sinthone, tota tantum lederet, quantum ipsa excedit. Verum quæ nunc sunt magnitudine bathmidas, totius manus extensio periret quidem efficitur, exactior autem sit flexio: ita vt nihil vel excedat, vel deficiat. Quod verò figura bathmidum assimilata est corone ipsius ingressari, maioris cõmoditatis gratiã, & hoc cuius considerat. Melius siquidem fuit exactè stringi eminentias à cavitatibus vtriq;: vt nullus in medio locùs vacuus relinqueretur. Hoc autem pulcherrimè fieri alterò potuit, quam nunc habet; vtraq; bathmidon à latiore quidè superno labro incipente, in valde verò breuem infernè terminò desinente. Sed & paulatim ipse conuertitur pro thè vtriusq; ipsas ingressariar: ita vt nec pars aliqua eorum angustia loci laboret, nec laxa sit, ac vniuersa non mediocre vtrq; prouideatur etiã hoc obstat. Quod verò & cavitatès ibi cõstituisse sint, quò cubiti ipsius corone peruenitur erat in perfecta extensione, & flexione; positionis eorum artificium ostendit, quod nemo non aperte nouit. Cùm enim nec in alia humeri parte aliqua cavitatè viliam inuenire liceat, nisi vtriq; earum, quæ inueniuntur; non summa, nec remota, sed cõmodissimo loco posita videtur; quousq; non maioris cõmoditatis gratiã eis sitis usq; sitis? Nam præter positionem, magnitudinè carinæ, & figuram adeo cõmodè simit, & exactè hæbet ad omnes manus actiones vniuersa natura, vtrū vel paululum quis immutauerit, inueniuntur flexionem ibi afferat.] Hæc Galenus vtrq; adeo quidè clara, vt nulla indigant expositione. Sed vltis

l. Cap. 15.  
in princ.

m. Vt patet supra in proximo textu.

Bathmidas  
quæ.

Sinus carii.

Motus flexionis.  
Extensio.

Bathmidas  
necessitas  
& quibus.  
Si non esset.  
Siminores.  
Si maiores.

Figura.

Locus, ut  
polio.

extremis humeri partibus: superius in quâ, inferius; : tempestiuus est ad intermedias eius partes per migrare, hoc dumtaxat prænotato, quod tamen in media humeri prædicta cautas concavus trochlearum rotarum orbis per similes, tam quoad ipsam cavitatem, quam quoad utriusque; posita supercilia sit: nihilominus tamen quadantenus quoad hæc differt: quoniam scilicet internam superciliâ longè maius, elatiusque, fuit, trochlearum supercilijs similibus, articuli lux attonè ad interiora præpediens, externâ verò minus, ne radij tam cum ipso humero, quam cum ipso cubito cõmodam dearticulationè impediret: cù præcipue internam externum humeri tuberculum radio coniunctum sit prædictam trochleæ cum cubito dearticulationè satis superque; defendat: sed Galenum audiamus.

☉

## TEXTVS QVINTVS.

☉

☉ Τὰ δ' ἄλλα μὲν περιεπέρις ἔχει ἡ θραξὶς ἢ μὲν ἑστὶς, ἢ ἴσως ἄνευ, κατὰ τὸ γὰρ ἔχει τὸ σπῆν, καὶ τὸ ἴση, αἰὼς δὲ ἀποδιέρη, καὶ ἑστὸς ἔσσι.

☉ Quoad alias verò partes, rotundus est humerus, nõ rectus, neque similis ex toto. Galenus enim quoad anterius, & exterius: finus autem posterius, interiusque;.

☉

## COMMENTVM QVINTVM.

☉

**V** M E R I figuram inæqualem posuit. Cùm nec exquisitè rotundus, neque rectus omnimò sit, quanquã teres quodammodo, nec sibi ipsi vndeque; internam similes: quinimò dissimilis viq; adeò, vt nil perpetuum, totalèq; de anterior, posterioremq;, aut de superiore, inferiorèq;, siue etiã de lateribus pronuntiam determinatè queat. Eapropter Galeni sermonem si nõ prorsus, quadantenus tamen adaptare, glossareq;, ad bonum sensum reducere conabimur. Inquit igitur Galenus hic gibbum esse humerum, quod anterius, exteriorisq;. Id quod verum esse admittere possumus, anterius quidè à medio sursum, à sine scilicet illius asperitatis, quæ ad insertionem quatuor primorum humeri motorum musculorum, .µ. Originemq; secundum cubitum siccantem musculi .α. à natura creata est, litera e. in prima, & secunda figuris notata. Tereti enim forma pars illa superior quadantenus extuberat, secundum longitudinem, eò magis interim cõpressâ utriusque; quoad prædictâ asperitatem descendendo magis accedit, deorsum verò anteriore sedè, quæ internam cavitatem trochleæ respicit, cõpressâ leuiter est: quibus cõpressionibus, velut in superioribus secundum intus, & extra dilatatur: ita in inferioribus secundum ante, & retro, vt cõmodè prædictæ dearticulationes cum radio, & cubito fieri possint. Dicit præterea Galenus hic, gibbum esse humerum exterius, addereq; possumus in simal posterius, in prædictâ lateralis cõpressionis sine: vbi velut in quadam lineam protuberat: quantum scilicet a loco medio propè præactam asperitatem, deorsum ad externam tuberculum radio inarticulatè protenditur. E regione verò finum esse posterius, interiusq; ait. Quam tamen similitatem, si rectè, atque; exquisitè perpèderis, exterius quoque; quoad lateralem illius cõpressionem inuenies. A dimidio autem supra, scapulae dearticulationè versùs, anterius magis, exteriorisq; gibbus est: posterius verò, interiusq; finus. Verum tam gibbus, quam finax partes viq; adeò leuiter, obicureq; gibbæ, vel finax sunt: vt tutus ciset vndeque; inæqualem statuere, quã ( vt dixi ) abiolutè, perpetuòq;, vel gibbum, vel finum in illis pronuntiare. Vt mirandum proculdubio de Galeno in dicto libro de vsum partium secundo, .µ. eius rei, quæ non est, rationem vestigare conatur, sic dicens [ Os igitur humeri rationabiliter extrinsecus quidè magis gibbosum est, in ternis verò partibus magis simum. Melius enim fuit ( vt etiam mox a principio dictum .α. est ) ad seiniuicem conuersas fuisse manus. Quod si est, concavus quidem osium partes seiniuicem aspicerentur, auertere verò sibi ipsi forum conuexitates: Mox autem huiusmodi constructio brachia cetera priora ad apprehendendum corpora cõuexa, & gibbosa, preparando simul locum vasis, quæ ad totas manus feruntur. ] Hæc Galenus. Quæ quidem non nisi quoad infimam humeri partem, ac ipsius cubiti priuicipij, verificari quodammodo potest. In reliquis verò partibus, nec de gibbositate, neque de simitate ad propositam rationem determinare quidpiù verisimile possumus. Sed alia cõtemplemur. Præter dictam enim asperitatem magnam ( viq; adeò, vt in senioribus, durisue corporibus insignis quidam in eius medio processus exoritur, præsertim; in parte ipsius superiore, ad musculi epomidis apud finem insertionem paratus ) altera inuenitur posteriora versùs, minor asperitas, litera f. in prima figura denotata, cui carnosa primi cubiti siccantem musculi .ξ. interioris principij pars .α. in transitu connascitur. Humeri foraminula vix effatu digna nõnulla circa sinuum, & capitum supercilia obseruantur, ligamentorum siue oriendorum, siue implantatorum grana, pauciora autem, minoraq; ad hæc per humeri corpus dispersa velut porali nonnunquã viuuntur, vt venulæ per ea introrsum penetrant, nutritionis occasione. Cùm verò cõsideratione dignum nil aliud ipseiale

Asperitas magna.

µ prima quidè 3.

tab. l. c.

1. Δ. secunda verò 4.

tab. 3. ter

ty 13. tab.

5. quarta 4.

tab. 7. c. p. o.

v 8. musculi.

tab. 7.

Cõtra Galenum.

α. Cap. 16.

in princ.

o. r. d. v. p.

1. &amp; 1. 3.

Asperitas magna.

Asperitas alio.

ξ 6 musculi.

tab. 6.

α. Ibidè in altero bra chio o.

Foramina.

preter ea, quæ prædicta iam sunt, circa humerū occurrat. Nisi quæ talis, tantæque formæ ipsius diuersitas musculorū diuersitati, eorumque; vel cōmodæ, vel tutæ firmitati, ac inflexioni, siue implantationi, aut principio ascribenda est, ad cubiti, & radij, cum quibus dearticulatur, cum interseu- uicem quoque connectantur, dearticulenturque; insimul in eodem capite, ex Galeni etiam, quem interpretari conamur, dogmate, sermonem conuertamur, cum sic scripsit.

Περὶ πύχου, Καρδίου. κ.

De Vlna. Caput Decimumsextum.

TEXTVS PRIMVS.

Πύχου καλεῖται ἢ καὶ ἅπαν τὸ κῆλον τὴ μεταρῶν θραχίονα, καὶ καρπῶν. Καλεῖται δὲ καὶ τὸ ἔσπερον ἰσὺν τῶν ἐν αὐτῇ τῶ μῦσων, ὅπερ ὑπετίθηκαται διατῆρ τῆ κερῆτι ἀρρωστολογουμένη. Αὐτὴ δὲ ἢ καὶ τὸ πύχον αὐτῶν τῶ ἰσὺ περιλαμβανὸν τῶν ἔξω τῶ θραχίονα κῆλων ἐπισημαίει καλεῖται, καὶ ἔστι τῶν διαφθόρων τούτων ἔργον, καὶ τὸ φανερόν, καὶ ὅλον ἅπαν τῶν χεῖρα σημαίον.

Cubitus appellatur quidē tūm totū membrū, quod mediū est inter humerū, & brachiale, tūm etiam eorum, quæ in ipso sunt, os alterū, quod grandæus, alterūque; radio nuncupato subferuntur. Cuius quidem finis superior leniter cauus exteriorem humeri condylū recipit. Huius dearticulationis munus totam manū tūm in pronam, tūm in supinam circumducere.

COMMENTVM PRIMVM.

**Q**UOD πύχου, hoc est, cubiti nomen bisiariam, vel ut Celsi brachium, capiatur, prædictum antea fuit, p. cōmuniter quidem pro toto membro (vt hic dicitur, quod mediū est inter humerū, & brachiale) duobus ex ossibus cōposito: Ac specialius pro eorum, quæ in ipso sunt, altero grandæiore, quod radio subferuntur, de quo nos, vbi sermo incidit, sub nomine cubiti, præsertim in hoc capite, loquemur; totum interea prædictum membrum, vlnam, distinctionis gratiā, velut etiā prædiximus, q. nuncupantes. Cum verò in præsentī capite de vtroque; simul officio Galenus ratiocinetur: Eapropter condecens fuit in titulo cōmuniter πύχου sumptisse. Ideoq; clarioris etiam doctrinæ studio, iuxta fæctam determinationem, vlnam pro toto fumentes, traduximus. Propriè dictus igitur cubitus, grandæus os est, alteri quidem minori, quod radius appellatur, subiectum, vt super eo, scilicet cubito, superficiali suo sinu, tuberculum humeri externum recipiens, etiā; dearticulatus radius, in pronam, & supinam, vnā cum sibi dearticulato quoque; inferius brachiali, extremāque; tandē manu, cōmodè, ac liberè circumducī queat. Quauis autem superficiali cavitatē humeri capitulum externū à radio cōprehēdi nunc dicat. Haudquaquā tamen talis, tantāque; parua huiusmodi cavitatē est: vt ad arthrodiā hæc dearticulatio reducenda veniat: sed ad enarthrosim, prout præcedenti etiā capite declarauimus. Cur autē vnū quidem os (perbellè inquit Galenus. f.) in humero, duo verò in cubito constituta sunt, dicere consequens fuerit. Ad quam quidem propositam difficultatem summam prius ex Galeni dogmate respondēbimus: deinceps autem pro maiore fide, ac claritate, ipsius etiā Galeni verba recitabimus. Dicimus igitur, quod ad humeri motus vniuersos vnū os factū erat, caput rotundum habens: quod in leuiter cauū scapulæ sinum recipiatur, depressis, nō altis superiecijs circumdatum. Cum in eius articulo, tanquā rarè validas actiones obcurrunt, ad motus facilitatem magis, quam ad di spathiam intendit. Ad eò vt eò modissimè ad omnem positionis differentiā moueatur. Quodq; maius est, in orbem agilitissimè circumagatur: validissimis interum ligamentis munitum, ne nimis promptè luxetur. Quod si duo in talibus motionibus ossa forent: alterum alteri impedimento esset. Socius verò est in vlnæ constructione. Cum enim hæc duos habere motus deberit: Alterum quidem inflexionis, & extensionis: Alterum verò in pronam, & supinā: vnico hi offe, vnicaue dearticulatione compleri nequibant. Nimis enim laxa, & luxationibus quæcunq; ex leui causa obnoxia talis dearticulatio esset, cum tamen his motibus validissimas actiones obeamus: Idcirco necessariū fuit, duo fuisse ossa, alterum quidem, cui extensionis, atq; inflexionis motus inniteretur. Atq; idipsum nomine totius, cubitus Græcè πύχου nuncupatur: seu maius dicere, totū cōmūiter nomine partis huius proprio nominatur. Id enim os principale est, propter brachij ipsius flexionem, & extensionem, totūque; cubiti motum: cui alterum os incubat: quem radiū dicimus, propter manus motū illi dearticulatū. Immo enim cubito, sed firmiter super mensā persistente, manū ad pronam, & supinam cōuertemus. Diuersa igitur (vt patet) dearticulatio necessaria fuit. Cuius diuersitatis ratione, duo hæc ossa, nō sicut in humero vnū, necesse;

p. Cap. p. p. celsi cōm. πύχου de plicæ.

q. Ibidem.

r. Com. 3. versis finē. f. 1. de v. p. cap. 17. in princ. Dubium. Responso. Cur os humeri simplices.

Cur vlnæ ossa duo. Vlnæ motus duo.

ria extiterut: natura magis ad dispathiam hic, in humero autem magis ad motus agilitatem prudentissimè attendente. Quibus deinde ambobus ossibus alia ratione carpum dearticulari, magis quoque ad dispathiã, quam ad motus agilitatem intendente, dicemus: vt fursum, ac deorsum, & in latera manum tuto mouere, ac circumducere valeamus. Hæc ex Galeni dogmate collegimus. Quæ quidem vt exquisitius pendere valeas, fidelitq;, ac abundantius ab eodè educas; verba eius in medium adducere, velut in alijs ferè omnibus obiter auimus, nõ grauauimus. Inquit igitur, pro responsione ad propositam difficultatem, Galenus \* ( At præcedit hoc quidam cõmunis sermo de omnibus dearticulationibus. Dicitum itaq; antea est, qd nõ solum formas particularũ organũ aptas actioni, cuius gratiã organum quoddam factum est, natura efficit, sed etiam dispathiã musculorum prouidet. Ostenditur autem hoc ipsum & in dearticulationũ tractatione. n. Si quidem vbi motus earum fortibus, & multis actionibus simulari debebat, & metus erat, ne ob violentiam ipsarum, luxatio quædam contingeret, dearticulatio huiusmodi constringitur, & continetur vndiq; multis quidẽ extrinsecus ligamentis crassis, .x. non membranosis solum, sed & rotundis, & cartilagineis corona stipata; eminentias autem simul caustibus ijs, quas ingreduntur, æquales: vt nuiquam vlla sit laxitas, simul autem quibusdam cõuexis labris, & veluti supercilijs adamussim retentas obtinet: vbi verò paucis, & nõ violentis actionibus dearticulatio facta est, ibi statim, eũ motu iam abicito, tenuia quidẽ, & membranosa ligamenta, laxam autem omninõ totam ossium cõmissionem fabricata est. Quòd igitur totus corporis omnes dearticulationes hoc modo se habeant, explicabit procedens sermo in vnoquoq; membrorum. Quod verò & manũ dearticulationes sic habeant ( de quibus proposui dicere ) iam licet expendere. Validissimas siquidem, & plurimas functiones obimus, tũ carpi, tũ gibbi cubiti dearticulatione mouentes: quare dearticulationes istæ securq; sunt, tũ ipsi ossium cõmissuris, tũ ligamentis ipsas dearticulationes foris connectentibus, quæ non crassa solum, sed & dura vndiq; sunt facta. Humeri autem dearticulatio tanquã raro valida obens actiones, frequentior autem vel quicquens, aut leuiter, & citra violentiam inota, laxam quidem, & ipsorum ossium habet cõpositionem, magisq;, adhuc membrarũ ipsa ambientium. Neq; enim cartilagineas ipsas, neq; crassas, neq; omninõ duras, sed admodũ penes, & molles, & quæ minimo negotio quamlongissimè extendi possint, natura creauit. In gibbi autem cubiti, & carpi dearticulationibus, non crassa modò, sed etiam dura quædam ligamenta vndiq; cõtrauentia, & prohibentia, ne dearticulationũ ossa plurimũ a mutuo connexu resiliant, ac distent, facta sunt. Quapropter & si sepe violentè moueri cogantur, manus tamen, quam in humeris articulorum accedit luxatio. Non enim fieri potest, vt os aliquod suo articulo aberret, ac promineat: nisi plurimũ a reliquis distet. Distare autem plurimũ ei contingit tũ ex ligamentorũ imbecillitate, & laxitate, tũ ex ipsa ossium cõpositione; quãdo coryliarũ *troch.* hoc est, cauitatũ circumferentię supine sunt, nullum prorsũ adeptę superciliũ. Quin etiam & in corylis ambonas quosdam, idest labra, superciliaue, ac extremitates habentibus, ipsę supercilorũ circumferentiã non raro violentis motibus circumfractę, non solum statim articulus, vt excidant, sed toto tempore reliquo hoc ipsum assiduè pati permittunt, quo consistit, exquiritum dearticulationem, ne luxetur facili, multũ habere momenti. Cur igitur non omnes dearticulationes tutas natura cõstruxit? Quonia pugnam haberet necessariam varietas motuũ cum securitate cõstructionis, neq; poterant in idem ambocõuenire. Sequitur enim illa quidem laxitatem dearticulationis, hæc autem stabilitentũ, & omni ex parte cõstructionẽ. Vbi igitur nõ est penculosa varietas, superflũ ibi, & vanum erat, aliquid molari ad tutelam. Vbi autem est penculosũ, & fallax, ibi maiorem dispathiã, quam varietati eũm prouidisset, seroq; in eõ iam esset, vt propter singularem motum musculo simile effecerat membrũ, vtriq; articulorũ adhuc apertũ posuit dearticulationem motibus in obliquis cõmodaturam. In humero enim articulo, nõ solum extendere, & flectere, sed quoquoersis in orbem circumducere licet brachium. Etenim caput eius rotandum est, ligamentaq; laxa, & cõcauitas ceruicis scapularũ est supina, & vndiq; similis, quomodo & caput. Articulus verò gibbi cubiti, & carpi vndiq; cõstrictos variè mouere, & in omnes partes circumferre non licebat. Quare eũm quidem esset impossibile, nõ expeditet autem varietatem motuũ prorsũ negligere, duplicem molita est in vtroq; articulatione: vt quod deorsum vtraq; requirit, hoc secũdæ accessione suppleatur. Ipsas enim ad latera delationes membrorũ, fursum quidem, radij ad humerum dearticulatio efficit, deorsum verò carpi ad tenuem cubiti apophysim ( quancũq; hoc falsum esse offenduri sumus. \* ) Atq; in singulis digitorum ossibus dearticulatio habet quidem ipsa quoq; motus ad latera (intellige quòdam prima digitorum ossa, primosq; articulos) vti in humero: nõ tamen quò in multas partes carpi magentes, & quauis ligamenta tenuia, ac membranosa ipsis circumiacent. Ipsa enim ossium cõformatio diuersa est ab ea, quæ in humero. Neq; enim similia sunt vndiq; capita, qd nõ adamussim rotanda sunt, & excipientũ capita ipsa cauitatum supercilia in tenues ambonas, idest margines deapophysis cõstrin-

\* d. de v. p. cap. 17. circa princ.  
n. d. de v. p. cap. 8. & 11.  
u. Lib. 12. eiusdem.  
x. Vide eisdẽ cap. 12.

Manuum, carpiq; & cubiti dearticulatio. Humeri articulatio.

Dubium. Responsio.

Cõtra Galenem. \* In singulis digitorum ossibus dearticulatio.

constringant extrinsecus tūtō vndiq; assumptis etiā ossium, quæ *συναρτησιδι* vocantur, epiphy-  
 nes. Quantum enim abfunt a carpi, & gibbi cubiti cōstructionis securitate, tantū superant eam,  
 quæ in humero est, natura ratione optima id molita. Et si enim quam minima corpora compre-  
 hendunt: cum agunt solæ, atamen in apprehensionibus maiorum gibbi cubiti, & carpi dearti-  
 culationes non parum adiuvant. Immo multo pluribus actionibus subserviunt, quam aliæ dearti-  
 culationes, nudę vndiq; neq; vt quæ in humero sunt, in circuitu maximis vestiuntur muscu-  
 lis, nihil quidem inotus impediētib; securitatem verò non pauca humero præbentibus. Itaq;  
 cum duo sint, quæ talem articulorū efficiant: fortitudo videlicet ligamentorū, & exacta com-  
 positio: vtraq; quidem est in gibbo cubiti, & carpo: altera verò indigitis. In humero autem neci-  
 tra planè est. Quamobrem quoniam securæ, & strætæ vndiq; constitutioni, nō licet moueri va-  
 riè, iuxta cubitū, radiū duplices dearticulationis gratiā rationabiliter posuit natura. Hæc Ga-  
 lenus. Quæ vera in digitis sunt, quodā primos articulos, in secundis enim & tertijs ambe cause-  
 læ sunt. Cum per ginglymon dearticulentur, quam Galenus minimè cognouit. A quo nōnul-  
 lorum quoq; aliorum dubiorum solutiones addiscemus:

Pro quorum tam dīctorū, quàm dicendorū intelligentia  
 duas hic in margine propositas figuras contemplare: Prima  
 quarum anteriorem, seu malum dicere anteriorem  
 vñæ, hoc est, duorū ossium, tam cubiti, quàm radij con-  
 iunctiōnē ostendit. Altera verò exteriorē, posteriorēq;  
 eorundem ossium faciem præferet. Est autem cubitus in  
 vtraq; figura, quod grandius os est, à literis R. vsq; ad A.  
 in vtraq; notatum. Radius verò alterū os est minus, vtro-  
 biq; à literis s. vsq; ad N. designati: quod (vt patet) alteri  
 maiori superponitur. Est igitur superior cubiti finis, hu-  
 meri trochleæ dearticulatus (vt videbimus, supràq; dīctū  
 iam est.) per ginglymon, literis E. D. notatus. Primis au-  
 tem radij superior, de quo impresentiarū tetigit Galenus,  
 leuiter casū cum esse, ac humeri condyliū recipere sub-  
 iungens; litera N. tam in prima, quàm in secunda figura  
 ostenditur. Sed sigillatim ambo perpendamus. [De posi-  
 tione autem, & conformatione ipsius radij (cum ipso etiā  
 Galeno. 7. deinceps dicamus.) In ipso enim codē sermo-  
 ne & de cubito dicitur.] Primum igitur dubium soluendū  
 occurrit circa radij positionem. Cur scilicet hic obli-  
 quus, cubitus verò reclusus positus fuerit? Ad quod sic Ga-  
 lenus respondet, dicens. [Positio sanè radij obliqua meritò fuit, quemadmodū cubiti positio re-  
 cta. Secundū naturam enim motus vtriusq; ossis esse oportuit: Sed motus  
 quidem membri per extensionē, & flexionem, secundū longitudinem eius fit: qui verò ad pro-  
 num & supinum, ad latera est: propterea igitur & obliquus quidem est radius, reclusus autem cu-  
 bitus. Cubitus siquidem extensionibus, & flexionibus: radius verò conuersionibus ad latera sub-  
 seruit. Ob eam causam ad humerū vtriusq; ossis dearticulatio dissimilis fuit: Sed de illa quidem,  
 paulō post dicetur. 4. Positio verò radij, quæ quidē obliqua sit, iam dīctam est. Cum autem in om-  
 nibus duplex sit obliqua positio (vel enim ex pta intus foris desinat, aut contrā foris quidem incipit,  
 intus autem finit.) Cur alteram earum scilicet secundam dīctam in radio esse natura maluit,  
 nunc dicitur (scilicet cur foris incipiens, intus desinat?) Ex totius enim manus motibus ad latera  
 (sicut etiam dīctam est ante b.) qui quidem sunt ad supinum, ad pauciores actiones, qui verò  
 ad pronū, ad multo plures, & magis necessarias, sunt viles: propterea igitur & radij positionem  
 paratiorem ad obediendū motibus ad pronum natura effecit: superiorem quidem extremitatem  
 eius ad caput humeri externū duccens (quam vtraq; figura litera N. demonstrat) inferiorem verò  
 ad magnū extendens digitum (quæ in prima quidem figura literis s. v. In secunda verò literis  
 a. s. ostenditur.) At si cōtra se haberet, facilius vtrq; ad supinum, quam pronū moueretur. Pre-  
 senti namq; positioni prona figura vicinior est, contrariè verò supina. Ad propinquū autem locū  
 promptior, & facilior omnibus, quæ mouetur, est latior: quemadmodū ad longinqua difficilior:  
 ob idq; obliqua est, & sic, modo quoddā, obliqua (q. d. tali obliquitate modo, vt scilicet foris in-  
 cipiens, intus desinat.) Cur autem incumbit cubito radius? Quia hoc eubitus longior est, & plu-  
 rimum dearticulationis ad humerum ipse obtinet (cum, vt paulō post videbimus, principalior,  
 cōmodiorq; cubiti ad humerum ipsum dearticulatio sit: ideoq; etiam hæc sustinet, illaq; ab hæc  
 dependeat.) Rationi autem consentaneum fuit, os breuius super longiore vehi. Sed cur vtriusq;



Cōtra Ga-  
 lenum.

7. In proo-  
 som. 14.

7. 1. de v. p.  
 cap. 13. in  
 princ.  
 Dubium  
 primum.  
 Cur radius  
 obliquus.  
 Respōsiō.

8. Tex. 60.  
 ex 1. de v. p.  
 cap. 11.  
 Dubium  
 secundū.  
 Cur ab ex-  
 ternis in-  
 trosum.  
 b. Cap. 4. &  
 7. quælibet.

Dubium  
 tertium.  
 Respōsiō.  
 Dubium  
 quartum.



conformationem.] Hæc Galenus tam de cõmuni amborũ processuum nomine, & figura, quàm etiam de propria posterioris nomenclatura. Qui tamen post aliqua à distinctis de huiusmodi processuum quantitate, ac figura nõ nulla discurret, nõ secus ac antea de hos recipientibus humeri sinibus (quos Bathmidas nuncupat) locutus fuerat: sic igitur inquit [Quod verò & cubiti ipsius corvæ probam planè cõstructionem habeant, inde discas maxime, licet si cõsideraueris quantum lesionem totius manus actiones necessario accepturæ fuissent, si hæ breuiiores, vel magis oblique, vel rectiores, vel rotundiores, vel acutiores, vel latiores, vel alio quouis tandem modo transformatæ fuissent corvæ. Si quidem igitur per hypothelium eas demum longiores esse, quàm siue, quis dubitat eas maturius ipsi brachio incidentes, impedimẽtum aliquod summæ extensioni, & flexioni allaturas? Si minores, partim quidem & cubitus refrigeretur, & in posteriorẽ partem flecteretur, partim autem dearticulationis totius securitate priuaretur: vt etiã humerus ex cubito facile exiret, in flexionibus quidem, posterior apophysim præteriens, in extensionibus verò anteriorẽ. Ceterum si etiã essent rotundiores, aut rectiores, quam nunc sunt, medium humeri condylorum cauitatem rotundam laxam vniquẽ reddi necesse fuisset: vt quæ nequaquã simpliciter similiter vt nunc coiret, & conueniret toto corpore cù ipsi corvæ. Quemadmodũ si a angustiores etiam fuissent, per ampliores humeri locum videret, laxæ hæ demõd, & velut natantes ad laterales frequenter partes circumlatæ fuissent: adeo vt & rectus totius cubiti motus peruertetur, & totius manus actiones fultura, ac stabilitate destituta, ideoq; imbecilles redderetur. Queniam admodum & si latiores media humeri regione factæ fuissent, nequaquã eam ingredi potuissent: sed sic super circumferentia, & supercilium capitum sublimes vherentur. Nunc verò cum æquè ipsarum latitudine omnino sit rotundus, humeri regionem, quam Græci *τροχληθῆ* appellant, stringunt quidem vtraq; ipsarũ à cõdylis tuto vtrinq; declinare verò in obliquũ nullquã potest. Propter etiã tuta simul, & accommodata actionibus dearticulatio facta est.] Hæc de vtriusq; processibus per pulchrè Galenus: sed nos ad presens contextũ reuertamur. Inquit igitur duos hos processus magnũ cõprehendere sinum (quem à Græcè signatis .r. similitudine signato denuncupant) humeri trochleam in se recipientem, cù quæ per ginglytionẽ perfectissimè dearticulatur, dũm cubiti processus (vti dictum est) in prædictos humeri sinus reciproce recipiuntur. Quiniam nõ tantum in hoc ginglymi ratio cõsistit, quatenus scilicet humerus à cubito receptus, cubiti prædictos processus vna in se vicissim extensione, vel flexione in se recipiat, quàm in alio receptionis modo; prædicta enim signatois sinus cubiti figura sic excavata est, vt depreffa magis in lateribus sit. Quam obrem vniquẽq; perspicuum liqueat, sinum hunc cubiti, quoad latera, trochleæ supercilia, vtrinq; in se recipere: in medio autem, tanquam funis ab humeri trochleæ recipi, cartilagine autem huiusmodi sinus vsq; adeo incrustatus est: vt nõ secus, ac de prædictis processibus, ac sinibus dictum iam est, hic etiam sinus cum receptis trochleæ optimè accommodatus sit, vt ne quid nimis, aut minus dici queat. Futilis autem minimè fuerit vtriusq; ossis substantiam in teinsecam, & extrinsecam, necnon figuram, atq; superficiem perlabere. Cum enim vtrinq; longum, teres, fistulosum, medullosumq; sit, supra, infraq; appendices habens (quãuis Galenus soli quidem radio vtrinq; appendices inesse prædixerit. *k.*) varium interea tũm grossitiæ, tũm figura nõ sine mirabili artificio est: Cubitus enim supra, qua parte cum humero est, per ginglymon dearticulatum impensè crassius necessario fuit, pro dictorum processuum validorũ exortu, cõmodaq;, ac decenti humeri trochleæ amplexu: præsertimq; pro posteriore processu, què olecranon, & ancora nuncupari iam iam prædiximus. *l.* super quo tota dearticulatio firmatur. Notq; illi incumbere, dũm reclinat, solemus. Cuius validiores etiã dearticulationis ratione, tam in ipso cubito, quàm in radio circumpositæ, radicele sue processuum partes, extra sinus ipsos, ligamentorũ siue orondorũ, siue implantandorũ gratiã exasperatæ sunt, appendicesq;, ob eandem rationem obtinuerunt, ac vtriusq; in tein imperuibus foraminibus ab eubi decoratæ: qui erat primus appendicum vsus in processuum declaratus. *m.* Quæ quidem præter asperitates non propter ligamenta solam, sed ob musculorũ quoq; nonnullorũ, siue originem, siue insertionem factæ sunt: de origine quidem ab eterno, internoq; humeri tuberculis prædictũ iam est. Nonnulli enim radio, quidam verò cubito adherescunt: speciatim verò à cubito nascitur radij motorum primus, ac digitorũ vigesimus primus, vigesimus secundus, & vigesimus tertius: de quibus cõmẽto sequitur. Propter insertionem, radio processus asper inest. *n.* parte quidem superiore, internoq; in quem primus cubiti flectens .*n.* musculus inseritur. Cubito autem aspera quẽdã eleuatio inest. *o.* parte eadem, in quam cubitum flectens secundus .*o.* implantatur: sicut in posteriorem protuberantem, aspernamq; triangulam .*p.* extendentes siue duo, siue tres .*o.* disti inierunt. *q.* Sed amborũ ossium colligantiam vtriusq; ostendit: tam sibi inuicem, quam cum brachiali eodem Galeno addiscamus, quã subdit.



## TEXTVS TERTIVS.

*Ευκλις δὲ καὶ ἰατρῶν ἢ ἀράων ἢ ἀρχῶν τῶ ἀναλὺσι/προβόλων ἰατρῶν ἰσως. τὸν μὲν δὲ πᾶσι δὲ ἀλλοῖσι διακρίσει ἔχει ἢ ἰατρῶν ἰατρῶν ἀνά, καὶ τὰ ἀπὸ τῆς καρπῶ μέρη, κατὰ δὲ ἰζούθ, ἰσούθ δὲ αἰών. ἀρχῶν δὲ καὶ τῶ μέρη δὲκτολο, καὶ δὲ καὶ τῶ μέρη. ἰζούθ δὲ τῶ καὶ τῶ τῶ, καὶ διακρί. τῶ ἀπὸ ἀνά ἢ καρπῶ.*

Colligatur autem cubitus secundū utranq; extremū radio validis ligamētis. †. equaliter: Media verò abnuicē omnino d'chiscūt. Vterq; autē adnatā appendicē in partibus iuxta brachiale, fors quidem gibbam, intus verò concavā habet. \* Cubitus quidē iuxta parvū digitū, radius verò iuxta magnū. In huiusmodi autē eazitate brachiale sese infinuat, dearticulaturq; ad ipsam.

## COMMENTVM TERTIVM.

**Q**UANTVM VANQVAM validis ligamentis equaliter scilicet supra, infraq; cubitus eum radio colliguntur: cum tamen ibidem propter manus motum ad prouum, & supinū, dearticulentur, non adeo valida huiusmodi ligamenta sunt, quemadmodū in ijs animalibus cōtingit, quæ vel prorsus nullum (vt equi, & boues, ceteraq; huiusmodi folipecta, vel bifida sunt animalia) vel satis obsecurū, difficilēmq; hanc motum habent (vt canes quidem, felisq;), ac digitatis pedibus prædita huiusmodi animalia sunt) laxiora enim, pro manifestissimis, ac facillimis motus diuersitate, necessariū fuerunt. Dearticulationem autem adinuicem cum radio cubitus, per eam ginglymi speciem, quā secundo loco nos in proœmio declarauimus, .n. minusq; propnē dictam ginglymon determinauimus, verū interim ad enarthrosim utranq; reducētes. Vt enim supra ad humeri cū ipso cubito, radioq; articulū, cubitus radiū: ita infra ad coarpm, radius eubitū suscipit. Vterq; enim ibi exaeuatur vbi latius existit. Mediū verò partes abinuicem omnino d'chiscūt, du pliei quidem ratione, prima, vt præter omne impedimentū obliquo ductū radius cubito infinxus promptē, ac facilius in prouum, & supinū circumuoluitur: secunda, vt oportuna, cōmodaq; sedes tam intūs, quā extra pluribus muscū cōstitueretur, qui necessariū talem occupare partem utranq; debuerant: vt sunt digitos flectentiū tertius, .a. parte interna, præter eos, qui quidem huc superimponūtur, primum .β. scilicet, ac secundū, .γ. & eum quoq; omnium extimus, .δ. qui in latum tendonem cuti subnatū degenerat: præterea musculus est radius circumuoluentiū, ac per hoc manum ad prouum mouentiū primus, .ε. quem muscū quadratum nuncupare solemus, ac etiam tertius .ρ. radij, sed ad prouum voluentium secundus. Hi igitur omnes intermedii illud cubiti, ac radij spatium vel replent, vel aliquo modo contingunt, sicut obliquē nō nihil eius spatij replet brachialis secundus, .α. primus enim .β. totus cubito adheret. Pro quorum omnium substantiatione, membranaceū ligamentum \* à cubito in radiū per totum illud spatium implantatum est: cuius tum originis, tum infertionis ratione due vel ut exuberantes linæ nō nihil asperę .n. in utroq; ossē sibi inuicem è regione oppositę à solertissima natura factę sunt. Quod ligamentū non internis modō prædictis muscū salcū, siue fedes quędam est, sed nonnullis etiam externis: qui vel secundū totum, vel secundū maximam, aut miniam quoq; partem, sicut interni, tali ligamēto adnascuntur, vt sunt vigesimus primus, .β. vigesimus secundus, .α. & vigesimus tertius .n. digitos extendentes musculi. Itemq; obliquē radij motorum quartus, .λ. qui est ad supinum voluentium secundus. (Huiusmodi enim primus, qui radij secundus dicitur, .ε. superbrachialis musculo quarto .δ. radiū amplectitur.) Quibus superpositi sunt digitos extendentiū d' decimus septimus, .μ. decimus octauus, .n. & decimus nonus, .ξ. brachialisq; tertius .ε. Omnes igitur hi musculi aliquo modo cubiti, radijque, interuallū replent, nihil interea radij, ac per hoc extreme manus reuolutionem impediētes, ob prædictū interuallum: quod interim constans intermedij membranei ligamenti ratione, ac firmiter consistit. Habet autem utranq; id os, scilicet eubitus, ac radius, iuxta brachiale adnatam appendicem, ligamentorum (vel ut antea iam diximus .ε.) gratiā, quæ extrinsecus, hoc est, circūcirea in exterioribus; vbi supercilia sunt cauitate interna cōspicētia: itemq; extrinsecus quoad manus partem externam (vt scilicet ea parte ferendis iniurijs pertinacior reddatur \*) gibba est: intrinsecus verò (non solum interna manus parte, vt quadrato musculo .n. ibi residentis eederet, aptumq;), ac planum iter cō pertranseuntibus tendonibus paratur: vt colligitur ex ipsōdem Galeno secundo de visu partium. \* Sunt autem hi tendones primi, secundi, & tertij muscū digitorum mouentium, quos paulō ante ostendimus, sed etiam vbi carpi ossa in se receptura est) concava meriō existit: præfertimq; omnia hæc in ipso radio vtriusq; offis prædicti cauitate brachiale sese infinuat, dearticulaturq; hoc est, per diarthrosim, eiusq; speciem enarthrosim dictam (prout antea declaratum iam est .ρ.) connectitur. De quibus que-

† Idē .d. v. p. cap. 11. in fine.  
\* Idē .d. de v. p. cap. 11. circa med. n. Com. 16. a tab. 6. n.

7. b.  
8. tab. 5. 0  
6. c.  
7. tab. 6. n.

7. c.  
8. tab. 3. y

4. a.  
8. tab. 7. n.

8. g.  
9. tab. 6. n.

7. Q.  
a. tab. 3. x

4. c.  
8. tab. 3. x

4. z.  
\* tab. 7. y

13. n.

\* 1. 0. 2.  
fig. com. 1.

lib. c. c. 0  
r. p. c. c.

cubiti r. r.  
radij.

8. tab. 10.  
0. 11. n.

1. tab. 10.  
0. 11. n.

\* tab. 9. c.  
10. x.

1. tab. 10.  
A. 11. n.

\* tab. 6. A.  
7. y.

d. tab. 9. y  
10. f.

μ. tab. 9. a  
2. 10. f.

r. tab. 9. 0  
10. r.

ξ. tab. 10.  
P.

\* tab. 9. A  
10. q.

0. Com. præg  
cedenti cir.  
ca finem.

\* Ex .d. de  
v. p. cap. 11.  
circa med.

0. 7. musc.  
1. tab. x.

\* Ibidem.  
p. 10. p. 0. 0.  
0. 11. & 13.

dem inarticulationibus paulò post .g. distinctius loquemur. Nunc verò ad cuiusdam à Galeno  
 propositæ difficultatis enodationem, ex ipsius etiã verbis, cõuertamur: quòd sic videlicet nobis  
 testatum reliquit .r. [ Verbis autem multis ne id quidem eget, cur iuxta carpum quidem minimi  
 omnino sũnt obliqui motus : sursũm autem ad brachium maximi? ] Minimi quidem ad carpum  
 obliqui motus radij: adeò vt à cubito separari nõ appareant, nullũq; proprius esse motus exi-  
 metur alterius ossis, sed vnus amborum : sursũm verò ad humerũ radij motus maximi, ac mani-  
 festissimè distincti à cubiti motibus videatur. Responsonẽ igitur statim subdit Galenus, dicens  
 [ Infernè nanq; carpi, & radij ossa exactè coniuñcta sunt ossi cubiti. Vnde multus medicorũ visus  
 est nullus motus proprius fieri ab vtroq; ipsorũ , sed ea ceu vni dearticulata vnã habere solam  
 actionem omnium ossium cõmunem : sursũm tamen ad brachiũ radius à cubito multũ distat.  
 Quare ibi quidem licet radio solj plurimũ moueri, absq; cubito, parte autè inferiori nequaquã ]  
 Cõstructionis igitur diuersè ratione, diuersã quoq; motus imaginatio cõsequitur. Cũ superius  
 manifestissimus, inferius verò occultus motus sit. Verũm vt exactius dearticulatio ad carpum li-  
 queat, quæ de cubiti inferiore processu Galenus subdit, perpendamus.

TEXTVS QVARTVS.

Ἐκ περιεῖθ δὲ τοῦ ἀρχοῦ διαίχου καὶ τῶν κατωτέρων συνουσίῶν ἀπόψεως, διαβηθῆναι καὶ ἀπὸ τοῦ τοῦ καρπῶν.  
 Ἀλλὰ τόσους ἔστι ἔργα ἢ ἐν τῷ πλάγιον περιεῖθ τῶν καρπῶν. τῆς δ' ἐπίρας αὐτῶν ἕδω, καὶ ἂν ἐπιπέσει, καὶ  
 ἀποπέσει τῶν ἄλλων χιρῶν.  
 Inest autem cubito ex abundanti etiã processus, qui styloides nuncupatur, brachiali quoq; hic  
 dearticulatus. Sed huius quidem dearticulationis munus est, brachialis in obliquũ circumductio;  
 Alterius verò, quæ in rectũ sunt: secundũ quas extremã manũ extendimus, inflectimusq;.

COMMENTVM QVARTVM.

Cubiti ad  
 carpi de ar  
 ticulatio sp  
 ecies Galen  
 i duplex.  
 5. Vt. de v.  
 p. cap. 1. &  
 2. v. versũ  
 finẽ, & 18.  
 3. de anat.  
 adm. c. 20.  
 circa finẽ.  
 1. Tex. præ  
 cedenti.  
 n. Tex. 3.  
 2. In propo  
 sitione.

**D**UPPLICEM tam hic, quàm alibi .f. Galenus cubiti ad carpum brachiale dearti-  
 culationem ponit. Primam quidem paulò ante dictam, .r. secundũ quam cubitus  
 in sui cavitatem infernam carpi pariter recipit: quia scilicet tertium illius ossiculum  
 cõprehendit quanquã dearticulatio hæc, si ad totum brachiale referatur, cõmunis  
 cum radio existit) Alteram verò, secundũm quam processus hic, à scriptorj styli si multitudine  
 γαρρυσίῃ, & ἐπιπέσει nuncupatus, ad eiusdem brachialis ossis tertij leuẽ quandã, glenodentem,  
 siue pupillarem cavitatẽ insinuatũr ( prout sequenti rursũs capite distinctũs declaraturus est. n. )  
 Adeò vt vtraq; simul ad ginglymũ ( si vera Galeni sententia esset) reducenda vearet. Cũ  
 recipiat cubiti os, vnaq; ab eodem recipiatur. Recipiat quidẽ inferna sua cavitata brachialis tertij  
 ossiculum: recipiatur verò (vt dictũ est) ab eodem, quoad styloidem suũ processũm, quannũ  
 improprie satis ginglymos diceretur, cum nõ ad simplicem, sed duplicem motum ordinaretur,  
 sextũq; foret hic præter à nobis antea declaratos, .r. ginglymi modus, siue species, cum primo  
 quidem, secundõq; modo conueniens, quatenus scilicet ab eodem suscipitur, quod simul etiã  
 suscipit, magisq; cum secundo, quoniam in diuersis partibus id sibi contingeret. A quibus tamen  
 interea differt, aliter cum tribus alijs sequentibus scilicet tertio, quartoq; & quinto conueniens:  
 quoniam nõ ad simplicem, sed ad duplicem hic motũ pertinere. Sed neq; cum his etiã quoad  
 motus duplicitatem omnino cõgrueret: cũ illi sibi inuicem respondeant in motũ si multitudine:  
 hic verò diuersũ omnino, sibiq; inuicem oppositi forent, sed cũ talis articulatio brachialis ad  
 styloidẽ processũm in homine minime inueniatur, vt postea videbimus: idcirco neq; inter gin-  
 glymi species, modõsue neq; omnino inter articulos nos antea numerauimus. At prius Galeni  
 mentem elucidemus, mox verò deinde veritatẽ in illa disquiremus. Primam igitur dearticula-  
 tionem dicit oportuna esse ad rectũ carpi motũ, secundũ quem extremã manũ extendimus,  
 inflectimusq;. Rectũ intellige ad id propositũ ex ipso Galeno, tam sursũm, & deorsũm, quam  
 etiã in latera; neq; rectos tantũ hos equaliter à duobus musculis factos, sed obliquos etiã: quòs  
 quòs scilicet ab vno tantũ musculorũ brachiale mouentiũ contracto motus fiat, Qui omnes prædi-  
 cti motus à quatuor musculis facti, octo sunt ( vt ex ipsomet didicimus .y. ) omnes igitur hos re-  
 ctos hic intelligit Galenus, in quibus neq; cubitus, neq; radius, sed solũ brachiale proprijs à suis  
 musculis aliquo modo mouetur. Dicanturq; motus extensionis, & flexionis, etiã si obliqui sint,  
 vnico duntaxat musculo lateraliter mouente, non circumductiois, ipsius videlicet brachialis:  
 Obliquos verò motus, Græcè [ ἐν τῷ πλάγιον ] intellige apud eundẽ eos, quibus carpus ipse in pro-  
 num, & supinum circumducitur. Idcirco ait hic [ περιεῖθ ] hoc est, circumductio, siue circum-  
 latio, Qui motus non à musculis brachialis proprijs, sed ipsius radij motoribus nuncupatis persi-  
 citur,

Secundũ  
 in homine  
 non est.  
 Mens Gal  
 ni quæ.  
 Rectus mo  
 tus quib;  
 y. 2. de v. p.  
 cap. 4.

Obliquos  
 motus quib;

atur. Pro quibus significandis motibus, & verbis vſus eſt Galenus, *α. περιπλάσσειν*, & *περιπλάσειν*, quod eſt, circummagere, & circumvertere; *Β. ἑλκεῖν* autē *α.* Galeni ſententiā ſubvertere videtur. Quamvis enim recte prius in pronū, & ſupinū conuerſionem, circumductionemq; ad Galeni mentem expoſuerit, non recte tamen ſubdit verba hæc [ deinde etiam in latus duceretur. ] Ex interpretis ( vt opinor ) verſione deceſt, quī libro de vſu partū ſecundo .b. [ *in τὴν πλάσσειν καὶ ἑλκεῖν* ] [ ad latera delationes ] latinē traduxit. Sed vltimū ſemper eadem vltur dictione Galenus, ita etiam intellexit circumductionē: quæ ad pronum, & ſupinum fit. Id quod præſertim ex eius verbis competentiſſimū fit: quō in q. ſi ait *α.* [ *Ἐ* duplex ſit articulationis in brachialis: Altera quidem ſiniū ipſius brachialis incomplectentis cauitatem inter epiphyſium radij, & cubiti mediani: Altera autem parua offis incomplectentis paruam apophyſam cubiti. Hęc quidem gratiā verſionum manus ad pronum, & ſupinū facta eſt: Propter alterā verō magnam exoritur, & ſteſtetur carpi articulus, &c. ] Atq; idipſum rurſus ex ipſo etiam poſterius confirmatur. *α.* Vbi dubitatione propoſita, cur in carpo quidem obliqui motus minimi ſunt, ſursum autem ad humerum maximū? ( *Quam, ſi quicquid ſolutione, cōmento præcedenti nos recitauimus \** ) Ad eius reſponſionis confirmationem: quia ſcilicet cubito radius, carpusq; offa exarſtētiō ſitūgūtur, vt proprius radij motus à cubito diſtingui non appareat: ſubdit ſtatim, dicens [ *Quin etia dearticulatio tenuis cubiti apophyſeos, quæ ſtyloides vocatur; ad carpi os digito minimo præpoſitum, parua eſt omnino, quia & os ipſum brachialis neceſſario paruum erit, motumq; habet minimū ( tripliciter intellige ) & propter paruitatem quidē ( ſcilicet dearticulationem ) & quia cōiungitur ibi cubitus quodē radio, paruum verō os ( ſcilicet tertium ) omnibus brachialis offibus ] Propter hæc igitur tres cauſas obliqui motus ibi parui, ac minimi ſunt, vt diſcerni à quibuſdā medicis non potuerint. [ *Solum autem memoratu dignus motus ſeriet, diſtinctus admodū inter ſe omnibus prædictis offibus.* ] Indeq; eſt, quod in dearticulatione, quæ ad cubitum, diſtincti motus maximē apparent. Cui igitur duorū eſt ibi per obliquos motus, in pronum & ſupinū intelligere? Ob quos voluit ipſe ſtyloides proceſſus id os, brachialis tertii dearticulationē fieri? Aut vt iuxta Galeni perpetuū dogmā, dearticulationē, ad arthrodiām forte ſynarthroſeos ſpeciem proprie magis reducendam, ad adiuanos obliquos motus, hoc eſt, ad pronū & ſupinū factos, à natura inſtitutum fuiſſe, dicendū veniat. Inconſiſtens igitur non eſt Galenus, neq; ſibi cōtradict, cū eandem vbiq; ſententiā habeat. Optime tamē aduecōe cūm tanquam falſa ſupponcātem Veſalius, hanc prius dearticulationē ſtyloides cubiti proceſſus ad brachialis os in homine abnegat, quāquā in bobus, atq; ouibus, ipſiq; etiā ſimijis apparentem. Cūm in homine craſſa quedam cartilago *α.* à radij de inferiori proueniens, offibus quodē, nullis; ex duobus offibus, neq; ſcilicet ipſi cubito, neq; brachialis prædicto offiſculo adiacenti; intergeat, in ſimilia, quam inter maxillā inferiorem, ac tēporis offia, *ε.* necnon inter clauiculam & primum ſterni os, *ſ.* poſitam antea declarauimus. Impedimento igitur talis cartilago eſt, ne per ſomnū quidē cubiti proceſſus carpi offi dearticulati quō modo poſſit. Deinceps verō poſito, ſed nō conceſſo, qd huiuſmodi dearticulatio foret, tantarū hęc mentio demonſtravit Veſalius, vt ad obliquos motus prædictos adiuuet, qui in potius maximo illis impediamento ſit. Quam qd cauſam & boues, & oves, & quæcunq; animalia tali dearticulatione prædita ſunt, obliquos hos motus deſiderant. Si quidem igitur ſtyloides ille proceſſus ad dearticulationem nō peruenit, ac per hoc neq; prædictum vſum ad obliquos motus habet; quis nam eius vſus erit? An ſtraſtra fortaiſſis à natura factus eſt? Dicendū in profeſſo remanet, hunc proceſſum propter tria factum eſſe. Primo vt ſinū adaugeat, defendatq; hinc, veluti de radij epiphyſi etia eleuata adaugeat, defendatq;. In quem ſinū totum brachialis principium, quod tñbus ex offibus cōſtat, ſcilicet inſinuari oportebat. Secundo, vt ab ipſo validum ligamentū brachialis cū cubito articulo connectens pronatetur. Quod ligamentum in oſteum Galeni, Veſalij verō quartum brachialis os inferi, poſtea dicemus .g. cuius ligamento ratione ſituari, ac per hoc quōdā modo adiuuari, brachiale, manūq; in motu ad pronum, & ſupinum dicere, pro Galeno, poſſemus. Tertioq; tandem, vt in talibus obliquis motibus ( qui ſcilicet ad pronum, & ſupinū ſunt ) aliquo modo conſerat, cūm per ſynneuroſim brachiali coniungi videatur, ipſumq; ſubſtinet, ne ſuperfluē, præcipueq; in pronū relaxetur, atq; deſiciat. Ad eō vt auxilian in obliquis motibus dicamus: at non dearticulatione, ſed potius ſymphyſi, vtiōneq; per ſynneuroſim facta. Cūm per ligamentū ipſi brachialis offiſculus, nō tertio ( quanuis ita dixerit Galenus ) ſed oſteum, apud Veſaliū autē ( vt prædicimus ) quarto \* connectatur. Eſtatu digna ſoramina in duobus his offibus nulla ſunt, præter quedam in eorum extremis imperua ( vna prædicimus \* ) propter ligamentorum exortum, duorū ſupra medium parte ſuperiore, ac in parte vtriuſq; alteri videlicet alterum propter venarum ad eorum nutritionem ingreſſum; idcoq; minima ſunt, imperuaq; ( vt dictū eſt ) Reliqua de his offibus cōtemplandis vel ex prædictis nota ſunt: vel tanquam tyronibus difficulta dimittantur. Ad brachiale igitur conuertamur, Galenum audientes, quōm ſic ſcripſit.*

z. r. anat  
adm. c. 10.  
in ſine.  
a. lib. 1. c.  
24. & lib. 2.  
cap. 44.  
Cōtra Veſaliū.  
b. Cap. 17.  
verſin ſine.  
c. 1. de v. p.  
c. 11. verſin  
ſinon.  
et

d. Ibidem  
cap. 18.

\* Circa ſinem  
commentū.

«obnoſcūt  
«ad q.  
«ad q. d.  
«coluine  
«in q. v. p.  
«q. d. d.  
«omnino  
«omnino  
«q. d. d.  
«q. d. d.  
«q. d. d.  
«q. d. d.  
«q. d. d.  
«q. d. d.

Cōtra Galenū.

q. Quæ pri  
ma ſententiā  
daq; ſig.  
T. littera  
preſert.

e. Cap. 1.  
com. 1. & c.  
13. com. 2.  
f. Cap. 14.  
com. 1. in  
ſine.

Dubium, 1.  
Reſponſio, 2.  
Styloides, 3.  
viciuſ vſus  
implex.

g. Cap. ſeq.  
com. 1.

«obnoſcūt  
«ad q.

\* Prima ſen-  
tentiā cap.  
ſig. mon. 1.  
ſoramina. 2.  
\* Ceim 17.  
circa hęc  
q. d. d.  
q. d. d.  
q. d. d.

Παρι καρπὸν ἑξήκων. κ'

De Brachiali. Caput Decimumseptimum.

TEXTVS PRIMVS.

Ὅτι οὗτοι οὐκ ἔστιν ἅπλῃ τῶν καρπῶν ἀπὸ δύο σκευῶν ἐνυψώματα, ἀλλὰ πέντε, καὶ ἑκατὴρ καὶ ἑξήκων, καὶ οὐκ ἅπλῃ τῶν ἁπλῶν, ἀλλὰ πέντε καὶ ἑξήκων, καὶ οὐκ ἅπλῃ τῶν ἁπλῶν, ἀλλὰ πέντε καὶ ἑξήκων.

Ossa octo duobus ordinibus constituta brachiale componunt, dum omnia, & parua, medullæque expertia neque non multiplici figura existentia. Namque partim gibba, partim verò firma, & partim recta, partim verò orbiculata sunt.

COMMENTVM PRIMVM.

**O** VM dictio manus, Græcè χεῖρ, bisariam capi solet, primò cõmuniter pro tota quidem manu intres partes diuisa scilicet humerũ, vlnamq; & extremã manum, quod totum cum Aristotele .b. brachium antea nuncupari declarauimus: a, secundo speciatim, proprièque, pro ea parte brachij tertia, quã paulò ante diximus χεῖρ Galenus ipse nuncupabat, & Hippocrate quoque simplici diuisione ἀκροχέρας, q. d. extremã manum appellare consuevit. De hac secundo modo sumpta manu impresentiarũ locuturi, eam in tres rursũ partes distinguimus: videlicet in brachiale à Celso latinè dictum (quod Græci κεραιον vocant) & postbrachiale (postbrachion) illi quoque nominant; ipsos digitos, quos gens eadẽ δακτυλῶν appellat; in presentĩ capite primã extremitatis manus partem scilicet ipsum brachiale declarabimus, in sequenti verò duas reliquas scilicet postbrachiale, ac digitos in simul vnã cũ Galeno enucleabimus. Cumq; tres huiusmodi partes non nisi propter extremã manũ facte sint: Expropter vnica etiam figura cõstas ostendimus, quãuis hac iterũ duplici: vt primã scilicet internã eius partem, secunda verò externã præferat. Sed primã eius partem: videlicet ipsum brachiale aggreduamur; quòd ex octo ossibus cõstare nũc verissimè dixit Galenus; è cuius verbis falsam esse Celso sententiam liquet, huiusmodi brachialis ossium numerũ incertum esse dicentis. Ex mala fortassis impressione; eorum (quæ abrafas ex colligantibus neruis chartilagineis; seu malum neroe chartilagineis ligamentis fieri solet) segregatione. Exquisite enim singula dissecantibus statutus certissimũq; octenarius numerus in omnibus hominib; (nisi mōstruosè quidpiam diuersum contigerit) inuenitur. [Tanta igitur compositionis eorum est harmonia (dicebat etiam alibi Galenus\*) vt difficile comprehendĩ queat corũ numerus. Nisi enim prorsus abrafas ligamẽta, & denudaueris membranas cooperentes, vnũ esse tibi omnia videbuntur.] Triplex verò hic dubitatio statim ex Galeni etiam dogmate dissoluenda occurrit. Prima scilicet cur ex pluribus ossib; carpus compositus sit, & nõ ex vno, vel duobus, sicut humerus, & femur ex vno vlnaq; & tibia ex duobus? Secunda, si oportuit ex pluribus cõponi, cur ex octo, & nõ pluribus, neq; paucioribus? Tertiãq; demũ, cum ex octo cõponendum fuisse probatum sit, cur duobus ordinibus, & non vnico tantum, vel pluribus? Primumq; ordo tria ossicula ( prout numeris designata 1. 2. 3. patent) secundus verò quatuor (numeris etiam propriis notata 5. 6. 7. 8.) cõtinet: octauumq; Galeni (quod iuxta Vesalij, ac presentĩũ figurarũ ordinem, & numerũ, quartũ dicitur) vni duntaxat ossi primi ordinis tertio annexum remansit? Propter primã namq; dubitandi ratio minimè negligẽda (Galeno docente. w.) occurrit. [ Neptus enim nobis videtur possẽ creator, ex vno quidem osse femur, & humerũ, maxima membrorũ cum scissis, ex octo autem



Manus duplex. h. 3. d. d. animal. c. 7. circa princ. 1. Cap. 15. huius com. 2. in princ. k. Cap. precedens text. vi. in fine. Cõtra Vesalium.

1. Lib. 8. c. 1. verũ fin.

\* Lib. de v. p. c. 8. post princ.

Dubitatio prima.

Secunda. Tertia.

Responso pro dubitatione prima. m. 1. de v. p. cap. 3. circa princ.

brachiale,

brachiale, ita paruum particulam, vel ex quatuor postbrachiale. In digitus namq; diuersitas figurarum in motibus, vtilitatem eorū multitudinis demonstrat. In brachiali autem, & postbrachiali nihil tale apparet. [Cum in diuersis digitorum motibus, ac figuris hæc potius queciscere sperauerō videatur. [ At qui cōsistendum est enim contrariō sermone, ut quodam in loco Hippocrates ) ita cōponitur artificiosè, vt nulla qmattatur perfectioris excellentia. Ex vno enim ossis sans superiq; humerus, ac semur ( vt postea videbimus. a. ) constituta sunt, vt que vnico ossis soss motus exquisitissime complent, difficilimèq; passionem ex ossis grosse, ac duritie, grossiorumq; musculorum cooperentū tutamine adipiscuntur. Duos enim scopos vbiq; natura ipsa præ oculis semper habet, videlicet motuū, ac rōnemq; promptitudinem, ac facilitatem, & distantiā: quæ est ad petendum difficultatē, atq; resistentia. Propter quas ambas causas, carpum, siue brachiale, atq; ipsū quoq; metacarpium, postbrachiale eue pluribus ex ossibus cōponi oportuit. Primò sciūcet vt diuersis manus figure pro diuersis eiusdem explendis actionibus necessariis, fieri queant. Sæpe enim ea vt concavia indigent, tūm ob multos alios vsus, tūm præcipuè ad cōprehendendū liquores aliquos, siue puluerulenta quedam, vel aliquo interdum modo propter paruitatem sereniuisibilia. Sæpe autem ea vt recta vtuntur ad aliquid applanandū, vel ipsas quoq; alas præbendum, siue plana cōprehendendū. Ob diuersas igitur figuras, magis, ac minus, pro diuersis complendis actionibus necessarias, ex multis articulari ossibus vtrūq; membrum, tūm brachiale scilicet, quam postbrachiale ipsū, cōstruūq;, necessariū fuit. Ratioq; prima hæc sit, quam ex Galeno didicimus sic vberius icribente. a. ( Quando igitur perfectè extendere opus est summā manū, omnes quidem digitus tendones externi, ceu refringentes, & retrahentes tendunt; extenditur autem similiter & carpi articulus. Ab vtrūq; verò his, cum carpus & metacarpium arctentur, ac velut vete impellantur violentes, cedere quidem pristina sede coguntur, ferri autem foris cum nequeant propter tensionem tendonū hic sitorum, reliquam adhuc internam transpositionem habebant: plurimumq; intrō recessissent vndiq; pulsa, li ligamenta laxa, & tenuia habuissent. Nunc autem ligamentorū robur eius auxilio fuit, ne omnino luxentur. Attamen vnoquoq; articulo parum transposito magnū aliquid, & estatu dignum ex omnibus cōstruitur. Plurimam autem vim ad huiusmodi transpositionem tendones externi conseruat. Incidentes enim cōuexis ossium partibus, intrō omnia compingunt. Duplex autem hic fit sensu quod manifestè cōprehendatur ex ea extensione, concavia, & vacua quidem ante, regione interna, à transpositis ad eam ossibus occupata; pinoel verò cōuexitatem, externa scilicet relata. Non igitur solum q; repletur concaviū manus, sed etiam q; conplanatur, quod est conuexum organū, que in carpo, & metacarpio sunt, extendi accidit. Concavitas autem exactè manum efficitur, omnia facimus contraria; evolutes quidem à tensione externis respōnes, tendentes autem internos, flectentesq; digitos, ex quibus omnibus promptè rursus ad externū locum reuertitur vauūquodq; os. Sed necurū horum fieret, si cedere ipsa non pōsent; non autem cederent, si essent omnia vnū simplex. Ex quo igitur multa sunt facta, transpositionem adeptā tūm cōuexam plurimum, tūm rursus efficiunt rectam manū, propter vtilitatem amborū, quæ nobis vicissim adest, atq; omnino sanè altera perijisset cōstruūto, nisi plura essent facta. ] Hæc pro prima ratione Galenus, quæ ad manus varias actiones, variatq; illarum ratione figuras refertur. Secundam verò rationem esse subiunxit, propter distantiā, difficilimèq; passionem, siue securitatem ( quoniam serè discooperta hæc ossa erant ) valde necessariā. Hanc enim tūm ex ossium multitudine cōmuniter in omnibus, tūm propriè ex eorundem duritie, ac figura diuersā, presertimq; gibba adificiuntur. Vni formis enim figura, cōpositioq; ipsōssibus obnoxior, quam diuersa est, id quod hodie calibori, ac geminum ingeniosi adificatores obseruant. Hanc igitur secundam rationem ex Galeni verbis vberius ediscas, quam sic scripsit. p. ( Non solum autem manus a duone, sed etiā securitate inuuit huiusmodi cōstruūto. Si enim inter digitos, & cubitum vniū simplex os esset locatum, concaviū quidem intrinsecus, cōuexum autem extrinsecus, ita nudū, sicut hæc docet nuda esse ( hæc enim prior sermo monstrauit ) ab omni quidem dero ipsi occurrente facile frangeretur: factū autem mox totum vniq; præter naturā haberet, cum vnicum sit. Nunc autem, quia duodecim facta sunt ( octo scilicet carpi, quatuorq; metacarpi ) duodecima pars cōstitutionis tonus corrumpitur vno affecto. Porro vt omnino nihil patiantur, melius fuit ex multis componi, & potissimū ita duris. Cedentia enim occurruntibus ad suas dearticulationes exolunt ipsorū violentiam. Ita namq; & figitta, & hasta, & quicquid aliud tale est, tensa cona facilius, quam laxa penetrat, quod illa quædem resistent, hæc autem cedentia, paulatim eorum, quæ incident, violentiā exolunt. Vtrūq; igitur sortita est horum bium cōpositio, eam, quæ est cōmunis omnium, & quæ vniuersūq; priuatim propria est, vt scilicet, hoc est, patendi difficultatem; illam quidē, ex multitudine ipsorū, hanc autem ex duritie affectu. Quin & multiformis figurarum varietas ad cōmunes distantiā incredibilem cōducit. Multiformiter enim cedit his, quæ ex multis locis incident. Si verò vni formis eorum cōpositio fuisset, læsionibus obnoxia foret; quoniam nec cedere quidem omni-

admodum  
liberā h  
metuā h

Responso  
ad primū

Cap. 20.  
l. 1. 100.

Cur ex plu  
ribus, ratio  
prima.  
Ex actionū  
diuersitate.

o. 1. de v. p.  
cap. 8. r.  
cap. 10.

admodum

Ratio se  
cunda.  
Ex distan  
tia.

admodum  
admodum  
admodum  
admodum  
admodum  
admodum

admodum  
admodum  
admodum  
admodum  
admodum  
admodum

Responſio  
ad ſecūda  
& tertiam.

q. 2. de v. p.  
cap. 10. poſt  
med.  
r. Cap. ſeq.  
com. 1.

de v. p. 10.  
cap. 10. poſt  
med.  
r. Cap. ſeq.  
com. 1.

de v. p. 10.  
cap. 10. poſt  
med.  
r. Cap. ſeq.  
com. 1.

Obiectio.

l. 2. de v. p.  
cap. 11.  
Os reſtum  
cur dicitur.  
Cur charn.  
laginoſa.

Responſio  
ſecundum  
Galenum.

libell. cir.  
ca princ.

niſi poſſet. Propter hæc igitur, manus oſſa & multa ſunt, & ita coſtituta.] Hæc ex Galeno, quod  
primæ dubitationis ſolutionem. Quod ſecundâ verò, tertiamq; dubitationem; cur ſcilicet ex  
oſto, non pluribus, neq; paucioribus oſſibus, iſq; ſecundum duos ordines carpi; brachiale  
componatur, ex eiuſdem dogmate i. q. reſpondemus; dicentes, quæ oſſa metacarpi neceſſariò  
quatuor eſſe debuerint, vt quatuor digitis, eorumq; primis quatuor oſſibus ſigillatim correſpon  
derent ( pollex enim alijs, vt poſtea videbimus r. neceſſariò opponitur ) horum autē metacarpi  
oſſium vniuerſis ordo dearticulatur inferiori parti carpi, conueniunt per ſex quatuor quidem hæc  
parti, altera autem, que cubito dearticulatur; ex tribus oſſibus facta eſt; ſiſtentiſſimus namq; cum  
debeat eſſe carpus, qua cubito dearticulatur: ampliffima verò ſit explantatio digitorū; Medium  
totum inter hæc, quantum abſcedit ab extremitatibus; tantum anguſtæ, & amplitudinis par  
ticeps fuit. Cùm itaq; tres ſint ordines inter cubitum, & ſiſſionem digitorū medijs; qui quidem  
eſt ad cubitum (tanquam ad duorū tantū oſſa) primus; ex tribus, qui verò deinceps eſt, ex quatuor;  
Tertius autem huic dearticulatur ex quinque factus eſt. Quorū vnū quidem eſt magni digiti; alia  
verò quatuor metacarpij. ] Duobus enim his ordinibus carpi indigit; tertioq; ab his diſtincto  
metacarpium, non pluribus, ne in tot articulationū flexuris manus motus imbecillior exidere.  
Non paucioribus autem, quoniam vna dearticulati carpi oſſa neceſſariò ſunt, poſt brachiale verò  
eundem articulum, hoc eſt, illi per diarthroſim, quia propter maniſeſtiſſimos quidem motus;  
huic autem per ſynarthroſim, propter motus occultiffimos. Duas verò vſq; ad eò diſtantes arti  
culationes ſimul in eodē oſſe, ac per hoc in eodem ordine fieri, eundem non erat: Idcirco duo  
bus ordinibus aptius conſtituta carpi oſſa fuerunt, quorum ſuperior ex tribus; inferior verò qua  
tuor oſſibus coſtitutus ſit. Eademq; ratione metacarpium ordine tertio eſt: cum quo rursus di  
giti dearticulam debuerant, diuerſa quidē articulationis ſpecie, quam eā fuerit; qua cum ſecundo  
carpi ordine coarticulabatur. Ex his igitur, ſeptem oſſiū carpi duobus ordinibus diſpoſitorū  
neceſſitas apparuit. Perpulchram verò, interū naturę artem hic pendenda; quoniam humeri vni  
cum os ſcapulæ dearticulatum prius eſt, vna verò dein duo ſunt: mox verò primi ordinis carpi  
tria, poſtea ſecundū ordinis eiuſdem oſſa quatuor, ac tandem in planta oſſis quinque. Quamvis enim  
quatuor metacarpij oſſa ſint; nihilominus tamen ex oppoſito illorū; pollicis p. n. m. intermedium,  
in eodem cum illis ordine adiacet, brachiale quidem oſſi iuxta Galenū quarto, ſecundum nos  
autem, ac Veſaliū quinto, ordini ſue ſecundi, primo dearticulati (vnde nonnulli primæ polli  
cis os metacarpio attribuebant.) Idcirco quinque oſſiū ordines in latius ſemper procedentes, ante  
digitos; in tota manu eſſe concludemus. Quibus ſi tres alios ordines quatuor digitorū addideri  
mus, octo poterimus oſſium ordines in tota manu cōtemplari. Quorum vltima tanquā a ſe ſe  
ſeparabilia, diſtantiq; in maximā amplitudinem apprehenſionis gratiā perueniunt. Hæc  
pro reſponſione tam ſecundæ, quam tertie ſimul dubitationis dicta ſunt. Verum enimvero non  
tineret hic ambigere poſſet aliquis, probatū eſſe dicentis; carpi neceſſariò ex oſſibus ſeptem cōſ  
titutum fuiſſe: Nos tamen ab inſipio probandū propoſuimus, quæ oſſa, & cur ex octo, & non ex  
pluribus, neq; paucioribus coſtitutus fuerit. Neceſſe igitur eſt, & octavi oſſis vtilitatem adun  
gere: quod quidem extra vtrunq; prædictū breuiſſimè quæſiuit, tertio videlicet primi ordinis oſſi  
iuxta cubiti ſtyloſdem apophyſim; ſuperimpoſitum, parte quidem interiore, non quæ cubi apophy  
ſim diſtam attingat, quamvis ligamentum in ſe recipiat inferendum, quod ab illa enatum eſt.  
Id oſſium omnium carpi minimum eſt, à veteribus anatomicis ( Galeno reſectæ f. ) os reſtum, &  
os cartilaginolum nuncupatum eſt: Rectum quidem, quoniam & ſi rotundum ſit, aliquantulo  
tamen longius ſuperne deorſum, quam latum eſt immò in ſimis abſolute longum, ſua quæ rotun  
ditate exiſtit. Cartilaginolum verò, quoniā multa cartilagine obductū, cooperatumq; viſitur,  
ligamentorū, tendinūq; ſubſtantia illatum, que inter coquēdum cartilaginis cuiuſpā molli  
ſcule ſpeciem præſertit: non quia ſubſtantia eius molliſ ſit, cartilagineaq; in adultis, niſi ætate  
infantili: cùm ætatis carpi oſſibus omnibus id durius, denſuſq; merito generandum fuerit; ob  
iſta dicendus vſus. Hoc igitur ad ſuncto prædictis ſeptem oſſibus, octo reſultabunt oſſa brachia  
lis declarata, prout antea promiſimus. Querentibus igitur nonnullis, ad quem duorū ordinum  
brachialis reducendum id oſſiculum veniat? Ex Galeno prius reſpondere poſſumus, ad nullum  
duorum reduci dicentes: Etenim veluti prædictum quoq; eſt, extra vtrunq; ordinem poſitū eſſe  
apparet. [ Cùm enim exacta harmonia ſit in omnibus carpi oſſibus, natura earū loco, in quo præ  
dictum os tuto firmaret (vti Galenus idem ait. r.) multa, & miranda excogitauit. Primo namq; in  
feriorem eius ſineſta lubriſſima exacte fecit, cūm præſertit ea ſola ratione locū aliquem ſe inueni  
ram idoneum, in quo ipſum deſigeret, deinde autem in altitudinem iuſtam ductū, laxum ibi, &  
cartilaginolum molliſ eſt, præparans locum idoneum ad inſertionem tendoni ea parte carpi  
ſteſſent. Maior enim ſuit iſte, quam vt tuto ſit per pauca cartilagine adiaceretur alium oſſi  
ipſius carpi. Huic igitur inſeruit ipſum natura, & ſubtile ſine inferiorem proferens, poſuit inter  
os, quod cōprehēdat parū oſſis cubiti apophyſim, & inter ipſum magnū caput, quod & *apophyſis*  
nominat.

nominant. Porro oeu in parua valde concuuitate locatum chartilaginofum os, illud male tutum  
 necessarium fuisse, & facile quoquoersum versatile. Sed membranis quibusdam fortibus natura  
 id circumiacētibus ossibus alligauit, à quibus aequaliter distractū totum, manere ita rectum tan-  
 dem possit: in cauitatis supercilio vestum ossis amplexati paruam cubiti apophyium (id est ossis  
 tertii), quod cubiti apophyium amplexi non verè credidit.) Quia verò ad caput eius apophyios  
 perangens magnus tendo carpi flexens, futurum erat, vt ad se ipsum cōuerteret, & deiceret  
 ipsum os, aliam tensionem aequipollentem opposuit ipsi, ex oppositis partibus explantans liga-  
 mentum ad metacarpium desinens: Itaq; iam iuste, & aequaliter in omnem partem tractū char-  
 tilaginofum os nusquam decidit. Particulæ igitur carpi, quæ sunt versus paruū digitū, hoc mo-  
 do ornate, & instructæ sunt.) Extra vtrumq; igitur ordinem Galenus tanquam octauū id ossiculū  
 declarat. Nos autem vnā cum Vesalio rebus in primo ordine locandum, statuēdumq; deter-  
 minamus. Quamobrem non octauū os, sed quartum nuncupabimus: quatuor interim ex ossibus  
 primū ordinem determinans. Haudquaquā tamen propterea Galeni ratio destruitur, q̄ sci-  
 licet tria tantū ossa duobus vnæ ossibus dearticulantur. Cū id talem dearticulationem non in-  
 gredatur: sed à lia ratione quasi in gyrum considerato primo ordine, ad illū reduci potest. Quod  
 si quartum illud nuncupabimus, quod sequitur deinceps Galeni quartū nostrū, Vesalijq; quintū  
 erit: sicq; ad vitium vsq; Galeni enim septimū, nostrū est octauū. Scicigitur & nō Galeni ordine  
 in propositis duabus figuris designata sunt. Vterq; autē ordo à radio sub pollice exorditur versus  
 cubitum, digitaliumq; procedens. Verūm enim verò ex prædictis quedam apparet contradictio  
 enodanda venit. Quoniam Galenus ossa octo duobus ordinibus cōstructa prius in presenti textu  
 dicens, postea .u. vtrumq; ordinem enarrare volens, primi quidē cōstruū tria posuit: secundū verò  
 ordinis quatuor, tādēq; id chartilaginofum ossiculū quintum nominans, ad secundū verò or-  
 dinem reducere. Libro autem de viū partū secundo, .x. octauū os vocans, extra vtrumq; ordi-  
 nem collocasse apparet. Solutū inquam, enodaturq; difficultas hæc, siue contradictio. Et enim  
 libro de partū viū, duos illos ordines, secundū carpi dearticulationes ad vnam hinc, inde verò  
 ad metacarpion considerans, in nullo ordine duorū illud ossiculū collocat, sed vt octauū postro-  
 mo narrandum tanquam completis duobus ordinibus superflūū reliquit. Quod tamen aliter nos  
 cum primi ordinis tertio annexum esse cernamus: non temere quartum primi ordinis nuncupa-  
 uimus. In presenti autem capite cūm primi ordinis tria ossa, eorumq; dearticulationē cū vnā, .y.  
 coarticulationemq; cum secundi ordinis ossibus .z. expouerit prius, dānceps alia enarrare in-  
 cipiens, quatuor secundi ordinis adiunxit. Quibus expeditis, quintū ab ijs, quod tamen ab om-  
 nibus octauū est, vt sibi necessariū occurrit, appellat. .a. Nullū igitur ex diuersa huiusmodi com-  
 putatione absurdum sequitur: quinimodō idem tanquam ab omnibus reliquū, & à duobus ordi-  
 nibus distinctum, octauū nominare: alioq; modo tanquam à quatuor secundi ordinis distinctū,  
 quintum appellare, nullam præterquam in solo nomine, solue confiderandi ratione, dixerit lita-  
 tem habet. Siue autē octauū Galeni ordine vocemus, siue nostro more cum Vesalio quartū nuncu-  
 pemus, huius ossiculī viū ille non est, quem Galenus .b. primo numerauit loco, vt nerui scilicet  
 cuiuspiam præ ceteris per eam partem pertransseuntis propugnaculū fieret (quanquā alijs ibi  
 existentibus partibus itauiamen id contingere quodammodo possit, vt scilicet eorum propugna-  
 culum id os fieret.) Talis enim neruus, à quinto brachij petentiū descendens, inq; duos in finis  
 digitulos, auricularem scilicet, ac anularum, & medij dimidiū distribuendus in hominibus ad id  
 ossiculū minime pertinet. Verūm quadruplex verior eius viū est. Primus quidē, vt in superiore  
 ipsius sedem datur, inseraturq; ligamentū illud validū, ac durum, quod antea à styloide cubiti  
 processū orti diximus, .c. cubitum ipsum cum brachiali colligans. Secundus verò eiusdem ossi-  
 culi viū est, vt in ipsius quoq; superiore sedem primi brachiale flexentiū musculi .a. tendo inse-  
 rat: Duoq; hi prædicti viū eius sunt verè vt brachiale, carpiue os est; quos ambos etiā à Gale-  
 no collegisse, .d. promptum fuerit. Tertius autem succedit viū: vt ex inferiore ipsius fide vige-  
 simus .b. digitos mouentium musculus pronascatur: cuius beneficio minimus digitus à reliquis  
 abducitur. Quartūq; demū viū eiusdem est: vt musculorū quoq; digitorū decemū quartus .z.  
 suar ongis portionem inde, parte scilicet huius inferiore, assumat. Cuius quidem musculi mu-  
 nus est, paruū digiti primū os extēnis flexere. Duoq; hi postrema viū eius nō vt carpi os, sed  
 simpliciter vt os est, ei cōuenire dicuntur. Quibus omnibus exactè perpensis, ad Galeni cōtextū  
 reuertamur, singula pendentes. Inquit igitur dura esse omnia hæc octo ossicula, in natu ma-  
 ioribus intellige, iustantibus enim chartilaginans adhuc esse nondum in ossium substantiam ma-  
 iueris, velut alia quoq; non pauca, prædictū iam à nobis in proœmio sūt: .a. fungosæ tamen sub-  
 stantæ sunt, velut reliqua omnia, quæ ex chartilaginibus in os degenerate, prædictū quoq; ibidē  
 sūt. Quod item paruū sint, cōpertsimū est, quoniam non aequalis paruitas, seu magnitudinis,  
 sed in singulari diuersæ, maioris tamen primū, septimūq; & octauū: quemadmodū diuersissime  
 etiam figuræ existunt, in maxima nihilominus harmoniam conuenientia. Modullq; tandem  
 expertia

Galeni cō-  
 tradictio.  
 u. infra  
 text. 4.  
 x. Cap. 12.  
 Solutio.

y. Tex. 3.  
 z. Tex. 4.

a. Eodem  
 text. 4.  
 Vni quæ-  
 rit ossis  
 b. 2. de v. p.  
 cap. 1. in  
 ca. primo.  
 Cōtra Ga-  
 lenum.  
 Vni pri-  
 mi  
 c. Cap. pro-  
 ce. com.  
 ult. in fine.  
 Secundus  
 a. q. musc.  
 tab. 2. p.  
 5.  
 d. ibidem.  
 Tertius  
 b. 2. tab. 2.  
 4. tab. 2.  
 Quartus  
 y. 4. tab. 2.  
 Substantia  
 e. Com. 1.  
 verus sūt  
 pro 1. con-  
 clusione.  
 Magna-  
 do.  
 Figura.  
 An medul-  
 lola.

expertia esse adiunxit. Aduersus quem nonnulli ex recentioribus instare videtur, cauernosa, medullaq; oppleta esse, dicentes. Verum nil contra Galenum est id ipsum, quod docent, vt qui medullam iam comuniter dictam in omnibus ossibus inueniri, tanquam eorum nutrimentum vbiq; supposuit: propria dictam intere, quæ scilicet in manifestis cauitatibus coagmentata, condensataq; sit, medullam ab omnibus paruis abnegans, pluribus in terris magnis concedens: grandia ossa medullosa duntaxat nuncupans: quauis multo plura esse proprie etiam medullosa, quam ipse retulenti, reperiantur: prout à nobis in proœmio declaratum vberius est. *f.* Multiplicis autem figuræ esse, merito dixit: quoniam (vt Celius *g.* minus ineptè dicebat) oblonga omnia, largè quoddammodo oblongam figuram capièdo, apparent: nulli enim alteri figura quadantenus responderi inueniuntur. Rectius verò idem inquit triangula structura quadam inter se cõnecti. Id quod de totius carpi figura, non ossium ipsorum sigillatim intelligendũ est. Tria enim ossa adeo superiore in parte constringuntur: vt non duobus vniq; ossibus: sed potius radio dearticulatur. Cum ipsi cubiti ossi quam minimum, & quasi in puncto quodam tertium os cõiungatur. Eapropter in angustum ita vergunt, vt angulum quandam representent: Quatuor verò inferiore in ordine posita ossicula latus amplum, basimq; quandam trianguli iuxta metacarpj referant: Ideo cõ merito dici possunt, carpi figuram triangulata esse, duobus lateribus intus, & extrã existentibus. Quamobrem subdit statim Celius. *b.* [Cum inuicè superior alterius (intellige ordinis) angulus: alterius planities sit: Eoq; sit ex his vnus ossis paulum in interiora concaui speciei.] Est igitur etiam (vt ait) interius concaui speciem habens, exterius verò gibbæ: illam quidem interius, vt tendonibus pluribus, maioribusq; non venis modò, & arterijs, sed neruis quoq; locum cedens: Exterius verò gibbam, vt extrinsecus occurrentibus iniurijs minus obnoxium sit, magisq; resistens. Quam quidem carpi figuram in sequenti eotextu Galenus etiam tanget, sic subdens.

Galenus de sensu.

Figura. *f.* Com. *g.* Lib. 3. c. 4. versus finem.

Totus carpi figura.

h. Lib. 3. c. 4. versus finem.

Carpi cur intus concaui extra gibbi cõ.

TEXTVS SECVNDVS.

10 *Ἐπιτίται δὲ πάντα διεγείρει μυοχονδρίδας συνσφραγῖα ὀπίσθε ἀλλὰ καὶ ἔξω (ὡς τῆς ὀπίσθης) συμπερι-*  
 11 *κρίται. κυρτὰ δὲ ἄσφραγῖα τῶν ἔξωθεν ἐπιτίταιων ὄντα, κίλλα δὲ τῶν ἔσωθεν.*

12 Colligantur autem omnia ligamētis neruo chartilagineis adinuicem coarticulata: neq; (vt nonnulli arbitrantur) connata: leuiter quidem gibba in exteriori superficie existentia, sinuata verò in intrinseca.

COMMENTVM SECVNDVM.

13 **SS** A hæc omnia tamen si chartilagine incrustata sunt, non ea tamen chartilagine inuicem colligantur: sed duris quibusdam ligamētis chartilaginis quandã naturam representantibus: Idcirco Græcè dixit [*μυοχονδρίδας*] *q. d.* & nerui, & chartilaginis substansis participibus. Nos instar Græcorum, effuso nomine vertimus [neruo chartilagineis] dicereq; possemus [ligamentis chartilaginis] cū ligamēta generatim nerui etiã (prout antea diximus. *i.*) nomenentur. Coarticulatur verò inter se inuicè, hoc est, per synarthrosim coniunguntur, propter obicurum, minimeq; singulorũ per se consideratorũ motũ. Cum igitur per huiusmodi ligamenta chartilaginea sibi admodũ præcipueq; ea, quæ primi ordinis existunt, coarticulentur: Eapropter nisi prorsus abrasens (vt Galenus dicebat. *k.*) ea ligamenta, denudaueriq; membranas cooperientes, vnũ esse tibi omnia videbuntur: sicut nonnullis visum est. Quod autem ex ita multis, & varijs coppositus carpus est, intus quidẽ concauus, quantum manui esse conuenit, exterius autẽ fons, quantum & hoc conducit, quomodo nõ simul quidẽ artem mirabilem, simul autem, & prouidentiam indicat? At singulos ordines per se consideremus.

i. In proœmio. com. 11.

k. 1. de v. p. cap. 5. post finem.

TEXTVS TERTIVS.

14 *Ἡ δὲ ἐν ἄνωθεν μέρει τῶ καρπῶ ἐκ ὀπίσθης ὄντων, περιμετρικῶς πλεονεκτήει, διαρῆσται ὀπίσθως καὶ μετωπικῶς, καὶ τῶν ἐσωθεν ἄσφραγῖα: ὡς καὶ ὅτι γινώσκοντες ἀσφραγῖα τῶν ἐσωθεν τῶ πύργου ἀσφραγῖα τῶ μετωπικῶν τῶ καρπῶ τὸ ἔξω τῶ μετῶν ἔξωθεν ὄντων, τὸ δὲ μέσον ἐν αὐτοῖς ἴστανται μάλα καθήκοντα τῶν χῶρων, ἵνα συνβάλλουσιν ἀλλήλοις ὄντων, καὶ ἡ κίλλα. τὸ δὲ ὀπίσθως ὄντων τῶ καρπῶν περιμετρικῶς ὄντων διαρῆσται.*

15 Pars igitur brachialis superior ex tribus ossibus constans, rotunda quadantenus, protensa, ad eubitum, radiũq; & styloideum processum dearticulatur. Nisi q; pullari quadam breui cauitate styloideum cubiti processum recipit carpi os, quod parũ digitiũ respicit. Medium verò inter hæc illam potissimum sedem obtinuit: vbi cubitus, radiũq; inter se copulantur. Tertium autem à radio comprehenditur huiusmodi existens,



**Q**UOD superior carpi ordo ex tribus ossibus, velut inferior ex quatuor, predictum iam est. *A.* Quam partem & si in angulum quandam superius vergere predictum est, *m.* non tamen adeo angustam intelligimus, quin rotunda quadamtenus protrudatur (vt Galenus hic habet) qua verò ad radium dearticulatur, non nihil de cubiti extrema cauitate participans. Ad styloformem verò processum alligari, sed non dearticulan, atq; illud os digitali respiciens, quod tertium nominauimus, huiusmodi quantumuis leuem cauitatem nõ habere in homine ipso, neq; styloidem in se recipere, iam antea quoq; aduersus Galenũ prescriptũ est, *n.* ytea recipere, quæ scripta ibi sunt, fastidium pariat. Medium verò inter hæc tria primi ordinis ossa (inquit Galenus) illam maximè sedem habuit: vbi cubitus radio dearticulatur. Adeo, vt legendum ipsius os id medium, quod secundũ est, cum utroq; videlicet cũ radio, & cubito dearticuletur. Id quod falsum esse dissecatibus liquet. Cum ipsius cubiti os a tertio solo osse in homine cõteangatur. Primum enim & secundũ hoc, quod medium dicit solĩ radio dearticulatur. Nisi quodam huius secundi ossis internũ extremũ, pro quadã Galeni excusatione intellexerimus, quod scilicet ad media copulationem accedit. Cũ verò de osse illo tertio prius meminerit, quod styloidi etiam processũ, nedũm cubiti sinui dearticulari voluit: deinceps verò de medio senserit: tertio loco de primo ordine quodã retrogrado loquitur, quanquã id tertium vocat impresentiarũ. Non enim tertium est, sed primũ: quod duobus predictis maius est, ac bifidum. Nominat autẽ hic tertium ex sermone cõsequenta, q. d. tertio loco nunc declaratur. [ Quod autem (subdit alibi Galenus *n.*) conuenientiam habeat carpus, superioribus suis partibus cubito proximis talem, & tantum, qualis, & quanta futura erat maximè idonea ad dearticulationẽ prælocutorũ ossium, nonne & id prouidentiam optimi, & ætatis certitudinem ostendit? ]

## TEXTVS QVARTVS.

## COMMENTVM QVARTVM.

**I**NFERIOREM brachialis ordinem ex quatuor eiusdem ossibus constructũ esse, predictum sæpẽ est. *p.* Quantum verò post horũ quatuor ossium sermonem sequens: quod tamen simpliciter octauũ aliis non cupatũ ab eodem est. *q.* (velut antea pernotauimus *n.*) à nobis verò quartum, illis insidet, q. d. superequitat, partibus, hoc est, ossibus, iuxta quas styloides processus existit: vt est tertium, atq; septimũ quoq; os à Galeno nominatum, à nobis verò octauũ. Dicit autem [ partibus ] in nuere volens illarũ partium primi, & secundi ordinis ossa, quibus superequitat. Præterea notãdũ, q. cum Græcè habeat *ἐπιεπιτάσσει* *εἰς* q. d. [ superequitans est ] siue [ superequitans est ] siue cum alijs interpretibus elegantius [ insidet ] si quẽdam ad verbum de articulatione, aut contactũ intelligatur, falsũ est numero plurali loqui. Soli enim tertio ossi adhæret, solũq; illud contingit, ac verè superequitat, illiue insidet. Sin verò superequitare intellexerimus, quantumvis scilicet iecundũ interioremem brachialis partem, alia omnia ossa superat, exceditq; extrorsum egrediens: tunc verum erit. At nõ illa solũm ossa hoc modo superequitaret: quæ iuxta styloformem processum existunt, sed omnia quoq; alia brachialis vtriusq; ordinis ossa. Galeno tamen de duabus predictis intellexisse placuit, quod viciuoria sunt, vt in quibus superequitatio claris apparet. Quinetiam (subdit Galenus alibi *f.*) aliã quandã epiphysem ossis parui: hæstia gignosĩ. *p.* natura creauit, per colligationes fortes copulatis partem huic nũc dicto ossi (scilicet octauo) ipsius carpi, partim ei, quod est post ipsũm (scilicet septimo, ordine enim suo loquimur) dearticulato ad primam aetatem parui digiti: vt & ibi cõtingat parte altera tẽdõnem, à quo parũ digiti nũm diximus moueri, & carpum. Nonquã aliquis possit hoc carpi os nomen: sed non est numeratum ab Anatomicis: sicut nec aliquod corũ, quæ *ἐπιεπιτάσσει* vocantur: quæ multis manũ, & pedum articulis natura ex abundanti, velut actũm circũmponit, securitatis gratia. Hæc Galenus. Quibus in verba eandẽ dictionem huius depravatam esse liquet, videlicet [ *επιεπιτάσσει* ] idest [ magni ] pro qua legimus [ *μικροῦ* ] quod est [ parui ] & iterum [ *μικροῦ* ] hoc est [ magni ] pro qua dictione legimus [ *μικροῦ* ] quod est [ parui ] huiusmodi

modi enim sesamoides officulū non ad magni, sed ad parui digiti primam aciem sepe numero (vt in adultioribus, durioribusq; corporibus) inuenitur; quod in prima, & secunda figura, clariūq; in secunda, litera. N. ostenditur. Inditum verò quoddam esse potest, scilicet, & nō Galeni errorem fuisse: quoniam si ad pollacem respicere primum id officulū Galenus crederet, non profecto nonum, sed potius quintum, aut potius quartū nuncupari posset, determinasset. Sic inquam Galeni litera correximus, vt quadā tenus cum ad veterem sententiā, quauis forte (vt quispiam dixerit) inuitum, & non sine quāpiā violentia scimus; presertim cum omnis erroris immunitatem reddere nequiverimus. Etenim ibi cōtingere dicens parte altera tendonem; à quo magnum digitum diximus moueri, & carpum; tendonem innuere videtur quicquid, vigesimi tertij. a. eius pars in carpi, altera verò in pollicis os primū inuenitur, sicq; legendū potius [magnum] videtur, vt Græcè habebatur. (Nisi tendonem brachialis tertij digiti in quoq; mouere crederet.) Nos igitur verum sermone m docemus, vbi tendonem hunc, qui prædictū nonū officulū attingit, tertij brachialis musculi esse, .a. quāq; nō paruum, neq; vltimum alium digitorum primum mouet, sed ipsius dentatū carpi exteriū inhaerere. Huius igitur officuli vltus est, aliorū sesamoidis inhaerere, prædicto pertranscūti tendini firmitatem, ac stabilitatem quoddam præbere. Ac firmat septimi, locandū nos verò octaui, ossis cum postbrachialis quarto, parau scilicet digitorum sustinere articulationem roborate: Ac prædictū postbrachialis os (vbi exteriū septimū prædictū os, seu malum dicitur, octauū excedat) vacuū replendo, suffulere. Et prædictis autē carpi ossibus, duorū perpendendi processus remanent: videlicet eius, quod nos quintum scilicet secundū ordinis primū signauimus, quartūq; alias Galenus appellat, ac deinceps alterius; quod Galenus septimum, nos verò octauū scilicet secundū ordinis vitimum nuncupauimus. De primū igitur sic Galenus A. inquit. [Quæ verò versus magnum digitum, quoniam & ibi munimentū quoddam oportebat esse illud, descendētium superne neruorū, excidenti quadā tenus ad exteriū partes manus, inferūq; ibi debebat reliquū tendonum summā manū hāc septimū, .a. & nullūq; alū locus, in quo firmaretur tale alterum os, quale id est, quod ad parū digitorum; propter primū in carpo ossis (intelligi secundū ordinis primū, quod tamen apud eum alij ratione quartū esse, apud nos verò carpi quintum) prælongam quādam apophysū ad interiora manus secit cartilaginosam, & raram: in quam implāuit stercentem manū in tendonem.] Musculi videlicet brachiale mouementum secundi. Recte autem subdit Galenus, qd quauis dicto processū implāuit talia tendo: ibi tamen minimè cessat: sed in postbrachiale terminandū pertransit, in radicem scilicet ossis inde præpositi: quauis absurdū minimè est (prout Galeno etiam visum est) vt nō hūc quam discindatur: cuius altera pars in os medio digito præpositum inseratur: Et igitur in vniuersi processus in interna quinti ossis carpi, seu secundi ordinis primi sede extrosus in interea vergens, litera quidem. P. in prima præsentis capitis figurā signati vltus: vt aliquatenus ibi exemplum prædicto tendini viam tutam, ac firmam præberet: Ac ex eius processū apicibus validissimū illud enasceret transuersum ligamentū, à quo in octauū ossis processum statim dicensū in se ipsū tendinibus musculorū digitorum stercentium primi, secundiq; & tertij, .a. ne abeferret, impānētum, cooperimentūq; fieret. Et igitur octauū ossis (apud Galenū verò septimū) in se ipsū alter processus, interius ipsius ad manus volam respiciens te sede, introfūsumq; inhaerere. C. in se ipsū incuruatus, exculpsūq; (in prima præsentis capitis figurā, litera. O. notatus) ob duplicem vniuersi prædictum vltus: Tum scilicet vt prædictis musculorū trium digitorum stercentium tendonibus aptissima cōstitueretur sedes, hinc, & ab immediate præscripto quinti ossis processū altero e hāc intere conclusū, certūq; ac tuta: Tum vt ex altero in alterū pronāscens validissimū iam iam dictū ligamentum implāueretur, quod eisdem tendones oportunissime amplecteretur. Hæc de vniuersi maius dicere nouem brachialis ossibus effata magis digna prætata iam sint. Quoniam verò de eorūdem tam intersensuicem, .u. quam ad postbrachiale .x. coarticulationibus, neq; hōc & de ipsarū ad vltimā dearticulatione .y. meminuit Galenus, ea propter absurdum minimè fuerit, immo ne hic in memoria reuocare quæcumq; de huiusmodi coarticulationibus; de articulationibusq; in proœmio prædictimus: .x. vndecim namq; brachialis ossium proprias inter se in se ipsas articulationes obseruauimus videlicet primi cum secundo, quinto, sexto, & septimo; secundi cum tertio, & septimo; tertij cum quarto, & octaui; quinti cum sexto; sexti cum septimo; septimūq; tandem cum octaui; quæ si rectè obmiseris coarticulationes esse inuenientur (vt prædictum) vndecim. Quarum quidem septem ostendimus ibi .a. ad enarthrosim reduci: videlicet primi cum secundo, quinto, sextoq; & septimo coarticulationes per enarthrosim quatuor: propter eas, alias tres declarauimus, scilicet secundi ossis cum septimo, tertij, cum octaui, ac tandem ipsius quinti cum sexto. Alias verò quatuor coarticulationes ad arthrosim retulimus: videlicet secundi ossis cum tertio, tertij cum quarto; sextij, cum septimo: decimum, septimi cum sexto. Propter quas vndecim proprias coarticulationes, alias sepe in inter ossa secundi ordinis brachialis quatuor, & alia quatuor postbrachialis ostiones obseruata a nobis sunt: quarū vniuersam duplicat ad enarthrosim

Cōtra Galenū.

Quæ Tab.

9. & 10. N.

indicat.

Tab. 9. A.

10. q.

Noni ossis

vltus.

Quinti ossis

processus

vt supra

notat med.

3. musculi.

Tab. X. A. & C.

Vltus primi

ossis.

3. musculi.

Tab. 9. in se

ipsū, in se

ipsum verò

Tab. 9. E.

2. Quorū

processus

cedenti e.

com. 3. signa

uimus.

Octaui ossis

processus

Vltus dup

plex.

7. Text. 1.

7. Text. 4.

7. Text. 3.

7. Com. 13.

83. & 14.

u. Com. 13.

u. Com. 14.

redimus: .i. videlicet eam, quæ est primi postbrachialis ossis indici prepositi cū brachialis sexto facta. Reliquas verò sex ad arthrodiã retulimus: .d. videlicet eam, quæ est postbrachialis ossis primi predicti cum brachialis quinto; secundiq; illius cū huius sexto, & septimo; præterea tertij illius cum huius septimo, & octauo; deamumq; illius scilicet postbrachialis quarti, quod minimo præpositum est cū brachialis octavo. Sunt igitur coarticulationes ossium carpi proprie, cū quinque duæ supra viginti. Præter quas quidem, ipsius eiusdem brachialis cum vna dearticulatione quatuor annotauimus: .i. eas inter omnes ad enarthrosim reducetes: .f. videlicet primi brachialis ossis cū radio, secundiq; item cū radio: Rursusq; tertij cum cubito, ac deniq; brachialis eiusdem cum primo pollicis ossi. Omnes igitur articuli siue proprii, siue cōmunes ipsius brachialis, siue per synarthrosim, siue per diarthrosim facti: rursusq; siue per enarthrosim, siue per arthrodiã viginti sex erunt. Quibus ematē penitatis, ad postbrachiale, palmatue partem secundam ipsiq; etiam digitos accedere tempus huius est, cum Galeno sic dicentes.

c. Com. 13.  
d. Com. 14.  
e. Ibidem  
com. 17.  
f. Com. 13.

**De postbrachiali, & digitis. Capvt Dvodevigesimvm.**

**TEXTVS PRIMVS.**

Quod medium est inter brachiale, & digitos, postbrachiale nominatur: coarticulatur quidem ad brachiale, dearticulatur verò ad primas digitorum phalanges (sic enim digitorum ossa vocantur: Quædam verò scythalidas hæc eadem nominant) sola magni digiti prima phalange ipsi postbrachiali a latere dearticulatur.

**COMMENTVM PRIMVM.**

**POSTBRACHIALE** nostris, Græcis verò *μεταβραχιον*, illa palmæ manus pars dicitur: que quidē quatuor ex ossibus constat, ad quatuor digitos (excepto pollice) dicitur recte dearticulans. Dicitur etiam inquit ad alios dearticulatis, ad pollicem verò ex latere, non articulis, sed ligamentorum, musculorumq; duntaxat ratione copulatis; quoniam (vbi prædictum quoq; est, g. rursusq; paulo post .h. enucleabitur) pollex alijs opponi digitis debuit, nec eadem fene cum illis collocari, neq; cū metacarpo quous articulationis lege obligari sed duntaxat cum brachialis ossi quinto per enarthrosim dearticulari. Recte igitur postbrachialis ossa cum quatuor digitis dearticulantur, propter manifestissimū quidem motum, per eam dearticulationis speciem, quæ enarthrosis dicitur: cum brachialis autē ossibus coarticulantur, propter occultos quosdam volæ manus motus: per enarthrosim quidem quodam primū postbrachialis ossis cum brachialis sexto, per arthrodiã verò quodam reliqua (veluti præscriptum quoq; est .i.) Cum igitur pollex a latere postbrachiali opponatur, ideoq; nec illi, sed brachiali duntaxat e regione metacarpi dearticulatur, intusq; quodam primā phalagem (quam latnē intermedium appellant) recondat, à musculis ibi existentibus proprijs multis, ipsiq; etiam cute coopertus, tūm vt manus palma amplior euadat, tūm vt robustior hic fiat, vixus Aristoteli .k. nonnunquā fuit breuior alijs quatuor digitis. Verūtamēn breuior nō est, at ipso etiā medio longior. Apparet enim breuior (vbi dictum est) quia primū eius intermedium, porneq; etiā secūdu recondata sunt. Id ipsam verò propter eius robustionem. Ab illis enim cooperientibus, motu tibi q; musculis vnā defenditur; vt robustius alijs quatuor opponi queat. Vnde *αὐτῆς*, q. d. contramanus, siue contramanus, aut (aliomā interpretatione) pronamus dicitur. Absq; ipso enim egeri ferē inutiles sunt, vt bene inquit Aristoteles, .l. & *μεγίστος δάκτυλος*, hoc est, magnus digitus meritō nūcupatur. Magnus enim quia reliquos secundū omnem dimensionē maior, tam scilicet secundū longitudinē, quā secundū grossitiem, hoc est latitudinē, profunditatē. Talis enim grossities illi dāspathiā, roburq; adauget. Inter alios verò quatuor digitos meritō medius longior est: duo verò huic astantes, vt in *α*, & anularis, ferē æquales, omninoq; minimus inferior, extremulue aëricularis. Velut enim in tuncibus, alijq; id genus nauygis (dicebat ex Aristotele .m. transcribens Galenus .n.) remus medius alijs maior est, vt deinceps in actionibus suis æquales sint: ita in digitis contingit. Inæquales igitur digiti fuerunt, vt in apprehensionibus æquales euaderent. In apprehendendis quoq; magnis, ampliq; rebus, in medio maiorem fieri extensionē, apprehensionemq; oportuit.

m. Ibidem  
n. d. v. p. c. 14. veritas  
med.  
l. Cap. precedenti ob-  
men.  
k. d. d. par.  
cap. 16. an-  
te mod.  
Cōtra Ari-  
stoteles.  
l. Ibidem.  
Pollex reli-  
quo digitis  
maior.  
m. Ibidem.  
n. d. v. p.  
c. 14. veritas  
med.

Quæ, si mihi non fidant iuniores, à Galeno vberius dicant, sic scribente. a. [Cor autè inæqua-  
 les digiti omnes facti sunt, & medius longissimus? Sanè q̄ ipsorū similitates ad æqualitatem ve-  
 nire melius erat, quàm magnas aliquas moles in circuitu cōprehendunt, & quàm in seipsis hu-  
 midum, vel parvū corpus continere conantur. Ad maiores enim moles vel fortiter cōtinentas,  
 vel fortiter emittendas, equalis vndiq; cōprehensio multum conducit. Apparet verò in vniū  
 circuli circumferentiā conuenire digiti quinq; in actionibus huiusmodi, maxime quando equi-  
 sitè sphericum corpus cōprehendunt. In his enim etiā manifestissime cognoscat aliquis id, quod  
 in alijs quidem corporibus sit: nō tamen eque apparet euidenter, q̄ digitorū similitates vndiq;  
 equaliter oppositè tam suam ipsorū cōprehensionem reddunt tutiorem, & firmiorem, tàm profes-  
 sionem fortiorem edunt. Quemadmodū opinor & in tr̄ remibus, remorū extremitates ad vnam  
 equalitatem perueniunt, cūm tamen ipsi omnes non sint æquales: eorum etiā ibi medios eandē  
 ob causā maximos efficiunt. Ad manus autem claudendas, quādo vel parvū corpus, vel humi-  
 dum exactè volumus continere, q̄ digitorū inæqualitas vtilitatem præstat manifestissime, et si  
 p. Ibidem  
 cap. 23.  
 periore sermone monstratum esse arbitror: p̄ quo loco magnum iudici superuenientē fieri, vel  
 operculum superioris capacitatis declarabam. In presenti verò dum adhuc pauca quedā adice-  
 ro, me totum demonstrasse scire. Spenim in huiusmodi aduersionibus, ut scribentem digiti parvū lon-  
 giosum factum esse intellexens, aut aliquem mediorem breuiorem, aut oppositū eis magnā aliam  
 positionem, vel magnitudinē haberet, scias manifestè quāto est optima præsens cōstitutio, quan-  
 tumq; nocuentū iniquet actiones ipsas, si quid vel tantillum eorum, quæ ipsis insunt, tran-  
 smuteret. Magna enim corpora, & parua; & si quid humidum continere libet, non rectè tracta-  
 bimus, magnitudine aliquis digitorū immutata. Quò etiam manifestum est, quom exquilita est  
 præsens digitorū cōstitutio. ] Nō esse igitur sicut (ipsidem Aristoteles, q̄ Galenoq; r. testibus)  
 manū ipsam in digitos diuisam fuisse; vt ea vti possimus tanquā diuisa, & tanquā vnita, cō-  
 positāq; Quæ vnū diuisa sunt; prōmptè vniq; queunt: sed non eorūdem. Siquidem enim vnita  
 naturalitè esset, diuisi pro tempore nō possent vnū autem ea sepe vnita quom pluriū aliquid  
 super ipsa manu eleuandum apprehendimus; vel aliquid extendere, aut appianare volumus; vti  
 mur; eadem vbi aliam fore cuiuspiam præbere intendimus. Vt vnū autem & ea varijs modis di-  
 uisa, iuxta diuersas rerū apprehendendā figurar; quibus omnibus aptari manus debet. Aptatur  
 autem eo modo, quo est diuisa, polliceq; ab alijs distat, ac contrapōsito, secundum lateralem  
 articulationē brachiali è regione postbrachialis factam; vt enim dicebat Aristoteles, s. si manus  
 omnino deesset, potestis capiendi nō fieret. Sic nisi digitus à latere adesset, nō eadem illi facultas  
 probè daretur: adeo vt æqui pollentem alijs quatuor digitis facultatem inesse pollicis Galenus  
 demonstrat. s. Quamobrem veteres rectè ἀρὸς ἄλλη, hoc est, contramanū, siue prōximam  
 vocarunt, tanquam ipse pro manu tota esset, vel manū contrapōsitus. Quæ enim actioēs ma-  
 nus sibi ipsi perditas vident; siue ipsi quatuor abscedantur, siue hic solus ruat. Sic verò & ipsa  
 diuisa pars magni digiti, si quoquo modo corrumpatur, ipsa manus in actionibus in eōmodita-  
 tem, & turpitudinem habebit equalem simili noxæ omnium aliorum digitorum. Cuius defectus,  
 turpitudinem, in eōmoditateq; simia ridiculū animal (si cuti enim indiculum habet animam  
 ita ridiculū habens corpus) præfert. Cui tamen, quia quadripes abaratione est, melius fuit nō  
 alijs opponi, sed quemadmodū in pedibus quoq; nostris existat, cæteris minus, atq; vna seie est  
 alijs positum habere. Cū igitur pollex alijs opponatur, varijsq; modis omnes placentur, exten-  
 danturq; secundū varias rerum apprehensibilū figurar omnium manus actio perficitur, quæ pluri-  
 pliciter apprehensio est. Sunt autem (Galeni etiā dogmate. a.) quinq; digiti necessarij, nō plu-  
 res, nec; pauciores. Id quod præcipue demonstrat, si aliquis illorum de sit; præsertim verò (si  
 prædictū iam est) pollex; secundo loco index; tertioq; medius; quarto anularis; quintoq; demū  
 auricularis. Velut enim pollicem ordine insequitur; ita & dignitate, & vtu se habent; quoniam  
 scilicet diminuēdo procedunt. Cū verò nihil frustra operetur natura; quinariusq; numerus  
 perfectus iam sit, vt omnia tam magna, quàm parua apprehendi queant, tam circularia, quàm qua-  
 drata, vel cuiusvis alterius figura. Quæ omnia vel duobus (si parua sunt) vel tribus (si maiora,  
 seu numero plura) vel quatuor (si adhuc maiora, seu plura) vel demum quinq; extremis digito-  
 rum partibus. Quòd si aliqua fuerint, vnitis digitis cōiunctis, atq; eorū causā figuram cōstituen-  
 tibus cōcipimus. Quo in casu magnus digitus velut operculum vtilissimus est. Adhuc autem si  
 mole maiora sunt, quinq; digitis quidem, sed nō extremis, at medijs partibus. Sin adhuc maiora,  
 numeroe plura sint; adductis à se inuicē digitis, pollice in quā introsum, alijs verò extrosum,  
 varijsq; modo secundū figurarū apprehendendā diuersitate manus ipsa apprehendet. Inter-  
 dum verò, quom nō sufficit, tota quidem vnā; vel ipso etiam toto brachio circumductō. Quòd  
 si maius apprehensibile sit, altera adiuncta, contrapōsitāq; manū, vel totis etiā vnijs, totiq; tan-  
 dem brachijs apprehensio perficitur. Quòd si demum vniq; adeo magna moles sit, varijs manu  
 suam factis instrumentis, addita insimul tanquam cuncta regulante hominis ratione, atq; arte,  
 quacūq;

quæcumq; & quantulacûq; fit, apprehendetur, traheturq; , vel propelletur, aut quouis necessa-  
rio modo ad hominis institutum cõmouebitur, contrectabiturq; . Cum igitur (vt dictum est) na-  
tura nil frustra operetur, omniaq; , digitus quinque, latis exactè percipiatur. q; si maiore indigeamus  
auxilio, duabus manibus, duobusq; , tandem brachijs cõpleantur. frustratoria profectò fuerint ea,  
si vel digitus digitum alium, vel manibus tertiam manû adiunxisset. Optimè igitur duas manus,  
& earum quamlibet habere quinque; digitos dispositum à natura fuit. Hæc autem exactus formalis  
candidatus est Galeni verbis didicisse placuit, sic scribentis .x. [ Agedum igitur hanc eius partè  
primam expendamus, nõ perscrutantes, sit ne hæc planè, simpliciterq; , vultus, aut an sapienti ani-  
mali cõueniens; sed num eam omninò cõstitutionem habeat, qua certè, si aliter fuisset facta, mio-  
liorem nõ habuisset: vnum quidem, primumq; , caput organi apprehensionis optimè cõpositi est,  
si omnes figuras, ac omnes eas magnitudines, quas mouere homo potest, præ apprehendit.  
Vtrum igitur eam ad hæc cõmodè præstanda, diuidi multiformiter, an omninò indiuisam, solu-  
damq; , fieri: erat melius? An hoc verbis nõ eget pluribus: scilicet manum, si indiuisam manifestè,  
contacturam tantummodo sibi æqualem corporis cuiusq; , ad moti magnitudinem? At in multa di-  
uisam, moles septia multò maiores facillè cõprehensurà, & minimas res exactè venaturà? Maio-  
ribus siquidè molibus obiecta manus, digitis distans eas cõprehendit. Verùm quæ minima  
sunt, digitus duobus, casq; , summis, non etiam tota se ( hoc enim modo effugerent, ac elaborerentur )  
cõprehendere conatur: Hoc itenè pacto manus ad certam maiori, & minorè septia corpori  
cõprehensioem optimè constituta est. Porro ei cõmodissimà rursus fuit multiformiter, quem-  
admodum nunc est diuisa, diuidi, vt inuitiformes figuras cõprehendere possit: Ad quas optimè  
omnium appressas adit; organorum esse præparata videtur. Quisdoquidè circum corpus spheri-  
cum potest in orbem placere, ac id vndiq; , circulo cõprehendere: rectum item, & casu tuto com-  
pletitur. Quod si est, omnes figuras cõprehendit, quippe quæ omnes ex tribus cõstituantur li-  
neis curua, caua, recta. Ceterum quoniam corpora nõ pauca mole sunt maiora, quam quæ manu  
vna cõprehendi queat: aditricem alteri alteram natura efficit: vt ambæ ex oppositis partibus ea  
corpora cõprehendentes vna manu maxima nihilo sint inferiores. Hac igitur ratione & adsemiti-  
cæm inclinatae sunt .y. ( motus enim gratia facti sunt ) & omninò productæ sunt æquales. Si qui-  
dem hoc quoq; , organis si similiter & eadè agere debentibus conueniebat: prouide mihi cõsidera  
corporum, quæ homo potest vtraq; , manu tractare: maximò, vt lignum, vel lapidem: rursus mi-  
nimum aliquid, vt milium, aut prætenuem spinam, aut pilû aliquem: deinde illam omnem, quan-  
tã inter maximû, & minimum est, magnitudinû multitudinem, tam probè ipsa omnia cõtrectan-  
tem inuenies hominem, quam si vniuersumq; , illorum solius gratia factæ manus fuisset. Si qui-  
dem minima summis duobus digitis, indice & magno cõprehendit: quæ autè ijs paulò sunt ma-  
iora, iisdem quidem digitis, sed non extremis: Quæ verò ijs adhuc aliquantò maiora tribus digi-  
tis, magno, indice, medio, & si qua his adhuc sunt maiora, quatuor: Deinceps & quinque; post hæc  
iam tota manu apprehendit: Ad corpora deniq; , quæ ijs suis maiora, manû alteram adducit. Quorû  
quasi sanè fieri posset, nisi manus in digitos multiformiter diuisa fuisset. Non tamen per se laus  
erat, eam esse diuisam. Quid nanq; si nullus digitus quatuor, vt nũc habet, opponeretur, sed con-  
sequenter omnes quinque; in vna recta linea essent facti? Nonne perspicuû est, eorum tum cõmulti-  
tudinem fore inuicem? Quandoquidè quod tuto apprehenditur, aut vndiq; , circulo, aut omni-  
nò ex locis duobus contrarijs cõprehendatur, oportet. Id quod pensasset, si omnes in vna recta li-  
nea, vno ordine facti fuissent digitus. At hoc ipsum digito vno alijs opposito, diligenter scrutatum  
est. Qui quidem positioe, & motu ita habet: vt parua omninò flexione curuatus cû singulis qua-  
tuor oppositis actionem perficiat. Quoniam igitur factus fuerat ita agere manus, vt nunc agunt:  
ob id cõstructionem earum actionibus huiusmodi idoneam natura efficit. ] Hæc Galeni verba  
latine traducta sunt. Quibus & alia quoq; , subnectere nõ grauibimur: quoniam nõnulla subdit,  
sic dicens .x. [ Vbi autem addidero quod reliquû est ad primû huic librum cõplendum, scilicet  
utilitatem numeri digitorû, & inequalitatis mox finem faciam. Hoc autem inuentu nequaquam  
difficile est, si contemplerur quas ad res nunc digitorû auxilio fruimur. Nam si pauciores quidè  
essent, multæ actiones imperfectas fierent: pluribus autem nulla in re indiguimus. Quod autem  
si pauciores essent, actiones multæ læderentur, facile disces, si eorû singulos ratione percurreris.  
Magno nanq; perduto, omnes utiq; , alij potestate perierint. Abiq; , illo enim aliorum nullus rectè  
aliquid agere potest. Reliquorum verò index, ac medius, vt ordine sunt post magnû secundû, ita  
& vtilitate. Pariorum enim corporum omninò apprehensio, & omnia propè artium opera, & si  
quid violentum agere oportet, his omnia egere videntur. Ille verò, qui medio succedit, ac etiam  
paruus, maiorem quidè alijs habent vtilitatem: sed ea tamen manifestò in his apparet. In quibus  
comprehensibile circulo cõprehendi oportet. Si enim humidum fuerit, aut parû, digitus circa  
ipsum flecti vndiq; , cõprensiones opus est. Quæ in re magnus est quidè vtilissimus, veluti  
idei operculum quoddã aliorû factus: secundã verò potestatem habet secundus. Si verò durû, &

x. l. de v. p.  
cap. 13.Debium  
Responso.Cur due  
manus.Cur due  
manus.y. vide que  
2. de v. p.  
cap. 13.Cur due  
manus.Cur due  
manus.x. l. de v. p.  
cap. 13.Cur due  
manus.Cur due  
manus.

magnum fuerit apprehensibile, digitis à se invicem quamplurimum distantibus, ita illud comprehendatur, oportet. Adde q̄ id plures melius cōprehendent, pluribus partibus ei accidentēs, atq; contiguas. Dicitur est autem o pinor, prius motus laterales digitorū in huiusmodi actionibus multum pollere, magno quidem intrō, omnibus verō alijs extra circūductis. Ita enim modum vndiq; cōprehendi circulo contingit. Quod si circulo cōprehendatur, manifestum est, si plures essent, superfluo fore, nam in id quinq; iufficiunt. Frustra autē natura nihil operatur. Quippe sollicita est aequē, vt ne deficiat aliquid, atq; vt superfluo nihil creet. Nam defectus quidē in constructione opus quoq; manū, & diminutū ostendit: superfluo autem ius, quo per se satis agunt, est impedimentum tanquam onus alienum adiacens, atq; ea ratione noxiū. Is enim, cui pręter naturam sextus ortus est digitus, sermone nostrū cōprobat. Sed ad postbrachialis ossa reuertamur, eorum perpendicularē magnitudinem. Sic enim tanquam digitorū fundamenta, illorum ossibus maiora, longioraq; sunt, proportionē interm̄ seruata: vt omnium longissimū, crassissimūmq; illud sit, quod indici pręponitur, deinceps autē digitorum versus diminiunt de sensim procedant. Quod breuissimū, breuissimūmq; illud sit, quod auriensula subiectū, prępositū est. Sic inquit in magnitudine, hoc est, grosse, longitudineq; disposita postbrachialis ossa sunt, quanquā secūs forte parū diligenter consideranti de eo, quod indici pręponitur, appareat: quoniam scilicet superius id magis, quam medium sustinet digitum os ad carpiū coarticulātū eius stens breuius, emanatq; manū, quam illud esse videtur: prout in prima, & secunda pręcedentis capiti figura compertissimū characteribus I. II. III. IIII. est. Quod autem omnia huiusmodi ossa concaua, & medullosa sint pręscriptum iam à nobis est: vt quædam modū q̄ vtriusq; scilicet supra, & infra; appendicibus donata sint. .b. Ad eō vt de his repositis superfluo esset: Sunt autē & externa sedē, pręsertimq; superius, latiora, quam interna; vicinūs parte superiorē sibi inuicē consentientia, vbi cum brachijs coarctat, coarticulati debuerunt: In sensū autē palam in digitos diuisa tandem dilatari, velut predictum est. Qua quidem in parte, appendix in rotundum, oblongūmq; capitulum desinens, in digiti cavitatem in omdis infertur. Ad eū vt per enarthrosim deartuculan cum primis digitorū ossibus postbrachiale predictum iam sit. Superius verō, infra; grossiora cūm sint, in medio tamen cuncta tenuiora, angustioraq; existunt: vt in quibusdam intervallā, concauaq; sedes remaneant; prout multus quidē quarto, quinto, sexto, septimo, octauo, nono, decimoq; & vndecimo: .a. quorum vnum esse nō introitū sed ad latera primos digitorū quatuor articulos stendū (quicquid cū Galeno Vesalio differant) alibi demonstrabimus. Sed digitorū ossa cōtemplamur, quas proprie phalangas, & diuisas in tria iunctas parē: vt Galenus hic testatur. Pro quorum nominum exquisita cognitione, aduertendum est [ phalanx ] Macedonum nomen fuisse, quo militare quoddā agmen, cuiusq; aciemq; aut ordinem significabant, militū quidem rectē dispositorū, numeroq; milium octo armatorū, sic sub testudinea quadam serie consistorū: vt firmam, stabilemq; pugna, & in deficientē viro vtriusq; armisq; arma conserta perficerent. Vnde phalanx Gręcē dicitur est, quæ dicitur esse, quæ dicitur esse, quæ dicitur esse, quod est, à propē, seu iuxta se invicem existendo. Vel quæ dicitur esse, quod idem est: scilicet à propius accedendo: quoniam scilicet milites in acie sibi inuicem propē adherere solent, quāvis consistenti firmantur. Inde igitur nomen à similitudine sumptum hac digitorū ossium aciem, ordinemq; significare potuit: quanquam non ad ipsorum officiorū predictam aciem referunt veteres: At ad singula ipsorū digitorū ossa. Forte quia tam in latus, quam deorsum in aciem quādam ordinati sunt. In latus quidem cum sibi correspondētibus aliorū digitorū ossibus; pua prima cum primis: secunda cū secundis, tertiāq; demū cum tertijs: Quo tamen ab ordine pollicis interim declinat. Cūm primum, secundūmq; ipsius ossa medicarū aciei serie respondeant: tertium verō primis aliorum digitorum ossibus. Deorsum verō cuncta pariter ordinantur. Primum videlicet ad secundum, idē; ad tertium. Ob prædictas igitur acierum ordinationes, militū phalangarū ordinatāq; acie instar, veteres digitorū singula ossa phalangas nuncupare poterunt. Verū cūm non singulos milites, sed eorum simul multorū ordinatam compagem phalanx præferat. Expropter nomenclationis huius ad singula digitorū ossa deriuatio diuisa nobis videtur, aliāq; congruentior: vt ex alia scilicet phalangis significatione proueniat: dicitur enim phalanx etiam apud Gręcos τριφυλίαν ἔχειν, τριφυλίαν, hoc est, lignum quoddam rotundum, cōmensuratumq; quo baculi ferendis oneribus vtuntur: vnde & illi phalangarū nominantur, siue apud nonnullos alios abiq; aspiratione palangarij: verbumq; inde formatur, palangare, quod est, huiusmodi sustibus, vectibusq; onera portare, transueherēq;. Cūm igitur plicans digitis, ac horum ossibus veluti vectibus quibusdam firmati cūm cōprehendamus; idcirco nō temerē phalangis digitorum osses has partes nuncupari. Nec alia ratione scyralides appellantur. Cūm enim non exercitus aciem modū, sed huiusmodi quoq; baculū significet, paruaq; etiā tibus (polluce teste .d.) præfici nominantur, quibus magnoperē assimilantur. Non ossium igitur digitorū aciem, ordinemue duō hæc nomina dissectionis professoribus, veteribusq; medicis præferunt (prout

Ossū postbrachialis magnitud.

a. In proce. com. f. b. Ibidem, com. c.

c. In proce. com. f. b. Ibidem, com. c.

a. Signatur omnes S. rom. scilicet tab. a. Cōtra Galenū, & Vesalium. Phalanx vnde dicitur.

Cur phalanx dicitur in gulis ossibus. Ratio prima.

Ratio secunda.

Scyralides.

d. Lib. 4. c. 10. versus finem.

minis rectè quidam opinati sunt) multoq; minus ipsos digitorum articulos ( vt cum ipso etiam Poiluce nonnulli reputant) sed singula digitorum ossicula, quæ in manu quindocim numero existerè declarabimus. Quamobrem haud nodos, sed internodia nostra vocantur, q. d. ossicula, quæ inter nodos, hoc est, articulos, scilicet in articuloꝝ modo consistunt, in singulis digitis tñz: prout statim subdit Galenus, sic dicens.

Internodia

## TEXTVS SECVNDVS.

Ἐστὶν ἕκαστος τῶν δακτύλων ἐκ τριῶν ὀστέων συννηθῶν τὰς ἀνωτέρας δὲ πάλαιοντες ἐπιβαλλόντες τῶν κατώτερων, ἧς τὸ ἄρσεν τὸν ἐκαστὸν ἐπιβαλλόντες. Ἐπιβαλλόντες γὰρ καὶ τὴν μέσην δάκτυλον ἐκ τριῶν ὀστέων ἐπιβαλλόντες ἕκαστον, καὶ μὴ τὸν ἕκαστον τῶν μετακάρπιον τὸν ἕκαστον ἀπὸ τῆς ἀκροῦ, καὶ ἄλλοι τὰ μέσην δάκτυλον ἐπιβαλλόντες ἐκ τριῶν ὀστέων ἡ δὲ ἕκαστος τῶν ἀνωτέρων ὀστέων, ἧς τὸ ἄρσεν τὸν ἐκαστὸν ἐπιβαλλόντες.

Quare digitorū quilibet ex ternis ossibus constat, priore semper phalange in finem ad sequen-  
tis principia cōstitutū subeunte. Rationabile enim est magnū quoq; digitorū tribus ex ossibus con-  
structū dicere: primamq; ipsius phalangem cū postbrachialis minime cōnumerandā, secundū  
ambas quidem partes dearticulatam. Id quod primis digitorū, nō postbrachialis ossibus accidit.

## COMMENTVM SECVNDVM.

**D**IGITVS R ex ossibus digiti cōstitutū fuerint prius ex Galeno metupso vestigandū est; deinceps verò de talis ossium numero disputabimus. Inquit igitur alibi noster author.  
[ Ossium genus in digitis, q̄ & hoc ipsum gratiā eius, quod est melius, factum est, ex  
ijs vtiq; dices. Moueri quidem multiformiter inesse vtiq; eis vel sine ossibus, sicut  
etiam polytypibus: firmitatem autem in actionibus nunquam haberemus, carentes obfistere, &  
dura particula. Tale autem est & in animalium corporibus genus ossium, & propterea in digitis,  
& tota manu, & crure, & in multis partibus corporis facta sunt. Quod igitur in vnoquoq; aliorū  
organorū ea, quæ ab ossibus est, firmitas confertur, fortassis sermo procedens ostendit. Sed quod illi  
multas actiones vtilis eadem sit digitis, iam illic videre; si cōsideres nequaquam melius nos q̄  
tremētibus scripturos, inciferos, aut quid tale acturos sine ossibus. Quod enim tremētibus incit  
propter morbum, hoc semper nobis omnibus in ossis natura, flexis, & tanquam conuulsis digitis  
præ molliēte: sed ossium natura ad hoc adiutrix a creatore data est iustitians in vnaquisq; figura  
digitos. Etenim hoc ipsum, vt multiformiter figuraretur (quod futurum erat vltimum) ex eo  
habet, q̄ ex pluribus ossibus vniuersisq; compositus est. Id quod nō potuisset fieri, si ex vno solo  
essent creati. Solę enim illi illę actiones bene efficerentur, quæ digitos postulari extensos. Subit  
autem etiā hoc loco admirari artem naturę, quæ ad omnes actiones idoneos preparauit digitos.  
Sine ossibus enim si facti fuissent digiti, illas actiones solas probè perficerent, in quibus os circu-  
lo plicari circa cōprehensibile oporteret. Si autem os vnicū haberent, illis actionibus solas rectè  
seruirent in quib; eis extēsis egeremus. Quia verò nōq; sine ossibus, neq; ex vno solo creati sunt;  
sed ex tribus inuicem per singulos articulos cōnensis vniuersisq; factus est: propter id ad omnem  
actionē prompti figurantur. Flexis enim omnibus articulis, operantur digitus, perinde ac si abiq;  
ossibus facti essent: Extensis autem omnibus tanquā si ex vno osse solo cōlarent. Plenamq; autē  
neq; omnibus extēsis, neq; omnibus flexis indigentes. Aliquando quidem primum solum, vel  
secundū: vel tertium articulum: aliquando autem vel primum simul & secundū, vel secundū  
& tertium: vel primum simul & tertium extendentes, aut flexentes; hoc modo sex figurarū differ-  
rentias exprimus. Per vnam quantā autem differentiam, magis & minus in quantum multi-  
tudinem exeat, excogitari quidem facile potest, dici verò nō potest. Perfecta namq; flexio, veluti  
etiā extensio in magis & minus nō est dimissibilis. Mediū verò inter has motus articularū inopi-  
nabile est quantum numerū efficiant; ijs scilicet quandoq; magis, quandoq; minus vel flexis, vel  
rursus extēsis. Non igitur sex solę figurarū differentię digitorū cōstituti sunt; sed vniuersa-  
les quidem sex, particulares autem infinitę. Aliarū verò duarū cōstructionū altera quidem,  
quæ est sine ossibus, solum circulearem figuram: altera verò, quæ ex vno osse solo, rectam eis pre-  
stare potest. Nunc autem neq; eis carent, & vltra has sex quidem vniuersales; multiformes verò  
particulares figuras adepe sunt. Rectam igitur exactē figuram habere poterant, si ex ossibus solas  
secundum rectam lineam essent compositi, exactē verò circulearem nequaquam. Hęc de ossium  
in digitis necessitate, nō sim pliciter quidem, sed propter melius, ac de eorum quoq; pluralitate,  
ac figurarū varietate à Galeno scripta sunt. Qui quidem sex vniuersales digitorū figuras decla-  
rat: præter duas (cum quibus dicto essent) in quibus vel nullo indigerent osse, vt in circulari cōsti-  
plicitate, vel vnicū situs super; esset, vt in plana, extēsisq; manu præter illas inquam duas,  
alias

Ossis propter firmitatem in appo-  
sitionibus.  
Ossis in digi-  
tis prop-  
ter melius.

Sex figura-  
rarū differ-  
rentię gene-  
rales.

Figura  
vniuersa-  
lis

alias lex iam iam recitatatur ostendat. Nec septimā addere quispiā possit: vbi scilicet primū simul, secundū unūq; ac tertium articulum flectamus, incuruē unūq; cum hoc ad duarum alteram red-  
catur: in qua scilicet circulariter digiti plicantur: quam etiam sine ossibus (vt dictū est) digiti  
facere possent: vniuersales igitur figurę præsentia iam ostē sunt. Particulares autem in fine,  
secundū magis, & minus distantes: præsertimq; addendo diuersas in diuersis digitis complica-  
tiones: vt quā v. g. primus digitus solus omnibus, aut quibusdam his modis figuratur, vel pri-  
mus cum secundo, vel cum tertio, aut quarto, aut quinto: siue secundus cum tertio, vel quarto,  
vel quinto. Aut si tres, vel quatuor digitis, vel omnes hoc, vel illo modo figurentur: siue omnes  
diuersimodē, siue nōnulla sequēdū eandem, aliq; secundū aliam: præterea secundū magis & mi-  
nus. Proptermodum igitur enūtiato modo variari possunt figurę. Id quod præcipuē in citharę, ac  
cymbali pulsationibus conperimus simū sit. Sed de numero, magnitudineq; ac figurā singulorum  
ossium digitorum rursus ex Galeni etiam verbis pertractemus: quōm sic videlicet post nonnulla

f. 1. de v. p.  
cap. 16.  
g. Cap. 22.  
eiusdem.

Quod tria  
tarent ossa.  
h. ibidem.  
& vide 1.  
celi tex. 3.  
Quod non  
plura.  
Quod non  
pauciora.

Cur dicitur  
magis  
de eorum.  
i. Cap. 4. &  
7. eiusdem  
que iterum  
in presenti  
cōmēto.  
Singulorū  
figura.

Quod vni-  
uersales  
figurę  
sunt.

Ossa digi-  
torū articu-  
latione.

subdit. f. [ De natura verò articulorum, & ossium, quæ in digitis est, rursus pertractemus, vnde  
antea digressi sumus, reuerſi. Quod enim ipsis indiguimus ad actionum firmitudinem, & quod  
pluribus propter multiformes figurās, sufficienter demonstratum est. De multitudine autem  
ipsorum, cur tanta, & de magnitudine vniuersalium, cur tam magna, & de figurā, & modo articu-  
lationis nihil diximus. Si igitur tantē dicatur, neq; pauciora, neq; plura tribus fieri ossa digi-  
tis oportuisse. Quando si plura essent, præterquā q̄ nullam iuuarent actionem ( abundē enim  
monstrata sunt. h. omnes partes copulata ) fortassis & perfectā extensionem nōnihil lederent,  
minūs firmam, quam nunc sit, efficiendo. Quæ enim ex pluribus partibus cōposita sunt, sicili-  
quā quam ea, quæ ex paucioribus, sustinentur, & flexa collabunt. Pauciora autē si essent, tam di-  
uersas particulares figurās digiti nō haberent: vt igitur & multiformiter moueretur, & patendi  
promperitudinem effugerent ( quiduis sepe temper a natura intēditur ) tam ossium numerus  
abundē fuit ( Deus enim, & natura vniuersa in superfluis nō abundat, ita nec in necessarijs deficit )  
Manifestum verò omnibus est, q̄ prælocutus ossium esse positum debet. Illud enim vniuersi  
hoc vehitur. Maius autē quod bauiat ea, quod bauiatur, esse oportet. At verò & quod in valde  
paruum & rotundum designat digitorū immutates oportebat, ante ostēdendum. Si enim autē  
hoc aliter nō poterat, quam ossium magnitudine paulatim inuata, ob idōs manus prou locuta-  
dum semper esse debuit. Figuram autem ipsorum, quod a superioribus haurire ad inferam finitio-  
nem definit, eandem, quas magnitudo eorum dicta est asserere, præstabit cōmoditates. Quod autē  
& rotunda sunt, vt vix pariantur, easdem asserere oportet. Omnium enim figurarū hec, maximam  
est passioibus obnoxia: vt que nullam habent extantem eminentiam, quæ forte occurrantibus  
frangi queat. Cur autem vnus quodq; externus quidem extantē esse cōuexam, internus verò, & in  
lateribus nō exactē? An hoc quoq; melioris gratiā factum est? Internis enim suis partibus digiti  
mollunt, terunt, ac omnia accipiunt que externis fierent, si ossa tibi cōuexa fuissent. Externis  
verò partibus, cum neq; horum aliquid, neq; aliam quantis actionem efficiant digiti: reliquum  
fuit, vt ad solam patienti diuēditatem exquisitē sint constructi. In lateribus autē habebant qui-  
dem patendi difficultatē, immittentē custodientes: debebant autem, cum adducti cōstituerentur,  
nullum relinquere in mediū spatium vacuū. Nō igitur eos hac parte cūtos fieri oportebat. Eodem  
verò eius, quod dixerunt, sufficientem suam magnitudinē, & parū constructio: Si quidem ille su-  
pernam, hic infernam circumferentia exactē cōuexam obtinuit. Hac enim parte nec ab aliquo  
custodiēbantur, nec alii digito iuncta applicabantur. Quo sane non parum ad iurganda est natura  
in ossium cōstructione solertia. ] Quanquā id, quod de his duobus digitis vniuersū dictum, clarus  
integris existētibus ipsis digitis in carne scilicet pinguedineq; ac ipsa ossis cute cooperitis ipsis ossi-  
bus, manifestū est: quā antennis famen exquisitē specularibus verū esse in ipsis ossibus ap-  
parebit. Ex his autem, que declarata sunt a Galeno sunt, patet cur humerus tanquam prælocutus  
os, ac reliquę bauians, maxime ceteris, quæ ab eo bauiantur existit, deinceps verò cubitus, &  
radius, post que metacarpj ossa sunt. Quibus tamē pro vna indolūto ossē sumptū breuius le-  
quam bauians quoq; metacarpj singulis ossibus maior est. A metacarpio digitorum ossa succe-  
dunt diminuendo veluti prædictū iam est procedentia ob eandem rationem: quia bauiantia præ-  
locuta baui latis postlocuta maiora, necnon robustiora existunt. Interim verò singula digitorum  
ossa in sui medio corpore tenuiora, angustioraq; existit in extremis verò partibus supra, infra  
crassiora, amplioraq;. Quod quidem in citharę citharę, vt cōmodē inuicem, adqueis siue capitis,  
siue cauitatum supercitharę articulis possent: media verò propter leuitatem attingere nonit: in ex-  
tremis autē ossibus infra distabant, non propter articulationē ossa, sed propter vnguis cō-  
modam, tutamq; vt paulo post videbimus, externis quidem, internis verò propter carniū ibi  
repositarum sedem: præsertim verò propter cōmodam tendonū secūdi, ac tertij digitos flectere  
tum muscularū infertionem: cuius ratione tota illa eminentia, protuberantiaq; aspera est. Verum  
enimverò cum de ossium cōmūdigitorū articulatione prædictū iam sit, ab hoc non fuerit cur



ipſo etiam Galeo (vt eundem ſemper ex ſuo dogmate interpretemur) de iſſdem pertraſtare: vt quum ita ſubiunxit. k. [Miraculum autem dearticulationis modus nihilominus eſt. Neq; enim ſimpliciter, nec forte ex tribus oſſibus digitoſa vnusquifq; factus eſt: ſed veluti in uarijs cardines, ita & articuloſi vnusquifq; eminentiam vauitatis in ſiſiſſam habet. Veruntamen hoc fortasſe nō adeo eſt mirabile: ſed ſi conſiderata omnium totius corporis oſſium ſyntaxi, hoc eſt, motua con- nexione, eminentias cauuitatis ſuſcipientibus ſequales ſemper inueneris: ſam hoc ( probe ſciſ) maximum tibi, & mirabile apparebit. Si enim iuſto a m̄phor eſſet cauias, laxus ſanct, & inſirmiſ fieret articulus. Si ſtrictior, motus diſſiciliter fieret: vt qui nullam verſionem haberet, ac pericu- lum eſſet nō paruum, eminentias oſſium arcuatas frangi, atteriq; : ſed horum neutrum factum eſt. Ad hec omnes ipſas oſſiu cauuitas, quāſi eminentia labia quædam, & ſuperſicia (Græcè *ἐπιφάνεια*) circulo ambiunt, ad maximam articuloſum tutelam, ne aliquando excidant: Niſi forte peringentem aliquam neceſſitatem. Sed quoniam iterum ex tam ſecura conſtructione periculum erat, ne motiones diſſiciliter fierent, & eminentias oſſium extererentur: duplex robuſus auxilium in id natura molita eſt: prius quidem chārtilagine vtrunq; os ſubungens, atq; obliquis: Alterum verò ipſis chārtilaginis humorem vnctuoſum, & vituoſum, velut oleum aliquid ſuperfundens, per quem facile mobilis ſimul, & azrita contumax omnis dearticulatio oſſiu facta eſt. Naturę igitur artificium ſuperoliorum in cauuitatibus vel ſolum ſufficiebat prohibere articuloſi luxationem: ſed non cōmiſit naturā ei artificio ſoli cuſtodiam, præſidens multis motibus violentis, & vehemen- tibus animal ſæpè occupatum in: vt igitur vnusq; diligenter articulus omnis cuſtodiretur, liga- menta quædam ex vtroq; oſſe produxit natura, ex oſſe altero peruenientia ad alterum. Sunt autē eorum alia quidem, velut nerui quidam, teretia, & craſſa, alia verò membranarū inſtar prælonga, & ſubtilia, ſecundum articuloſum vultum, ac neceſſitate talia ſemper facta. Nam quæ vici- nima quidem, & craſſiſſima præcipuos, & maximos cuſtodit articulos, reliqua verò minus præ- cipuos, & minores. Hæc igitur omnia & cōmuniter, & in omnibus articulis machinata eſt, & in articulis digitorum, vt illis maxime cōueniebat. Paruaſi quidem ſunt dearticulationes, ſed dili- genter cuata, ſubtilibus verò labijs vnusq; coronate, & circumſepte, chārtilagine etiam tenui permutatę, & ſuperſite, ligamentis deniq; membranofiſ cōnexę. Hoc autem ſcilicet nullatenus eſſe labia oſſium equalia: ſed extrinſeſis quidem multo maiora, intrinſeſis verò minora, maxi- ma eſt nature in digitorum conſtructione induſtria. Si enim eſſent parua foris, vltra ſuumnam ex- tenſionem, refleſti articulos permitterent: Maiora verò ſi eſſent intus, eos liberè, & plurimum fleſſi prohiberent. Quare nocere vtrinq; extensionis ſcilicet firmitudinem auferentia, & flexi- onis varietatem. Quia verò e contrario facta ſunt, nullius quidem nocuerit, omnis autē cō- moditatis motionibus digitorum cauſa ſunt.] Hæc Galenus. Quibus ad dendum præterea non- nihil de articulationis modo eſt: diuerſa enim receptio eſt. Cum prima quatuor digitorum inter- nodia per anarthroſim præcedentiū metacarpi oſſium tuberoſitates extremas recipiant. Non- niſi autem ſecunda cum primis, neq; tertia cū ſecundis ſe habeant. Itenim tamctiſi ſequentibus priora ſuſcipiuntur. Hæc tamen eadē ſequentia à prioribus vice verſa recipiuntur: quare per ginglymon dearticulari prima cum ſecundis, ſecundaq; cum tertijs internodia prædictum iam eſt. Sic inquam in ceteris quatuor digitis ſe habet. Secus verò in pollicis oſſibus, internodiſſue. Pri- mum namq; in carpi quinti per anarthroſim quoq; inferitur, ab eoq; recipitur, & nō ſicut pri- ma aliorum digitorum internodia metacarpiam extuberans recipiebant, id recipit: A ſecundis pollicis eiuſdem internodia primū eſt eadem ſuſcipitur ratione, qua poſttrichialis oſſia ab aliorū quatuor digitorū internodijs ſuſcipiuntur. Vtrinq; igitur prima pollicis phalanx per anarthroſim dearticulata ſuſcipitur, tam ſcilicet carpi quinto, quā à ſuo ſecundo oſſe. Quamobrem & ſe- cundum pollicis articulum primis aliorum digitorum articulis diſſimilari dicemus: tertium verò huius aliorum digitorum ſecundis, & tertijs proportionari: vt ſcilicet per ginglymon dearticu- lentur. Vnde in cunctis aliorum manus extremitate digitis nouem proprie dictos, & ad ſimplicem motum ordinatos ginglymos poſuimus: ſcilicet octo in ſecundis, & tertijs aliorum quatuor digitorum articulis, nonumq; in tertio pollicis articulo. E quibus rectum nō eſſe Galeni in- preſenti cōtextu determinationem, aperte liquet, dicentis, priorum ſemper digitorum phalangum in ſequentis ſinum ſubire, etiam ſi dictionem [ſemper] quoad prima tandem internodia intelle- xiſſe voluerimus: niſi quoad pollicem. Huius enim prima phalanx in ſequentis ſinum (vt dictū eſt) ſuſcipitur. Ideoq; ſaluandi Galenum anſa nō debueret. Cum ſtatim antea de pollice locutus fuerit, ſtatimq; de pollice ſubungat; vt verba ea, quæ de priorē phalange in ſequentem ſubuenit prolata ſunt, ad ipſum quoq; pollicē referantur: ſicq; de prima eius phalange duntaxat reſpiciū ſecundæ Galeni ſententiā intelligenda veniat. Integrum verò ubi fuerit, impie Galeniſi condem- nare potius, quam veterū ſeruatã reuerentiã pie interpretari. Nos autem ad vnguium viſus, & con- uertamus: qui ſi non oſſa ſunt, oſſium tamen naturam quodammodo imitantur. Haud enim ha- gnini datos cum Piſtone dictū ad aliorū animalū imitationem, neq; cū Ariftoſele ad ipſoſū

digitorum tutelam. Sed primo vt carnem in extrinsecis digitibus paribus & posterioibus firmam.  
 rent. Secundo, vt vna cu predicta carne, ad rerum manutinentiam, durarumq; apprehensionem  
 conferrent. Tertio ad scalpendum, radendumq; & excoriandum. Quarto etiam ad aliquod mi-  
 nimum alicui parti assilum euellendum. Quinto ad incidendum, quod oblitescere non igitur,  
 maximum in digitu vnguem referantes. Sextoq; demum ad leuandum, utendumque aliquid  
 asperum: vt in scribendis chartis sepe nos facere solemus. Quas ob causas rotundi facti sunt, con-  
 uexi scilicet exteriis, intusq; concavi: preterea & locuitatis gratia sic firmati sunt. Quonia vero  
 scalpendo, vel aliud quid vnguibus agendo, consumi; exteri; eorum summitates debuerant;  
 Eapropter natura eos augeri semper voluit, tamen si hominis corpus inclinans iam, immo etiam  
 si decrepitu sit. Verum nihilominus est, q eorum exquisitum, propriumq; incrementum non  
 est. Sicut enim vere non nutriuntur, ita nec proprie ( Galeni dogmate .n.) augentur, sed eorum  
 generatio sola est. Verum enim, propriumq; augmentu ( Galenonet .n. ex Aristotelis .p. sententia  
 comprobante) secundu omnes dimensiones est. Quanquam eorum radices non modo nutri-  
 mentum, ac vitae conseruationem, at sensum etiam ( cuiusdem .g. decretis ) recipiunt. Ex quo ad  
 eas ( radices inquam ) non venas modo, & artenas, sed neruos quoq; pertransire cõdeces fuit.  
 Sed de hoc vberius nos in artem medicã nosõs commentarijs locuti sumus .x. Satis igitur nunc sit,  
 quae de vnguibus à Galeno scripta sunt, pro tyronibus ex eius monumentis repetere: vt quidem sic  
 inquit .f. [ Quonia igitur satius fuerat ita agere manus, vt nunc agunt: ob id constructionem earu  
 actionibus huiusmodi idonea natura effecit. Non enim .x. simpliciter oportebat duos digitos op-  
 positos in paruorum rerum venatione, suis ipsorum summitatibus operari, sed eos preterea tales  
 esse, quales nunc sunt, erat necesse, vt pote sic molles, sic rotundos, sic vnguibus manibus. Neq;  
 enim si carnosã non esset eorum extremitas; sed ossea, possent vnquam corpora parua, vt spinas,  
 vel pilos comprehendere: neq; si ea quidem carnosã, sed molliore, ac humidiorẽ carne prædita.  
 Oportet enim quod maxime fieri potest ei, quod apprehendunt; apprehendens eadẽ circũpli-  
 cari, si modo tuta futura est apprehensio. Dura autem, & ossa circumplicari nequeunt; sed quae  
 mollia mediocriter, obidq; mediocriter cedentia. Quae enim præter modũ mollia sunt; ac velut  
 fluxibilia, vt duris plus iusto cedunt, ita facile ab eis effluunt. Quapropter quae naturã inter mol-  
 lia immoderate, & nimis dura mediã sunt sortita ( quales sunt digitoru summitates ) erant vtiq;  
 hæc optima tutæ apprehensionis organa. .n. Cum autem sint & ipsa, quae apprehenduntur con-  
 sistentijs quam maxime varijs ( quaedam enim eorum magis, & quaedã minus mollia sunt, & dura )  
 ad omnia habilem fecit natura constructionem eorum. Propter hoc igitur neq; ex vnguibus simpli-  
 citer summitas digitorum, neq; ex carne solã, sed ex vtriusq; optimam positionem accepissent  
 composita est, carni enim ipsorum est in partibus ad inuicem inclinatis, quantum summita-  
 tibus res ipsas venari debebant. Vnguis vero extrinsecus vt firmamentu eis appositus est. Digni-  
 nang; suis ipsorum solis partibus carnis mollia corpora comprehendunt; dura vero; & propter  
 hoc carnis naturã pellentia, violentior; cogentia, sine vnguibus aut illis apprehendere digitoru  
 possunt. Firmamento enim tunc eget caro eorum euerfa: Rursus autem ipsi vnguibus solis tale  
 nihil poterat apprehendi. Duri enim cum sint, à duris prompte laborantur. Propterea igitur car-  
 niformi substantia in digitorum summitatibus vnguis in lapsum, ac lubricitatem contingente; v-  
 nguibus vero facilem carnis quæsiõnem vicissim firmatibus, organum apprehensionis omnium  
 paruorum simul, & durorum corporu factus est digitus. Dites autem apertis quod dico, si im-  
 moderationes vnguis spectaueris. Qui enim sunt in modico kgis, & propterea in se mutuo con-  
 didant, neq; spinam paruum, neq; pilum, neq; aliud quicquam tale apprehendere possunt. Quæ  
 vero propter paruitatem ad summates digitorum non perueniunt, naturam carneam firmitate  
 priuantes, eam ad apprehendendũ inualida efficiunt. Qui autem firmatibus digitoru equantur,  
 hi omnium soli vtilitatem; cuius gratia facti sunt, explent perfectissime. Ob id igitur dicebat  
 Hippocrates .x. [ Vngues neq; superiores, neq; inferiores esse digitoru summitatibus eõdem.  
 Ea enim quorum gratia facti sunt, tunc maxime prestant, quando cõmoderant habere magni-  
 tudinem. Multa quidem alia ad res agendas cõmoda ab eis proficiuntur: veluti si radere quid,  
 aut scalpere, aut excoriare, aut diuelli oportet. Nam in tota præpã vita, omnibusq; artibus, &  
 ijs potissimum, in quibus sunt exãthe manu operationes ( quæ Græcis *χειρουργίας* appelluntur ) his  
 talibus nobis est opus: Sed vt apprehensiori est organum manus, in paruorum simul, & durorum  
 corporum venatione, vnguibus vel maxime indiguit. .y. Cur itaq; Plato, præsertim cũ Hippo-  
 cratis imitator, si qui alius vnquã fuerit, & ab illo dogmata mutata sit maxima, tam negligenter  
 de vnguibus vtilitate locutus est? Cur item Aristoteles tũ cura alia, tũ circa nature artem  
 enarrandum alioqui peritissimus, in vnguibus vtilitate adeo cõcutiuit? Ille nanq; ( scribit Plato )  
 Deos, qui hominẽm construxerunt ait, eũ imperitos quodãam artifices, velut vitem vnguibus  
 in animalibus alijs generationem præmeditatos, illos ob id in summis digitis produxisse: Partes  
 vero hõs munimenta grass scribit Aristoteles. .n. Sed tamen cuius munimenti, an aduersus frã

Cur roman-  
 de  
 Cur semper  
 arguerit.

n. 1. an. me  
 sic. 10. 12.  
 n. 1. de pot.  
 naturalis  
 p. 7.  
 p. 1. 8. gene-  
 ratione, &  
 corruptio-  
 ne. 10. 21.  
 & 69.  
 q. 1. 8. anat.  
 adm. c. 11.  
 p. 1. 8. anat.  
 circa finem.  
 f. 1. de vng.  
 f. 1. in fine.  
 t. libidem  
 sup. 6.

p. libidem  
 sup. 7.

x. Lib. de  
 offic. med.  
 10. 20. cõ-  
 mētarij p. 1.  
 ni.

y. libide sci  
 licet primo  
 de v. p. ca.  
 Cõtra Pla-  
 tonem.  
 Cõtra Ari-  
 stotlem.  
 p. 4. de par-  
 tic. animal.  
 c. 80.

gratia, vel calore, vel vulnerantia, vel quassantia, non addidit. Neq; enim contra vllum horum munimentum gratia: neq; contra vlnud quidsā, præter hæc factos vngues iussit, & excogitari potest. Porro Platonis memini, & Aristotelis, nō quō malē ab eis dicta reprehenderim: sed vt quid me ad horum sermōnem enarrationem impulit, planum facerem. Quoniam igitur. b. actio quidem manus est apprehensio & apprehendere autem nihil possit vnguis nisi immobilis permanens. Nihil enim ita differret à lapide, vel mortua, manifestū est, q̄ præcipua ipsi actionis pars ea erit, per quam inuēta fuerit moueri. Quoniam igitur voluntarios motus omnes (quos manus sunt) à multis hinc de mōstramus: hinc vtiq; primum motus organum manū erunt. Alia verō vniuersa? hæc quidem, vt melius actio fieret: alia verō sine quibus nō poterat ipsa fieri: Alia autem pro custodia omniū horū creata sunt. Genus vnguium gratia eius, quod est melius videtur factum esse. Cum scilicet possent manū abiq; vnguib; apprehendere quādē, sed neq; moles omnēs, neq; ita benē, vt eum illis. Monstratū est enim. c. dura, & exigua corpora facile eis effugere, nisi summatibus digitorū aliqua subtiliā durissima substantia eius loci carnem firmatura. Hæc tenis duritiei vnguium, & positionis vtilitas dicta est. Cur autē. d. ad eū duri facti sint, & nō magis, & quare ex omni parte rotundi, nō iam quidem dictum est. Id autem dicere, iam est opportunum. Si igitur magis duri, quā nūc sunt, fuissent inftar ossium facti: essent quidem ita etiam ad apprehensiones minus idonei: vt qui ne minimū quidem flecti possent, rumpentur verō facillimē, sicut & alia dura vniuersa. Eorū igitur securitati prouidens natura, duros mediocriter effecit: vt neq; vtilitatis, cuius gratia facti sunt, quidsā noceretur: neq; ipsi promptē patiantur. Quid autem ita prouidens natura tan nō ipsos molliores ossibus fecit, quatenus cedēdo moderatē, illorum, quæ violenter extrinsecus incidunt, vim exoluerent: similitum omnium constructio tibi ostendit. Omnes enim animalū particulas prominentes, & nudas ex tali substantia creauit: qualis neq; quasiari facile propter molliētem, neq; rumpi propter siccitatē possit. Talis autem particula est vngula tam solida, quā bifida; talis calcar, talis cornu. Quibus quidem, quatenus arma sunt defensoria esse duriora, quā nunc sunt, cōtulerat: quō & quasiare magis, & incidere possent: ad sui autem ipsorū securitatē, non fuit melius ad eū dura fieri, vt facillē rumpentur. Ita igitur & gladium esse optimum dicimus, non qui ex fragili ferro factus, quale apud Indos est plurimum, quāuis promptissimē incidat: sed eum qui in tantam duritiā peruenit, quanta nō rumpatur facillē, & promptē incidat. Quæ igitur tam fortes sunt corporis particule & arma defensorijs proportione respondentes exponuntur, & fors emittant, duriores quidem sunt, quam operantia, sed nō couisq; vt frangantur. Quæ verō nō vt arma essent, factæ sunt omnino, sed simpliciter particule corporis, quæ prominere debebat (vel unguis, naris, cubiti tuber, genua) molliorem adhuc substantiam habuerant, vt magis cedentes, magis ea exoluant, quæ fors incidunt: qualis etiam vnguis hominum est, & propter hoc multo mollior, & subtilior factus est luporum, leonū, pardalen vnguib;. Nam manufacti est, polytici; animalis particula in apprehensionis perfectione constructa, non in feræ agrestis arma defensoria. Cur autem rotundi sunt vndiq;? An securitatis gratia? Sola enim figurarum rotunda ad vix patēdum exquisitē comparata est: vt quæ nullum expōitū angulum frangi potentem habeat. Sed quoniam i calpeudo, vel aliud quid vnguib; agēdo, exteri debebant nobis eorum extremitates, solas has animalis particulas semper augeri potentes natura cōstruxit: quāuis iam totū corpus augeri desierit. Augentur autem non vt aliq; partes, in longum, & latum, & profundum: sed pilorum modo in longum solum: sub nasō tubus alij semper vnguib; nouis, & antiquos propellentibus. Neq; hoc ociosē instituit natura, sed vt in locum eius, quod assidue exterritur, in ipsorum extremitate, sit aliquid, quod sufficiatur. Sic igitur ad summam naturæ prouidentia peruenit vnguium cōstructio. J. Hæc ad eū diffusē de vnguib; eorumq; substantia, figurāq; & vsu Galenus. Nonnulla verō ex nostris in artem medicāni cōmentarijs. e. hic adiungere poteris. Nos verō interim ad digitorū articulos reuertentes in illis non vñtuo sum modo, viscosūmq; ac oleagineum humorē, sed acrem quoq; sepe numerō includi inuenimus. Haud enim ita compacti sunt, quin aliquod intermediū spatium remaneat, quo hic, atq; illic sic eūdem necessitate moueri postlocata pars ceat. Accidit autem interdū, q̄ aer ille foriter intentus, cōtractūq; ligamentis vel vtrinq; diuisum sit, vel ad alterutram articuli partem recolletus. Quam obrem extenso, relaxatoq; secundū reditudinem ipso digito, siue in gyrum alterius manus vi cōtorto, ac per hoc extensis ipsa ligamentis, aperta; ac relaxata ipsius articulationis syntaxi, siue cōiunctione, illius aeris iam dictæ partes vtrinq; fortassis dispersæ violentia quadam se invicem in medium repercutiendo colliguntur: vel ex altera fortassis parte in alteram propulsi strepunt. In medium inquit sibi inuicem partes illę violenter occurrentes colliguntur, quoties rectē digitum trahimus. Ex altera verō parte in alteram, puta ex dextra in sinistram, vel e contra propellantur, vbi non rectē trahimus, sed in oppositā partem quodammodo in gyrum cōtortere conamur. Tunc enim opposita pars eius, in quam digitum retorquēdo inclinauimus, relaxatur, spatiosūq; ibi sit, in quo totus impulsus aer decumbat. Quid

b. r. de v. p. cap. 10.

\* Cap. 2. eiusdem.

c. Cap. 7. eiusdem.

d. r. de v. p. cap. 11.

Cur vnguis rotundus. Cur sic in p. augentur.

... d. r. de v. p. cap. 11.

e. Ex com. r. r. versus finem.

... d. r. de v. p. cap. 11.

... d. r. de v. p. cap. 11.

si rursus in priorem oppositā partem retorquere nitamur, sæpè iterum sonus ille fieri solet, re-  
 pulso rursus hinc aere, vt in eandem reuertatur partem, vnde venerat. Ex quo patet, cur si rursus  
 tertio, & quarto articulū extendere, vel in alterutram partem, sicut in gyrum violenter, ac subitò  
 protrahere, seu cōtorquere scitemus, nō amplius ille sonus fiat. Cūm relaxatis iam, ac sufficien-  
 ter extensis ipsi articuli ligamentis, apertisq; iam, & amplius factis intermedio spatio, non am-  
 plius violenta illa aëris repercussio, propulsioq; fit. Quo sonitu plurius factò, mulierculę, iocose  
 potius, quam seris masculorum futuram generationem prognosticari aiunt; velut eo non succo-  
 dente, seminarum. Quantum verò aëris violenta repercussio ad sonitum, strepitumq; faciat, vel  
 idiotis ipsi compertissimum est. Ad quam quidem violentiam non parum conferre autumou-  
 ditiose illius humiditatis lentitiem, glutinositatemq; dum scilicet aëris illius transitū, ac per hoc  
 si multaneam obuasionem, repercussionemq; impedit. Ad eò vt nō nisi violenter pertransire, ac  
 de loco ad locum exagitari queat: sed hæc obiter, ac tanquā curiosus potius dicta iam fiat, quā ad  
 propositum necessaria. Ad Galenigitur contextū reuerſi diuina, pollicem non postbrachiali,  
 sed ipsi brachiali, hoc est, eius secundi ordinis ossium primo dearticulati.

TEXTVS TERTIVS

Ὅτι ἐν τῷ ἄνω ἄκρῳ τῆς ἐκ δακτύλου μέρους ἐστὶν ἡ τοῦ τρίτου τὰ τῆ μετακαρπίου, περιττωμένης ἢ τῆς ἑκταῆς  
 ὄσσης δὲ τὸ τρίτου ὄσσης τὸ μεγάλου δακτύλου τῆς μετακαρπίου προτέρου, τοιοῦτα καλεῖται ἢ ἰνα. καὶ τῆς  
 δακτύλου; πέντε δὲ τῆς μετακαρπίου.

Vnde non absq; ratione dixerit quispiam quatuor duntaxat postbrachialis, quindecim verò  
 quinq; digitorum. Quicunq; autem tertium magni digiti os postbrachiali ascribunt, quatuor-  
 decim quidem esse digitorum quinq; autem postbrachialis ossa dicent.

COMMENTVM TERTIVM

**O**ssis pollicis tertium vocat, quod verè primū est ipsi brachiali (veluti prædictū est) dear-  
 ticulatum. Nominat autem huiusmodi os tertium, eo q̄ cum apud omnes compertissi-  
 mum sit, duo reliqua digiti magni ossa esse, non metacarpij, de hoc duntaxat dubium  
 remanebat, ideoq; in huiusmodi computandi ratione de hoc tanquam de tertio reman-  
 ente sermo incidit. Siquidem igitur id os inter magni digiti ossa connumeratur, sicut rectè fa-  
 ciendū est: tūc ex quatuor ossibus postbrachiale, ex quindecim verò digitū quinq; cōstitutū sunt.  
 Sin autem illud magni digiti primum, tertiumue postbrachiali ascribatur, prout nōnulli facere  
 visum est (quanus profectò minus rectè) Tunc postbrachiale ex quinq; digitū verò ex quatuor-  
 decim duntaxat cōstituerentur. Vtrius autem modo, totius extreme manus ossa triginta erunt,  
 videlicet humeri vnum, vlnæ duo, brachialis octo, postbrachialisq; quatuor: sicq; sunt quindecim:  
 alia verò quindecim sunt digitorū. Omnia igitur erunt triginta. Quod si postbrachialis ossa  
 quinq; dixerimus, cum remaneant digitorū ossa quatuordecim, illaq; fuerint sexdecim, in idem  
 peruenient. Qui verò inter postbrachialis ossa illud pollicis primū (scu maus dcoere alia ratione  
 tertium) adnumerarunt, non cōtemnendi viri fuerunt. Imprimis enim philosophorū sperachū  
 talia scribentem inuenimus? [Digitus autem magnus vno inflectitur nodo, cæteris binis inflec-  
 tuntur.] De proprijs loquitur digitorum articulis. Primus enim digitorū quatuor a pollicē ar-  
 ticulus cōmunis est cum postbrachiali. Pollicis verò primus communis etiam est cum brachiali  
 (siquidem tria pollicis ossa dixerimus) sin verò duo tantum: tunc primus eius articulus cōmunis  
 est (velut aliorum quoq; cum ipso eodem postbrachiali. Proprij igitur digitorū articuli tunc  
 erunt, pollicis quidem vnus, reliquorum verò digitorum duo. Ecce igitur quomodo Aristoteles  
 in prædictis verbis, primum illud pollicis os, quod hic Galenus ex sermōnis cōsequentiā tertium  
 vocat, non verè pollicis, sed postbrachialis esse os, inuit. Vnum dicens pollicis articulum esse  
 Celsus, f. autem tametū palmam quinq; ex ossibus constare ait, ac per hoc os illud cum ipso me-  
 tacarpo annumerasse visus est; dicens tamen postea absolute digitos ex ternis ossibus constituit;  
 cum digitorum ossibus illud computasse apparet. Differunt enim palmæ, & metacarpij partem  
 dicere. Palma enim ex quinq; constare potest; interum verò vnum ex ijs nō metacarpij, sed pol-  
 licis per se est (vt patet) sicq; pars dici potest palmæ, non tamen propterea metacarpij. Sed hæc  
 pro Celsi contradictione (quanus inuiti) soluenda. Inuiti inquam. Ex eius enim verbis quinq;  
 palmæ ossa, præter quindecim digitorū internodia, colliguntur. Cū sic dixerit. [Tūm ex alte-  
 ra parte, recta quinq; ossa ad digitos tendentia palmam explent (aliqui metacarpij legunt) a quib-  
 us ipsi digiti oriuntur, qui ex ossibus ternis cōstant; omniūq; eadem ratio est.] Sed his omittis,  
 ad nostrū Galenū reuertamur. Manus igitur hæc est, a quam totam homini tanquā sapientissimi

\* de hist. animalium c. 17. post princ.

f. Lib. 1. c. 1. post med.

Digitos.

DEVS Optimus, Maximus velut organum organorum, siue organum ante organa concessit; quemadmodum fore statuerat. Tota inquam manus est, quæ humerum in se, vnamq; ac extremam deniq; manum cõprehendit. Quæ rursus extrema manus in tres particulas subdividitur: scilicet in carpum, seu brachiale, ac metacarpion, seu postbrachiale, ac ipsos deniq; digitos. Alijs verò singulis animalibus propria arma, propriaq; artes distribuit: vt tauro cornua, leoni dentes, vnguesq; , sicut equo duras vngulas, aproq; exertos dentes tanquã ferocibus animalibus ad offendendum, seseq; infimal defendendum arma quædam, ceruo autem, leporiq; pedum velocitatem tanquam finidissimis animalibus ad fugiendum præbuit: sicq; vnicuiq; secundum animæ, motumq; ipsam insequentiã diuersitatem, membra, partesq; dispensat. Soli autẽ homini tanquã futuro animali sapientissimo nullum armorum genus, nullamq; artem præbuit: vt tanquã tabula rasa eius anima existeret, in qua nihil est depictum; ad omnes artes recipiẽdas prompta, parataq; sit: Manusq; nihil in se habens quodlibet armamenti genus in se recipere possit: quorũ si aliquid in se naturaliter insitum haberet: aliorum profectò nullũ recipere possent. Intus enim existẽs prohiberet extraneum. Ex quo naturam non homini, sed alijs animalibus omnibus noueram fuisse dicendum, si nullam quidẽ huic armaturæ speciem, nullamq; artem naturaliter indidisset: quam tamen alijs modò illorum conuenienter præbuit. Nullam enim cõsultò ipsi hominĩ dedit, vt omnes capere possent. Satis enim illi vitæ rationem; intellectumue, ac manus habuisse. Quoniam igitur sapientissimũ animal futurum erat: idcõ manus habuit, non sicut Anaxagoras imperitẽ dicebat, econtrã: quod scilicet idcõ sapientissimum animal sit, quia manus habet. Non enim instrumeta sapientie cause sunt, neq; illa a nimam docent, sed anima instrumenta etiam nondum natis vt conatur, ac tentat, & ad ipsius famulatu hęc diriguntur: prout exemplis pluribus comprobari potest. Haud enim dicendum est, quempiã idcõ sapientem, quia libros habeat, nec idcõ citharedum, quia citharam possideat: sed contra potius, idcõ scilicet libros illi retinere, quia doctor, aut sapiens est: Ita hunc idcõ citharã obnuisse, quia citharedus est: velut de brutis etia exemplificat Galenus, dicens bouis vitalum ante cornuũ ortum illis inniti, & aduersus asquem vtũ. Sic equi pulum nuper natum mollibus adhuc vngulis calcitrare: aprũ dentibus exercitis, nondum tamen ortis vtĩ innixis sic & catulum mollibus adhuc dentibus morum appetere. Adeo vt anima in instrumenta impetat, non instrumenta a nimam moueat: vnumquodq; igitur in ea mouetur, instrumentũq; ita vitũ: quemadmodũ ab anima sua, propriaq; natura infligatur, excitaturq;. Homo autẽ non sine ratione illis vitatur, nec puro nature instinctu, præsertim verò manibus: quæ organa sunt organorum. His enim omnia alia organa facit, hisq; non solum in bello vitũ, sed in pace etiam. Nec solum in terra, sed in ipso quoq; mari, atq; acre degit, terre sribusq;, & aquaticis, atq; aereis, volatilibusq; dominatur. Tandemq; manus beneficio, & Aristotelem, & Platonem, Hippocratemq; , ac Galenum intelligimus: quorũ scilicet in manu scripta opera perlegimus. Hęc igitur omnia summam ex Galeni monumentis collegimus. Quæ nihilominus pro tyronum nõ modico vsũ, per eiusdem Galeni verba, in xta morem nostram repetenda recentissimus: quibũ scilicet sic ille exorditur, dicens. g. [ Vitales autẽ sunt hęc omnes, ( scilicet particule ) ipsi animæ: quippẽ cum eius organũ corpus sit, & propterea multum differunt à sensuicem particule animalium; quoniam & ipsæ animæ differunt. .b. Quædam enim sunt ferocia, quædam timida: Alia aggressiua, alia mansuetã, alia velut ciuitas, & negotiosa; alia velut solitaria. Omnibus verò aptum est corpus animæ moribus, & facultatibus. .i. Equo quidem forebis vngulas, & iuba ornatum, instruiturq; est: etenim velox, & superbum, & generosum est animal. Leoni autem, vt pote animoso, & feroci dentibus, & vngulis validum: Ita autem & tauro, & apro. Illi enim cornua, huic autem exerti dentes, arma sunt innata. Ceruo autem, & lepori ( timida enim sunt animalia ) velox quidem est corpus, sed nudum omnino, & inferme. Timidis enim ( opinor ) velocitas quidem, arma verò ferocibus conueniebant. Neq; igitur timidũ aliquod armavit natura, neq; ferox, & strenuũ quodpiam nudum destituit. Hominũ autem ( sapiens enim est hoc animal, & solum eorũ, quæ sunt in terra, diuinum .k. ) pro omnibus simul defensorijs armis, manus dedit, instrumentũ ad omnes quidem artes necessariũ, paci verò non manũ, quam bello idoneam. Non igitur indigni cornu sibi innato: cum meliora cornibus arma summis manibus quãdocũq; volet, possit accipere. Etenim enis, & hasta, & maiora sunt arma, & ad incidendũ promptiora, quam cornu. Sed neq; indigni vngula, nam lapis, & lignũ quas vngula quassant fortius, violentiusq;. Ad hęc neq; cornu, neq; vngula quicquid, nisi cõminũ agere possunt. Hominũ verò arma eminus equẽ, ac cõminũ agunt. Telum quidẽ, ac sagitta magis, quam cornu, lignũ autem, & lapis magis, quam vngula. Sed velocior est homine leo: quid hoc tandẽ est? Homo sanẽ equũ domuit sapientia, & manibus velocius leone animal: quo vtens & subterfugit, & persequitur leonem, & sedens ex alto humilẽ, inferiorẽq; illum percutit. Non igitur est nudus, neq; inermis, neq; vulnerari facili, neq; calciamentorũ expertus homo: sed ipsi thorax est ferreus, quãdocũq; libet,

libet, omnibus enim difficultius perforatur, & fractiatur organa: Est & multiplex eorum species, est & armorum, est & operamentorum. Non igitur thorax solum, sed & domus, & murus, & turris sunt hominis operimenta. Si autem innatum esset ei cornu in manibus, vel aliquid aliud tale armorum genus, non vitio; posset uti manibus ad domus constructionem, vel muros, vel turres, vel thoracis, vel alicuius alterius similis. His manibus homo utitur textur, & rete contextur, & nalam, & sagenam (ad piscandū) & velum (ad venandū.) Quarē nō solum his, que in terra sunt, animalibus, sed eius etiam, que in mari, & aere, dominatur. Talia quidem hominis ad fortitudinem arma sunt manus. At tamen pacificū, & politicū animal homo manibus leges scriptū, aras, & simulachra Dijs erexit: nauem, fistulam, lyram, scalpellū; forepem, & alia vniuersa artū instrumenta construxit, & cōmentarios etiam speculationis eorum scriptos reliquit: tibique licet litterarum, & manū beneficio etiā nunc colloqui cum Platone, cum Aristotele, eū Hippocrate, & alijs veteribus. Ita quidem d. sapiens usimū animalū est homo: Ita autē & manus sunt organa sapienti animalū cōuenientia. Nō enim quia manus habuit, propterea est sapientissimū, vsū Anaxagoras dicebat: im. sed quia sapientissimū erat, propter hoc manus habuit, ut rationis usum Anaxagoras dicit. Non enim manus ipsę hominem artes docuerunt, sed ratio. Manus autem ipsę sunt artium organa, sicut lyra musicę, & forceps fabri. Sicut igitur lyra musicę nō docuit, nec forceps fabricis: sed est vterq; ipsorū artifex per eam, qua predictus est, rationem: A gere autem nō potest ex arte, absq; organo: ita & vna quęlibet anima facultates quasdam à sua ipsius substantia obtinet: Efficere autem ea, quę nata est efficere, sine organo nequaquā potest. Quōd autē corporis particulę animam nō impellunt, v. aut timidam, aut stenuam, aut sapientē fieri, manifestē videre licet, si animalia recens genita cōsideres, quę quidem prius agere conantur, quam perfectę habeant particulas: Ego namq; bouis vitulum cornibus petere cōstantem sepe numero vidi, antequā ei nata essent cornua: & pullum equi calcitrantem, molliuissimū adhuc ungulis, & aprum quendam per pusillum genis sese tueri cōstantem magnos dentes nouā hūc habētib; & capulum recenter narum morderē affectantem, teneris adhuc dentibus. Omne enim animal & sup̄ ipsius animę facultates, & in quos vsus partes sup̄ polleant, nullo doctore presentit. Aut eur paruos adhuc aper morderē dentibus exilibus cum possit, his quidē ipse ad pugnam nō vitatur: quos autem nōdūm habet, ijs gliscit vti? Qua igitur ratione dici potest animalia partium vsus à partibus doceri, quę & antequam illas habeant, hos cognoscere videantur? Si igitur vna tria acciperent: vnum aquile, alterum anatis, reliquū serpentis: & calote moderato fouens, a ramaliaq; genita rōpro putamine excluderis: illa quidem alis volare conantia, antequā volare possint, hoc autem reuolui, & serpente affectans videbis, quāuis molle adhuc, & inuadum fuerit. Et si, dum perfecta erant, in vna, eademq; domo nutrueris, deinde ad locum subdialeme ducta emisseris: Aquila quidē in sublimē attolletur: Anas autem in paludem aliquam decolabit: serpens verō sub terram irretet. Deinde illa quidem opinor extra doctorem venabitur, hęc natabit, serpens verō in terrę quercinis latebit. Naturę enim animalū (vt ait Hippocrates) à nullo doctę sunt. Quapropter cętera quidē animalia mihi natura magis, quā ratione artē aliquid exercere videntur: A pes videlicet. a. plasmare, fingereq; alucolos: thesauros verō quōsdā, & labyrinthos formę fabricari: Nere autem, & texere, Araneę: vt autē cōiecto, sine doctore. Homo autē .p. sicut corpus nudū armis, ita & animā artibus de situta habet. Proinde pro corporis nuditate, manus: pro inertia autē animę, rationē accepit: quorū vsu corpus quidē armat, & modis omnib; custodit, animā autē omnibus ornat artibus. Sicut enim si innata aliqua haberet arma, illa ei sola sepe adessent: Ita & si artē aliquā natura sortitus esset, reliquas sanē nō haberet. Quia vero ei melius erat omnibus armis, omnibusq; artibus vti: neutri eorū innatū ipsi propterea datū est. Pulchrę igitur Aristoteles .4. manū velut organū quoddā ante organa esse dixit: pulchrę autē & aliquis nostrū Aristotelē imitatus rationem velut artē quandā ante artes esse dixerit. Sicut enim manus, quāquā nullū sit eorū, quę particularia sunt, organa, quia tamen omnia rectē potest recipere, organū est ante omnia organa: Ita & ratio, nulla quidē ex artibus est particularibus: omnes autē in seipsam recipere nata est: ob id ars ante artes fuerit. Homo igitur animalū omnium solus, cum artē ante artes in anima habeat, rationē: optimo iure organū ante organa in corpore manū possedit. Hęc de manus excellentia dicta ex Galeni verbis habentur sunt. Reliquū est igitur, vt ad ossa pertinetur, Galeni (quem interpretamur) ordinē in sequentes, quę sacro ossi cōmitti dicuntur, quōm sic videlicet ipse subdit.

l. 1. de v. p. cap. 3.

m. Contra Anaxagoram etiam Arist. 4. de part. c. 10.

n. Vide pro his etiā 1. 1. de v. p. c. 7. c. de loc. aff. cap. 6. circa med. c. epid. cōmentario 7. cōm. 1.

o. Vide 2. physic. tex. 80. p. 1. de v. p. cap. 4.

q. 3. de anima tex. 38. & vide 4. 4. part. 10.

Πηρὶ τῶν τῶν ἰσθμῶν συντηρητικῶν Κεφάλαιον. 18.

De his, que sacro ossi commissa sunt. Caput Pndeuigesimum.

TEXTVS PRIMVS.


Τῶν δὲ τῶν πλεονεκτητικῶν τῶν ἰσθμῶν, καὶ μεγάλων τῶν φωνητικῶν ὁδῶν ἐπιτηρητικῶν τῶν δὲ τῶν ἰσθμῶν ὁδῶν

ὅταν ἴσως ἴσως αἰσθητὸν ἔχηται, τὰ δὲ γὰρ ἄρθρα αὐτῶν μέρη τὰ πλατῆα, λαγίον δὲ καὶ λαγίον τὰ δὲ μὲν τὰ  
 ἐπιπέδων ἔξωθεν τῆ, καὶ αἰσθητὸν, λαγίον δὲ; τὰ δὲ ἴσως τὰ αἰσθητὸν μέρη ἰσθμῶν ἀπενεργῶν, λαγίον, καὶ διατετα-  
 ῖται, καὶ ἐπιπέδων ἔξωθεν τῆ τῶν αἰσθητῶν, ἴσως δὲ.

Rectis, magnisq; lati ossis lateralibus processibus duo quedā ossa cōstructa sunt, nullū nomen sibi ipsis impositū habētia. Superiores enim ipsorū late pates, Illud ossa nominantur. Exteriores autem, postq; femoris ingreffus inferiores, coxendicum ossa. Quæ autem inde in anteriora protensa, tenuisq; & forata, atq; inter sese in extremo coalescentes sunt, pubis ossa vocantur.

## COMMENTVM PRIMVM.

VANVIS nullum toti ossi proprium nomen a veteribus impositū sit: Eadem tamen ratione, nominis scilicet carentis, recentiorum nonnullis nō temerē ἀνομιμα, hoc est, in nominatū, siue nomen non habens, nuncupare libitū est. Cūm verō in prima ætate, ad annum vig; septimum, in tria ossa distinctum id fuerit (velut antea iam diximus.) Quæ per synchondrosim prius unita, quod est, per intermediam quādam cartilaginē, in os



deinde ea cartilagine degenerante, in vnū coalescant: Eapropter veteres illi anatomici putentem ætatem perpendentes, vnicuiq; per se nomen proprium dedicarunt (prout in presenti textu prædictum iam a Galeno est) videlicet vt in superius, omniumq; maximū, ac latissimū, ἴσως λαγίον, hoc est, id est, os ilium (vt latine dicere solentur) appellarint: Quod in prima, secundaq;, & tertia figura litens θ. & ο. denotatur est: duabus quidem cartilagineis lineis à duobus alijs ossibus distinctū: quarū prima quidem ab acetabulo centro sursum, altera verò indidit extorsum expressit: prima quidem ab osse tertio, secūda verò à secūdo primum id distinguunt. Ex ceteris autem, anteq; riuq;, ac magnitudine mediocri aliud os, λαγίον, latine verò coxendicum, siue ex Celsō f. coxam nuncupant. Quod secundum os in prima, secūdaq;, & tertia figuris litera. m. designatum est: duabus internis lineis etiam determinatum, secūda videlicet ex prædictis, ac alia, quæ tertia est; ab eodem acetabulo centro alijs cōtermina in torsūm procedens, os quoq; id secūda à tertio distinguens. Signantur autem prædictæ lineæ, prima quidem litera. p. in prima, & secūda figura; Secūda autem linea notatur litera. q. in tribus propositis: Tertiaq; demum linea litera. r. indicatur in prima; secūdaq; figuris: Anterior itaq; os, omniumq; minimū, quod à primo osse linea prima, à secūdo autē linea tertia fecerint, ἴσως ἴσως. Græcè, latine os pubis, & ἴσως ἴσως, quod est, os pectinis, nuncupatum est: Omnia tamen hæc tria ossa, acetabulo, quod proprie apud Homerum (vt videbimus) λαγίον dicitur, partem quampiam constituunt: superiorem quidē primū os efformat: anteriorem verò tertium os: Posteriorem verò demum; huiusq; maiorem acetabuli partem secundum os complet. Unde nomen λαγίον proprie magis sibi vendicauit. Dicitur enim λαγίον, latine coxendix, ἴσως ἴσως ἴσως, hoc est, ab eo, q. subsistens sedentes (immò etiam stantes) In id enim immisissu in femoris caput (vt postea videbimus) totū subsistet corpus. Quam etiam ob rem, tametsi tria deinceps prædicta ossa coaluerint, quibus nomina foetus in imposita fuerant, & in vnum reducta, referatq; interim pro prædictis partibus eadem nomina: tubulos minus tamen, deficiente totius ossis ex tribus aggregati nomenclatura, Hippocrates, & Introdutoriūsq;, & alij; non pauci ex Græcis auctoribus, partis præcipue subsistentis nomine totum indicarunt, λαγίον veluti Celsus, coxam, illud appellantes: cui quidem toti etiam talis subsistentia non temerē attributa est. Præsertim cum ossis quoque sacri processus, siue superioris primæ partis ratione, subsistat: quod quidem os sacrum totius spinæ; ac per hoc vniuersi etiam corporis basis est. Cumq; (Aristotele etiam ipso doceante. x.) nates homini carnosas natura fecerit, ad totius corporis requiem sedendo vtilem; Eapropter ipsæ etiam natium carnes apud

Tria coag ossa.

f. Lib. 8. 9. cap. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

f. Lib. 8. 9. cap. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

x. 4. 8. art. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

p. Lib. 1. c. 17. post medium.

a. Ibidem c. 17. post frax.

a 15. muf. fe. tab. fig. 17. p. p. libid. o. Ortab. 16. fig. 17. p. a. Annotat. diu.

> Quod paulo ante primū diximus. & Quod ibidē diximus.

apud Græcos *λοξια* nuncupari folent. Vnde Pollux dicebat. γ. [*λοξια* γὰρ εἶσι αἱ τραχὺταὶ μέρη τῶν ὀστέων ἐπιπέδων ἁπλοῦς] quod est [ Femora (vt interpres ibi verū: sed rectius nates) quidem sunt utrinque post lumbos carnea prominentiæ. ] Nec alia, quam fedentibus, ac validissima sustentationis etiam, ratione *λοξια* dicitur etiam nervosum illud ligamentum, quod validissime femoris tuberculum cum acetabulo cōnectit. Vnde Pollux idem inquit. κ. [*αὐστηρὰ δὲ εἶναι τὴν ῥαχιδῆα τὴν ἀντιπῶν ἐπὶ τοῖς μαστοῖς, λοξία*] hoc est [ Vocatur autem coxendis neruus etiam ille, qui acetabulum ad femur colligans est ] De vtroque; autem ligamento quamvis intelligi possit, nonnulliq; de primo. α. potius acceperint: Nos tamen de secundo. β. magis scilicet recte intelligimus. Vnde & ipse quoq; articulus eiusdem coxendix dicitur, Græcè *λοξία*. Vt statim subdit, dicens [ *ἐπιπέδων δὲ τῶν ἀπὸ τοῦ κατὰ τὸν ὄπισθον ὀπίσθον δὲ ἔκαστος ἴσθμὸς ῥαχιδῆος* ] quod est [ Hoc (scilicet magno lapide Diomedes, Æneæ) coxendicem percussit: vbi semur coxendicis inuertur, acetabulum verò nuncupant. Confregit autem sibi acetabulum, duosq; ad vtrunque (scilicet acetabulum, ac femur) abruptit tendones ] tendones vocat ipsa ligamenta, quæ talem articulum cōnectentia duo sunt: alterū γ. scilicet orbiculari articulum ipsum vndiq; aliorum artuum loquantur, amplexæque; quoniam illis quidem similibus omnibus roburibus existens. Alterum verò δ. huic peculiare est (de quo sequens dixeret textus) teres, cartilagineumq;, ac sua ducte validissimum, a medio femoris capite nascens, & in acetabulo humilimum sedem insertum. In predictis igitur verbis Homerus (β.) duntaxat acetabulum, *λοξια* nomen, intellexit, vel totum id secundū eo, quod a parte acetabuli quibq; nuncupari voluit. Sed hoc ad grammaticos. Omnia igitur alia huius nominis significationibus, eisdemq; rationibus, ad Galenū in pō certum, de predicto nam femoris ad acetabulum per teres illud, validumq; peculiare ligamentum facta conuersione loquentem, his verbis.

TEXTVS SECVNDVS.

Κῆτος δ' εἶσι αἱ τραχὺταὶ καὶ λοξία τραχὺταὶ ἐπιπέδων ὀστέων ἁπλοῦς. β. δὲ τοῦ μαστοῦ, α. κατὰ τὸν ὄπισθον ὀπίσθον δὲ ἔκαστος ἴσθμὸς ῥαχιδῆος. γ. ἀντιπῶν ἐπὶ τοῖς μαστοῖς, λοξία. δ. ἔκαστος ἴσθμὸς ῥαχιδῆος. ε. ἀντιπῶν ἐπὶ τοῖς μαστοῖς, λοξία.

COMMENTVM SECVNDVM.

**S**IVE pro toto osse, siue pro secūda eiusdem parte *λοξία* hic sumptimus, verus Galeni sermo est; q; scilicet in vtroq; latere ischion, siue coxendix acerabulo habet: in quod quidem femoris caput inseritur, perq; validissimū ligamentū illi annexū est. Cumq; ligamentū illud vtriq; ossi adnatū sit: veluti & aliud quoq; α. in orbem articuli cōplectens vtriq; ossi tāta scilicet coxendici, quam femori cōmune est. Ideo per vniuersū sim coalescere, atq; vniti, profertur possunt. Licet non per se, siue per immediatam: sed (vt antea β. id est dictum est) per synneurosin: idēq; per mediatam, siue per accidens factam synphysion quia per aliud, puta per intermediū ligamentum: quod neruus etiam nuncupatur (vt ostendimus. ε.) Hanc enim aduersum est, eandem per symphysin, ac per hoc propter quietem: & per articulum, ac per hoc propter motū, diuersis rationibus copulari (prout antea quoq; demonstratumus. d.) Mirandum igitur hic minime est, si quidem Galenus ε. hoc est, copnatum, siue coalescens esse ipsum acetabulum cum femoris capite inquit. Id quod tamen per vtrūq; ligamentum verum fit: nihilominus tamen de proprio, speciali; ligamento intelligimus: cum primum illud omnibus cōmune sit, vt de eo meminisse hic penē superfluo dici poterit: Ex his autē, prius, quam vltra progrediamur, huius ossis, de quo loquimur, constructio tam cum se more, quam inter suas inuicem partes patet. Velut enim cum femore per synneurosin, atq; etiā musculorū (vt postea videbimus) ratione, per ischiacōsim: Ita partes eius inter se in pueniētate per synchondrosim, deinceps autem per immediatam symphysim, coalescunt: in os videlicet degenerante (prout antea iam diximus. ε.) intermedia illa cartilagine. Construitur verò etiā illius os cum osse sacro per synchondrosim, hoc est, per intermediam quandam cartilagineam vna; adeo tamē paruum, leuēq;, glutinoso modo interstitillat: vt serē immedata symphysis esse appareat, quæ tamen per elaxationem promptē liquabilis est. Nisi in senectutibus interdum exquissimē coaluerint, ea cartilagine affliccata, & in ossis naturam conuersa. Quod si asperitas teres quædam, atq; inæqualitates vtroq; sint: videlicet in ossis illij nuncupati posteriore parte, quæ

Quod preceſſit. can. po. sumus.

Quod ibidē primū posuimus.

In Prop. com. 11. ver. su. finem. c. libid. 17. & com. 12. q. libidem com. 10. & c. 11. Cōstructione

Com. 17. q. 1. d. 1. q. 1. d. 1.



cum sacro cōmunicetur, ac ipsius etiā sacri ossis processibus: adeo vt multæ tuberositates, atq; etiā sinus in utroque sint ac vicissim alterius tubera in alterius sinus, & e contra mutuo quidem congressu recipiant, recipianturq;: Sed tamen ob id ad ginglymum talis cōstruho reducitur, quæ propter motum articulationis est. Hæc propter firmissimā quædam symphysin est. Anterioris demum ad pubis ossa, dextrum cum sinistro inuicem per synchondrosim, hoc est, per intermedia chartaginena, tam in masculis, quam in feminis cōmunicantur, multam quidem ab inuio, procedente autem estate pauciores, sensim degenerant in os intermedia illa chartagine, quantum nunquā penitus ita succedit vt synchondrosim destruat. Nec aliter vni huiusmodi ossa cōtingit. Ossis Ilium figura impensè varia est: superius tamen semicircularis est, muliebr̄ ventilabro non ab simili. Quam tertio præsertim figura litera. o. præfert. In cuius apice, supremæque sede appendix est characteribus 1. r. 12. 13. & 14. in 2. & 3. figuris annotata. Quæ ab anatomicis, Ilium spina nuncupatur. Velut externam eiusdem ossis faciem: quam secunda etiam, tertiâ, figurâ literis. o. vel. o. indicant, Ilij dorsum idem appellant. Quamquam hæc nomina Galenus non nunquā pro eadem, vera scilicet spina, confundere apparet. Totius propostii ossis vsus quadruplex a natura intentus est. Primus quidem, vt ossi sacro tanquam totius dorsalis spini, quæ corporis velut carina est, basi annexū Ilium, ac per hoc totam os, corpus vniuersum, tam tendendo, quam stando, atq; etiam mouendo, sustentat. Est enim scapulae ossi proportionale: velut illud in quâ articulando humero, ita & hoc articulando femori per eōmodum: sic; velut illius ope humeri articulus firmatur, ac vno modo mouetur, circumduciturq;: sic & huius ope femoris articulus nō firmatur modo, sed quoquo versis etiam cōmouetur. Est igitur nō superiori modo, sed inferiori quoq; ac per hoc totius corporis basis. Secundus vero vsus est, vt eodē sacro ossis vitium; annexum id os, quandō veluti peluim efformet, que intestina, præsertimq; rectum, ac vesicam, nec non in mulieribus vterū quoq; conueniētib; prehendens, muniat, substituaturq;. Tertius verò de in vsus eiusdem ossis est (cuius ratione nō magnum modō, sicuti propter duos alios prædictos vsus effectum est, sed etiam vario modo figuratum, variisq; sinibus, atq; prominentiis, & asperitatibus dotatum est) vt diversorum musculorum principium, basiq; sit: Qui, nisi nos in eorum deciperent, vel error in cōputando successerit: ad quatuor & viginti reducuntur. Imprimis igitur quinq; musculorū principia ex prædicta Ilium ossis appendice ortum habent, quam paulo ante Ilij spinam appellari diximus. Primum quidem transuersū abdominis musculi. 1. ab interna eius sede ortum habētis, ob id quidem compressa, amplosq; ibidem reddita tali sede, vt cōmodius, validiusq; tale principium oritur. Secundum verò, ascendētis musculi. 2. etiam abdominis à media eiusdē appendicis regione. Tertiumq; 3. ab externo eiusdem spinae latere oboritur (quod infernam cōiunctam partem) descendētis musculi principium, sedēq; est. Hæc inquam tria et tota appendicis spina dicitur ducunt. Præterque, alia duo sunt musculorū principia, quæ ab anteriore diantaxat eiusdem appendicis sede oborta sunt. Alterum 4. quidem tibie motorū primū, alterum 5. verò eorundem sextū. Præter hos verò quinq; musculos, alij tres ab eiusdem ossis Ilij externa regione, quam appellari dorsum prædicimus, originem sumpserūt: Primus 6. inquam; secundusq; 7. ac tertius 8. femur mouentium musculi. Vtra quos prædictos octo musculos, alij duo ab interna ossis eiusdem Ilij regione enascentur: videlicet dorsi quintus, 9. ac femoris septimus, 10. Ab eiusdē verò interno latere; quo in posteriora fertur, extra sacrum os prominens, ipsi scilicet tres sup̄ originis partem ducunt, videlicet thoracem mouentium quartus, 11. dorsiq; motorum sextus, 12. & septimus, 13. Est autem & in ossis hoc Ilij tuberculum. 14. quoddā exterius supra sinum postea declarandū: quod Ilium ossi, & coxendicis cōmune existens, nono tibie motorum musculi 5. principū præbet. Qui musculus ab Ilio nascentibus prædictis adiunctis ordine quatuordecimus est: Quintuodecimusq; tandem femur mouentium decimus, 15. ab eiusdem ossis Ilij extuberante linea originem habens: quæ quidem ab ea eiusdē ossis sede oritur, qua primi officuli sacri ossis processum transuersū cōmunicat. Hæc igitur quiddecim ab Ilij ossis pronascentes musculi sunt. Ab ossis autem coxendicis alij sex; seu maus dicere (& quidem rectius) quatuor noui musculi principium ducunt. Ab acuto enim, posterioriq; eiusdem processu, præter ligamentū inde exoritur, & in transuersum quinti officuli sacri ossis processum pertinet, seu dicere maus eorundem, aliud femoris quoq; motoris musculi tanquā secundū principū exoritur. Quem musculum femoris vndeccimū dicere possemus: veluti & aliud quoq; inferius principū ab appendice ossis coxendicis enatum femoris duodecimū proferre possemus. Rectius autē decimi femoris musculi tria principia determinantes, ad quatuor novos ab ossis coxendicis pronascentes musculos perueniamus: qui ab eius appendice principium ducunt. Sunt enim tibie motorum tertius, quartusq; & quintus, atq; etiam femoris motorū quinti maxima quartus. Tibie in quâ tertius 16. ab clauore ipsius, posticq; eiusdem sede originem ducens. Quartus 17. verò ab acutiore magis parte. Quintus 18. deinceps, ac eandem femur mouentium quintus. v. omnium postremus anteriorum eius, in maximam appendicis prædictæ portionem occupans, ad pubis vsq; regionem. Ex anteriore autem

Fig. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.



litera .4. in secunda, & tertia figura denotatum. Secundum verò pubis ossis proprium, parte sua licet anteriore, qua pubis ossa inuicem secundum .i. suæ originis principium ducere, præpositus tum, à quo tubæ motorum musculum secundus .i. suæ originis principium ducere, præpositus tum, Tertiumq; demùm posterius coxæ ossis proprium, quem acutum nominamus, quod præpositus tum inter quatuor, & quintum præscriptos status prominentem, à quo musculum femoris vnde cum mium, siue potius decimi portione mense tetigimus: hunc litera .v. in tertia figura nobis indicat. Integrum verò tibi licet alios etiam processus annotare. Appendices autem duas pubis ossis tibi iam inuicem supraq; claudis innotauimus .i. g. Alteram quidem in superiore ossis, siue sede, quam eisdem ossis spinam nuncupauimus: Alteram verò in inferiore coxæ ossis parte, i. quam eisdem ossa basin dicere possumus. Ambe quidè per se notè sunt. Priori, in secunda, & tertia figura characteribus .v. tal. n. 3. 4. inscribitur. Posterior autem in prima, & secunda figura tal. littera .n. denotata. Reliqua est de coxæ ossis acetabulo (de quo præfens contextus loquitur) quædam aduersionis, sed enim corporis omnium ad articulationem dicatorum, siue simy, siue acetabulo quæ in ista iunctura, præfens distentionemq; est. Circa quod quætor pendenda sunt dicitur. Primum, quod in ferre ipsius sede autorsum magis, ab acetabulo fando deorsum à ferreitas quædam est, supra quidè maior, infra verò minor multis cæcis foraminibus opplent. Vnde perca illud præmā ligamentū (de quo præfens Galeus sermo est) exoritur, quod in sanctoris caput, induritur. Reliquæ verò eisdè acetabuli partes læuæ, lubricaq; charreflagitij ob articulationis motus facilitatem, i. g. ut itaq; sunt. Secundum, quod perabranda venit, est, quæ ab acetabulo in superiore tali asperitate, ac ligamentū exortu respondens, incuium, depressiud est, iuxta magis sordantibus prædictæ coxæ partibus, ac pubis ossibus cõmuni medietatem. Tertium sequitur, quædam in modo prædictam in anteriore parte, quæ in primam iam iam declaratum firmum, eod; inferiorum processum, nonem respicit, de pressis, ac tenuis protuberant, quam in partibus alijs, ut tibi dicitur sordantibus hominibus ferre: in actu in angulum flexi, in torsum abq; impeditur, non, facilis queat. Eleuatius autem in alijs partibus merito appellatur, ut firmus, siue stantibus, siue quousia modo ostenduntibus ferre, idem extendi, siue in posteriora duci possit. Quartam deniq; notandū in modo ostenduntibus in exteriora quædam in superiore regione foraminula quosq; circa quæ plurima videntur: Et quibus validissimū alteram orbiculare ligamentum educitur, quod sordioris caput coxæ ossis ossi foras per alligat, ipsiusq; articulum sustinet. Non tamen adeo validissima, duo hæc ligamenta, coxæ ossis nexus sunt, quoniam interdum frangi, ac dissolui queant: vnde luxatio non fieri, claudicatq; homines non cõtingit. Omne siquidè morbi coxæ ossis præfens, quæ in ipsa etiā ligamentæ pati queant, vnde hic igitur omnium de toto coxæ, siue coxæ ossis generatione dicitur esse prædicta, non in musculi modo, sed in spinis etiam intelligenda veniunt. Quicquid deinde ossi quædam in modo ostenduntibus prorsus ignari pulam prædicare soleant. Ossis videlicet pubis in mulieribus perderi potest, quædam piam, siue rarū in ista, coxæ ossis tibi inuicem innotè: quæ (ut alijs) partus tibi dicitur diuisis ossibus, quod facilius, ac promptius factis ipse foras exceditur. Quæquam non penitus aegri gendat nostri cuiusdam vetustioris præceptoris historia (alia tamen, non ea, quam apud dicitur, ratione) venit. Sciam namq; velluti vestem se lucratum esse actabat à quodam diuitem mercatore, ob raram, ingeniosamq; curationem in illius ossis inuicem facta coxæ ossis diuicem fuerit. rebat) cum in partu vsq; adeo feratilis illa ossum pubis inuicem facta coxæ ossis diuicem fuerit. adeo ut dextri ossis dentes cum sinistri dentibus occurrerent, vnde propriam à partu reduci cõstructionem non minime poterant. Quam ob causam vehementissimo dolore cruciabat mulier, mortem potius exoptans; quam adeo feratilis illa ossis. Quo quidè viso, referretq; obsterice, se maius ossium foramen, siue inter ea spatium intermediū tangere. Prædictam ossium pubis luxationem esse, tibi in ista præfens hoc, tibi referentis doloris causam ex ista ista, tamen quidam cognitionem ignauis, quodam curatione tamen, siue ex accidenti, siue diuino potius affatus spirititu solertissimus ille medicus mulierem lara, validissimaq; fascia per nates, & coxæ ossis, ac per tibi coxæ ossis ligam. in quædam ista, validissimaq; cõstrinxit: sperans quidè (ut inquit) vehementer hac coxæ ossis distractione iam pubis ossa in propriam sedem, propriamq; cõstructionem reducere. Non se à tali intentione frustratum esse subdebat. Strepitu enim quodam ex ossium inter reductionem attritione facta (quem non illa præfens modo, sed ista ista quædam, ac præfens malitiosus ille, quæ fascia vtriq; trahendo cõstrangebant, clarissimum audiuerunt) quamprimum, non secus ac in luxationum omnium repositione conuulsi; sedatus dolore est. Cuiusmodi celebritas sedatio conceptam sanè de luxatione, ac reductione sententiam cõprobauit. Verum enim ueritas ista, non hanc abnegare non cogitur: sed quædam inuicem tanquam verissimum admittit, exactionis quodam modum cõprobatur. An inuicem ossium pubis feratilis, aut dignitas (præfens est) quædam proferebat) cõstructione abnegamus, ac eorum ex consequenti irritatione ex ista, quædam inuicem saluissimum reprobamus. Alibi ut non usendacem; sed quodam hoc igitur cum in ista, quædam inuicem damus. Et cõprobatur in ista cõstructione, aliquantulaluxatione talè est: si in ista, quædam inuicem

Fig. 245.  
A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.

Abos duo  
Appedice  
dicit. omni  
g. in proce  
com. 101

Acetabulu.  
Femoris  
operatur  
lo quod  
in ista  
ostibus  
ali  
ali  
Coxæ os  
m

Coxæ os  
in parte

Morb.

Pubis ossa  
in feminis  
ut in viris.  
Cõtra ob  
nullos.  
Historia.

Historia  
probatio.

Rationis  
supplicatio  
Rationis



Bipes verò ipse solus inter pedeftria factus (omiffis Satyris hominem quòdam hæc imitantibus) & erechthos: quia manus habuit. Cujm enim necessariu ad vitæ corpus ex his partibus: quæ in thorace sunt, & vtro cõplicatur, egeat; cõlis, id est cruribus; seu artibus: in cæuis quidẽ, canibus, equis, & alijs similibus anteriora cõla posterioribus similia facta sunt. Idẽ ipsi conseruet ad velocitatem. Homini verò (neq; enim propria indigebat velocitate, vt qui equum sua sapientia, & manibus erant domiturus, fuit); multo melius pro velocitate organa habere ad omnes artes necessaria: anteriores artus manus facte sunt. Cur autem non habuit quatuor crura, & præterea etiam manus, sicut Centauri? Quoniam primò quidem impossibilis est ipsi naturæ corpori ad eò differetiam multo. Secundo quomò etiam si possibilis esset, absurda nihilominus in teum esset, & nutriti, videtur; impossibilis: Tertio quomò dato qd. possibilis esset, viuereq; ac nutriri posset: inutilior tamen, & inanis cõmoda talis constructio, quam humana foret. Deus autem, & natura quòd melius est semper eligunt. Vt autẽ claris hæc ex Galenò liqueant, sigillatim ex eius verbis enucleatur. Impossibilis (inquit) est sporò ad eò differentiu multo. [Non enim sicut Plantes, & Pithores ipsi, tũt colores, tũm figuras solim ipsorũ natura cõpositura erat; Sed etiam substantias totas cõmpositas, quæ impermixtæ, ac puræ sunt. Neq; enim in coctus quidã venereus homini cũ equa fuit, persisterent matrices speima. Pindaro autem, si vt Poeta quidẽ recipit illam, quæ factas de Centauri, fabulam condonandã est. Si verò vt sapiens vir, & sibi plus vulgo poetarum scire quiddam assumens, audebat scribere (quòd equis magnetidibus bellucosus cõmiscabantur: ex quibus oriebatur exercitus parabilis ambohus progenitoribus similis, in ferna quidẽ parte, mari, superna verò, patri) accusandus est, qd. sibi sapientia arrogauerit. Equa enim ab eis, & asina equi portet erit recipere sperma; & retinere; & perficere ac animalis mixti generatio: nem; Ita & lupa masculi canis. Canis verò ipsa nõ lupi solum, sed & vulpis, sicut & vulpes canis. Equus autẽ hominis sperma fixatissia ne receperit quidẽ in sinu matris. Longiori enim putando opus fuerat, si quãdo autem fuisset, corruptus vtq; vel mox, vel nõ multo post. Verum nõ Pindare, ipi quidẽ cantare, & fabulari concedimus; scientes poetã musicum, inter alia propria ornamenta; maximè ipso miraculo egere. Admiratio enim velut attonitos reddere gultis, opinor, & delectare audientes, non docere: Nobis autem, quibus de veritate non de fabulis cura est, satis cõflata substantiam hominis, & equæ omninò misceri non posse.] Et hæc quòdam primò. Quòd secundã verò dicemus [Quòd si concesserimus in concepta saltem, & misceri, & perficere hoc animal: ita absurdum, & alienum. At quibus nutrimentis nutrietur iam natũ, nõ sine inuenturum. An herbis quidẽ quibusdam, & hœdæis crudis inferiori, & eadem equina; coctis autem, & humanis cibis superiora? Melius certe suscipiet eam & duo ora ei fuisse, hoc quidem humanũ, illud autẽ equinum. Erat itaq; (ni fallor) duo etiã corda habeturus, si quid ex posterioribus oportet conseruare.] Sed hoc quòd secundũ, Quòd tertio verò sic dicemus [Quòd si quis etiam missa fecerit omnia hæc, quæquã absurda, quæ ediderit; gigni posse, & viuere: hunc equinis predictis cruribus hominibus: nihil accedet ex huiusmodi constructione; præterquam velocitas: neq; hæc simpliciter, neq; in omnibus locis, sed in planis, & leuibus solum campis. Si verò aliquãdo opus fuerit per accliuẽ currere, aut per decliuẽ, aut per obliquam, aut per inæquale, ea, quæ nunc est, constructio humanorũ crurum multo est melior. Ad eandẽ verò modum, & transilire, petra; qd. acutas, & rectas prætergredi, & omninò omnes locorũ difficultates superare cõmodius poterit homo, quam monstruosus ille Centaurus. Vellem autem videre eum, vel deoos idicandem, vel naues fabricandem, vel per malam ad antennis nauium manus reptantem, ac licandentem, vel probris aliquid nauicorũ operum perticandem. Vt absurdus, & ineptus ad quòd in omnibus esset, & in multis planè impotens hæret? Quomodo enim ascendendo per graciles, & longas scælas ad parietes altissimos ascēdat? Quomodo verò posset remigare, cum ac probe quidem idere queat? Quancũq; autem hoc ei adesse: tamen anteriora crura manũ actum impediunt. At fortassis naua quidem non probus; agrotola verò frugi foret. Sed hic quoq; plus inest in eptitudinis. Maxime si quid agere oporteat, vt ascendere arbores, & aliquos fructus decerpere. Neq; vtq; hanc solam cõsideremus absurditatẽ eius. Sed ad artes vnaeris transi, & finge animo currere aut fabricare, aut satorum, aut tectorum, vel ferbam: Quomodo quidẽ sedebit? quibus verò cruribus imponet librum? vel aliquid instrumentorũ quodã; quomodo tractabit? præter alia enim omnia, quæ hoc homo præcipuò habet; etiam fodere cõmode in coxis, hinc omnium animantiu solũ inest. Sed hoc quoq; multos latet existimantes solum hominem stare rectum, nõ percipientes, qd. etiam sedere solus possit. Centaurus igitur ille poetarũ (quem nõ hominem, sed equinum hominẽ quendam rectis vocẽ) neq; firmari possit tũt in coxendicibus; neq; si cui hoc ei inest, manus vtq; vteretur cõmode, impediẽtiũ eum anterioribus cruribus ad omnes actiones. Velut si cuiusq; nostrũ postorũ alligant quæ duo oblonga ligna. Etenim si nos ita cõparatos recumbere vellet aliquis in conuincio, mirabilis quẽdam rerum facies profecto apparebit, & multo magis adhuc dormituri quibus nobis. Mirandum enim & id in illis centauris, qd. neq; toto lecto possint

Dubium.  
Responso..r. o. h. id. l.  
h. in. m. r. y.Quòd im-  
possibilis  
centaurorũ  
generatio.q. m. h. id. m.  
m. r. y. q. q. q. q.  
h. in. m.Sugeneretur  
centauri,  
ne viuere  
possent.Si viuere  
inutilior  
eorũ con-  
structio.m. h. id. l. q.  
m. r. y. q. q. q. q.  
h. in. m.

possint uti, neq; super terram quietere. Indiget enim constructio particularu corporis ipsorum  
 altera alteri; humana quidē lecto, equina vero terra. Sed fortassis non equinis quae per erubus  
 sed humanis melius fuisset nos uti. Sic quidem, praeter id, quod nihil haberet neque ad aliquam actio-  
 nem; adhuc & velocitas deperiret hominibus. At qui si neq; humanis, neq; equinis, nec alterius  
 alicuius animalis; si quidem quodam equinis, quod humanis sunt similia. Cum magnitudo qua-  
 tuor duo sint superflua, manifestum est, quod si haberemus sex pedes, vel etiam plures; sic adhuc  
 essent plures nobis superuacua. In vniuersum enim si quod animal manibus recte vtitur est; nul-  
 lum oportet in huius pectore prominere impedimentum, non solum innatum; sed ne acquirere-  
 tum quidem. A toxicis quadrupedibus, sunt multi pedibus animalibus; quibus pedibus hoc cru-  
 rum pluralitas condocens, obdierit ipsa dorum vsus, est. [Bipedes, quidem & aues sunt. Restat  
 autem solus animalium omnium huiusmodi. Solus enim ipsi secundum rectitudinem curuū est ipsi-  
 na. Quod si ea est, profecto & rectitudo omne corpus ad vitam necessarium. Nam quod ad vobis  
 carina est spina huius corporis, & ad hanc curuā ipsa vobis quidem, ut & quadrupedibus, angu-  
 sum rectum efficiunt. Solus autem hominibus vna recta linea extenditur. Talem igitur figuram  
 erura ad spina habent in quadrupedibus; & volatilibus animalibus, dum ambulat, qualem ho-  
 minibus sedentibus. Ob eamque, cuiusmodi paulo ante dictū est, nullam curuam, in qua staret rectum  
 in. Quare licet optimo diximus, solum hominem stare rectum. Alii enim animalia quodam magis  
 alia mensuris. Auaem omnia sunt propa; & modo gradantur simillimo infantibus, qui seipsum  
 in mensuris. Stelliones quidem, & omnia animalia, quae cunq; sunt breuium crurum, prorsus sunt  
 prois. Ostingit enim ipsos venter terram semper, & is amplius ad huc seipsum. Equus autem,  
 & canis, & bos, & leo, & omnia quadrupeda medium locum obtinent inter prois, & pla-  
 na recta. Ita autem & aues vniuersae, quaeuis bipedes sine. Neq; enim haec vna linea recta cum  
 spina habent gressus instructa. Solus igitur omnium animalium homo rectus sua. Sicut enim  
 federe omnium solus monstratus est. Et enim omnes manus in oppositis actionibus vbi sunt  
 figuris. Haec enim erecta, haec vero sedentes manus conuertunt. Neque autem tantum prois; aut  
 supinus moitur quoque. Meritoque nullum aliorum animalium, quod erecto stare, vel federe  
 possit, fabricata est natura. Quippe quod nihil manu elaboratur erat. Incipiamus igitur rursus  
 a cruribus, & ostendamus vna quatuor, eorum partem artificiosae ad eos constituta. Vnde exco-  
 gitari quidem possit, aut nichil constructio. Via autem ista hic sermo, & ipsa singulari pro-  
 positum inuentio, ac demonstratio secundum dictam a principio methodum erit. Postea igitur  
 quā ut manus apprehensio instrumentum, ita erit ambulationis sui, modo quidem simpli-  
 citer; sed vt maxime conuenienter sapientia animalis (id ipsam certe dependentes) sermo non  
 finito, de crurum numero differendum) rebouū fuerit ostendere, singulis erurum partibus ita  
 esse constructas, vt maxime eo modum erat futurū bipedi animali ratione praedicta. Postquam  
 igitur ambulandi instrumentum diximus esse humanū crus, non si in plures, sed vt maxime con-  
 uenienter sapientia animalis, compositum videlicet, nec omnino simplicem conseruamus adhuc eius  
 notionem. Dicendum itaque nobis est prius quidē, quomodo fiat ambulatio. Deinde quae res ipsi  
 accedente fiat homini quae eius ambulatione. Fit autem ambulatio, altero quidem erura terri  
 firmo, altero autem utentia. Sed firmari quidem, pedas; circumferri autem totius vniuersae est  
 actio. Quae propter eius perfirmationem, & motum perficitur ambulatione illius quidem, pedes  
 sunt instrumenta; huius autem tota erura. Hoc autem de in stantibus iam mobiliter ad motū per-  
 spicuum est. Stabilitatem enim, cuius gratia facti sunt pedes, non minus etiam quae prestant. Quinetis  
 & simulantibus, & ceterisque alter quidem pedum in terra firmus est; alter vero siquis cū tota  
 erura ferat. Et mutas quidem loca, beneficio cruris, quod mouetur, nobis inest. Hoc enim est  
 quod loca permat. Quod vero non cadamus, hoc pes in terram huius efficit. Quosque enim  
 ad praesens textus expositorum conuenit. Est igitur (vt idem Galenus in p.) vnum quidem in  
 femoreos, quemadmodum in brachio. Duo autem in tibia, his fessilia, quae in vna conueniunt.  
 Quorum alterum quidem vocatur *cruris*, hoc est, tibia, eodem cum toto membro nomine alter-  
 rum vero minus, *cruris*, id est, fibula. Maximum certe omnium corporis ossium femur *cruris* est.  
 Primum enim hoc firmamentū est aetabulo, & primum omnem superlatentem corporis molem  
 vehit. Non solum femoris magnitudinem proponit his verbis Galenus; sed rationes quoque ad-  
 iungit, quia scilicet primum id aetabulo firmatum est, ac per hoc in motu cruris primum funda-  
 mentum est. Secundo quod si superlatentem corporis molem vehit. Duplex igitur fundamē-  
 ratione, maximum omnium corporis ossium esse debuit, atque enā, si recte perpendere, validissimum.  
 Maximum esse, in homine stante, ac sedente, duobusque duntaxat cruribus in inerte, intelligitur  
 atque etiam in simia hominem ipsum quam maxime imitante. In ceteris enim animalibus, mo-  
 ximeque in vobis multo breuius femur, quam tibia est. Vnde nonnulli decepti sunt; aues ipsas  
 more desituentes. Id ipsum igitur femur supra quidem, extenditur ossi per simplicem cruris

Libid. c. 2.  
vbius fin.Fami. libid.  
vbius fin.  
vbius fin.n. libidem  
cap. 3. ver-  
su med.n. libidem  
cap. 4. in  
p. 10.n. libidem  
cap. 5. circa  
p. 10.p. libidem  
cap. 5. in  
p. 10.



ab acetabulo foras procedere? Quis tam acetabulo situs, quam ceruicis longae rationem ex eodẽ Galeno didicimus alibi sic scribentem. **a.** [ At quini si collum femoris statum ex cotyle obliquũ foras abfcederent, propropinquũ fore fuert alterius femoris collo. Hocvtrũ si acciderent: quis adhibe locus fuerit reliquus interius femoris musculis, qui maximi necessarii q̃ esse debent? Quis autẽ neruus a spinali medulla in tota crura distributus? Quis venas, quis arterias; quas domq; glandulis ipsarum replentibus? Non enim per externas cruris partes dixerimus demitti hæc oportere. Omnium enim foras incidẽtium nõs admodũ exposita effiẽt. Forsitan autẽ si ne nos quidem id saltem (tantum abest, vt natura) lateat, oportuit ad læsionem locis collocaffe venas ita magnas: quarum si qua vnuerata fuert, vi supertus animal esse queat? Arteria namq; in signũ earũ, quae illic statim sunt, vulnerata: nullo pacto fracturatur. Si igitur venas, necris, arterias; glandulas, & musculis multis, & magis oportebat præparasse id spatium foras ex cotyle procedere; necesse fuerat femoris. Et certe scederẽ apparentẽ; externas eius partes restitutiã totam excedere extẽr- narum corporis partũm. Si quibusdam verò minus foras extuberauerit collum capitis femoris; his inguinũ loca fuerit angusta, & mutuo sese collidentia, forasq; nutare ob id femore toto, & gehu cogitũs. Car igitur non extrinsecus possit natura cotylas, vbi nunc sunt cõuexitates femo- rũm? Ita enim & colla ipsa cotylis submissa sicut secundũ restitutiã capitiũ, & femora recta fecisset. Quoniam pondus corporis recta ad perpendicularẽ lineã ad cotylem dependent esse; & ad femoris caput **v** & maxime quando ambulantes, vel currentes; alteri quod crurũ alium cõ- tũmesimus; reliquũ autem in terra firmum tenemus. Hoc autem, quod firmatũ sit in medio id, quod portat, maxime fiat. Si verò huiusmodi positio cruris tutissimi gradientibus est, manifestũ est, contrariã fore periculosisimã. Propterea certẽ ad externas partes sicuturã cotylas abduxit, & cum eis capita femorũ, hõficiatũ tenũt. Sed optima positio eorũ præfens est. Cũm verò cursus locorum angustia ex hoc nasceretur, vnicum relinquẽbatur remediũ non secundũ restitutiã, sed capitiũ efficiere femora; sed vt nunc sunt, foras vergentia]. Sed hæc de superio capite, sua eã appendisse; ac si nunc, eãdemq; de ipsius subiecta ceruice distantiantem ex Galeno nunc ferit. Inferiore autem hic ipse sede multa pernotaũda occurrunt. Primum, quoniam leuiter dilate, scens (vt Galenus inquit) in duobus longa, insigniterq; crassa capita, vtrq; ad eõ quidẽ magna, quiniã modò totius corporis collum capitiũ maximi dimittunt; ac definit vt quantum generationi loquẽdũ, veterem more (prout antea ostendimus. **x**) non condyli modò; sed epiphyse quõq; (Galeno inscripto referente. **y**) nõminat possint: Præsertim cũ sine ceruice eũdem sint. Speciatim tamen à proprie dictis condylis differẽtia, nõ condyli, sed ob eorum magnitudinem capita dominantia veniant. Non solũ igitur dicendum est cũ Galeno in præfati textũ, quod

Dubium.

Responso.

Inferius caput.

Notandum.

primum.

Cap. 1.

com. 1.

Utr. 1.

cap. 16.

post.

prim.

com. 1.

Tab. 1.

in proo.

com. 1.

Fig. 17.

Fig. 17.

Fig. 17.

Fig. 17.

Fig. 17.

Fig. 17.

ad latera huiusmodi in inferiũ duo capita protuberent. In posteriore item sedem ambo magis porriguntur, quã in anteriorẽ: præsertimq; quod interius est. Id enim retrorsũ, atq; introrsũ quõq; tantò magis exteriõs protuberant: quibũ magis anteriorũ exteriori cedit. In lateribus autem, quod interius est, grossius quidem in medio factũ est: quod autem exteriõs, vtrũ mediũ lateris retrorsũ alii quantũ magis exporrigunt. Tertio peribrandũ vterũ est, quod nõ idẽo simpliciter motus capitis cũ tibia articulus moueri videtur: quia mutuo ingressũ, siq; per gangly non deapientur (prout nonnulli minus recte eosiderunt) sed quia duplex articulatio; dextra scilicet ac sinistra, enarũmũ firmatũ femur est. Quoniam verò simplex motus non est, licet talis appareat, cũ aliqui talis cũ motus tibiã introrsũ a latente musculõ. **a.** fiat (prout antea iam ostendimus. **x**) Quis musculi alterũ quõq; vtrum aliã esse ostendimus: videlicet ad firm mandũm retrahendo tibiã in ipsũ, ac per hoc totũ quõq; crurũ: quãdo scilicet restũ animal stare debet (vt homo) aut ad sese posterioribus super pedibus stabilendum (si quadrupes sit.) Haud enim sicut Galenus. **a.** dicebat, propter flexionẽ factũ ille sub poplite lateris musculõs est. Quatõq; deinceps pendendũ est; quod in anteriore, mediãq; duorum inferiõrũ capitiũ sede sinus quidã effatũ dignus est, leui charçlagine incretustatus, ad molam, siue patellã recipiendã (de qua posteriorib; loquemur. **b**) paratũ: huncq; ordinẽ secundũ ossis sinũ declarant (statuom- in secundã figurã. **d.** indicat). A quo tertiu (vt quĩtõ notandũ ad nuxerimus) in posteriorẽ regione longẽ maiorem, profundiorẽq; sinũ obseruãmus in tertia figurã. **e.** notatũ, non prædecti anterioris instar, charçlagine illinatũ, sed asperũ, & iniqualem: vt scilicet validissimũ semper, nonnunquã verò etiã (vt postea videbimus) tertium duo ligamenta in ipsũ implantentur; alterum **f.** quidẽ a medio tibiã ossis sibi subiecto tuberculo. **y.** exonsens, alterũ verò à poste-



postenore ossis eiusdem tibiae sede .A. principiu ducens : seu malumus econtrà dicere, q̄ scilicet ab eo sinu exoriantur, & in prædictū tibiae mediū tuberculū, partemq̄ eiusdem ossis posteriorem duo hæc ligamenta inserantur. Quorum ortuū, siue implantationū causa, vtrobiq̄; foraminula quædam, asperitateiq̄; visuntur. Hicq̄; primus sit talis insignis quidem sinus vñs, non ginglymodis ( vt aliqui reputarunt ) articulationis occasione. Alter verò, vt per ipsū hunc tertium sinum nervorum quoq̄; femur à deuntiu quartus, maximus quidem, & in tibiā ad pedem vsq̄; distribuendus, cumq̄; eo sinu arteria, venaq̄; notabiles in tibiā descendentes tutò deducatur, ac perforantur. Qui secundus quidē vsus duobus illis posterioribus capitibus attribuentus magis est: vt quæ in sui medio neruum, vasq̄; prædicta cōprehendunt, tutò quidem firmatū, & ab extrinsecis occurrentibus defendentia. Sextò deinceps perlibrandū est, q̄ non is tantum prædictorum capitū in vsus est: ac præcipuis quidem alter: vt scilicet ( præter articuli flexionem, quæ omnium principalissimus scopus est ) inde pedis motores quidam musculi enascantur, supq̄; generationis originem suscipiant. Ab interno enim capite, quod in prima figura .B. in tertia verò numerus 15. indicant: scilicet ab elatioe ipsius sede, iuxta genu articulū, partim extēnis, vt in tertia figura litera .x. nervosiq̄, ligamentosq̄; ac luido principio, partimq̄; interius magis, supioriq̄; iuxta modium femoris ( eiusdem figure litera .l. ) carnosū: Duplici inquam hoc principio primus pedis motorū musculū .x. nascitur. Ab externi verò capitis in tertia figura numerò 16. denotati superiore etiā sede; quam litera .m. præferet, pedem quoq̄; mouentū musculorū secundus, .f. ac tertius .n. principium ducunt, ac sub poplite quoq̄; latens musculus, .z. si non totam: partem quandam tamen suæ originis assumit. Septimò præterea notandum est, duos alios sinus in prædictis capitibus inueniri: quos ordine quartū, & quintū annumerabimus: Quartum quidem in capitis interni latere externo litera .z. in tertia figura insignitum quidem, euertētiq̄; compressum: per quem musculorū tibiā mouentiū primū, .B. secundū, .x. tertijq̄; .z. & quintū .n. tendones oportundē, ac tutò interno ipsi capiti firmati percurrant, ac reflectantur, siue antorsūm conuoluantur. Supra quæ paulò altius quatuor femur mouentiū musculi .µ. tendo inseritur. Quintum verò sinum in externi capitis externo latere obseruamus, litera .n. in eadem tertia figura notatum, per quem appositissimè quartū .x. pedem mouentium musculorū tendo reuoluitur: ne in suo quidem obliquo recessu aberrare contingat: Oestusq̄; demū remanet annotandum, quod amborum capitū in inferiōri latere multis foraminibus, abiq̄; charulaginea quidem crusta, perforata fuerunt, vt validissima inde ligamenta pronascantur, vel in eadem inserantur: præsertimq̄; illud cōmune omnium articulorū membranae etiam ligamentū, quod in orbem obducitur, tamen in huiusmodi genu articulū non in parte anteriore, quæ à patella interim adeo occupatur, vt tali ligandō locus minimè remanserit: Sunt enim, Galeno metipso hic declaratis, eialia tria ligamenta rotunda; validaq̄; Primū quidē: quod ipse posuit, ab exterioribus totius dearticulationis partibus exporrectū, crassum quidem, ac teres, nō modò femur cum tibiā, sed ipsam quoq̄; fibulam exquiritè iniunctè colligans. Secundum verò ab internis productū iam tam prædictō ligamento extēiore præcipuis, mollissiq̄; cum interior articuli regio in motu vehementia minus elaboratur sit, quam extēns, minisq̄; ob id periclitatara. Quod interim internum ligamentū, licet ex femoris in tibiā capitis latere pronascatur, ac per hoc internū veniat nuncupandū: nihilominus tamen in tibiā latus minimè implantatū, sed antorsūm procedens, in tibiæ pro maiori sui portione cōtēnsit. Tertiu deniq̄; ligamentū in medio posterioris, & vñs .i. .z., quod est, interioris ( forte legendū vñs .i. .z. id est anterioris ) Melius autē dixisset, interionis, & extēnsionis, regionis charulagineū quidē, ac validissimū ligamentū: quod inter duos tibiæ sinus ex protuberante illius parte originem ducens; in femoris maximū illum sinum, quem paulò ante tertiu sinum ordine declarauimus, implantatū; vel si malumus econtrà dicere. In quem porrò sinum aliud nonnunquam licet nō semper, ligamentum, mucosum quidem, gracileq̄; ad anteriorem prædicti ligamenti sedem implantatur, quod ab anteriore tibiæ ossis etiam regione enatum fuerat. Præter quæ tertium quoq̄; ( quamuis inter prædicta ordine sextum ) à postenore eiusdem ossis tibiæ sede enatum robustū quidē; neruosiūq̄; ac bifidum ( Galeno etiam rectè id declarante .c. ) in posteriorem eiusdem quoq̄; sinus partem inseritur. Ex his autem tribus Galenus hic vnicum duntaxat cognouit, quod in medio est. Pium verò magis est, vt pro vno, & eodem tna ligamenta ipsū computasse dixerimus. Simul enim omnia hæc in media consistunt interioris, & extēnsionis regione. Sex igitur, si exactè perpendimus, vel ad minus quinq; huiusmodi inferioris articulationis ligamenta existunt. Quibus præintellectis, cum ipso etiam Galeno, femoris huius ossis figuram contempletur; quibus sic subdit.

## TEXTVS TERTIVS.

De his dicitur à morbo q̄; exquiritur corpus p̄ se ip̄m. vñs .i. .z., quod dicitur de his extēnsionis, quod dicitur.

Est autem totius femoris figura gibba quidē anteriore in parte, atq; exteriorē: sima verō pars posteriorē, atq; interiorē.

COMMENTVM TERTIVM.



**V**M optimam sedem capiti eius (scilicet femoris) preparasset natura (prout alii perbellē Galenus idem ait. d.) ipsam nuncupati sicq; corylen, non secundū rectitudinem coryles apparet extensum femur: sed vt curviam negligenter expendenti videri qucat, figura femoris admodū vitiōsa est. Quippē q̄ conuexū quidem, ac curuū priore, & externa parte; resimū vero partibus hīs cōtrariis factū sit. Hanc eius formam, & Hippocrates. a. nouit, consultiq; eo fracto seruare, neq; mox inuertere. Porro quibus natura femur fuerit rectus, quam conuenit: blesī sunt omnino ad genu. Hoc autem quantum malum sit, nō ad cursum solum, sed etiā ambulatiōem, & stationem tutam, refert quidam, & ille quodam loco i. immō, & quemuis ex plebe. Cūm cernat quotidie arbutus idipsam, non latere. ] Paulūq; infra rursū [ Quōd si rursū vsq; ad genu forās vno tenore abscederent, & nusquā intrō reuenterentur (scilicet femora) alter vtiq; ipsis esset blesī status modus. Itaq; optimo iure collum & primū, & maximē à capite foras vergit: Post id autē & continū dimidia pars totius femoris, postq; autē rursū reuertitur ad genu. Ob eamq; causam vniuersā figura femoris curua quidē exteriorē parte, resima autē interiorē efficitur. Ad eundem autē modū magis quidē sima retrosum, antorsūm est: vter magis curua ad fessiones idonea est, & ad multa opera, quae agimus sedentes. Causisimodi est scribere libro ad femur extenso. Ita autē & quodcumq; aliud secundū curuitatem eorū extendatur facilius, quā si fessit aliter facta. Quinimodū dum firmamus vno crure corpus (sēpe enim cōperimus hoc nobis esse vtile cūm in vita omni, cūm arbutus) melior fuit figura *Pauli*, id est, curua, quā recta. Vt enī, si latitudo esset equalis velocitibus artubus, & viciis corporis partibus, tuta sic maximē, & eueris difficilis firmitudo in altero ipsorū esset, habente vnaquaq; superiorem nūm in corpore partium sustuliciens sibi ipsi aliquid ad perpendiculari: Ita & nunc q̄ curuū factū sit crur partibus eius partim quidē externis, partim verō internis magis, & alijs in medio locatis, nulla superiorū partū subiecta caret rectitudine. Quisq; vultus occasione, non solum hoc crur, sed etiā tibiā magis curuā extrinsecus natura fabricata est. Maxima autē sicut huius femoris sit, q̄ qui plurimum curuis sunt: erubus ( Ha quidem, dum adhuc generentur in vtero, alij verō à prima educatione facti sunt ) suis duobus pedibus, siue altero solo stare velint: firmiorem multo, & difficiliorē eueris, quam qui crura habent recta, obtinent firmitudinem. At verō in constructione crurū, firmitudinem certam, tanquā seipsum nō modō natura sibi proposuit: sed prouida etiā nihilominus, vt citō possemus currere, si quando vñs incidisset: ne plurimum quidē ea peruerterentur, eam: Curua autē estēpūs fecit, vt & securitatem firmationis habeant, & velocitas cursus nihil ledatur. ] Hęc idem Galenus. Quibus aliū quoq; obliquatus, præsertimq; simitatis posterioris vliam addere possumus, vt scilicet musculis appositi eandē posteriorem ipsius femoris sedē occupantibus, in quibus vena, neruus, arteriaq; insignes occultas debebant, ac tutō per ea pertransire. Sunt autē hi musculi femor amplectentes, ipsiq; annexi duo, videlicet musculi tibiā mouentū ostiauis. & qui totam ferē le moris ossis amplitudinem obcingit. Præter eam posteriorem partem, quam femoris motorū quatuor. a. peroccupauit: præ totam scilicet acutā, protuberantēq; ac asperam, & inæqualem illam lineam in tertia figurā A. indicatā, quæ à processū femoris radice vtra uectiq; longitudinis eius procedit, in quibus talis femur mouentū multo implantatur. Duo igitur hi sunt femoris partem posteriorem primū occupantes: Dein verō multo, de quibus meminisse nunc superflū est cūm ossi inuicem adhiere fecerint. Quodā partū verō extremarū, superioris inquam, inferioriq; figuram perostandū est, vtroiq; illas dilatare: supra quidem, partē; anteriore, iuxta ipsius ceteris radice: vt vultū eius, ampliōrēq; principū musculis tibiā mouentū ostiauis enatis potuerit. Inim autē iuxta caputū amborū radicem, non amplum modū, sed depressū quoq; sūm vt capita femoris pedes: oportunitus pronascentur: itū vt cōmoda magnis vasīs, ac neruo cō pertransuansibus lecti parata sit. Ne fortassis erranda declinent. Quamobrem & leno illis os est: cūm præcipuō multo musculo principium ibi dari oportuerit. Erat autē hoc ille tutus, ac defensus vtraq; a capitis ibi subiectis: vt rotandū os ea parte fieri nō oportuerit. Sed alia Galeni verba cōmplementū. Quōm de processibus eandē femoris subdit, dicens:

d. 3. de v. p. cap. 2. post princ.

e. 3. f. f. d. d. 2. 6. 0. Proprius ambulans, & stare.

Proprius sedens.

Proprius firmari oportet curu.

Tab. 5. ff. 6. v. Tab. 12. ff. 13. r.

TEXTVS QVARTVS.

Anteriorē dē legi nō paratū vniuersū tū dēpōnē, sē pertransiret inuicem, vultū dē mēpōnē tū dēpōnē, sē dēpōnē tū dēpōnē.

Processus

Processus autem duos habet paruos ceruici subiectos, quos rotatores vocant. Longè maiorem verò externum, qui nates appellatur.

## COMMENTVM QVARTVM.

**D**VO sunt femoris processus, proprijs vniuersisque suis appendicibus (non secus ac tria prædicta eiusdem femoris capitâ) dotati; quos à femoris reuolutione, quam in ipsos infert musculus (vt videbimus) faciunt, Græcè *τροχανηρις*, latine rotatores, anatomici nuncupant. Alter quorū inferior, internaq; in parte existens, minor est, in secunda, & tertia figura litera .A. annotatus. Alter verò in externa longè maior, superiorq; in tribus figuris litera .T. designatur, quem non tantum trochantera, sed *πυρρις*, latine nates nominant. Nō alia opinor ratione, nisi quia in ipsum infertur musculus quatuor scilicet semur mouentiu primus, .F. secundus, .P. tertius, .Q. & quartus .V. natem cōstituant. Horū enim causi trochanter hic maior processus factus est: Quinimō propter hos quatuor musculos, in eiusmodi processu parte externa, quatuor velut impressiones quedam in ætate prouectissimæ apparent; Sed ne horum quidem quatuor tantum primorū femoris musculorum causi maior hic processus emerit: verum alij duo, videlicet nonus, .V. ac decimus .A. ex femoris etiam motoribus musculi in ipsam parte interna, qua femorus caput respicit, musculi implantantur. Quorum inferiorisq; implantationisq; ratione, sinus quiddā asper, & inequalis, ac profundus existit litera .R. in tribus figuris propositis indicatus (quem inter sinus ordine sextū statuemus) sex igitur prædicti musculi in maiorem hunc trochanterem inseruntur. Præter quos adhuc septimus remanet nō implantationis, sed originis .V. sicut ab ipsius processus radice, in externa, anteriorēq; radice originem alius musculus duxerit, quem tibie motorū septimū .F. cōnumerare cōsueuimus. Maiora igitur rotationis, ac circumductionis femoris ratione, quàm simpliciter trochanterem anatomici pronuntiant, de hoc maiore processu intelligere solent. Quamuis alter etiam rotator sit. Etiam propter duorū musculorū implantationem paratus ille est, videlicet femoris motorū sexti, .Q. & septimi .A. Ultra quos octauus .A. etiam insertus ad huius processus radicem est, posteriore scilicet in femoris regione. Cuius implantationis causi, linea quedā aspera protuberat, obliquè deorsum in posteriora quadritenus vergens, que literis .A. in tertia figura denotatur, in quam distus femoris octauus musculus inseritur. Cū verò de tribus his musculis, sexto scilicet, septimoq; , & octauo femur introrsum, versus alterum crus mouentibus, attrahentibusq; ac de eorum in ossa facta implantatione mentio facta sit: ab nequaquam hic fuerit, mirabile casum enarrare, qui anno abhinc propemodum duodeuigesimo, Domino Don Blasco à Septimo contigit. Hic enim quū in Terra Cammaratē vnā cum suo Cognato eiusdem Terræ Conite, necnon & alijs multis equibus hastiludiu certaret, compressis vltra modum crunbus, ob superfusam staphylis nuncupant longitudinem, inter eurrentibus, & ter circa horum musculorū insertionem, dolorem quandam extensiuū, & quasi dissipatiū percipiens, rumore demum quopiam, strepitūq; instar percutientis balistæ facti: non secus ac in durū cuiuslibet substantiæ fractione fieri solet: in maximum eiusdem loci dolorem repente cecidit, vique adeo vt equitare nō amplius potuerit: sed ab equo descendere coactus, in animi ferè deliquitū peruenit. Quoquoque igitur ibi aderant medici quāprimū aduocati, viso quidem in femine (parte quidem femoris interiore, quadante-nusq; posteriore) oblongo quodam tuberculo ad digiti, tam in grossitie, quā in longitudine magnitudinem, magisq; inferius in extremo eleuātū, ex vulgari idiotarū nomenclatione, superrequisitum esse neruū determinarūt: vt vulgō scilicet nostri dicere solent [neruo incauato]. Quamobrem nullus momenti casum esse reputantes, anodinus fortibus, inunctionibusq; curare ad doloris mitigationē vebātur. Cū verò frustra illos laborare Blasco ipse patiens aduertenit, medicis illis minime confidens, in vrben Panhormum sese cōferre decreuit. Vbi octo iam conuocatis insignioribus medicis, quatuor quidem phisicis, totidemq; chirurgicis, exordicis articuli luxatio ab eis reputata est. Cuius curæ causa, multis tū per sanguinis missione, tū per medicamenta, vtiuntibusq; extenuantem, præmissis euacuationibus: Itemq; fortibus, atq; mollicibus, laxantibusq; inunctionibus, tyrannicè pauperculum agrotantem eruciantes, ad mansuetigium deniq; hoc est, luxati femoris, vt perperam credeban, repositionem deuenire determinauerant. Quod enim in femine, sub iugine eleuātū tuberculū, tametsi nō orbiculare, sed oblongum apertissimè appareret, q̄ anatomici perpendicularis, femoris esse caput reputabant: quod scilicet ab acetabulo coxæ deficiens, ibi emineret. Ideoq; curationem per submissam illi tumori fasciam: quæ sursum à valē quopiam chirurgo patientis viri humens adherente attrita, in proprium acerbulum tale femoris reputatum caput reduceret, exp̄stam de terminauerant. Minimè interim aduerentes solertissimi illi medici non tumoris modō longitudinē, minimūq; femoris capitū respondētē figurā: sed eius quoq; locū infra iugem, inferiusq; maiorem lætū

Trochanter maior.

F. tab. 9.

T.

F. tab. 10.

R.

F. 11. tab.

R. 12. f.

F. ibidem

11. tab. 9.

V. tab. 8. 9.

F. tab. 10.

R. 12. a.

F. tab. 5.

A.

Trochanter minor.

X. tab. 8. 9.

V. ibidem

A.

V. ibidem

R.

Historia.

elevatione, desuptusq; cedentem quandam comprimenti regionem: adeo vt digitum submittere, sursum premendo, haeret: nisi carnis musculorum multitudo, crassitiesq; (carneis illis enim homo erat) resisteret. In qua etiam pressione punctio quaedam sentiebatur, ossis frustulum esse quod emineret, acutum, pungentem; exquisitius perpendentibus profiterens. Cum vero luxatio nis reputaret iam reponenda dies ab eis deputatus appropinquaret, egrotans pater, qui Baro est Iarratanae, vt quidem omni laude dignissimus, tamen nil de luxatione, eiusq; patrandae repositione ambigeret: Diuino tamen spiritu affatus, minimè perscrutandum tale opus abiq; mea praesentia iussit. Me igitur (quanquam inuis cunctis curatio nisi astantibus medicis) accersim praecipit, consilium non de opere, quod necessarium supponebat, sed de operationis modo petiturus. Quamobrem absentibus medicis accersito mihi, priusquam in egrotantis habitaculo peruenirem, factus obuiam ineffabilis pater est, casum filii, vocatamq; a se luxationem referens. Cumq; inter namandum, rectum, & abiq; elucidatione, aequiq; curibus, & abiq; vilo articulo genu dolore ipsum egrotantem incedere audierim, sic Deus me adiuet, vt casum ouestigii percepti quemadmodum postea referam. Subridens igitur nullam inesse femoris luxationem respondi, absentium interea medicorum repudiatem, ac studendi negligentiam increpans (nolo enim ignorantiam tantis viris, primatibusq; medicis ascribere) Quod autem ex auditu quam praesens animo conceperam, viso deinceps egrotante ad nos quidem sponte à suo cubiculo egrediente, tactuq; tandem certissimè confirmam, antequam ipse referret ei praedicens, se nimium longis firmitatè esse staphilibus, dum equitans in basilidulo percurreret. Quod audiens idem egrotans nò sine admiratione respondens cõprobauit. Declarato igitur casu ( postea iam iam enarrado) patri, & egrotanti filio praecipit, vt aduenturam medicis vesper dicerent, me coram negligētiam, si uolè & incharitatem increpauit: vt qui minimè pro tali casu studuerint, neq; libri aliquè aperuerint. Quamuis enim ( vt illis praedixi) probi viri manus sit ( id quod semper obseruare enix sumus) preterita medicorū, quæcunq; & qualiacunq; sint, cõprobare, nulloq; pacto medicorum infamiam desiderare, multoq; minus eam excitare, cum egrotans saluti obit potius, quam confectæ nihilominus tamen ubi de futura curatione disceptatio proponitur, sanctū est veritatem prehonorasse, eamq; Socrati, & Platoni quantumcunq; amicissimis proposuisse. Cuius igitur aduentus ignarum medicū, qui rem minimè intellexerit, difficilius longè sit disputare, illumq; à sua refractaria pertinaciā, vel stultitiā dimouere: eontrā verò facillimū sit docūm quæcunq; virum proposita sibi veritate superare ( erubescit enim hic, vt inimicus mendacii, veritati contradicere) Ideo ad studendū illos medicos vt quadam, emulacione sibi proposita, impellere, atq; irritare potius, quam persuadere, vel hortari decreui: diebus eos egrotantē neglexisse, ac per hoc multos aures in mensis spatio, plurius paulo depredatos potius, quā lucratos fuisse: vt studerent igitur praecipit, remq; diligentius perlibrarent, postmodiq; paratiores, ac melius armati ad cõfultationem, locūq; negligentis defensionem ducerent. Quæ quidem cum adiuerint medici, quanta non bile, sed rabie agitati fuerint, ignemq; peros, & naves exullarint, tibi perpendendū omitto. Non modò igitur per libros, sed per cimiteria vagantes, ossaq; coxendicum, ac femorum disquirentes, eaq; omni sedulo perlibrantes ( quantum antequā aliquo modo curationem aggressi essent, huc facere debuerint) vt talem luxationem aptare possent, suamq; sententiam defendere, ac tumoris figuram, & situm rationabiliter ostēdere, per totam noctem simul cuncti laborarunt. Cum verò nò inuenire ad suū propositū valuerint, tristes tandem non amplius luxationem esse, neglecta intentione tumoris ratione, sed quandā subluxationem, præ pudore interim, atq; iracundia nò pallidi modò, sed Chamæleonis instar varios colores recipientes, pronuntiabant. Quibus exultis, respondimus, eorum sapientiam, nostramq; insimul stupiditatem admirantes: vt qui multa dicerent, quæ imbecillimus noster intellectus percipere nequiret. Quamobrem ossa hæc ambob; tam scilicet ischii, quam femoris, serio à nostris scholaribus, precipientibus nobis, illuc allata in medium adducti iussimus, luperq; incensā quadā coram nobis reponi. Quibus quidem tanquā exemplis suam nobis interpretari sententiā velint, insisterent rogauimus, quomodo scilicet ex luxatione ( vt prius dixerant) vel fortassis subluxatione quæpiat ( vt nuper effugerant) tuberculū illud in interna femoris regione prædicari enasei, atq; hinc potuerit talem figurā præferens: quod tamen interea non humore, sed ossæ substantiā cuti subiectam, omnib; ipsorumq; etiā aduersantium cõmuni consensu, proferebat. Cum igitur nil probabile, vel rethoricū nobis ostendere potuerint, partim erubescentes, partimq; iracundi nostram efflagitarunt ( vt eorū nomine vtar) phantasiā. Quibus coram illustri multorū equitum consessu respondimus, considerata causæ origine, tuberculūq; figura, & reliquis symptomatibus, exquisitèq; perlibratis his, quæ per anatomicas administrationes euidenter apparent, nil aliud esse potuisse, quam totā illam ossis femoris partem difficillimam, deiquam atamq;, ac per hoc legregatam: in quam quidem musculi implantantur femur mouentū sextus, septimusq;, & octauus: totus videlicet trochanter minor: de quo paulò ante locuti iam sumus, in quæ sextus, ac septimus inseruntur: ac totū illud quocq; os, quod

predicte asperę, inæqualiterq; protuberant linee subijcitur, in quam octauus musculus implantatur. Cuius enim trum horum musculorum munus sit, coniungendo crus alteri alteri cõiungere, firmiterq; applicare: hiq; tres sunt, quorum vi equitantes, ac presertim aliquo modo presantes, siue currentes, aut quousque deniq; modo equum circumuoluentes, firmantur; presertimq; si abiq; scissis, vel spaphilibus occupatis, vel illis fortasse nimis longis, vi super stapede pedes cõstanter stabili nequeant, equisiliens existant. Quinq; (vt predictum iam est) immodice prolapsi, lons illis concuies (quas staphiles dicimus) predictus musculus in haud idio cessasset, ob nimiam cruris, violentiaq; quandam contractionem: præcedente fortassis aliqua eius indente, ac deiquamante licitate, totus predictę partis ossis, ius cum musculorum infertionibus, legereq; ad à magno femore, apertio; in parte inferiore facta est. Quod si à seipsis propositis illa curatio modo prescuto; fuissent, credentes scilicet illam ossis elevatione, caput femoris esse, ac pce hoc in eis, suppositoque laqueo, aut fissa sursum attollere curauissent, dubio procul omni hominum, eorumq; scriptis præsertim in neruo, venaq;, & arteria effusa dignis illac pertranseuntibus, præsertim trucidantem, vel in edulionem, aut gangrenã citò perduxissent. Interrogantibus ergo curis illis tam medicis, quàm illustribus illis, nobilissimisq; proceribus, quæ nam curandi methodus in tali casu obseruanda veniret? Respondimus, non alia incedendu fore, vi, quam fissa latur; scilicet in uenerim ea parte circumdare, vt ea disgregata pars, discissaq; cum reliquo ossis reliquente, præposito constringenti medicamento copiosissime: quæ scilicet ac in ceteris omnibus ossibus futuris procedere solemus. Cùm sic igitur factū esset, ante mensē talis conuictio, conuictioq; facta est: vt incolumis adhuc vsq; diem Blaius ipse remaneret. Quem profecto cuius posses tanquam rarissimum, ac mirabilem quamplurimū nõ equites modò, sed medici etiam, intellegendi causa, nostram domū frequentarunt, in nostro equis aptato seculo, ceterisq; multis obsequiis ac femoris ossibus deincepsq; in musculorum tabulis hæc omnia perpendentes. Cùmq; veritas ipsa omni ex parte sibi consona sit: aduersarij medici tanquã vni procul quibusdã iustis, inueteri in anatomicis administrationibus non periclitē exercitatis, boniq; interrim christiani vengam in castigatio palam passi sunt, propriū in huiusmodi casu errorem publicè acceptantes, nostręq; interim sententię, atq; methodi subsistentibus. Quæ omnia tandem quãmaximè cõmendauerunt, multoq; magis ad fidera extulerunt, vbi experimento quod didixeram totum cõprobatum esse cognouerunt: sed hæc obice ob casus raritatem hic præsertim iam sint. Ad tibiam igitur vnã cum Galeno conuerti tempus estet: nisi velut in alijs quosq; capitibus obseruauimus, præstibandorū hic epilogum prius absoluerimus. Præter cõmune igitur omnibus ossibus temperamento: quod frigidum, & siccum est. Vt in femoris cõcempati iam antea, presertimq; cõmento primo, & tertio sumus: vt scilicet tam cruris, inferiorisue partū in mouendo, quàm in cadendo superiori basi esset, tibiq; motores musculi ex ipso pronalicerētus, septimus inquam, octauusq;, ac sub poplite latens, queni na mero decimū dicere posse mus: Item pedem mouenti primus, secundusq;, ac tertius. Magnitudinem præsertim textu primo, veluti si figuram textu tertio, ex ipso met Galeno didicimus. Substantia verò ex procerij textu quinto liquet durissima enim extensis est, intus autem cõcava, medullosa. Quod numerum sperat, vnicum vtrinq; os est, tamenq; varias partes habeat varijs nominibus insignitas. Foramina multa etiam in eo sunt, vel oriendorū ligamentorū, vel nutrientiū venarū pertranseutiū gratiã. Nullã verò effatu dignum in eo foramen adest. De sensu demum nil amplius repetendū, cùm aliorū ossiū (præter dentes) inhar, sensū de siturū id os sit. Appendices in eo quatuor (prout antea ostendimus. g.) sunt, in superioribus videlicet capite, duobusq; trochanteris. Quartusq; dñmū inferius vnica enim appõdix vtrinq; inferius caput cõoperit. Processus quinq; annumerari possunt: duo videlicet trochanteres, ac tria predicta capita. Sinus deniq; multos auinotare possemus. Vnum tamen antea nos sex effatu dignos declarauimus: quinq; scilicet cõmento secundo, sextum verò in cõmento presenti. His ergo repetitis, ad tibiam conuertamur.

Temperamentum  
Vitis dicitur  
pica.

Magnitudo.  
Figura.  
Substantia.  
Numerus.  
Foramina.  
Sensus.  
Appendices.  
g. in proce.  
com. 6.  
Processus.  
Sins.

**De Tibia. Caput Vigessimoprimum.**

**TEXTVS PRIMVS.**

Tibia, vocatur quidem sic sum vniversa cruris pars, quãta inter genu, talumq; media est: tũm quãtus os, quod in eadẽ est. Tenditur autẽ id inferius: & ad ipsam duntaxat fessur doarticulatur,

Nomen.

**D**VO apud Græcos nomen id *αἰψία*, latinè tibia, significat: Alterum quidem, totam eam partem, quæ inter genu, & talum est, non solum scilicet ex duobus ossibus aggregat, vt dicitur propositè figurè hic præferunt: sed vnâ etiam cum musculis, venisq; artibus, & nervis, ac ligamentis quoq; & ipsâ demum cute: idq; generalis significatû est: Alterum verò specialius: videlicet ex toto hoc aggregato, duobusq; eius ossibus, dicitur quod maius est.

Nos igitur in præsentibus hoc toto capite speciatim id nomen sumemus ab alio minori osse distinguètes; quod fibulam siue suram nuncupabimus [ Nominatur itaq; ( inquit idem alibi. Galenus ) maius os *αἰψία*, hoc est, tibia, eodem cu toto *αἰψία* nomine: Alterum verò *αἰψία*, id est fibula. Tenue id admodum, & multo minus, quam tibia os, & extrinsecus ipsi adten sum est. ] Pausoq; infra [ Ap igitur non æquum est hic quoq; admirari prudentiâ conditoris? qui ad vtriusq; vsum & si certè contrarium, exactè conuenientes, & essentiales in vicem fabricatus est totius *αἰψία* particulas? Quoniâ enim superius portari oportebat ab inferiori: fortius, simul & maius rationabile fuit esse id, quod subiectum esset, vt videre est in columnis, muris, domibus, turribus, & omnibus inanimatis. Quia verò moueri quidè oportebat, quod superius: et moueri autem ab eo, quod subiectu est, maius rursus, & fortius, ratio fuit esse ipsum superius: vt in brachio cotingit, cubito, & summa manu. Itaq; cum & tibiam portandi seiporis gratiâ præstaret esse maiorem, vt autem ipsâ moueretur faciliè, minorèta, essetq; necessariò alteru eligere: cum ambo simul conuenire nò possent: ratio certè fuit, eligere quidem quod vtilius, alterum verò non omnino neglectissè. ( Est verò totum crus organum ad ambulationem factum, vt supra .i. declaratum iam satis superq; fuit ) sed in organo propter ambulationem inersitatus, ad motum promptior cõstru-



i. Cap. 1. titulum.

ctio longè vtilior fuit ea, quæ ad securitatem firmationis inersit oportuna: Propterea igitur in minorè fecit femore tibiam: nò tamen eousq; minorem, vt nò posset iam tutò ipsum portare ] Quoniam, vt postea videbimus, cum tibiè fibulam addiderimus, ad sustentandù maioris rationem habebit [ Tibiâ; hic primò quidem memoria est repetèda methodo in isto dicta. *Αἰψία* quæ dicitur bimus eousq; particula vsum ad actionem organi totius oportere referri: Secundò autem, qd si omnia, quæ ipsarū sunt, partium, mente immutauerimus, neq; inuenierimus positionem aliam meliorem ea, quam nunc sortitæ sunt, neq; figuram, neq; magnitudinem, neq; connexionem, neq; ( vt paucis omnia complectar ) aliud quidequam eorum, quæ corporibus necessariò insunt, perfectissimâ pronuntiare oportet, & vndiq; rectè constitutam præsentem eius cõstructionem.

i. Cap. 2.

.i. Quod certè, & quæ ante dicta sunt secundù hanc methodum nobis diligenter expressa sint, & in sequentibus eidem eam seruariamus, nemo ( si modò intentus fuit ijs, quæ priùs scripta sunt ) ignorauerit. Quòd autem & tibiæ magnitudo ad certam symmetriam, seu cõuenientiam venit, quòd tùm ad femur, tùm ad pedem pertinet, ad eò vt optime sit cõparata ad velocitatem motus, nihilq; ad firmationis securitatem ledatur, euidenter discet tam ex ijs, quæ propter varietates, aut fortissimè ratiõnes sunt reddite, tùm ex earum contrarijs, quæ propter aliud symptoma quoddam sunt extenuatæ. Si quidem quibus crassior, quam par est, contingit, superius pondere imminuet, & vitiat velocitatem ambulationis. Quibus verò est gracilior, facile ei eueritur, & cadunt maximè si citus moueri voluerint. Opus enim est, sicut & antea dictum est, ad benè ambulandum altero quidem crure totum corpus tutò vehi, circumferri verò celeriter alterum. In bo autem eiusmodi habet tibiæ secundùm naturam magnitudo. Etenim portandis superiacentibus sufficit, & transferri ab eis faciliè potest. Itaq; iam manifestum est, maiorem, quam nunc est, non oportuisse esse tibiam. ] Sed nostrum prosequamur intentum, Galeni cõtextum interpretantes.

iii. Cap. 1.

Interius igitur tibiæ os tenditur, exterius autem fibula. Cuius tibiè figura triangularis est, tribus protuberantibus, tamen nò exquisitè rectis lineis, ac tribus quoq; acutis angulis insignita. Quarum prima anteriorè est, cæteris prominentiõr, adeò vt ipsam tibiæ anatomes professores nuncupant. Hanc in prima figura litera .γ. præferet. Dicit autem alia, secunda scilicet, & tertia Secunda quidem ex tenor fibulam respiciens: quam in secunda figura .β. indicat. Tertia verò interior ad alterius cruris tibiâ vergens, in vtraq; figura .α. indicata. Sed hæc superiore in parte, inferiorèq; ad obtusum angulum magis declinat. Quæ admodum tota ferè secunda acutiõr est. In quam eòdem ligamentum .α. secundùm longitudinem extensum tibiæ fibulam colligans inseritur: seu manus dicere qd ab ipsâ exoritur in sibi respondens fibulæ angulù, lineamque ( de qua

Sicut.

Figura.

Linea prima.

Tibiæ ipsa.

Musculus.

tab. 15. fig. 17. d. &amp; fig. 15. 7.

postè

posterioris loquemur) implantatum. Prima autem anteriorum, quam spinâ diximus, medio se habet modo inter secundæ lacinæ obtusionem, ac tertię acutiam. Inter has tres quidem lineas, siue angulos tria latera cõsistunt. Primum quidem externus fibulam respiciens inter primâ, & secundam lineam in prima figura .a. designatû, quod pianum iam, quinimum quadantenus cõpressum pedis motorij musculorũ sexto, .b. & nono, .c. digitorumq; pedis eiusdem quartodecimo, .d. & quintodecimo .e. sedem ex parte laci præbens: cui reliquam fibula distrahuit. Secundũ verò latus interioris est i: quod, & tertia lacinis circumfinitur: quod insigniter gabbũ, carnali; omnis expertis, ac nudum existit solo periostio, cutiq; cooperitũ (vt paulo post Galenus idem refert .a.) a Græcis *χρῆς*, & *ἀρρυσίον* appellatũ; quod quidẽ latus in prima figura .x. litera, denotatũ est. Tertiu verò demum latus est posterius, in secunda figura .d. designatũ, quod secunda, & tertia lacinis cõterminatur: Deperitium quidem magis, quam secundũ, licet minus, quam primũ est, musculis pedis digito mouentibus secundo, .f. & tertio, .g. pedisq; motorũ quanto .h. idoneam sedem præparans. In cuius quidem lateris tertij superiore sede aspera quedam linea, sinuosiã; potius, quam proreberans pendenda venit, obliquẽ introrsũ a medio ferẽ latitudinis ipsius in terminam lineam descendens. In quam sinuosiã, asperamq; obliquam lineam musculus tibiẽ motorum decimus .i. sub poplite latitans dictus implantatur. Propẽ quam lineam asperam extrorsũ vltra medium talis alpeutans non continendũ foramen obseruatur nutrienti vasorum gratiã exculpsum, vt sic licet intrò penetret. Cur autem tibia extrinsecus curua sit, dictũ iam antea .a. fuit. Sed hæc quodã tibiẽ figuram, speciatimq; quodã eiusdem latera, anguloq; ac lacinis dictã iam sunt. E quibus omnibus iam iam propositus tibiæ vsus liquet duplex: Alter quidem, vt non secus ac in manu eubitus, ita in crure tibia, quarandam motuum basis sit, sic etiam stando, ac sedendo femoris firmamensum sit: Alter verò, vt ab ea tam pedis, quam eius digitorum motores quam plurimi musculi originem sumpserint, ac ipsi ad hærentes firmentur. Pedis inquam motorius quartus, .x. quintus, .a. sextusq; .g. ac aliquo modo etiã nonus, .i. digitorũ verò motores secundus, .e. tertiusq; .a. ac decimusquartus, .x. & decimusquintus .y. Pedem inquam mouentiũ quartus ex posteriore sede coarticulationis tibiæ cũ fibula principiu nerueum, validumq; sumit, toto propemodũ progressu tibiæ ossi, ac ipsi euan fibulæ incumbens. Quintus deinde ab eadem posteriori sede, qua tibia, & fibula inuicem de hætere incipiunt, originem ducit: nõ solum membrano ligamento, quod secundũ longitudinem tibiæ fibulam colligit, incumbens; sed magnam quoq; posterioris tibiæ sedis partem integens, internũq; internam fibulæ lateri adnatus, ab oq; robur assumens. Sextus autem ab anteriori sede coarticulationis fibulæ cum tibia ex vitro; videlicet osse, eorumq; cõmuni ligamento principium ducens externo tibiæ ossis lateri innotuit. Secundus deinde eorum, qui pedis digito mouent, atq; etiã tertius a posteriori sede ligamẽti fibulam cum tibia connectentis enascentur, totam ferẽ tibiæ, ac fibulæ longitudinem posteriore in parte percipientes. Quintadecimus autem digitos mouentiũ musculorũ ab osse tibiæ originem sumit, qua parte sic licet i sub genu articulo fibulæ cõmittitur. Ab hoc autem pedis nonum originem lascipere, dicere possuimus: Quintadecimusq; tandem ab externo ipsius etiã tibiæ latere originem sumit; vbi membraneũ illud ligamentũ, .x. quod secundũ longitudinem tibiæ cũ fibula cõmittit, principiu suscepit. Sed de his quidẽ musculis obiter intantũ dictũ hæc sit, pro tibiæ vsu enarrãdo. Subdit autem Galenus in præsent. textu, ad ipsum duntaxat tibiæ os femur dearticulãri, quauis cum fibula post articulationem tibiæ coniungatur, pro ipsius etiã articulationis, ac totius quoq; corporis sustentamẽto, de qua quidẽ femoris ad tibiã dearticulatione eius posterius locuturi sumus, .p. nõ est, vt hic fructu feruorem dilatemus. Ideo ad fibulæ fermõnem priũ ipso cum Galeno pertransiamus, quã sic videlicet subdit.

Latus pri-  
mum  
Tab. 1. 7  
Tab. 4. 3  
Tab. 5. 9  
Tab. 14.  
A.  
Tab. 15.  
Fig. 15.  
D. E.  
Tab. 14.  
G.  
o. Cap. p. p. c. d. e. f. g. h. i. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x. y. z.  
Tab. 13.  
F.  
Tab. 15.  
Fig. 15.  
D. E.  
Tab. 1. 7.  
Tab. 4. 4.  
Tab. 3. 4.  
A.  
Tab. 4.  
F.  
Tab. 5. 9.  
F. Musc.  
Tab. 15.  
Fig. 17. a.  
Fig. 15.  
F.  
P. Tex. 8. com. 3.

TEXTVS SECVNDVS.

11 Το γὰρ ἰσοπέδη ἔστι, ἢ κλίση ἀλλήλων, καὶ τὰ πόδια ἴσα ἀνωμαλῆται τις κλίση στροφῶ, καὶ τὰ πόδια διὰ τὴν ἰσημερίαν καὶ τὴν ἰσότητα. Συναρτῶνται δὲ τὰ πόδια καὶ ἄλληλα τὰ στήματα, τὴν δὲ τὴν μέσην πάντῃ ἀρῆματι  
12 ἀλλήλων, συνῆματι δὲ τὴν ἰσότητα ἀνωμαλῆται  
13 Os enim externus, fibula nuncupatur, crassitudine quidem a tibia multum superatur; longi-  
14 tudine autem ad genu minime peruenit. Coarticulatur verò tibiæ secundum in ambo extremitatibus.  
15 Quodã medium autem a femine cum penitus abscedunt.

COMMENTVM SECVNDVM.

16 **F**IBULÆ magnitudinem perpendicularis, eam tam grossiã, quam longitudine tibiæ  
cedere inuenimus. Tenuior enim, ac breuior ipsa fibula est: longẽ tamen tenuior, quã  
breuior. Ideoq; Galenus crassitudinẽ a tibia multum superari; alibiq; .q. tenuẽ admodũ  
dum, & multo minũs, quam tibiæ os, esse ait. Quodã longitudinem verò, non sic lo-  
quutus est: sed q. d. ἰσημερίαν, q. d. q. non tangit ipsam genu, siue q. non peruenit ad genu; parũ  
est

Fig. 15.  
Fig. 17. a.  
Fig. 15.  
F.  
P. Tex. 8. com. 3.

esse excessum per huiusmodi loquedi formam, parteq; duntaxat superiore innuens. Eoq; magis, quoniam inferore in extremo fibule longitudo tibiam superat: Adeo vt cōpēnsata inferna longitudine cum superna breuitate in idem serē perueniant. Extrinsicus igitur tibie fibula appōita est [ Vtilitatem geminam quidem (eodem Galeno declarant) in animali prestatis primā, & necessariam: ex abundantia autem ( vt ita dicam) tertiam. Primā quidem certē vtilitas eiusmodi est dearticulationis ad astragalum: a qua extendi, & flecti pedem dicebamus: alteram enim partem dimidiam exteriorē hęc propemodū efficit totam: vt tibia internam. Alter autem vsus fibule hic quidem est, quod qua posita nō parte ab incedentibus foris legēnda erant, facīle omnia tibię vasa, & musculi hęc circumposita est fibula. Tertius vsus est in externo femoris capite, & quod tibia substat. Ad id loci enim affirmata, ad iocūtatē simul, & firmationē non parum conferit. (Quibus quartam vsū nos postea addeemus, scilicet vt multorū musculorū tam pedem ipsam, quam pedis digitos mouētium apōssima sede, vel etiā principitū sit, vt postea videbimus) Quod si quis putat, crus nihil indigere fibula, cū possit tibia, sicut supērnē ad genu sola ad femur dearticulatur, sic & infernē dearticulatur ad astragalum. Non intelligit se desiderare in ea id magnitudinis, vt nihil vincatur a femore. Hoc autē lapideō cuidam, & ligneo animali & accideere potest, & præterquam qđ nihil incommodabat, tutius poto subsistentiatū supēriora. Quęmadmodum si pedem quis, non eiusmodi nunc est, sed multo maiorē fecerit. At animali viuo, & vero per superiora moturo inferiora, omnino absurda esset huiusmodi constitutio. Fortiora enim esse oportet, & maiora motura rebus a se mouendis. Rectē igitur natura extrinsicus ad tibiam extendens fibulam, simul quidem munimentum quoddam hoc musculis, & vas fabricata est: simul autē media inter tibiam & fibulam regione multos musculos posuit: per quos moedus pes erit. Magnū autem os vni si fecisset hac solam, extrinsicūq; ei vasa, & musculos sine munimento circumpositis, malē habitum totam ita erasum, & graue secisset vulnus. Neq; enim hoc licet dicere, qđ supērnē quidem, & infernē ipsi apophyses producere prestauerat, quibus dearticularetur adiacentibus: ipsium autem os per totam tibiam tenuē facere. Facillimē enī in eis essēt patibiles eius apophyses, & maxime quę essēt ad astragalum plurimū excidentes a totius ossis rectitudine.] Paulōq; infra, [ Ita; iam manifestū est maiorē, quā nunc est, nō oportuisse esse tibiam. Et cū eius sit magnitudinis, fibulam ipsam haud mediocriter pēbere articulo astragali ratulam; ac veluti aduersus externas iniurias propugnaculum quoddam tibię adiacere. Cuius utinā capiti præter hæc omnia adfirmatū est. Manifestū igitur ex dictis est, qđ plurimū discretū cōstructio fibule a cōstructione radii, quodq; sapienter natura, vbi nihil plus accessurū erat, ambulationis organis, ex multitudine articulorum, vbi cōpositiones ossium immobilēs omnino fabricata est. Nam promptitudo, & diuersitas motū apprehensio organū, firmationis verō feceris ambulationis est vtilior. Propterea igitur cū radius supērnē, & infernē dearticuletur, etiā fibula in vtraq; parte dearticulatur tibie. Sicut enim si simplex esset totū crū nulla parte interceptū articulus, securitas ab eo totū animal vbi subliteretur: & tūc qđ plurimas dearticulationes nō dēspēdit ad perfectā securitatē propē peruenit. Si enim abiq; articulis fauisset omnino, neq; ossis posset, neq; flecti, & ita amiserit vsū omnē; cuius gratia factum est. In multas autem dearticulationes diuisum, lubricū, & fallax esset, adeo vt nunquā constanter vno crū stare possemus; quōd cōstitutū circūuertentur, atq; cadere mus. Quare & hic admirari oportet naturā: vt quę ex cōtractis, & vitiatibus se multo, & pugnātibz, necessarijs tamen ambobz curat; tantū ex vno qđ accepit; quantum neq; motus facultatem, neq; firmationis securitatē vixiatum erat.] Sed vt hæc omnia exquisitius perpendatur, ipsius fibule figura nō est incompleta (ita enim quantum vbi peraddit vsū peruenimus.) Haud igitur tunc exquirere triangularem est, sicut vbi; nisi parte duntaxat inferiore. Præter superiorem enim partem: quę secundū compressā quandā spheram orbicularis est: totum quod in medio est, ad quadrangulū pōtius vergere debet terminādum est. Quatuor enim eundē sensum in ipsa apparent, ac per hoc quatuor etiā angulū. Quatuor linearū nulla exquirita seruat rectitudinem. Prima igitur inferor est acuta, in interiorēq; protuberans, primum quidem angulum acutum quoq; constituens: quam in prima figura .s.s. præferet. Secunda verō linea interior est, partim acutum, partim verō obtusū angulum efficiens, gibbata: hæc est. Velut tertia, quę exterior est cōcaua non acutum, sed obtusū angulum constituens. Internam, quę tibiam respicit .f.f. Externam verō .a.a. in prima, & secunda figurā cōmostrant. Præter verō a secunda linea ligamentum cōmune fibule, ac tibię, & in secundam tibię lineam insertum præstatū. Sic igitur apud Vclaium tres hęc prædictę antumerant triangulam ipsam fibulam determinantem: (ideo; tria etiā latēs hęc prædictę antumerant) interius inter primam, & secundam lineam, quod quidē latūs vnū eum tibię ossis exteriorē laterē pedem mouentium sexto, .a. ac nono, .b. digitoꝝq; extendentium decimo quarto, .y. & decimo quinto .a. aptam sedē in præbeat. Cumq; in huius lateris medio linea quēdā protuberans adhuc sit, supra quidem acutiore, infra verō obtusiorē angulum efficiens: a quo non nihil principij pedis

ibidem. Fibule vsus quadruplex.

Cap. ante mē.  
Fibula ad radiū cōparatio.

Figura.

Linea prima.

Linea prima.  
a. l. tab. v  
a. tab. 4. r.  
y. ibidē v.  
f. tab. 5. p.



pedis digitos mouentiu quintodecimo .i. prebetur, hac negligentē, ac inter effatu dignas linesas  
 minime cōputantem. Nobis autem vsq; adeo insignem hanc lineam cōspiciētibus, angulumq;  
 ac diuersa linea efficientem, vt negligenda minime veniret, tanquā lineam quartam, quatuorq;  
 angulos, & latera cōputare magis ardeat. Ideoq; quadratū potius, quā triangulare huiusmodi  
 os determinare: at id parui momenti est. Secundum igitur latus externum quadantēnsis a sperum  
 inter primam, & tertiam lineam ab anatomicis ponitur pedem mouentiu musculorū septimo, .i.  
 & octauo. & locum aptē prebens. Ab externo enim appēdis eius offis latere circa genu principij  
 partem ducens, iu latus prædictū artēnsis, ei; cōnatus vterq; hūc musculus est. Tertium deniq;  
 latus est posterius inter secundam, & tertiam lineam circūscriptum, quod posteriores tibiq; mu-  
 sculi, præsertimq; pedis digitos mouentium secundus, .i. & tertius .i. occupant. Sed hæc quoad  
 fibulę figuram dicta intantum sint. Annotationem autem dignam præterea est, nullam huius offis  
 partem excarnem esse, præter externi lateris infirmam partem, supraq; inferiorem eiusdem offis  
 appendicem. Subdit autem in præsentī contextū Galenus fibiam tibiq; offis coarticulati, q. d. per  
 synarthrosim copulari, siue articulari, nec interim adeo sursum protendi, vt genu attingat, hoc  
 est, vt cū femore ipso articuletur: At superior quidē eius appēdis interno suo latere, retrorsum,  
 sinum quandam leuissimē celapum pupillaremq; obtinuit: in quē tibiq; appendicē cōdylus, siue  
 capitulū, posteriore in parte lateris externi existens, per arthrodia coarticulatur. Vsq; adeo qui-  
 dem interea firmus alterius, alterius vero capitulū obicurum, an cēpū; est, vt quodnam ingrediat  
 tur, recipiatur, & quod recipiat; distinctuere; difficultatū sit: Nisi in crustatissimis cuiuspi charti-  
 laginis leuissimę interuentu fibulę os a pertitis sinuetur, tibiq; verō appendix aliquantisper  
 protuberet. Econtrā verō parte inferiore se habent: Fibula enim à tibia recipitur abiq; chartilagine  
 in crustatione. Quinimmo cū aliquali vtriusq; a speritate. Ideoq; cum recipitur à tibia parte in-  
 feriore, ipsa fibula, illamq; hæc suspēns recipiat: Eapropter ac secundā ginglymi speciem, hæc  
 articulationem supra reduximus, .i. quoniam scilicet in diuersis partibus huiusmodi receptio fit  
 tibiq; à fibula, fibulq; à tibia. Quam præterea ossium amborū coarticulationē, velut in alijs om-  
 nibus articulis contingit, validum quoddā corroborat, sustinetq; orbicularē ligamentū, Verum  
 enimvero perpendicularē deinceps nonnulla, præter hæc, in alterutro offe veniunt. In tibiq; quidē  
 anteriore parte, iuxta genu, superiorēq; ipsius appendice foramina quadam prædicti ligamētū  
 oriundi gratia: Itemq; alphas: in quā septimū, .i. octauūq;, .i. & noni .i. tibiam mouentium  
 musculorum tendines implantantur: In fibula autem superiore appendicē, eimē anteriore quidem,  
 ex ternoq; ipsius latere, alpera quædā protuberantia: in quā præter trium musculorū tendines  
 transitu quodam pro parte insertos, quartū .i. quoq; tibiam mouentis tendo implætetur, pedūq;  
 motorum septimū .i. inde principij duxerit. Sed hæc quoad superiorem tibiq; cum fibula coar-  
 ticationem, amborūq; ossium supernas partes, dicta iam sint. Quoad infernam verō partem  
 annotandum est, inferiores tibiq; ac ipsius etiam fibulę appendices vsq; adeo vtrinq; extendi, vt  
 mediam in se ipsius attrahat, talis cum tibia dearticulationem cōprehendant, quam primę spe-  
 ciē, verēq; ginglymon esse, antea iam .i. declarauimus. A d. internum nanq; latus tibiq; appēdis  
 cis proceulus dorsum fertur, curuus quidem, leuiterq; chartilagine in crustatus extorsum quen-  
 dam efficies sinum, in quem talis recipitur, inter rorsum verō gibbus, siue cōuexus. De quo, ac  
 fibulę quoq; proceula, quatenus ambo malloscos efficiunt, ipsomet cū Galeno postērius tracta-  
 tum sumus. Nūc igitur reliqua Galeni verba expediāmus. Subdit enim itamq; in præsentī etiā  
 contextū, quod quoad mediā seu iuncturam tibiq;, & fibula abscedunt, dehiscunt. Atq; id ipsum  
 quidē, vt musculis eum locū vtrinq; occupaturis cōmoda sedes præbetur, vt tamen interea ro-  
 bur, firmitatemq;, & sustentatio nō delit, secundū longitudinē totū id spaciū, quo abinuenim  
 ossa hæc dehiscunt, aliud propriū ligamentū intercedit, nō secus ac inter cubiti, ac radij os inue-  
 nitur eundem hic & ibi vltim præstans. Quoniam verō superius tibia femoris dearticulati præ-  
 tæritum iam est: Eapropter quomodo huiusmodi dearticulatio fiat: an videlicet per ginglymon  
 ( prout nonnulli perperam dixerunt ) an per duas potius enarthroses ( vt antea nos diximus .y. )  
 vbetitis cum ipso etiam Galeno discutiamus: quōm sic videlicet subdit.

libidem.  
 Tab. 6. p.  
 libid. p.  
 Tab. 14.  
 A.  
 libid. p.  
 t. in peco.  
 com. 6.  
 Tab. 5. A.  
 Tab. 5.  
 Tab. 6. p.  
 Tab. 4. p.  
 Tab. 5.  
 charac. 5. i.  
 Tab. 10.  
 y. in peco.  
 u. libidem.  
 x. Tex. &  
 com. 4. hu-  
 ius  
 y. in peco.  
 com.

TEXTVS TERTIVS.

33  
 34  
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  
 40  
 41  
 42  
 43  
 44  
 45  
 46  
 47  
 48  
 49  
 50  
 51  
 52  
 53  
 54  
 55  
 56  
 57  
 58  
 59  
 60  
 61  
 62  
 63  
 64  
 65  
 66  
 67  
 68  
 69  
 70  
 71  
 72  
 73  
 74  
 75  
 76  
 77  
 78  
 79  
 80  
 81  
 82  
 83  
 84  
 85  
 86  
 87  
 88  
 89  
 90  
 91  
 92  
 93  
 94  
 95  
 96  
 97  
 98  
 99  
 100

**N**ON vna quidem, sed duabus, immò tribus partibus tibia femoris cōnectitur, duabus videlicet articulationibus, & in carti medio neurochartilagineo quodã ligamento; Idcirco non singulari numero, sed plurali vsus est, dicens κατὰ τὴν μέσην συνάρτησιν, hoc est, quibus scilicet partibus: siue secundũ quæ, scilicet secundũ quas partes femori cōnectitur. Magnam habens appendicem, crassam videlicet, ac latam, & a tenens magis descendentem, vt in prima figura .B. litera signatur. Sunt igitur duæ eiusdem appendicis cauitates oblongæ (quas in secũda figura .F. G. indicant) lubrica leuiq; chartilagine in crustatæ femoris condylos, capitula recipiẽtes, siue reũtius Galeni verbis vtentes dixerimus, in quas femur ipsum ingreditur. Quauis enim duæ enarthroses sint, interior scilicet, & exterior, dextraue, ac sinistra vnus tamen quodammodo rationem habent. Quodammodo inquam, propter vnicum manifestissimum motum scilicet flexus, & reflexus: non simpliciter tamen, & omniquaq; vnus, vt in propriissima ginglymo continget. Cum alter quidam obsecutus reuolutionis motus à lateralibus hinc & inde flexentibus mĩsculis, præsertimq; ab eo, qui sub poplite latitat, per eosdẽ articulos aliquatenus laxos expleatur. Quam ob causam cauitates hæc superficialis magis sunt, quàm vt femoris capitibus recipiẽtes apte respondeant. Ne tamen interea periclitetur, ac lubrica nimis talis articulatio sit, duabus sagacissima natura lunariibus chartilaginibus talium cauitatum profunditates adauxit: alteræ scilicet alteri cauitati apponens: quas in margine apposita figura præfereẽti. Quæ cum neq; femori, neq; ipsi etiam in tibie adnascantur, nisi ligamenti articulum amplectantur beneficio ipsi tibie aligerunt, motũ minime impediunt. Sunt igitur hæc chartilagines, parte quidem interioris cauitatis inferiore, atq; exterioris exteriore lateris .N. N. vtrobiq; denotata, crassiores, paulatimq; deinceps nõ modo versũ apices, at versũ ipsum quoq; centrum attenuando descendunt. Nisi enim sic facte fuissent, præsertimq; in lateribus cauitates minime auisissent. Sic igitur cauitates has molliore hæc, ligamentalisq; chartilagine adauxit cum Galeno femoris proportionatas esse dicemus, nõ vt in emundatis ossibus appareret. Quia scilicet sic ille ait. x. [ Atq; hæc ipsa quidẽ mirabiliter ab ea ordinata sunt, & ips ad hæc magis ipsi sunt dearticulatio. Sphyphes enim ossis ipsius femoris ( vocatur autem similiter, & ipsum γυγιον, latine femur, nomine totius ossi ) mirabiliter conuenientes habent in tibia cauitates: vt neq; laxus sit ingressus eorum productiõnũ, neq; motu difficilis propter loci angustiam. Circumposita quoq; ligamenta vnde quaq; tuto custodiant, cõtineantq; dearticulationem: Ad eò vt flexõnibus nobis aliquando, aut extendentibus, plurimũ femur à tibia minime excidat. ] Hæc reũtissime Galenus: quauis nonnulli reprehedere ausi sint. Sed nos ad prædictas chartilagines reuertimur. Anterior igitur exterior, atq; interior chartilago inuicem, litera scilicet .p. colligantur: Posterior autẽ scilicet litera .q. ob ligamẽti (quod ordine sextum antea declarauimus .a.) exortum abinuicem abscedunt. In harum igitur cauitatum, ac lunarium chartilaginum, quinimmo totius appendicis medio intersitio tibiæ quidam .x. velut appendicis processus enaicitur asper, inæqualisq; ac duplex prædictas cauitates, siue sinus abinuasẽt fecernens. Et quo quidẽ tuberc, præsertimq; ex media vtriusq; apicis eiusdem tubercis regione aspera, foraminulisq; nonnullis prædicta ligamentò illud validissimum exoritur, quod supra .b. ordine quartum posuimus. Idipsum ergo est, quod περιχρυσίου, ob sui robur, quantimq; Galenus appellauit. Quod non fecit ac antea fecimus, .x. neurochartilagineum nuncupauimus, q. d. nerui, hoc est, ligamenti, & chartilagine substantiæ participi. Vnde nentum, siue potius ligamentum chartilagineum, aut chartilagineum nerueam, siue ligamentalem dicere possemus. Rectius autem dicemus ligamẽtum chartilagineum: quod quidem in condyloꝝ femoris medium illum sinum (quem prius ordine tertio enarrauimus .d.) tanquam in profundam quãdam scissuram inseritur. Sed his omnibus exquisitẽ penpenis, ad anteriorem, inferiorẽq; tibiæ ossis partem cum Galeno reuertimur: quia sic videlicet subdit. (on . . .)

p. 3 de v. p. cap. 11 in p. 11  
 Cõn. v. p. salum.  
 a. Cap. p. d. n. i. v. r. f. i. s. i. d. e. π. 11. 1. 0.  
 2. f. i. g. p. r. f. e. i. s. i. c. a. p. i. s. i. x. p. 4. f. e. t.  
 b. Cap. p. d. n. i. v. r. f. i. s. i. d. e. c. Cap. 17. v. r. f. i. s. i. d. e. d. Cap. p. d. n. i. v. r. f. i. s. i. d. e. p. 11. m. d.

TEXTVS QVARTVS.

Ὅτι δὲ ἀρατὴ τε, καὶ λείπει ἐν τῇ ὀστέῳ τῆς κνήμης ἐστὶν, ἀρτικίνητος ἐπιπέδου. τὸ ἑκαστέρου αὐτῶν κρητὰ τὰ κρητὸν κρητὸν, καὶ ὑψηλὸν, ἕνωσιν τὰ ἐν κρητῶ ὀστέῳ ἐπιπέδου, καὶ πτωχὸν ἀσπίδου, καὶ τὸ ἕνωσιν ἐπιπέδου, καὶ ὑψηλὸν ἀσπίδου ἐν σπυλῶ, τὸ πτωχὸν ἀσπίδου. ἢ γὰρ ἀρτικίνητος ἔστι τὸ τῶν ἐκαστέρου κρητὰ λαμβάνουσι σπυλῶν ἐπιπέδου, ἔστι δὲ κρητὸν αὐτῶν κρητὰ δὲ ἐπὶ τῆς ὀστέῳ τῆς κνήμης τε, καὶ πτωχὸν ἀσπίδου, κρητὸν δὲ ἕνωσιν, ἔστι καὶ ὀστέῳ, καὶ δὲ ἕνωσιν.

Quantum verò ex carne, ac tenue in tibie anterioribus est, protibia nuppeupatur. Fines autem tibiæ, ac fibulæ vtrinq; inferni, quali colli vocantur. Hos ipsos gibbos rursus ibidem, & osseos excarnes,

excarnes, atq; alijs prominētiore plurimi talos appellant prostris aberrantes. Talus enim sub his  
 22 vtrinq; cōprehenditur vnde quaq; coniectus, vt ne tāgere ipsium quidem possis. Fines autem hi  
 23 tibię fibulęq; processū sunt, gibbi quidem foris (vt patet) intus autem caui.



**T**OTVM id, quod in anteriore tibię parte, ad latus quidem secundū ( vt antea diximus .r.) pertinens, excarne, ac per hoc (ob carnis scilicet defectū) tenuē, tam ipsius appendicis anterior pars, quā ipsius ossis tibię prædictum secundū latus, primaq; linea, siue primus angulus, quem tibię spinam vocant, præsertimq; parte superiore, à Græcis *σπίς*, latine ocrea, & *σπινθηριον* vocatur. Latine dicere possumus protuberans: quonia scilicet extrinsecus occurrentibus causis primum occurrens, tibię defensoriū est. Quomodo autem superior huius pars se habere, quisue illius vtus sit, præsentium iam est. *f.* Reliquum est igitur, vt ad inferiores tam tibię, quā in fibulę partes enarrandas cōuertamur. Inferius igitur tam tibię ossis, quā in fibulę ipsius appendices existunt, extra quidem gibbæ, protuberantięq;, intus aurem quadantenus sinuę, seu eaurę astragalum, latine talum nuncupatum, simul ambæ cōprehendentes, quamquam diuerso articulationis modo, tibia siquidem per proprijsimam dictam ginglymon ( prout antea iam enucleauimus .g.) fibula verò per arthrodiam (vt hæc etiam enarrauimus .h.) ambas quidem tanquā diarthroses species: quoniam propter motum manifestum. Per ginglymon inquam tibia cum talo dearticulatur: Ideoq; sinus appendicis eius talum recipiens duplex est, in medio quidem protuberans: vt scilicet in geminos illos sinus talum recipiat: per eam verò protuberantiē ab ipso talo recipiatur. Quamuis autem Galenus dicat, fines hos (quos verè malleolos, Græcè *σφαίρα*, nuncupamus) tibię ossis, fibulęq; fines esse: Addere nihilominus oportet, processum hos immediatè non fibulę, aut tibię esse: sed appendicum horum ossium. Sunt igitur qui deorsum protendantur talum cōprehensuri, eumq; eo dearticulandi, parte quidem interna tibię, externa verò fibulę appendicē processus. Qui quidem è regione sinuati, partibus scilicet quibus talo dearticulatur læsi chartilagine in crustati sunt. Interna diximus parte tibię: externa verò fibulam, ad corporis situm referentes. Tametsi Galenus in præsentis cōtextu *τῆσδ*, quod est, foris: & *ἔσω*, quod est, intus (quum scilicet foris gibbos, intus verò cauos, tam tibię, quā fibulę processus ait) ad ipsam ponens dearticulationē respexit: vt scilicet quod ad ipsam, ipsiusq; colligationē spectat, intus, quod verò extrā dearticulationē, siue à tergo eius dicere maius consistit, foris nuncupari. Vnde vtriusq; extremū, quod tangi à nobis potest, præsertimq; nudum, & excarne, malleoli nomine insignitum extrinsecū dixit. Priore autem ratione intus & extra considerantes, tibię processum, malleolū intrinsecū dicemus, fibulę autem, malleolū extrinsecū. Sed circa hos quidem appendicē inferiorū processus pernotanda quedam sunt. Primumq; circa ipsius tibię infernam appendicem: quoniam scilicet tres in ea sinus effatū dignos obseruamus: Primum quidē versus posteriora, in in sinu videlicet eius sede quadantenus alperū. È quo chartilagineū quoddam ligamentū egreditur ipsam talo ibidem firmissimè colligans. Hunc .r. in prima figura præsert. Secundus verò euidem appendicis sinus est anterus trāuersum oblongus, asperior, inæqualiorq; prædicto, supra mediam appendicis protuberantā .l. in prima figura indicatus. Vnde ligamentū aliud simile prodit, eandem quoq; tibię appendicē tali ceruici connectens. Tertiusq; demum perpendicularis sinus est, parte iterum posteriore ipsius processus in malleolum producentis, oblongus, atq; superne deorsum cę latus: vt per eum trium musculorū tendones à transuersis ligamentis obduētū tūto pertransiant: videlicet tendones muscularū pedem mouentium quinti, .f. & digitorū secundi, .r. & tertij: .r. quem sinum .m. in secunda figura præsert. Quod fibulę verò infernam quoq; appendicem annotandū est, hæc cum extremū malleolum constituit, tū longiorem, tū crassiorē esse in reno tibię malleolo, idē, eodēdenti ratione: vt scilicet validius extēris dearticulatio firmetur: vbi maius de luxatione periculum instare poterat. Eiusdem præterea appendicis malleolum externum cōstruens internā sedi, qua talo dearticulatur, sinus quidam iubeat, maximè conspicuus, ac .r. in secunda figura denotatus, ex quo chartilagineum quoq; aliud ligamentū pronascitur, fibulam ipsam talo validissimè connectens. Posterius autē litera .q. secundę figurę sinus alter amplior est, sed vix in emundatis ossibus conspicuus, nisi chartilagine quadam adactus, transuersoq; ligamento quodam obduētū, vt tendones muscularū pedem mouētium sexti, .r. & septimi .r. deducens, eos firmat. Ne fortassis à sua sede inter mouendū aliquādo declinent. Dicit autem Galenus hic nō nullos tempore suo fuisse, qui quidem prædictos appendicum tibię, ac fibulę processus ( malleolos Græcè *σφαίρα*, vt diximus, proprie nuncupandos inconfultē, ac falsō talos latine, Græcè autem *σφαίρα* nuncupabant: Minimè interim aduerentes, talos vndiq; contegi, vt minimè ipsos tangere, quod aliter, queamus, nec duos esse, nisi vnum in pede quolibet. Quem licet in emundatis sceleris pol-

c Com. 1.  
huius ve-  
sus finem.

f Com. 2.  
versus finē.

g. In procē-  
com. 17.  
h. ibidem  
com. 14.

Tibię ossis  
inf. 20. si-  
nus primus.

Et tab. 15.  
fig. D. E.  
in alia ve-  
rō c.

Et tab. 15.  
fig. D. E.  
in alia ve-  
rō c.  
Et tab. 14.  
r. tab. 14.  
r. & 15.  
fig. 15. p.  
Fibulę infe-  
rior appen-  
dicis.  
Sinus pri-  
mus.  
Et tab. 1. 2  
Et tab. 6. a.

friori in parte, qua eū calce, atq; anteriore, qua cū scaphoide osse dearticulatur, cōspicere nobis liceat: In viuente nihilominus, vel etiā emortuo, non tamen à chartilagineis nonnullis ligamentis emundato, vsq; adeo cōtegitur: vt neutiquā videre, vel tangere fas sit. Nunc pnciporum errorem annotasse oportet, tantò magis, quoniā nostro etiā æuo nō pauci è nostris Græcorū interpretibus eosdem ossiū fines talos nuncupent: talum pro *στυλῆ* traducentes. Vbi scilicet venam incidendam in vteri affectibus fore aiunt in interno talo; vcluti pro cocendice in externo talo. Cū tamen interno, vel externo in malleolo dicere debuissent. Sed hæc ad grammaticos. Cū verò cuncta iam prælibata sint, quæ in alijs omnibus obseruauimus. Idcirco tempestiuum est, ad molam cum ipso etiam Galeno conuerti, sic videlicet subdente.

*Ἐπι στυλοειδῶς, Καρπῶος, κλ.*

*De Patella. Caput Vigefimumsecundum.*

TEXTVS PRIMVS.

*Ἐστὶ τῆς τῆ μηρῶ, καὶ κνήμης συνάρτητος, ἕξωθεν ὄντος χροῦ πάσης ἐπιπέδου, σφαιροειδῆς τῆ ὀστέου, τὴ κνήμῃ δὲ καὶ τῷ ἄνω ἀνωτέρω τῷ ἰσχυρισμῷ ὡς τὸ περιλαμβανόμενον ἀπὸ τῆς ἀνωτέρω καὶ τῆς ἑξωθεν τῆς παλάμης καὶ κνήμης ἐπιπέδου καὶ ἀπὸ τῆς ἑξωθεν τῆς ἑξωθεν τῆς παλάμης καὶ κνήμης ἐπιπέδου.*

In femoris tibiq; dearticulatione, extrinsecus, os chartilagineum, figurq; rotundū incubat, gibbas quidem, & veluti condifosas subiectorum ossium partes aptis cavitatibus cōprehendens; medium verò femoris, ac tibie latum spatium breui quadam eminentia cōplectens. Nominant autem idipsum os, nonnulli quidem supergenicularem, nonnulli verò molam.

COMMENTVM PRIMVM.



MOLIS nominibus deoatū id os est. A' molaris enim lapidis rotunditate *μῶλα* Græcè dicitur, latine autem mola. Cuius etiam rotunditatis ratione, rotula, quali parua rota nuncupari à nostris consuevit. Alia autem similitudinis ratione, quam ad scutū habet, nonnulli è nostris scutale os, siue scutiforme nuncuparunt. Quæ admodum vel qua patellæ ostracolo pisici etiam simile est, patella vocari solet: vel fortassis quia tanquā femoris, ac tibie dearticulationi superpositum id os omnibus pateat: sicq; à patendo, patella nomenclatur. Galenus autem hic à sede, cui innititur, quæ *γῆν* Græcè, latine verò genu dicitur, *ἐπιγενυῖδος*, q. d. supergeniculare, in titulo appellauit; quauis postea molam quoq; ab alijs quibusdam nominari subiunxerit. Vt quo; autem nomine vsus est libro de vln partū tertio. Cuius verba postè enarrabimus. Quouis autem modo id appelleretur, substantiam eius, atq; vni figuram Galenus impresentiarū tetigit, dicens chartilagineosum esse, quodā substantiā, ac rotundum quodā figuram. Verum circa cuiusdem verba nonnihil annotandū est. Quodam namq; aduerbium [*ἕξωθεν*] cum adiectiue [*χροῦ πάσης*] coniungentes, intelligentē; interm à Galeno dies os id exterius, id est parte extrinsecā chartilagineum esse, Galenum inde reprehendunt, falsā docente, os id exterius chartilagineum esse. Quauis enim in pueritia (velut alia quoq; multa ossa) chartilagineū id sit (prout antea iam declarauimus. k.) Procedente nihilominus, perfectūq; iam ætate, durū exquisitè est, solidūq; , ac parte præsertim anteriore, siue dixisse malumus extrinsecā. Nos autem Galeni manes, vbicunq; licuerit, excusare obnoxii, aliter textū hunc exponimus: vt scilicet dictio [*ἕξωθεν*] quod est [extrinsecus] non cum [*χροῦ πάσης*] id est [chartilagineum] coniungatur: sed cum verbo [*ἐπιγενυῖδος*] latine, incubat, siue apponitur. Quocirca non quòd extrinsecus chartilagineū id os sit, intellexerimus: sed quòd extrinsecus apponitur, siue incubat. Quod præterea chartilagineum vocare Græci idcirco soliti sunt, quoniam prius exquisita chartilago, in prima scilicet ætate, sit: deā chartilago ossea, deinceps verò chartilagineū os fiat. Quòd si tandem purum os euadat: nunquā tamen deest, quin chartilagine vndiq; in crustū appareat: parte inquam interna, seu dicere malumus posteriore, qua cum femore, & tibia cōnectitur, vera chartilagine: parte autem sui externa, siue anteriore, cū tres duri, quasiq; chartilaginei tendones, scilicet musculorū fibræ extendentiam sepeunt, .o. octauūq;, .v. & noni, .s. cum ipso coalescant. Quod maxime apparet, vbi per elinationem illi collaqueant: chartilagineum namq; eliquatum quodam substantiā præferunt. Quocirca veteribus anatomicis chartilagineū os idipsum absolute nuncupasse libuit. Quòd si circa hanc expositionem ambigas, quoniam scilicet nō exterius, sed anterius os id in genu articulo appositū est: Idcirco Galenus nō rectè locutus esset. Respondēbimus cuestigiō dicentes, diuersis rationibus idem anterius dici posse, atq; exterius. Respon-

j. Cap. 11. post princ.

k. In proe. cō. 1. in declaratione s. cōclusionis.

v. tab. 5. A. v. tab. 5. B. 6. II. p. tab. 4. p. & tab. 5. declarat. 5. Obiectio. Responso.

quidem

quide in ad posterius cōparando, dextrumq; & sinistrum: tuncq; horum alterum internum dicitur: alterum verò externum: puta si dextrum internū est, sinistrū remanet externū, & e contra. Idem verò, quodcunq; sit, anterius iam iam prædictū, alia ratione, ad ea scilicet quæ in profundo sunt, comparatum, exterius dici potest. Quemadmodū v.g. de huius articuli ligamentis profertur licet: Nonnulla scilicet externa esse: vt præsertim quæ articulum ipsū in orbem circumuehant: alia verò interna: vt quod à tibie ossis medio tubere prodens, in modum condyloꝝ femoris sinū inferitur. Cū igitur molā hæc nō intus in profundo, sed exterius appōita ipsi dearticulationi sit: Eapropter non temere Galenus hic dualitē potuit exterius appōni, siue incubare (Nūc velimus fortasse deprauatā proferre literam, & loco dictionis [ *ἐξωθεν* ] quod est [ exterius ] legendum fore [ *ἐπιπλέον* ] quod est [ anterius ] vt rursus; enim diuersis rationibus verum esse decernimus.) Sic igitur libro de vsu partium tertio .i. de hac etiā molā loquens Galenus, quāuis anteriorem occupare partem ( vt paulō post eius verba referemus ) dixerit: Nō nunquam tapen  
 10 exteriore partes modo prædicto considerauit: vt quū ait [ Extrinsicū autem contineri supercilij, &c. ] Omnem partem profundo oppositam extrinsecā appellans. Paulōq; infra [ Admirabitur nihilominus externam tutelam pro robors actionis portione ] Rursusq; paulō post [ Hoc  
 15 quidem externas partes ossium colligans, illud autem internas ] Sed hæc pro Galeni defensione dicta intantum sint. Cur autem postiope non exterius modō, sed speciatim anterius huiusmodi os locetur, posteriori fermone cū Galeno declarabimus. Vbi molē huius vsū enucleauerimus. Nunc igitur ad figurā reuertamur. Inquit enim Galenus rotundū esse id os. Quod tamen exquisitē rotundum nō est: longius enim quam latum est: ad eū vt scutum perbellis præferat, partēq; præsertim sui anteriore, vnde os scutale, seu scutiforme nō temere à nonnullis nuncupatum est. Quinimodō si exactius perpendris, ad minus sex quidem lineas in eo obseruabis: vnde sex laterum Græcè *ἑξάγωνον*, seu *ἑξάγων*, hoc est, sexangulum dicere possemus. Quorum laterum duo prima superiora ab eius medio tubere, parte quidem superiore anterius procedentia: velut, & alia duo infima in infernum eiusdem ossis processum terminata, obliqua sunt: prædictorū verò intermedia, recta magis existunt. Præterea huius ossis anterior pars conuexa quodammodo est, cui prædicti trium musculorū tendones in transitu coalescunt. Posterior autem sedes, quæ femoris, tibieq; dearticulationē respicit, duplici sinu, seu cavitatē femoris condylis, capi ab usque proportionalitē prædita est: vt in quas ea inseri debuerant, nō propter motum, sed propter quietem, stabilitatemq; in ipso etiā motu: prout de semimoidibus ossibus contingit: velut antea quoq; iam tetigimus. *us.* rursusq; de eorūdem vsū repetemus. *us.* Ne autem dum tibie, ac femoris dearticulationem sustinet os id, illam in suis motibus præpediat, huiusmodi quidem cavitates lubrica, læuiq; chartilagine inconstatæ à natura factæ sunt femoris capitibus (vti dictum est) etiā proportionales. Quocirca cum exterior femoris ossis condylus maior sit, patellæ quoq; illi respondens exterior cavitatis maior est. In quarum tamen cavitatū medio (secundū longitudinem superne dorsū) amplius quoddam, sed mediocriter protuberans tubus est, quod cōdyloꝝ in intermedio femoris ossis sinu anterius occurrit. Velut autem posterioris id os chartilagine incuruitatū, læui est, quæ scilicet femoris condylos spectat. Ita quidem anterius asperum quad anterius est, & cæcis multis foraminulis obstitum: similiterq; ex posteriori parte quantum quodam processu dorsū in ducto elatiorem tibie ossis sedem respicit: vt scilicet tres prædicti tendones aptius, ac firmitus ipsi innascantur. His enim solis, non alio quidem ligamēto tenori, vel tibie os id alligatur. Cuius quidem vsus, post nominum, ac substantiæ quādam determinationē, sic alibi subdit,  
 20 dicens .o. [ Mola verò à quibusdam, ab alijs verò supergenualis vocata, os chartilaginōsum anteriore partes dearticulationis omnes continet: prohibens quidem & ipsum femur elabi ad partes  
 25 anteriore, in illis maxime figuris, quæ vocantur Græcè *γόνυ*, id est genu flexo, & *ὀρθόν*, id est genuculatum, & curuē. Iam verò eiq; nec adamas, & maxime in decliuis locis, quū in anteriora totum corpus nostrum nutat, nō medicam præbet cōinoditatem. Id autem planē experti sumus  
 30 in quodam adolescente eorum, qui in palestra versantur. Cui luctanti euulsa à ligamentis mola à genu quidem secessit, abiit autem fursū ad femur: inerantq; ambo huic periculosa: curuato in genu, & ambulatione in decliuis: ob idq; sustentaculo, ac firmamento opus erat huiusmodi loca  
 35 permeantia. Poro si omnes in genu cavitates, aut emanētias ossū dixerō: & ostendero neq; eminentiam vllā in eadem idonea cavitare, neq; vllam cavitatē occupante ipsū eminentia: Sed omnes ad vnguem cōuenientes quidem inter se, extrinsecus autem contineri supercilij quibusdā  
 40 ipsōrum ossium, & ligamentis alijs quidem latis, alijs verò teretibus: longior quidem sic, quā in propofueram oratio fuerit, nihilo autem apertior. Sufficit enim quæ prius est habita cōmuniter, ac ita vniuersum de cōstructione omnium articularū. Si quis verò vt fabulam qualem cum legitur  
 45 orationem, nihil amplius iuuabitur, ne ab ijs quidem, quæ iam dicta sunt. Quod si examinare ad vnguem singula, & perpendere ea, quæ in anatomis apparent, voluerit: admiraturum puto eum naturam non in genu solū, sed etiā in singulis alijs articulis adamussim omnes tū eminentiarum,

I Cap. 11.

Figura.

m in proce.  
 com. 11.  
 n. De mola  
 hic, de se-  
 fan. c. 14.

o. 3. de v. p.  
 cap. 11. post  
 princ.  
 Vñ ubi  
 plex.

tiarum, tūm cauitatum eas fufcipientiu magnitudines, & figuras fibi inuicem aduenientes effe-  
 ciffe. Admirabitur autē nihilominus externam tutelam pro robors aetione portionem aduētane  
 p. 3. de v. p. 11  
 cap. 7. 8. 11  
 & 10.  
 q. f. ibidem  
 cap. 10. 11  
 Vt vnti? 11  
 Sinistratio 11  
 eir. iohet  
 in anatio-  
 tibus. 11  
 e. Quod fir-  
 pra con. 2.  
 cap. i. vige-  
 simi fecun-  
 dam erat. 11  
 f. Qui tibi  
 mouēdum  
 sepunt dñ.  
 1. Quod uen-  
 tiam erat  
 ibidem. 11  
 tiarum, tūm cauitatum eas fufcipientiu magnitudines, & figuras fibi inuicem aduenientes effe-  
 ciffe. Admirabitur autē nihilominus externam tutelam pro robors aetione portionem aduētane  
 p. 3. de v. p. 11  
 cap. 7. 8. 11  
 & 10.  
 q. f. ibidem  
 cap. 10. 11  
 Vt vnti? 11  
 Sinistratio 11  
 eir. iohet  
 in anatio-  
 tibus. 11  
 e. Quod fir-  
 pra con. 2.  
 cap. i. vige-  
 simi fecun-  
 dam erat. 11  
 f. Qui tibi  
 mouēdum  
 sepunt dñ.  
 1. Quod uen-  
 tiam erat  
 ibidem. 11  
 tiarum, tūm cauitatum eas fufcipientiu magnitudines, & figuras fibi inuicem aduenientes effe-  
 ciffe. Admirabitur autē nihilominus externam tutelam pro robors aetione portionem aduētane  
 p. 3. de v. p. 11  
 cap. 7. 8. 11  
 & 10.  
 q. f. ibidem  
 cap. 10. 11  
 Vt vnti? 11  
 Sinistratio 11  
 eir. iohet  
 in anatio-  
 tibus. 11  
 e. Quod fir-  
 pra con. 2.  
 cap. i. vige-  
 simi fecun-  
 dam erat. 11  
 f. Qui tibi  
 mouēdum  
 sepunt dñ.  
 1. Quod uen-  
 tiam erat  
 ibidem. 11  
 tiarum, tūm cauitatum eas fufcipientiu magnitudines, & figuras fibi inuicem aduenientes effe-  
 ciffe. Admirabitur autē nihilominus externam tutelam pro robors aetione portionem aduētane  
 p. 3. de v. p. 11  
 cap. 7. 8. 11  
 & 10.  
 q. f. ibidem  
 cap. 10. 11  
 Vt vnti? 11  
 Sinistratio 11  
 eir. iohet  
 in anatio-  
 tibus. 11  
 e. Quod fir-  
 pra con. 2.  
 cap. i. vige-  
 simi fecun-  
 dam erat. 11  
 f. Qui tibi  
 mouēdum  
 sepunt dñ.  
 1. Quod uen-  
 tiam erat  
 ibidem. 11

Καὶ τὴν ἐξ αὐτῆς αἰὶα εἶναι. Κεφάλαιον. κγ'.

De Pedis ossibus. Caput Vigesimo tertium.

TEXTVS PRIMVS.

Τὴν ἑ τριῶν τριῶν εἰμαζαν ἀπορροῖαν, ἐπὶ τῆς αὐτῆς ἰσχυρῆς κήματι τῆ, καὶ πύριον, ὁ ἀσφῆλαιον πὶ.  
 μεταβάλλεται, τὴ πύριον ἀπὸ καλήμενον ἀπορροῖαν εἶχε. Ἐ δὲ ἔλλον ἀπὸ μέρους, τὸ μὲ ἰσχυρῆς ἄλλο πάντα,  
 καὶ ματρίων ἐπὶ πύριον, ἵκοντα μελλῆσθαι ἐξ. Τὰ δὲ ἀφῶς κεντρὰ ἰσχυρῆσθαι ἐπὶ ἀντὶς ἀρροῖαν ἀρροῖαν  
 διακρίβεται ἄλλο τὸ εἶναι τὸ καλήμενον ἀπορροῖαν. κατὰ τὴν δὲ, ἔκ τ' εἰδῶς, καὶ τ' ἀρροῖαν, ἐπὶ ἀρροῖαν ἐξ.  
 καὶ πύριον, τὰς ἀρροῖαν ἀπὸ κήματι, καὶ πύριον καλήμενον πύριον ἀρροῖαν, τὸ δὲ ἰσχυρῆς ἄλλο μέρους  
 εἶναι εἶχε.

Sub paulo ante dictis processibus in finarū tibiæ, ac fibulæ extremitatū, talus cōprehenditur:  
 ipsius quatrionem nuncupatū fursum vergētem habens. Ex reliquis autem eius partibus, poste-  
 riores quidem in lūigatae omnes, modicæ; orbiculatæ sunt, fursum magis vergentes: Anteriorēs  
 verò, rotundo capite oblonge ceruici adnato, ad os nauiculare appellatū dearticulantur. vtrinq;  
 autem ex dextris, & sinistris in superciliosas eminentias dēscens, cauitatibus sub tibiā, & fibulā  
 genitis comprehenditur: hanc, tanquam lēuem fuisipius partem, intus habens.

COMMENTVM PRIMVM.

**C**VM de pedis ossibus locuturum se proposuerit: ab astragalo principium sumpſisse  
 necessarium fuit: quod immediatē post tibiam, fibulamq; sequitur, quibus dearticu-  
 latus est. Os igitur, quod Græci ἀσφῆλαιον, siue ἀσφῆν vocant: nos latine talū dicimus.  
 Cuius situm, partiumq; figuras, & dearticulationem Galenus hic enarrat. Est igitur  
 huius tali ritus sub antedictis infimarū partiū, tibiæ, in tūs, externis verò fibulæ processibus. Partiu  
 verò figura est diuersa. Potior enim pars eius fursum vergens est, quam Græci πύριον appellant,  
 latine quatrionem dicimus, à quatuor scilicet lateribus ita nuncupantes: quibus quidem rotulæ  
 quartam quasi partem, pauloue plus, præferret, suo cum sinu, in quem (velut illa sinem in se re-  
 cipit, qui per eam reflectitur) Ita id os mediū tibiæ finis tuberculū fuscipit: quod per eius sinum,  
 quemadmodū, & prædictū os quoq; per duplicem tibiæ sinum extremis suis tuberibus ginglymo  
 reuoluuntur. Sed ne absurdum quidem est id ipsum os inuerſe etiam balistarū nuci comparare:  
 vnde nonnulli nuciforme os appellant. Sunt autem prædicta quatuor eiusdem latera, primum  
 quidem

Sius.  
 Figura.  
 vtrique.  
  
 Locus pri-  
 mum, & se-  
 cundum.

quidem & secundum, per quæ præcipua pedis reuolutio fit, anterioris, & posterioris. Anterioris quidem ad ceruicem positâ declarandam, quæ ad nauicularæ os tendit: posterioris verò ad calcem: videlicet fecundû anteriorem, ac posteriorem terminum. In quos, dum pes flectitur, & extenditur, abscis; villo in latera motu aptissimè reuoluitur, ginglymoq; cum tibiq; extremo secundu median horum regionem dearticulatur. Tertium verò, & quartum latus, dextrum, & sinistrum sunt, siue intrinsecum, & extrinsecum: Intrinsecum quidem, quo cum tibia, extrinsecum verò, quo cum fibula connectitur. Quæ omnia latera leuissima quidem, lubricaq; cartilagine incrustata sunt. Quod autem huic terrore, siue quatuorini subest, id totu est: quod posteriore enarthrosi tota, anterioris verò enarthrosi tantillo, cum calce coarticulatur. Hæc autem subiecta pars quatuorini respectu nõ sursum, sed dorsum vergere suis processibus dicenda est: Galenus tamen ad aliam potius eiusdem cum calce coarticulationem cõparans: quæ anterioris ad eius capitulum fit, posterioris partem rursùm vergere inquit: quatenus scilicet eleuator illa pars est, capitulò verò inferioris positò, deorsumq; vergentibus, stante homine, existit. Anteriores autem (vt rectè subdit) rotundum capite prominenti ceruici adnato ad os nauicularæ appellatum dearticulatur, iuxta Galeni dogmata, qui ad latera circumferri pedem, dearticulationis eius esse opus ait, n. quæ est ad

Tertiũ, & quartum.

tu. 3. de v. p. cap. 8. circa mod. Cõra Galenium.



os nauiforme: Dearticulati igitur inquit, dearticulationemq; aliis appellauit hæc tali cum nauiformi cõiunctionem: Cum tamen occultum hæbeat motum, quantum ex se est, nisi aliq; cum ipso coarticulationes cõiungantur. Quamuis enim ad latera pedis motus (ad quem articulus hic siamopere confert) manifestus sit: occultus tamen ab eo solo fit. Cum non parum ad eundem motu faciat articulus, quo cum calce posterioris: similiterq; alius, quo scaphoides cum tribus tarsii ossibus, atq; etiã alius, quo calcaneus idem cum ossis cyboide punctuato coarticulatur. Ex multis igitur occultis motibus manifestus vnus resultat, quænammodò in spinæ vertebris contingit. Compertissimè verò est quod demũ subdit; vt ninq; scilicet ex dextris, & sinistris, in supercilioas eminētias delineans, cavitatibus, sub tibia præsertim, & quodammodo sub fibula genitus, cõprehendi, siusq; ipsius partem tanquã profecto leuem intus habere (tanquam leuem diximus. Est enim dictio [sic] interdu explicanda, declarandã aduerbium: vt eam scilicet partem totam exprimat, quæ leuis est. Forteq; deprauatus textus est, legendumq; prout nobis magis ardet, vt *scilicet* *interdu*, quod est totam iuspius leuem partem, &c.) Quamuis autem leue quod intus articulũ est, tam superius, quã posterioris, & à lateribus sit: Nihilominus tamen læui, lubricaq; cartilagine totum id incrustatũ est, magis quidem exterius, quã intus: quoniam exterius fibula longius inferiori in parte, quam tibia exterius extenditur. Habes autem id tali os in prima, & secunda figura litera T. denotatum: particulatim verò singulas partes, habito præsertim ossis, contemplari facillimè poteris. Verum enimvero nonnulla hæc annotanda superiunt. Primũ quidem, quoniam interna ipsius parte, sub læui, cartilagineq; incrustata sede, sinus quidam asper inest: in quem cartilagineum illud ligamentum quod à tibiq; sinu à nobis antea x. declarato, & tanquã primo inferioris appendicis tibiq; sinu expolito descendere diximus, inferitur. Quænammodũ in externo etiam tali latere, sub amplore eius partis leuitate, sinus alter est præteritũ oblongus, in quem à primo fibule sinu pegasensio y. ligamentum alterum exiens implantatur. Tertium verò sinum in posteriore tali sede perpendimus: per quem quidẽ tres transeunt musculorũ tendones: videlicet pedem mouentium quinti, x. ac digitos mouentium secundi, y. & tertii. z. Quomodo autẽ talis cũ calce articuletur, postea dicemus. z. Nunc autem cum ipso etiam Galeni eisdem tali ossis cũ nauiculari clarã in articulationem cõtemplemur, omnes interim omittentes asperitates, foraminulaq; nõ ob aliud facta, nisi propter ligamentorũ insertionem, siue exortum, ac aliquorũ valorum nutritionis gratia penetrationem. Est autem ossis huius substantia exterius apparens solida, verò autẽ intus spongiosa, multaq; foraminibus peruis. Multa verò hic ex Galeni dogmate annotanda forent: quæ vt exquisitius intelligantur, vnã cũ alijs pedis ossibus in capite huius sine enucleabuntur. Ad calcem igitur os cum eodem conuertamus, quomũ sic ait.

Cap. 8. circa mod. Cõra Galenium.

Galeni locus.

Sinus præteritũ. x. Cap. 8. circa mod. y. Ibidem versus finem. x. Tab. 1. 5. fig. 1. 5. D. E. Tab. 1. 4. A. Tab. 1. 4. dem. z. Cam. sup. Foraminula. Substantia.

TEXTVS SECVNDVS.

Anterioris & posterioris reuolutio fit, anterioris, & posterioris. Anterioris quidem ad ceruicem positâ declarandam, quæ ad nauicularæ os tendit: posterioris verò ad calcem: videlicet fecundû anteriorem, ac posteriorem terminum. In quos, dum pes flectitur, & extenditur, abscis; villo in latera motu aptissimè reuoluitur, ginglymoq; cum tibiq; extremo secundu median horum regionem dearticulatur. Tertium verò, & quartum latus, dextrum, & sinistrum sunt, siue intrinsecum, & extrinsecum: Intrinsecum quidem, quo cum tibia, extrinsecum verò, quo cum fibula connectitur. Quæ omnia latera leuissima quidem, lubricaq; cartilagine incrustata sunt. Quod autem huic terrore, siue quatuorini subest, id totu est: quod posteriore enarthrosi tota, anterioris verò enarthrosi tantillo, cum calce coarticulatur. Hæc autem subiecta pars quatuorini respectu nõ sursum, sed dorsum vergere suis processibus dicenda est: Galenus tamen ad aliam potius eiusdem cum calce coarticulationem cõparans: quæ anterioris ad eius capitulum fit, posterioris partem rursùm vergere inquit: quatenus scilicet eleuator illa pars est, capitulò verò inferioris positò, deorsumq; vergentibus, stante homine, existit. Anteriores autem (vt rectè subdit) rotundum capite prominenti ceruici adnato ad os nauicularæ appellatum dearticulatur, iuxta Galeni dogmata, qui ad latera circumferri pedem, dearticulationis eius esse opus ait, n. quæ est ad os nauiforme: Dearticulati igitur inquit, dearticulationemq; aliis appellauit hæc tali cum nauiformi cõiunctionem: Cum tamen occultum hæbeat motum, quantum ex se est, nisi aliq; cum ipso coarticulationes cõiungantur. Quamuis enim ad latera pedis motus (ad quem articulus hic siamopere confert) manifestus sit: occultus tamen ab eo solo fit. Cum non parum ad eundem motu faciat articulus, quo cum calce posterioris: similiterq; alius, quo scaphoides cum tribus tarsii ossibus, atq; etiã alius, quo calcaneus idem cum ossis cyboide punctuato coarticulatur. Ex multis igitur occultis motibus manifestus vnus resultat, quænammodò in spinæ vertebris contingit. Compertissimè verò est quod demũ subdit; vt ninq; scilicet ex dextris, & sinistris, in supercilioas eminētias delineans, cavitatibus, sub tibia præsertim, & quodammodo sub fibula genitus, cõprehendi, siusq; ipsius partem tanquã profecto leuem intus habere (tanquam leuem diximus. Est enim dictio [sic] interdu explicanda, declarandã aduerbium: vt eam scilicet partem totam exprimat, quæ leuis est. Forteq; deprauatus textus est, legendumq; prout nobis magis ardet, vt *scilicet* *interdu*, quod est totam iuspius leuem partem, &c.) Quamuis autem leue quod intus articulũ est, tam superius, quã posterioris, & à lateribus sit: Nihilominus tamen læui, lubricaq; cartilagine totum id incrustatũ est, magis quidem exterius, quã intus: quoniam exterius fibula longius inferiori in parte, quam tibia exterius extenditur. Habes autem id tali os in prima, & secunda figura litera T. denotatum: particulatim verò singulas partes, habito præsertim ossis, contemplari facillimè poteris. Verum enimvero nonnulla hæc annotanda superiunt. Primũ quidem, quoniam interna ipsius parte, sub læui, cartilagineq; incrustata sede, sinus quidam asper inest: in quem cartilagineum illud ligamentum quod à tibiq; sinu à nobis antea x. declarato, & tanquã primo inferioris appendicis tibiq; sinu expolito descendere diximus, inferitur. Quænammodũ in externo etiam tali latere, sub amplore eius partis leuitate, sinus alter est præteritũ oblongus, in quem à primo fibule sinu pegasensio y. ligamentum alterum exiens implantatur. Tertium verò sinum in posteriore tali sede perpendimus: per quem quidẽ tres transeunt musculorũ tendones: videlicet pedem mouentium quinti, x. ac digitos mouentium secundi, y. & tertii. z. Quomodo autẽ talis cũ calce articuletur, postea dicemus. z. Nunc autem cum ipso etiam Galeni eisdem tali ossis cũ nauiculari clarã in articulationem cõtemplemur, omnes interim omittentes asperitates, foraminulaq; nõ ob aliud facta, nisi propter ligamentorũ insertionem, siue exortum, ac aliquorũ valorum nutritionis gratia penetrationem. Est autem ossis huius substantia exterius apparens solida, verò autẽ intus spongiosa, multaq; foraminibus peruis. Multa verò hic ex Galeni dogmate annotanda forent: quæ vt exquisitius intelligantur, vnã cũ alijs pedis ossibus in capite huius sine enucleabuntur. Ad calcem igitur os cum eodem conuertamus, quomũ sic ait.

ἄρην, καὶ σκαλίον, περιεπίρριθ' ἐκ τοῦ ἰσίου, καὶ οὐλοῦ καὶ τὰς τρεῖς ὑπερβολὰς τῶν ὀστέων. Ἐπίρριθ' ἔστι δὲ ἄρην μέρη, τὰ μὲν κατ' ὄψιν τῶν μεγάλων δακτύλων, ὁμοῦ δὲ καὶ τῶν μικρῶν τῶν ὑπερβολῶν, καὶ ἐξ ἑκάστης ἑνὸς καθήκοντος ὄστος ἔχει. τὸ δ' ἐκ τοῦ ἰσίου μέρη δάκτυλων ἑξ ἑσῶς αὐτῶν ὄσῳ τῶν ὑπερβολῶν καὶ καθήκοντος ὄστος γινώσκουσιν, παραπέτακτος δ' ἐκ τοῦ ἰσίου μέρη τὰς τρεῖς ὑπερβολὰς, ἀλλ' ἕκαστος μὲν αὐτῶν ὄστος, καὶ ἂν διακρίνεται ὄστος τῶν ὑπερβολῶν καὶ δὲ καθήκοντος τῶν αὐτῶν.

Subjicitur autem huic os eorum, quae in pede sunt, maximū: vocaturq; calcaneum, rotundas  
 quidem tali partes comprehendens, duas verò quaedam eminentias in apras illius cavitates con-  
 gruenter inserens. Quoad eas verò partes, quibus incedimus, leniter rotundū, ac latiusculū est.  
 Rotundū verò & ex posterioribus est: penicq; has, tibiae rectitudinem admodū excedit. Et parti-  
 bus autem eius anterioribus, quae quidē ē regione magni digiti sita est, ipsius tali capiti subiacet, pullumq;  
 sibi ipsi copulatum os habet. Quae verò eius extremitas minimo digito respondet, ossi  
 eundā eubiformi nuncupato coarticulatur, quod ab externis partibus naviculari iuxtapositū est.  
 Sed illud quidē ealiū est, qua parte ad talem dearticulatur: hoc autem eubiforme gibbum est.

COMMENTVM SECVNDVM



**A**LLO calx subjicitur: quem .A. in prima, & secunda figura praesert. Dicitur verb  
 calx, siue calcaneum a calcando, quia scilicet terrā calcat. Qua etiam ratione a Gre-  
 cis κλίμα vocatur, a verbo κλίω, quod est, calcare, ac pessumdare, & ἔμα, quod est,  
 terra. Vnde legitur [ κλίμα τῶν σκάλων ] q. d. conculcatus ciuitatis, siue locus, quem  
 tota ciuitas calcare solet. Omnium igitur pedis ossium verē maximū esse Galenus ait. Maximam  
 quidem ( prout aliis inquit .A. ) quoniam ad perpendicularū subiacet toti colo : sicq; tanquā totius  
 corporis basis existens. Cuius substantia talo similis est. Quauis vt laboraturum id os in inonibus  
 omnibus, atq; etia in firmationibus, cuius sciret natura : duram quidem summē, propriam ipsius  
 quoq; substantiam fecisse, Galenus idē alibi .B. minis cōsultē dixerit. Quamplurima enim ab  
 eo nasci, vel in ipsum inseri ligamētis eum oportuerit, musculiq; similiter ( vt postea videbimus )  
 summē duram eius ossis substantia esse non decuit : praesertim cum fractiois pericula minis ob-  
 noxia talis substantia mediocriter dura, quā in quē durissima, sit. Rotundas verò tali partes ante-  
 rioribus comprehendētis calcaneum esse, scilicet quib; sub illius capite post eversum sunt. Quē  
 admodū eiusdem capitis tali anterior pars ab ossē nauiformi suscipitur. Duae autem quēdā calcis  
 eminentiae: quae scilicet intus, & extēra sunt, in aptas tali cavitates congruenter inseruntur, non  
 articulatione quidem, sed ligamētis duob; taxat colligatae cartilagineis quidē, crassiq; vt; ad ob-  
 vt in emundatis ossibus non paruis inibi pateat intervalum. Sed praeter dictam enarthrosin, quae  
 calx tali caput subtus comprehendit, ista etiam enarthrosis est, secundū quam a talo calcaneus  
 recipitur. Vnde nos antea non inodū vt duas enarthroses connumerauimus .A. sed ad secundam  
 quoq; ginglymi speciem reduimus .A. Quoad eas verò partes ( subdit Galenus ) quibus incedi-  
 mus, leniter rotundum calcaneum est, & latiusculum. Rotundum quidem posteriore etiam, &  
 superiore ( prout aliis inquit ) addeq; tū & laterib; extēroq; latere : vt alia omnia rotunda, dis-  
 spathe gratia. Praesertim verò inferius partibus, vt hie inquit, quibus incedimus, cū in continuis  
 terre, ac durarum rerum calcantibus rotundam figurā minis offendatur. Latiusculum autem, &  
 quadantēns etiam leuē, tūq; basis, ut si firmē stabilitatis gratia factum est. Quancūq; ob rotundā  
 interē musculorū necessarium originem, quibusdam prouerberationibus inaequale est: vt ex  
 quo loco musculi quinq; pedis digitorū motores exoriuntur : videlicet primus, .A. & quatuor  
 omnium postremi, .A. vt sunt decimus nonus, vigesimus, vigesimus primus, & vigesimus secundus.  
 A quorum principiorū tergo prouerberationes dictae praegalant, deorsum tertē prius obcur-  
 rentes, quō dictorum musculorū principia inter calcandum tūiora sint, minisq; cōprimuntur.  
 Cumq; rotundum ex posterioribus sit ( vt praedictū est ) penes easdem partes, tibiae rectitudinem  
 admodū excedit, tūm primū, vt validius tibia super pede, in star perpendicularis linea super illa  
 transuersim supposita firmetur: tūm secundū, ac magis, vt robustissimus ille tendo .B. ex pedem  
 mouentibus musculis primo, .A. secundo, .A. quartoq;, .A. ac etiam tertio .A. proueniens in ipsum  
 inseratur, quauis minimus ille teraq; tendo intus a latere potius implanteretur, ab alto distinetur,  
 qui ex primo, secundūq;, ac quarto verius cōmissus, obpositusq; est. Huius etia validissimi ten-  
 donis ratione, posterior illa calcis sedes a perussimē depressa est: condecentēq; aspera. Et parti-  
 bus autem eiusdem anterioribus ( subdit Galenus ) quae quid cum magno digito respondet, ultra-  
 gali, talis huius capitulo subiacet; illud in sua cavitare recipiens, quod ossi scaphoidei coarticulandum  
 aptiorum erat, nulliq; alteri ossi cōiungitur. Altera verò eius extremitas, quae minimū digiti tum  
 respicit, leui, lubrica; cartilagineis incrustata est, ac per arthrodiam ( vt antea diximus .A. ) cum  
 tarsū ossē extēriore a eubi similitudine eubiformi nuncupato coarticulatur, quod quidam Graec.

3. 3. de v. p.  
 cap. 3. in  
 princ.  
 Cōtra Galenū.  
 b. Ibidem  
 Verū finē.  
 c. In proc.  
 cō. 13. ver-  
 ses finē.  
 d. Ibidem  
 cō. 14. post  
 princ.  
 f. Tab. 14.  
 g. Ibidem  
 μ. Tab.  
 15. 13. Itē.  
 h. Tab. 14.  
 i. Tab. 14.  
 k. Tab. 14.  
 l. Tab. 13.  
 m. Tab. 13.  
 n. Tab. 13.  
 o. Tab. 13.  
 p. Tab. 13.  
 q. Tab. 13.  
 r. Tab. 13.  
 s. In proc.  
 cō. 14.



ci, *scaphoides*, eadem ratione appellant. *scaphis* enim apud eos idem quod apud nos cubus est, *sex* lateribus (vt postea videbimus) quodammodo insignitus. Idipsum igitur os ab externis partibus ipsius scaphoidis, nomenclaturis iuxta positum est. A quo tamen interea distat et Galenus subdit, scaphoides scilicet qua parte cum talo coarticulatur, cauum: id verò, quod *subscapoidis*, cubiformeque dicitur, gibbum esse merito dicens: vsq; adeo tamen pauca humilissimi gibbositatis est, vt difficile sit distinguere, quodnam ingreditur, quodue suscipit. Ex quo potius oppositum de cyboide solertissimo Vesalio apparuit: vt scilicet a cyboide calx suscipiatur, & non calx cum Galeno cyboide suscipiat. De partibus autem interna, & externa Galenus hic nihil tenet, ideoq; nobis splendè reliquit. Internum igitur calcis latus leue est, admodumq; sinuatum, cauatumq; per quam quidem equitatem non solum vena, arteriaq; & nervus in pedis plantam distribuendi, sed etiam pedis motorum musculorũ quinti, ac digitorũ mouentium secundi, & tertij tendones oportune perforantur. Quorum tendonum ratione sinus precipuè caelatus est antorsum à tergo interni processus ipsius calcis, qui quidem processus tali capiti subiectus, illud suscipit. Nec deest hic eminentia quedam postensius idcirco extensa, vt ab ea pedis digitorũ mouentium musculorũ duodeviginti, s. sui ortus principium duxerit. Quemadmodum ab aspera, non nihilq; etiam protuberante parte extenore, retrorsum quoq; musculi alter enascitur pedis digitorũ mouentium decimus septimus. *λ*. Antorsum verò sinus alter est: per quem septimi, *μ*. & octaui, *ν*. pedis mouentium musculorũ tendones reuoluuntur. Septimi quidè tendo, vt in pedis ossis, quod pollicis preponitur, radicem; Octaui autem, vt in alterius pedis quoq; ossis, quod minimũ digitorũ sustinet, processum implantentur. Sed de calcaneo satis dictum sit. De altero autem osse nõ nihil addendum: de quo in presenti textu Galenus etiam meminit; ipso videlicet, quod Greci *scaphoides*, q. d. latine nauiculare, a scaphis, vbi nauiculæ similitudine, appellant. Idipsum igitur os est, quod parte quidem sui posteriore, effatu digno, atq; internum oblongo sinu, lubrica quidem chartilaginea incrustato astragali, talus caput suscipit: A tenore autem, tribus tarsii ossibus pariter incrustatũ coartulatur. Primo quidem, quod pollicem respicit, vt ab illo suscipiatur duobus autè reliquis è conuerso: vt illa scilicet sinus leuibis quibusdam, superficialibusq; cauitatibus suscipiat. Quamquam vsq; adeo leues eorum superficies sunt, vt difficile admodum appareat iudicare quodnam suscipiat, quodue suscipiatur. Vnde cubis Anatomicorũ nonnulli eas assimilantes, tres scaphoidis ossis cubos nũcupare solent. Velut autem superior huius ossis sedes ob maiorem securitatem, gibba est, ita inferior, cauitas pedis (vt postea videbimus) necessitate gratia, siua est, introrsum magis quandam sinum habens, per quem sexti, *ξ*. pedem mouentium musculi tendo reflectitur. Compertissimũ verò id os tam prima, quam secunda figura, *θ*. indicatur. Sed hæc de tribus in similibus ossibus, talo inquam, calcæq;, ac scaphoides in tantum dista sunt: tanquã de his, quæ pedi propria sunt, nullũ in manu sibi proportionale os obtinentia. Reliqua enim (vt postenus ostendemus) manus ossibus proportionaliter correspondentia sunt. Quoniam verò Galenus in presenti contextu de cubiforme etiam osse meminit: Eapropter non nihil de ipso etiã tetigisse hic, vtilissimum fore arbitrari sumus. Idipsum igitur os non solum *subscapoides*, latine cubiforme nuncupatur, à cubi scilicet seu taxilla similitudine, quem Greci *scaphis* vocant, ob sex videlicet apparentia quedam eius latera: sed etiam *subscapoides*, latine multiforme, ob variã eius exquisitissimam per se ipsam, merito nuncupatur. Quod enim antenus vt vnum latus alij numerauerant: verè nõ simplex, at duplex est: Alterum quidem, quo cum pedis osse coarticulatur, quod minimo digito preponitur: Alterum verò, quo cum altero pedis osse connectitur, quod anulari ( vt hic dixerimus) digito respondet. Quod præterea sibi proximo tarsii ossi coarticulatur, ipsiq; etiam scaphoidis inferius annectitur, nõ simplex proculdubio est, sed duplex forteq; etiã triplex. At quid de inferna ipsius (sede dicendum) quæ plura quidè inæqualia latera præferat: quemadmodum externa quoq; sedes vix lateris nomen ob obsecramus quandã sui planitiẽ mereret. A postulisimè igitur alij Anatomici Polymorphon, hoc est, multiforme id os (non secus ac aliud caput cuneũ referens) nominauerunt. In huius igitur ossis inferno latere, seu dicere malimus inferna sede, qua terrã respicit oblongum quandam, effatũq; dignum sinum obseruamus: per quem quidè oportuè septimi, *π*. pedis motorũ musculi tendo in pedis os pollicis propinquũ inserendus pertinetur. Hoc igitur os est, quod tanquam tarsii quartum Galenus hic, parte, qua digitali respõdet, calci dearticulati determinauit: quanquam rectius coarticulati dixisset. Reliqua verò tria tarsii ossa deinceps cum ipso etiam Galeno declarabimus: vbi nonnulla eiusdem monumẽta perhibereimus: vt quomodo sic videlicet nobis testati reliquit. *f*. [Subiacens verò ipsi tibiæ pars pedis ( cui parti totum crus incumbit secundũ rectitudinem) cõmunis omnium pedum, vnum quidè nomen, quale est tarsus, & pedion, nõ habet, sed cõponitur ex tribus ossibus nominata habentibus *scaphis*, quidè, id est, tali, & *scaphis*, id est calcæne, cõiuncta multis: tertio verò *scaphis*, hoc est, nauiformis, ab anatomicis medicis indito nomine. Is quidè solus nulla est in manu particula, quæ proportionè respondeat: sed sunt simpliciter basis solius instrumentũ: Aliæ verò omnes particule, basis simul, &

apprehensionis. Neq; enim tarius, necq; pedion, vtrunq; si gillatum, vna est simplex paruesita: sed sicut carpus, & metacarpium, ex multis ossibus, tum duris, tum paruis composita sunt. Hæc de tribus ossibus Galenus. Et quibus patet, quod cum pes propter firmationem, ac stabilitatem factus sit (prout antea iam dixerat. g.) veluti crus propter motum, propria pars pedis, vt pes est, quæ sustinet verè sustentaculi rationem habet, est quod tibiæ subiaceat tripliciter, videlicet talis, calcis, & scaphoides. Quoniam verò pes non firmationis modò instrumentum est, sed etiam quæ ratione ambulationis, atq; apprehensionis: idcirco alie quedam partes necessarè fuerunt ipsi etiam in manu quodammodo proportionales. Quamobrè. b. [Dicamus iam quædam modò in manu secimur, quantum sit vnaqueq; simplex pedis paruesita, & quam figuram adeptasit, & quam positionem, quamq; in se inuenit syntaxin, atq; connexionem vniuersalè habeat, & quæ sit earum numerus: sed etiam molliorem, vel duriorum, vel rariorum, vel densitate, vel quæcunq; corporibus insunt, percussiuam, quem habeant vbiq; versus exponentes, & monstrantes non licuisse melius aliter eas cõstruuisse. Longus quidem nihilominus est hic sermo, quia in qui de manu est habitus: sed similitudo cõstruatur non in manu. Quæcunq; enim pes vt apprehensivum instrumentum in manu similia est fortitudo, ea ad dictum de manu sermone remittenda sunt. quæcunq; verò vt ambulatorij, hic enarrare oportet: seruat autem similia in his prædicta. i. iam tria, videlicet carpo, seu brachiali tarius: metacarpio, seu postbrachiali pedion, plantæ pedis: digitiq; tandem digitis.] Si quidem quod ex multis, ac varijs ossibus constituta sunt, inuicem quidem multitudine in denticulatis, permembranosa verò ligamenta cõnexis, id vt apprehensionis instrumentis pedibus accidit: Ob id ipsum multitudine digitorum quinque, & singulorum in ipsis articuloq; numerus. Non tamen quod vna serie positi sunt digiti omnes, sed hoc propriè est pedibus tanquam firmationis organis. Similiter autem quod minores digiti pedibus fuerint, quam manibus. Apprehensivum namq; solum organo magnitudine ipsorum digiti conueniens: Et autem, quod vt ambulatorij sunt vbiq; propterea apprehensivum est factum, etiam tanta longitudo, quantum nunc habet, satis est. Sed interna quidem eorum altiora, externa verò humiliora fuerunt: simul quidem, quatenus apprehensivæ sunt partes, vt comprehendant, & circumplicentur loco cuius conuexus: simul autem, quatenus sunt firmitudinis instrumenta. Cum enim ambulando alterum quidem crus impuatur, alterum autem in terra firmatum totam corporis nostri molem sustineat altiora, merito ipsi interiora sedem natura fabricata est. Si enim equalis ex vtraq; parte esset pes, versus sublimem cruris partem (quæ exterioris est) reperet, ac inclinaret ipse pes primus, & maximè, acutè eo crus totum. Quod si fuisset, manifestum sanè est, quod ambulantes facillè caderemus. Itaq; tutioris ambulationis gratia altiores facti sunt interne partes pedum. Quibus autem non sunt altiores, in lætantes, aut currentes, aliquid quando autem & ambulantes in locis inæqualibus, facillè euerterentur, & collabuntur. Hæc verò sermone euidentiorè adhuc si quis procederet libro accipias, k. in præsens autem hæc sufficiunt. Apparet enim pes iure optimo internis partibus altus simul & cauis iunio, propter securitatem firmationis, & certitudinem apprehensionis. Postquam. l. verò, vt dictum est, externa quidem pedis oportuit esse humiliora, interna verò altiora: periculumq; erat, ne si multus & magnus ossibus attolleretur pes, grauis redderetur, concauè medium eius inde effecit: prouidens cuius aliud quoddam eodem modo ex huiusmodi constructione pedibus, vt apprehensivis instrumentis, ad firmitatis securitatem in locis cõuexis, & inæqualibus multum cõferens, de quo prius diximus. Propter tria igitur causas pedis hæc videtur facta. Primum quidem, gratia altitudinis interiori partium pedis: Secundum verò apprehensionis: & tertium adhuc leuitatis: Quorum primum quidem ad securitatem firmationis (postquam. m. enim rationabile fuit partium tibiæ superiores quidem) quæ sunt postgesta, vt paulò ante à Galeno quoq; ostensum est, foras sensim abscedat: inferiores verò, quæ sunt ad malloco, intro reuertit: par fuit ob id quoq; particularium pedis altiores fuisse internas, vt tibiæ partes tam intro inclinantibus obfirmat. Secundum. n. verò ad varietatem ambulationis: Et tertium ad velocitatem motus, multum habent momenti. Nō igitur. o. adhuc quæretur, cur calcanei ossis anterior pars tenuior sit, & angustior: neq; cur ad paruum digitum abscedere magis videatur. Si enim anteriori parte, vt posteriori, esset crassum, & latum calcaneum, & talè magis, in anteriorem pedis partem extenderetur, quomodo fuisset interna eius pars cõcaua? Merito igitur hic multum de crassitie eius ossis, & amplitudine interna parte natura abstruit: ob idq; ad paruum digitum extensum esse apparet. Propterea rursus astragalus intro magis vergere videtur licet posterioris eius partes ad medium calcaneum sint firmatae. At quod semper magis, atq; magis gracilescat, in anterioribus partibus calcanei ossis, & ab internis abscedere videatur ad externa, merito astragalus ibi ab interna parte calcanei: & veluti suspensus apparet. Quomodo autem dicitur eodem modo interna pedis cauitas facta fuisset, quam si subiectus os minus, & trietibus internis partibus factum esset: quod verò superiacet, quæ sit a principio, seruetur? Calcaneum namq; cõcauè subiectum toti membro, semper valde oportuit in terra esse firmatum: superpositum verò ei os sublime pendere. Quia propter & quæ cõiunguntur his ossi: quod calcaneo quidem

g. Ibidem cap. 1.

h. Ibidem cap. 7. in princ.

i. Ibidem cap. 6. Pedis conuenientia cum manibus. Amborum differentia prima.

l. Intra pedis cur altiora.

m. Ibidem

n. Vt cap. 9. euasit libri versio. l. Ibidem cap. 8. versus finem.

o. Ibidem cap. 9. versus finem.

p. Inter c. 3. versus finem. q. Inter c. 7. post med. Gal. ante 6. g. &amp; h. 11.

r. Astragali sinus.

s. Ibidem

t. Ibidem

ideft cubiforme nominatū ab externis partibus pedis firmum in terra litatur. Quod verò astragalo scaphoides, ideft nauiforme vocatum, fimiliter ipſi astragalo ſubline eſt, & ſublatū a terra, internis partibus pedis locatum eſt. Pari autem modo tria tarſi oſſa huic coniuncta, & ipſa ſublimia apparent, & internis pedis partibus poſita ſunt. Externa enim eorum parte firmū, & humile cubiforme iuxta porrectū eſt: quod ad ipſum calcaneū dearticulatū dicebatur, & ita iam ſeptem primorum pedis oſſium vius conſtat. Calcaneum namq; ꝑ maximum mentū factū eſt, & leue quidem inferna parte poſteriori autem, & ſuperiori rotundum, & prælongū ad exteriora pedis. Maximum quidem; quoniā ad perpendicularū ſubiacet colo: leue autem partibus inferioribus, firmationis ſtabilis gratia: rotundū autem in ſuperiore, & poſteriore, vt alia omnia rotunda, diſpathiæ gratia: externis verò partibus ad parū digiti, prælongum, & paulatim attenuatum, propter internam pedis cauitatem. Eadem verò ratione astragalus non attenuatur, ſed manens ſublimis alio nauiformi cōiungitur *veſty*, ideft; formæ ſimilem illi efficiens figurā. His deinceps adiacent tarſi oſſa, tria quidem nauiformi coniuncta: quartū verò calcaneo. Ponturq; ipſum (vt dictum eſt) in terra firmū ab externis pedis partibus: alia verò paulatim attolluntur: & omnium ipſorum hoc eſt altitudo: vt ſimul quidem habeat, per que firmetur, & roboretur hæc particula: que vocatur tarſus: ſimul autē vt altiores ſiant internæ pedis partes. Os itaq; q. quod ab externis ipſius partibus eſt locatum: quod ſanè & cubiforme nominatur, dearticulatū cauitati calcanei ad ſinē adiacenti. Reliqua verò tria tres cubos nauiformis oſſis obsequant. Hoc autem ipſum rursū circumambit caput astragali ille rursū iacet quidem inter epiphyſes tibiarū, & fibulæ ſuperiōrē a lateribus, & præterea a tergo ab ipſis comprehenſus. Superiacet autem calcaneo duabus eminentijs ſibi: in duabus calcanei cauitatibus firmatus. Atq; extendere quidem, & ſteſtere pedem, ſuperne astragali dearticulationis eſt opus: quæ ad tibie, & fibulæ epiphyſes diſta eſt ſen: ad latera verò circumferre; opus eſt dearticulationis, que eſt ad os nauiforme. Alij enim certè oſſium connexus in pedibus idem, ac in manibus multus, & parū parum quid auxiliantur prædictis cōſtructionibus: ſenſibiles autem ipſi per ſeipſos non ſunt. Apparet igitur ex ijs astragalus quidem principaliffimum oſſium eſſe: quæ ad pedes mouendos pertinent: calcaneum autem eorum, que ad firmationem. Propterea illud quidē vndiq; in circumferentias quaſdam deſinere decebat: Hoc verò leue eſſe inferiori partem immobile verò quamſien poteſt maximè, & cōſtanter firmum ad adiacentia oſſa. Quæ etiam & magnitudine plurimū excedere ipſum oportebat non alia ſolum, ſed etiam ipſum astragalum. Quamquam & hic magnus ſit: vt qui maximū quidem oſſibus ſuperis dearticuletur: Non parū verò in anteriora apophyſim produens, vbi cōmittitur nauiformi: ſed tamen & ipſo eſt multo maius os calcanei. Retroſam enim præterlabatur non ſolum astragalum, ſed etiam ipſam fibiam, & ante iore parte quam plurimū procedit, & reſpondentem habet longitudini amplitudinē, & his ambabus profunditatem. Subiacet enim rectitudini tibiarū, & ſerè totam ipſam ſolum ſuſtinet, & per hanc ſemur, & per hoc, ſuperiacens corpus, & maximè quando ſalire voluerimus, aut magnū gradum facere. Magnitudinem igitur inſignem oportuit ob id. in eſſe oſſi calcanei. Alioqui temerè natura cōmiſiſſet ei tanta onera. Propter eandem cauſam firmam præſturiſſe ei cōmiſſionem, non ſalacem, neq; errabundam. Sed ſi fibulæ ipſi & tibie fuiſſet dearticulatū, neq; medijs astragalus locatus: binū in infirmum, & laxum fuiſſet. Illic enim enaſcens pes ad prius colorem deſinens, maximū neceſſariū haberetur erat omnium, que in ipſo ſunt, dearticulationem, & motionem. Ob eam ſanè cauſam astragalus in medio eſt tibiarū, & calcanei locatus. Sed quoniā omnino huic quidem coniunctū eſſe oportebat calcaneum, timens rursū natura, ne quopiā propter vicinitatē eius, vehemētiore motu fruendo, firmum quidē minū, ac ſecurū redderetur. Primum quidem (vt iam dictum eſt) duas ipſius apophyſes cōcauitatibus illius inferuit: dein de verò plurimis ligamentis duris, chartaſtagnosis, his quidē latis, alijs verò terebibus copulauit ipſum nō astragalo ſolum, ſed alijs etiam oſſibus vniuerſis vndiq; adiacentibus, quod ei ſacere potuit, adaptans, vt ſeruari conuenientem firmitudinem.] Sunt autem adiacentia oſſa tria ſcaphoides, tūm oſſa tarſi quatuor: Quorum vltimum, quartumue ſolum nomine dotatum eſt, vt *veſty* noncupatū ſit. Reliqua verò tria innominata ſunt, de quibus ſtatim Galenus ſubdit, dicens:

## TEXTVS TERTIVS.

Deinceps verò tria ſunt oſſa parua inferiori nauiculari extremitati cōarticulata. Cum qui bus etiam his exterius cubiforme os exporrigitur. Poſtq; quatuor hæc pedis tarſus caſat

Scaphoides.

p. Cap. 1. in princ.

q. Ibidem veſty modium. Astragali articulationis duplex.

Articulationis duplex vius.

Astragali calcanei vius, magnitudo, &amp; figura.

q. Ibidem veſty modium.

Astragali necessitas.

Astragali calcanei nexa.

p. Cap. 1. in princ.



**A** METSI multa sint tarſi nominis ſignificata, *ſicut et in veteribus*, quod eſt, à verbo ſiccari dicta. Vt Pauli Apoſtoli patria, quia ſicca fortaliſſi exiſtat: ita & tereſmiò, aliorumq; huiuſmodi nauigiorũ generis remorũ ſcenes: quia ſine molli aliq; intermedia ſubſtantia extenſi ſunt: Atq; palpebrarũ chartilagineſ; quibus pilorũ quoq; nõ iecũs ac ramorum ordo quidam ineſt: Nihilominũs tamen ad propoſitum noſtrum beſana capi tariuſ poteſt, eademq; ſemper nõpenſandi ratione. Primò eõmuniter, pro tota videlicet peduſ parte cum ipſius etiam digituſ, quæ quidem tribuſ oſſibuſ ſuccedit: videlicet talo, calcio, & nauiculari. Ad eõ vt oſſibuſ tribuſ, ac viginti, cum pedo ſcilicet, ac digituſ, totuſ cõſtituatur. Ex quiſ tituſ enim perpendicularibuſ nõ ſicca modo tota parſ hæc apparebit tanquã pauca, tenuiſ carne contexta: ſed etiam remorũ ſeriem, atq; effigiem quãdã præſentet. Preteritumq; in emundato ſceletõ. Apparent enim quinq; peduſ oſſa ſuis eũ digituſ velut oblongi quidam remi: quoruſ veluti manubria quẽdã, ac principia ſunt quæ ſpecialiũ tarſi oſſa quatuor appellantur: quomodo impreſentiarum capimus tariuſ. Idcirco enim proprie magiſ nomen id huic parti congruit: quoniã excarniſ, ac ſicca magiſ eſt. Cõtuſ primũ quidem oſ intuſ caſtuſ, quod pollicem reſpicit, cubiſoſi, quartore omnium maximo parum profecto eedẽs, quodã magnitudinem: quæ quæ inferiũ, peduſ veruſ, ſeu dicere maluiſus anteriorũ, tãtõ maiuſ ſuperiore, ſeu diſtalle maiuſ poſtiorẽ eſt: quãtõ cubiſoſe vice verſa latuſ, maiuſq; ad calcaneũ, quãtã ad pedion eſt. Septem verò lateribuſ primũ id oſ inſigantiuſ eſt. Quorum quatuor quidem, aliã oſſibuſ coartculatur. Anterior enim latuſ eũ peduſ oſſe, quod pollici preponitur. Poſterior verò eũ nauiculari: Internũ autẽm inferiũ, ſiue anteriorũ, cum peduſ oſſe altero: quod (vt ſic dixerim) indici digito præfertur. Internũ verò ſuperiũ, ſiue poſteriorũ cum ſecundo, omniuſq; minimo tarſi oſſe. Tria verò cuſidẽ reliqua latera chartilagineſ ligamẽtiſ (vt videbimur) cooperiuntur. Quam ob cauſam nonnulliſ receperunt àſperitateſ. Duerſiſ inquam rationibuſ anteriorũ, ac poſteriorũ laterũ, ſuperiũ etiã, & inueniũs dicit poſſe. Velut enim in manu quod poſteriorũ oſ, calcio; propiã aquaſ ſuperiũ etiã appellare poſſimur: quatenũſ in ſibiſ descendamur. Simpliciter autẽ ſuperiũ latuſ intelligimur quod genuſ reſpicit quemãquãdã inferiũ determinabimur quod terẽ immutabit. Id quod annotaſſe oportuit, eũ in præſentẽ contextu Galeniſ inſerõſem nauiculariſ extremitateſ intelligat; quæ altera quidẽ ratione anterior eſt. Velut autẽm omniuſ tarſiſ propiã dicti quatuor oſſium maximeſt cubiſoſe, quod quartũ dicitur, ſecundoq; loco primũ, ac tertiuſ tertiuſ: ita omniuſ miſum eſt oſ ſecunduũ. Quæ ſimul omnia ſibi inuicem nõ chartilagineſ in crutaſtione interueniẽte coartculata; niſi chartilagineſ duntaxat ligamẽtiſ exteriũ copulata eleuatiõem eorum ſuperficiẽm quõdam oſſeſtũant, inſimã verò, quæ ſcilicet tetra reſpicit, cauam, ac ſimã, ob neceſſariaſ cauãtũſ peduſ cõmoditateſ, prout antea .x. iam tetigimur. Inẽt autẽm oſſiſ tertio, quod cubiſoſiſ proximo eſt, proceſſuſ quidã latuſ, deorsũ ad terrã proſcedẽs, idoneuſ profecto, vt in ipſium quintũ .x. pedem mouentiũ muſculũ tendõ validiſſimẽ implantetur. Sed ne decipiaris quidẽ huic, veluti Galenũſ nõnunquam in eũtia quãdam, ac negliẽtiaſ deceptuſ eſt, vt quatuor oſſa tarſiſ numerãſ, cyboidẽſ, cubiſoſe quẽtã tanquã abulũſ diſtinctũ computariſ. Vnde nõn viginũſ ſex (vt verũ ſunt) ſed viginũſ ſeptẽ peduſ oſſa, nõn ſecũs ac in manu eſſe determinãuit: Hippocratiſ verba interpretãtũ volẽſ, dicentiſ, ſ. q̄ [peſ hominiſ multũ, ac parũ oſſibuſ, nõ ſecũs ac ſumũq; manuſ conſtat.] Hippocratiſ enim huic ſermoni, quãtuſ extũmũſ, ac parũſ conſtare vtũq; membrũ expreſſat: nõ tãmen propter eũ eundẽ neceſſariũ oſſiculorũ numerũ determinãt. Idẽm verò nõn oſſium in toto curã, ac brachiõ, totãque manu eſt. Si pro deſicientẽ hoc vno pollicis peduſ oſſe, molã ad iũxentũ, vt ſic in vtroq; membro triginta oſſa ſunt, præter ſciãtũ, prout antea iam oſtendimur ſ. Ex quatuor igitur oſſibuſ cõpoſituſ propiã dictuſ tarſuſ, prima eſſe parſ eſt, quæ manuſ partibũſ reſpondet. Carpo enim ſeu brachialiſ proportionaliſ eſt: Haud enim obſtat ex eõto carpuſ, & tarſum verò ex quatuor oſſibuſ conſtitui. Viũ enim duẽritũſ, diuerſitateſ cauãũ, ſicut eũſdem ſimilitudo ſimilitudiniſ cauãũ exiſtit. Ad purã nanq; apprehenſiõem duobũ ordinibũſ neceſſariũ indiguimur, ideoq; maiore oſſium, ac diſtincto, magnitudinẽ inferim minorũ; horum numero. Ad ambulatiõem verò, ſtabilitateſq; cum minima propter hæc apprehenſiõem, paucioribũſ, iſſq; maioribũſ oſſibuſ opũs nõn eſt. Dicoimur autẽm poſtea .x. ex ipſiuſ etiã Galeniſ dõgnate, nonnullãſ congruentiaſ, ſiue ſimilitudineſ, atq; aliqũſ interim differentiaſ, quæ in manuũ, ac pedum conſtructionibũſ obſeruantur. Vbi ſcilicet peduſ reſiquãſ partẽ cõtemplatũ fuerimur, totãq; ipſorum conſtructionẽ conſidero, quõ in manu obſeruauiſ. Ad pedũ igitur accedamur, cum Galenõ ſic dicenteſ:

7. Com. præ  
 præſentũ.

8. Tab. 15.  
 fig. 15. D.  
 E. deĩndẽ.

9. Cõtra Gal.  
 lenũm.  
 ſ. 1. de fra.  
 ctũũ ſer.  
 3. Galenũſ  
 in com. &  
 com. 16. in  
 fac.  
 1. in proœ.  
 com. 1.

10. Cap. ſiq.  
 com. 1.

De ossibus plantę. Caput Vigesimumquatum.

TEXTVS PRIMVS.

Incipit vocata planta, ex quinq; ossibus constructa.

COMMENTVM PRIMVM.



**S**ECVNDa pedis pars ijs, que in manu sunt, proportionalis, *scilicet* Gręce dicitur, Latinę plantę, seu planta. Manus enim metacarpio, seu postbrachiali respõdet. Hanc Hippocrates à pectoris fortassis costarũ similitudine (quò ad sensum inquam, intermediarũ spatia) *scilicet*, quod est, latinę pectus appellare nonnunquã solet. Nonnulli verò postea: Alij; pedis vestigiũ nuncupant. Quauis autem vt digitorum basis, apprehensoriumq; organũ metacarpio ipsius manus proportionalis pedis planta sit: Ab illo tamen differt, quatenus hæc implanationis, firmationisq; instrumentum est. Vnde hæc ex quinq; ossibus constat, illud verò ex quatuor. Cum ad cõmodius apprehendẽdum pollex illa tanquam *scilicet*, hoc est, pro manus, siue cõtra manus oppositi largiore articulatione debeat. In hac autem eodem cum reliquis digitis ordine firmari: ob maiore quidem, a pũorendis; stabilitatem. Tota igitur substantia, internisq; sinibus medullosis quinq; hæc ossa pedij, illorum quatuor metacarpij in ista, cum sibi ipsis inuicem, tum ipsis tarsis etiam ossibus, velut illa brachiali, per arthrodesi coarticulariunt. Quæ quomodo in singulis particulatiã fiat, præstẽsum à nobis est. x. Pedij verò ossium forma, similes etiam his, que in postbrachiali, quodãmodo quasi triangulis cõsistationis; interiori sunt: superi, quam infra: parte scilicet quæ terrã respiciunt: grossiorisq; posterius, tanquã in basi quadam, quæ cũ tarsis ossibus coarticulariunt. Intermedium verò spatium, præteritum; parte inférieure ad terram vergente, non secus ac in postbrachiali cõtingit, latus est. Vt quemadmodũ ibi: ita hic quoq; musculi quidam repositi sũt: pedis motorũ quintus. *scilicet* vsq; ad duodecimũ. Octo enim musculi sũt. Quibus addamus quartum. *scilicet* in interna eius ossis sede locatum, quod pollicij præsertur (cuius ratione pars eadem attenuando descendit) illa proportionalem, qui in manu (si reseribẽ, atq; exquisitè persiderimus) ordine quidẽ vademus. *scilicet* n. nuncupandum veniret: parte indicis superna. Rursusq; tertiumdecimũ. *scilicet* in externa ossis alterius parte repositũ, quod digitalo præponitur, illi quoq; ex hunc proportionalem, qui in manu ordine quartus. *scilicet* itatũdus est: in parte scilicet digitali exteriori, siue inferiore. Quo magis verò ad digitos hæc ossa accedant, cõ magis attenuantur. Vbi autem cũ digitis coniunguntur, non secus ac in manu, capitula appendicibus in primi singulorũ digitorum ossis cavitatem enarthrosi dearticulantur. Peculiare verò demũ duobus pedij ossibus extremis processus contempletur: Internus quidem, quod scilicet pollicij præponitur, a laterum: in terram videlicet respicientis eius sedis postenorũ parte in pyra presentis capitis figura. *scilicet*, denotatũ, vt in quem septimũ. *scilicet* pedem mouentiũ musculi tendo implanandum erat: Exterius autem, quod scilicet digitalo præsertur, alteri in cuiusdẽ externa sede: *scilicet* vt in quem octauũ. *scilicet* pedis quoq; motorũ musculi tendo alter inserendus veniebat. Sed hæc de secũda pedis parte manus partibus proportionali satis dicta. nunc sũt. Ad tertiam igitur accedamus manus quoq; respondentem, in qua digiti quinq; reponuntur.

TEXTVS SECVNDVS.

Quibus deinde pedis digiti succedat. Ex tribus verò interodijs omnes, ad corũ, que in manu sunt, si similitudinẽ cõstruẽti, excepto magno digito. Solus enim hic inter ipsos ex duobus ossibus cõstitat. Colligant harũ quidẽ dearticulationes membranacea ligamẽta, eas verò, que in talo, & calcæe sunt, multũtã validã: Nonnullãq; ex his rotanda simul, ac neurochartilaginea.

Fig. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

**Q**UAE de digitorum ossibus, tam in manu, quam in pede, hic à Galeno enarrantur, suis cum utrobique positis ligamentis, vsq; adeò clara sunt: vt nostra nõ indigeant interpretatione. Cum præcipue multa de his, y. corumq; appendicibus, ac de articulationibus. a. antea à nobis præparata iam sint: vbi de eorum quoq; medulliosis finibus nõ nihil tetigimus. .b. Reliquum est, vt cum Galeno de toto pede, ac partibus, atq; etiã de eiusdem congruentia, differentiãq; cum manibus permulta discurramus. Imprimis igitur cur humani pedes oblongi sint, ac molles, placibilescue cum ipso inedocorum Phebo cõtemplèmur. *¶* Vtrum scilicet præstulset et rotundus, & durus fieri pedes, si cut equis, an oblongos, largos, molles, & multos, quales nunc sunt? Priorem siquidem distam cõstruõtionem velocitas, & patiendi difficultas forsã sequi viderantur. Secundæ verò horum neutrum quidem propriũ: euidenter tamen apparet opportuna huiusmodi constructio ad omnes locorum difficultates: & sicubi oportet sublimes muros conscendere, aut arbores, aut petras. Si igitur neutra quidem constructio vtriusq; illas dotes, ac excellentias habere poterat: oportebat autem omnino alteram eligere: perspicuũ est, huius quidem priores, alteras verò hominibus fuisse operabiliores: Illas enim q̃ quatuor pedes sunt, quatuor pedibus, qui rotundi fuerint, licet tuto ingredi. Bipedi verò anq̃mã falsas omnino est huiusmodi constructio, nisi ipsi pedibus non solum rotundas, sed etiã valde magnas & largas supposueris à tergo in gulas. Sed ita demum & onus superfluum esset, & quiduis aliud poterat, quam velocitatis instrumenta (vt in mulieribus patet suis pedibus crepidas imponenti bus) poterit erigatur, si velocitatis gratiã rotundi sunt constructi pedes, non solum tales, sed etiam paruos esse, quales sunt equis: Pariter autem & durities pedum, equis quidem, in facili sedatione, comoda, hominibus autem, calceamenta conserere cum possint, non solum cõmodi nihil, sed etiã detrimentum sæpe afferret. Nunc verò, prius constructo calceamento, aliud nobis nouũ pro illo circumponere promptissimũ est. Si verò haberent pedes aliquod tale cõnatum calceamentũ, quale sunt in gulas, equis quidem solidæ, bobus autem huiusq; simul atq; ipsam calceamentũm esset affectũ, claudicare illis ipsũm esset necesse. Sed illis quidẽ animalibus, vt quæ nec manus, nec artes habeant, melius fuit quomodo ad patiendi difficultatem pedes cõparasse hominũ verò, qui pro re nata idoneum calceamentũ inuenire potuit, sæpe etiã nudis pedibus vti posse habuit, præstitit eos esse probris detestos. *id.* Sed q̃ quidem iustus fuit, non oblongos solum, sed etiã molles esse pedes, abundẽ demonstratũ est. Cur autem oblongi adeò quantum nunc sunt, & lati adeò, & cæui quidem sensim insertũ, gibbosi autẽ superna parte sint, postremò eorũ multos, sequenti sermone monstradũ. Postquam igitur ambulandi instrumentũ diximus esse humanum crus, non simpliciter, sed vt maxime cõueniat sapienti animalĩ, cõpositum vidẽ solet, nec omnino simplicem conseruemus adhuc eius notionem: Dicendum itaq; nobis est potus quidem, quomodo fiat ambulatio: deinde quare ipsi accedente, fiat homini conueniens ambulatio. Fit autem ambulatio, altero quidẽ crure in terra firmato, altero autem cõsculato. Sed firmus quidem, pedis, circumscribitur autẽ totius cruris est actio. Quapropter eum per firmationẽ, & motum perficiatur ambulatio: Illius quidem, pedes sunt instrumenta, huius autem, tota crura: Hæc autem & in stãtib; immobiliter, admodum perspicuũ est. Stabilitatem enim, cuius gratiã facti sunt pedes, non minus etiã tunc præstant: quin etiam & ambulantes, & currentes atq; quatuor pedum in terra firmus est, alter verò simul cũ toto crure fertur. Et mutas quidem loca beneficio cruris, quod mouetur, nobis inest: hoc enim est, quod loca permutat. Quod verò nõ edatq; hoc pes in terrã fixus efficit. Quomodo enim posset is transire animal, cùm ne ipse quidem mouatur? Testimonium autem eius rei locuples tolerant nobis duo cerũ exemplã, quæ haud ita pridem casu quodã obtigerunt. Pests seua in summos pedes grassata. Et crudelitas prædonis circa Cõsacium Pansphidæ. Pestilentia namq; potest faciebãt: prædo autẽ abscindebat extremos pedes, vt sine baculo nõ possent ambulare qui in huiusmodi incidissent infortunati: Non q̃ ad motum crurũ à baculo iuauerentur: sed ad firmatatem, quã peis habebant cõ pedibus. Stare namq; poterant quosdam mutis in his pedibus, ambulare verò non poterant, q̃ totam motum corporis vni mutilato cõmittere cõgerentur. Vidi autem & alios quosdã, quoruũ digiti mortificati à niue exciderant: sed hi quidem neq; stando, neq; ambulando, neq; currendo, in planis saltem, & leuibus, vincabantur à sanis. Quod sicubi oporteret aliquem peruadere difficilem locum, & maxime si præcepisset, ac præruptus fuisset, nõ solum iam perabantur: sed omnino erant inuiles, & præ illis impoentes: Quibus autem non solum digiti, sed etiam pars pedis ante digitos, quæ vocatur *calcium*, cõstitutus (vt in exemplo secundo patuit: simulq; cõtingit in primo) saltat his est gressus, non in locorũ difficultatibus iolum, sed in planis quoq; campis. Si verò pars, quæ ante hanc sita est, corrupta fuerit, quam tarsion nominat: non solum hi non possunt ambulare

10 autò, sed ne stare quidem constanter. Ex quibus omnibus manifestè est à firmam, ac tutam sta-  
 11 tionem, amplos, & oblongos pedes esse appositos; ob idq; tales potius hominibus, ceu à uoluntate  
 12 nem firmam, & tutam basin requirètib; quàm quadrupedibus fuerunt. Hoc igitur ut bipedi-  
 13 bus ipsi inest solum: non tamen in eis etiam ut sapientibus. Ut talibus enim uarietas firmitatis est  
 14 propria ambulare indigentibus in omnibus locorum difficultatibus: quod nõ accidit, nisi va-  
 15 riatè fissent in pedibus dearticulationes. Nam ut in manibus antea de iò strauimus, .i. ex varie-  
 16 tate articulorũ, que in ipsis est, & cauitate interna factas fuisse accommodas: ut circa omnes figu-  
 17 ras corporis circumplicentur: ita & pes, quantum maximè leuit, manus imitans, & dearti-  
 18 culationibus quidem variegatis: eam autem uisibus partibus, quibus locum aliquè gibberosum cal-  
 19 catum erant, in omni loco rectè firmari possunt. Hoc ipsum igitur est illud exanimè constructio-  
 20 nis humanorũ eratum, quod antea inuenire desiderabamus; quòd dicebamus, nõ ut gressu sol-  
 21 lam, sed etiam ut rationali animali conuenientes ipsi à natura datos fuisse pedes: vno autem verbo,  
 22 ac summariè inuiximè quis id cõplexus dixerit, multiplicem illam fissurã simul cù ipsa in medio  
 23 cauitate: Quantum enim ipsa pollet ad securitatem in locis gibberosis, aliã ratione nequaquã di-  
 24 cicens euidentiũs, quam si uideris aliquid quando hominem oblongas, & tenues scalas ascendentem.  
 25 Comprehendens enim tumè concauitate pedis cõexitatem lignorum scalse; deinde utraq; com-  
 26 plectens digitis, & calcaneo, quã maximè fieri potest, basin emittit rotundam manus modo com-  
 27 prehendentem corpus subiectum. Diuersa certè oratione etiam nunc uidetur môstrasse idem,  
 28 quod principio. Nam quòtq; firmitatis gratia pedes facti sint, paulò ante demonstrauimus, tunc  
 29 quò optime ad talem firmitate sint præparati, & molles, & lati. Præsens uerò sermo eam ostendit  
 30 in omnibus locis bellè firmari posse humanum pedem, à decentiq; constructionis necessitatem,  
 31 nõ diuersimodè caput quoddam, sed id, quod initio dicebamus, cõfirmari. Quidnam igitur adhuc  
 32 deest sermone? ut constructioem ipsorum; quò ex sermone præsentè duplex uideri possit, compre-  
 33 hendamus? Multè fidum etiã iusta de causa factum fuisse humanum pedem diximus, & eam in  
 34 medio, ut omnia loca peruenire queat: cuius quidem, & medijs, ut nunc dictum est, quæcunq;  
 35 subiecta gibbosa sua t' amplexantem, digitus autem (etenim & hoc quoq; adijciendum) in rectis,  
 36 & obliquis; & declinibus, ac præruptis utentem. Quæ tandem est horum omnium causa? quam  
 37 in vnũ caput cõferre oporteat? Cuius paulò ante oratio nostra ab ipsa rei natura coacta meminit.  
 38 Cùm diceremus humanũ pedem; quod eius maximè facere potuisset, manus fuisse imitatum.  
 39 At qui hoc si est uerum: apprehensorium autem organum fuit manus, fuerit & pes ipse, aut alio  
 40 quodam modo, ut uideoqueq; huiusmodi. At non equorũ ceret: ut qui planè priuatus est omni  
 41 apprehensione. Non enim ad uarietatem motuum hic, ut rationali animali, sed ad leuitatem &  
 42 promptitudinem, uelox cõparatus est. Luporum autem, & leonum, & canum pedes medijs inter  
 43 hos sunt, neq; simplices omnino, ut equorũ, neq; uariè dearticulati, ut hominum. Ad uentri-  
 44 nem nanq; & cibationem utuntur et ipsis tanquã manibus, .i. ad reliquam uerò multitudinem  
 45 actionum, quas homo obit, omnino sunt inepti. Hæc Galenus pro quinq; propositorũ dubio-  
 46 rum solutione: uidelicet primò cur humani pedes oblongi sint: secundo cur lati: tertio cur mol-  
 47 les, hoc est; plicabiles: quarto cur supra gibberosi delapsus uerò caui: quinto cur multiformi. Re-  
 48 liquum est, ut ex ipsis etiã dogmate cõtemplemur, quomodo pedes humani cù manibus con-  
 49 ueniunt, & quomodo ab illis differant. Quamuis autè multe sint (ut antea tenueramus. g.) pedum  
 50 cum manibus conuenientie, ac difference: nunc tamen eas duntaxat enumerabimus, quæ ad  
 51 ossa pertinet. .i. Rursus igitur, & hic oratio ab ipsis rebus coacta est inanimè affinitate pedes  
 52 multiformes; nobisq; in posterum principum, & uelut elementum quoddam omnium deinceps  
 53 dicendorum hoc statuatur. Oportere quidem omnino humanum pedem, nõ nudè solum stabi-  
 54 litatis, ut equinũ: sed apprehensionis etiã gratiã exuisse: Nõ posse autem simul cõstare utriusq;  
 55 summam perfectionem. Sic enim futuri erant ipsi aut manus, aut equini pedes. At si manus qui-  
 56 dem fuisset, magnum digitum oportebat oppositũ alijs esse, ut sermo præcedens probauit, .i. &  
 57 sic perijisset omnino firmitas. Quod si parui, rotundi, & duri; ac leues uicem fuissent, ut equo-  
 58 rum: uitiata sic fuisset omnino apprehensio. Perinde igitur ac si lacuũ fuisset utraq; eligere qui-  
 59 dem cõmoditatem, uitare autem nocuentum: sic natura creauit humanos pedes similes quædã  
 60 manibus, multiformes uerò, multorumq; articulorum: nõ tamen oppositũ alijs digitum magnũ  
 61 habentes, sed in vno deinceps ordine omnes cõstitutos. Nam igitur hoc solo differant à manu  
 62 constructione: An etiam quiddã adest ipsis aliud eximium, & selectum, ceu instrumentis  
 63 id est fundamenti? Non potest parũ hoc quidem, neq; fortuito, sed quod maximè cõmune est omni-  
 64 bus pedibus, in equis quidem peculiare accidit, quia nulliquã eorum pedes imitant: sunt manus:  
 65 in alijs uerò animalibus non equaliter quidem: Omnia tamen aliquid constructionis manus ipsius  
 66 assumpserunt. Homines uerò nulli omnino reliquerunt. Sed quod tarsus uocatur carpo aduicis  
 67 habuerunt, & metacarpo pedionis à recentioribus medicis uocatum: digitos autem ipsos digitis  
 68 admodum similes. Hæc igitur tres partes pedis sunt: qualis & manus, digitus, tarsus, pedionis: quatuor  
 69 nulla

Cur infes-  
 cau, ipe-  
 nus gibb-  
 sint pede-  
 e. i. de v. p.  
 cap. 1. 2.

Cur pes hu-  
 manus mult-  
 itudus.

Idem e. i.  
 ante mediũ  
 lib. 3. & lib.  
 1. cap. 1.  
 in fine.

g. Cap. pœ-  
 dens cõ. 3.  
 in fine.  
 h. i. de v. p.  
 cap. 6. in  
 princ.

j. Vt lib. 1.  
 cap. 1. & 2.  
 & lib. 1. c. 3.  
 C. Diuina  
 sia p. ma-  
 gen. r. 2. 3.  
 Diff. e. 1. 2.  
 p. 1. 2. 3.

C. Diuina  
 sia p. ma-  
 gen. r. 2. 3.  
 Diff. e. 1. 2.  
 p. 1. 2. 3.

Differentia 39 nulla inest equis. Subiacens verò ipsi tibie pars pedis (cui parti totum crus incumbit, secundum  
 secunda 39 rectitudinem) cõmunis omnium pedum vnum quidem nomen, quale est tarsus, & pedon, nõ  
 39 habet sed cõponitur ex tribus ossibus nomina habentibus astragali, & calcanei cõiuncta molis;  
 39 tertio verò nauiformi ab anatomis medicis indito nomine. Is quidẽ solus nulla est in manu par-  
 Cõuenientia 39 tucula, quæ proportione respondeat: sed sunt simpliciter basis solius instrumenta. ] Ex his, quæ  
 duplet 39 præscripta iam sunt, duplicem duntaxat pedum cum manibus cõuenientiam elegimus: Primam  
 39 quidem generalem: quoniã scilicet multifida ambu hæc membra sunt, hoc est, ex multis ossibus,  
 39 ijsq; vario modo dearticulatis, siue coarticulatis, constructa (quam quidem cõuenientiam præce-  
 k. Com. 1. 39 denti etiã capite tetigimus. k.) Secundam verò specialem hæc addidimus, quæ in tribus vtriusq;  
 circa med. 39 membri partibus cõsideratur scilicet in pedis tarso, plantaq;, & digito, cũ carpo, metacarpioq;  
 Differentia 39 triplex. Differentias verò tres elegimus: duas quidem hæc: primã scilicet in magni  
 39 digiti serie: quoniã scilicet non inest eius, qui in manu, alijs opponitur. Secundã verò in tribus  
 39 primis ossibus; scilicet talo, calcæq;, ac naviculari: quoniã in manu proportionale nullũ habent.  
 Libidem, 39 Diximus verò vtrinq; superius. l. ubi tertiam tetigimus, quæ ex digitorũ magnitudine inferuntur.  
 & paulo 39 Cũ pedis digiti omnes maiores, quã manus digiti, proportionatè ibidem ex Galeno dicitur,  
 prius. 39 sint. Sed primam, quæ ad pollicem spectat, differentiam ad hæc triplicem postea, immò quadru-  
 39 plicem, ex eiusdem Galeni verbis, ostendemus. Vltimã enim tribus pedi proprijs ossibus, atq; etiã  
 m. 2. v. p. 39 tarso [ Post hæc ( subdit paulo posternus Galenus. m. ) sunt plantæ ossa, terram cõtingentia post  
 cap. 2. post 39 astragalũ, & nauiforme, & cõtinua huic tria tarũ ossa. Quid & hoc nomen ab anatomis inposi-  
 39 tum est huic pedis parti. Deinde sunt digiti, quorum maximus est intus, non amplius ex tribus  
 39 phalangibus, & articulis, vt reliqui, constatus, sed ex duabus. Cũ enim alta, & concava, qualis  
 39 est forenx, futura esset interna pedis pars: rationabile fuit, firmitudines tutas vtinq; et adiacere  
 39 maxime nõ ossium. Posteriori quidem parte os, calcanei erat, priori autem, nisi manus digitus  
 39 multo simul maior alijs fuisset, & duabus cõstitisset phalangibus, nulla fuisset subimibus ossibus  
 39 securitas. Quocirca primò quidẽ non modò tantò maior alijs magnus pedis digitus, quantò ille,  
 39 qui est in manu; sed etiam multò amplior. Secundò autem nõ ex tribus sunt ossibus, vt ille, & alijs  
 39 omnes, sed ex duobus. Tanquam enim ( vt puto ) magni egeat: quæ ossibus inibi ponendis, vi-  
 39 tautit diuidere in multa, & parua. Quinetã etiam partẽ plantæ, quæ magno digito præposita est, duo  
 39 videntur subiecta esse inferiori regione, veluti sustentacula quedam, & stabilimenta, vt prius os  
 n. Com. se- 39 magni digiti prædictæ plantæ parti omnino ipsa in terra defixæ cõiungantur, vndiq; opinor huic  
 quent. 39 parti pedis natura vppeditata securitatem seu multũ laboraturæ propter præpositam sibi cuius-  
 Lubium. 39 tatem, & veluti fornice ossium. ] Sed de his paruis ossibus, non pollicis modò pedis, sed manus  
 39 fuerat ad metacar-  
 39 pũ cõpara-  
 39 ratio. 39 Quibus cum aliam coniunxerimus paulò ante dictam, quoniam scilicet nõ vt in manu alijs digitis  
 Cõuenientia 39 huiusmodi pollex opponitur: quatuor huiusmodi pollicum differentię computabuntur. [ Num  
 Differentia 39 igitur planta proportione respondeat metacarpio, an quippã differat, dicere, tempestiuũ fuit.  
 Eudem 39 Mihi quidẽ videtur nõ omninò similiter habere. In vtraq; enim parte primum acies vniuersiusq;  
 opinio. 39 digiti apparet os præpositum. Sed in pede quidem, seu vno ordine omnia busiacentibus, quantus  
 Impugna- 39 est illorum numerus, tantus merito est & ossium plantæ: In manu autem cũ magnus digitus po-  
 39 sitionem selectam sit sortitus, & separatus sit quidẽ plurimũ ab alijs, propè autem dearticulationem  
 Carpi ad 39 partem abductus: merito ex quatuor ossibus metacarpiũ cõstitit. Eudemus verò plantam,  
 39 & metacarpium similiter vtinq; ex ossibus quinq; constare affirmans: pariter autem & magnũ  
 Anterior 39 digitum in pede & manu duas acies habere, qd putet exactam eorũ proportionẽ seruare oportere:  
 partes. 39 hallucinatur: Ex tribus enim ossibus magnus digitus in manu cõstitit euidenter: vt & dearticula-  
 39 tiones eorũ & motus declarant. Attamen his ita habentibus proportio hanũ particulariũ euident  
 Posterior 39 est: nec opus est, vt cum Eudemo mentiamur. At verò ne carpi quidẽ ad tarsum proportio cõ-  
 Media. 39 structionis est obscura, siquidem ex quatuor ossibus tarsus constatus est. Nam ex pluribus, & mi-  
 o. Eodem 39 noribus cõponi particulis apprehensoriũ instrumentorũ erit proprium. At ex maioribus quidẽ  
 cap. 7. ver- 39 dem, sed paucioribus, ambulatoriorũ. Anterioribus igitur partibus pedis adamussim pẽsimiles cõ-  
 p. 1. hinc. 39 prehensorijs ex equalibus illis numero ossibus factę sunt: vnum enim, quod ablatũ fuerat magno  
 Simul pe- 39 digito, ipsi plantæ appositũ, & cetera vt par numerus fuerit seruatus. Posteriores verò, cũ instru-  
 ab huma- 39 menta omninò ambulationis salubria sint, nullam habent in manu proportione respondente par-  
 nis differe- 39 ticulam. Reliqua igitur pars pedis iambarũ nec, prorsus est similis, nec; iam omninò dissimilis  
 p. 1. cõdit. 39: sed vt solũ decebat ipsam inter opposita ponendam, vtriusq; naturã moderatè imitari. Sic ipse  
 cap. 11. vi- 39 tarsus cõstitutus est. n. Mentionem autem faciemus huic etiam sumę pedis. Nõ enim sicut manus  
 in sine pri- 39 tarsus solũ magnũ digitũ habens cursum imitatur dactilicula monstrabat. p. humanę manus: Ita &  
 nis cuius 39 pes in cõstructione vnus particule cuiusdã vniuersi, differt ab humano; sed in pluribus diuersus  
 libri. & 1. 39 est. Distant enim plurimũ iuicidẽ digiti, & multò sunt ipsius manus digiti maiores. Quam autẽ  
 e. post prin- 39 cipem. oportet.



operabat maximū esse aliorum, minimus est. Non subiacent verò prepositi ipsi partibus, quæ  
 firmant plantam, neq; enim tuta omnino est basis eorum. Vt quæ cœcaua magis, vt manu facta  
 sig. Et crurum etiā natura nō est omnino recta ad spinam, vt hominibus: neq; ipsius genu flexio  
 similis est humanæ. Perierunt autem omnino ipsi, & quæ ad isthia sunt carnes retrorsam quidē  
 cooperentes, & occultantes meatum excretionibus superfuitatū destinatum. Sedentibus autem  
 super eas cōmodissimū futuræ munimentū aduersus subiecta corpora. Quare non modò sedere  
 bellè, neq; stare: sed ne currere quidē potest simia. Velocissimè autem prensans obuia manibus  
 ascendit, sicut et mures testæ, & leuia: eò q̃ cœcaua fortita est pedem, & digitos plurimum fidos.  
 Huiusmodi enim constructio circūplican curuis omnibus corporibus probè eū possit, & vndiq;  
 ipsa turo cōprehendere, idonea est his, quæ alta percipere nata sunt. .q. Postquam igitur ratiō  
 habili sit, vt nunc ostensum est, partiū tibiq; superiores quidē, quæ sunt post genu, foris sensitu  
 abicedere: inferiores verò, quæ sunt ad malleolos, intrò reuertit, par fuit ob id quoq; particularū  
 pedis altiores fuisse internas, vt tibiq; partes eam intrò inclinatas obferunt. Eratz; id, quod p̃ori  
 sermone .r. omissimus, quā vilitatem internarū partiū pedis exponeremus. Nullum igitur  
 ossis crurum ornamentū adhuc superest narrandum: sed magnitudo cuiusq; & paruitas, & pos-  
 sitio, & figura, & cōpositio, & quæ ex duritie spectatur differentia, tum ligamētā inuicem ter-  
 tia, & orbiculata summa tum prouidentia: tum arte à natura ipsa sunt comparata. Sunt autem  
 quamplurimè inter pedem, atq; manum cōuenientiq; multaq; etiā differentiq; quodam musculos  
 inquam, eorumq; origines, ac tendones: præterea quodam articulos, eorumq; motus. Item quodam  
 digitos, præsertimq; quodam pollicem, ac ipsos etiam vngues: quas omnes Galenus ipse libro de  
 viu partium tertio .f. perbellè declarauit. Verū extra nostrū propōitū sint: sat superè; nobis  
 fuerit eis, quæ ad ossa pertinent, pertransiuisse. Tempestiuum igitur est cum Galeno præsentī  
 libro colophonem imposuisse, sic scribente:

**TEXTVS TERTIVS.**

1. *Tὸν ἄριστον ἰσθμὸν τῆς ἀνατομικῆς ἀπὸ τοῦ εὐρυτέρου, καὶ τὸν ἐν μέσῳ εὐρώτατον τὸν ἰσθμὸν τῆς ἑσφαλῆς ἔστιν, ὁ δὲ  
 2. ἵσθμὸς ἔστιν ὁ ἰσθμὸς τῆς ἀνατομικῆς ἀπὸ τοῦ εὐρυτέρου, καὶ τὸν ἐν μέσῳ εὐρώτατον τὸν ἰσθμὸν τῆς ἑσφαλῆς ἔστιν, ὁ δὲ  
 3. τὸ ἰσθμὸν τῆς ἀνατομικῆς ἀπὸ τοῦ εὐρυτέρου, καὶ τὸν ἐν μέσῳ εὐρώτατον τὸν ἰσθμὸν τῆς ἑσφαλῆς ἔστιν, ὁ δὲ*  
 4. *Hæc sufficere mihi videntur introducendū tyronibus de ossibus didicisse. Horū nanq; com-  
 5. passio scelerosus est. Sin verò in aliqua alia parte paruum quoddam os inuenitur: quemadmodū  
 6. in corde, gutturisq; & naso, ac in digitorū aliquo sesamina nuncupata: necnon aliud aliud  
 7. huiusmodi dicere nunc necesse non est.*

**COMMENTVM TERTIVM.**

1. *Σημῆτις* Græcis non aliud, quam nobis aspicatū corpus, siue cadauer præfert, *παρὸ τῶν σπλάνα,*  
 quod est excoctio, siue atrenus. Remotis enim carnibus, ac reliquis alijs omnibus partibus emū-  
 data ossa quænia, sibiq; inuicem intereā iustā naturalem ordinem cōpacta simul excocta *σημῆτις*  
 nuncupantur. Vt de hoc vberibus libro de anatomicus administrationibus primo .x. locuti sumus.  
 Omissi verò tanquam tyronibus non adeò necessariā, multa paruula ossa. Vt illud imprimis est,  
 quod in corde inuenitur quibusdā animalibus solet: de quo nos antea .m. non nihil tetigimus. Vbi  
 etiā de gutturis ossē .x. meminimus, quod yodes appellant, atq; etiā sesamina vnde nuncupantur,  
 quæ in multis manū, atq; etiā pedū digitis obseruantur. De Nasī autem ossē, quod isthmoides,  
 siue spongiosè nuncupamus, tanquā de octauo capitis ossē, supra .y. etiā locuti sumus, vt nunc  
 repetere necessariū non sit: sed illud addam nonnulla. Inprimis de cordis ossē: q̃ scilicet illud  
 in homine visum ne per somnū quidē est, neq; chartilaginè, aut chartilag: sed aortæ, venæq;  
 arterialis radii, tanquā eorū visorū principū durior aliquantū est. In elephantis autē, & equis,  
 ac (vt nō temerè inquit Anistoteles .x.) in quodā boum genere inuenitur. Non temerè inquam,  
 plurima enim diuoriorū boum quantumvis veterum corda cum discussuerimus, in vno duntaxat  
 exquisitissimū os inuenimus, anno mellefimo quingentesimo trigesimo nono, notabilis quidem  
 magnitudinis: Adeò vt auricularis nostrū digitū secūdu os excederet, oblongū intereā, leuiterq;  
 cōpressum, quasiq; pyramidalè existens, grossius videlicet parte, quæ ad aortę radicē pertinebat,  
 vt cuius vasis amplior radii, circulariq; est. In cæteris verò bobus, tametī duram quandā, chartila-  
 gineamq; substantiā eodem in loco inuenierimus: vix tamen exquisitā chartilaginē maxima ex  
 parte, rarissimèq; hanc ossicam dici posse chartilaginem, multoq; minùs os chartilaginè cōpre-  
 ximus. Siue autē os, siue chartilago reperiat, duplex eius visus descriptus à veteribus est: Alter  
 2. quidem ab Anistotele, .r. quā si sic dicat [Cor sine ossē est omnū, quæ nos nouerimus, præ-  
 3. N n terquiam

terquam equi, & generis boum cuiusdā, quibus præ magnitudine quasi adminiculū subditū est: quomodo potū etiā corpus ossibus subfientatur, & continetur.] Alter verò vsus à Galeno .b. tanquam verior ostenditur, ac generalior: vt scilicet ligamentorū, siue membranarū, quæ hostiola vocant, arteriosorūq; vasorū, aortę scilicet, ac venę arteriosę principū, stabilitamentū; sit. Cūm igitur in homine tales os minuit, nisi quid vsū proportionale, reperiat. Expropter in nostris de humanorū ossū conclusionibus ipsū nullibi cōmueramus. .c. In gutture autem vt miramū tria, vt maximum tredecim ossa vnus nomine appellari prædicimus, .d. quod ioides diceretur. Cujus partes, clarioris doctrinę gratiā proprijs numeris tanquā nominibus designentur, à primo, vsq; ad vndecimū. Erit igitur primū, quod ceteris maius, latiusq;, ac corū basis quedā est, in tertia fig. A. B. in quarta autē D. figuratū. Foris quidē, antepusue gibbū, vt in tertia: intus verò, posternusue concauū, vt in quarta. Secundū verò, ac tertiu, quibus nullū os aliud annectitur, nullū q; scutiformi laryngis chartilagini alligantur, suis extremis H. H. vt vtraq; figura notatur, amboq; E. F. designatur, primi lateribus copulati, humilissus quidē: velut superius quartū, & quintū eadē annectuntur I. & K. vtrobiq; etiā notata prædictis inferioribus longiora, sed intemū angustiora.

Reliqua.

Reliqua verò tria, quæ vtrinq; superioribus addi solent, in altero tantū latere signantur in tertia figura, numerisq; in vtroq; eiusdē latere 6-7-8-9-10-& 11. Duplex igitur v. litterę figura ex huiusmodi ossibus resultat. Prima quidē ex ossē primo cū secūdo, & tertio, Altera verò ex eodē primo cum quarto, & quinto, alijsq; vtrinq; cōsequētib; Superiora tamen scilicet quartū, & quintū. Nonnunquā cū alijs annexis ad vndecimū vsq; numerū, præsertim; in mulieribus inueniuntur. Quo casu corū vicē supplet valdū quodā, oblongumq; nervosum ligamentū à styloide ossē excediens: quod in primi ossis prædicti superius latus inferitur; vt ipsū scilicet os vides superiore in parte fir. naret; tuncq; dūtaxat tria ( vt prædictū est ) ossa erunt. Sepennumero autē superiora etiā duo indurata reperiuntur scilicet quartum, & quintum, deficientibus adhuc reliquis, tumq; ossa quinque erunt. Procedente autem etate, quò magis siccescēdo indurescunt, quæ prædictis tanquā additamenta suppleunt: eò magis corū numerus augetur. Vt septē prius, deinde nouē, posteaq; vndecim, ac nonnunquā ( licet rarissimè ) ad tredecim quoq; perueniant. At exquissimè cuncta perpendamus. In primo igitur ossē tres obseruantur sinus: vnus quidē superius transfuersim: .c. in quem priororū musculorū vōdis secundū par. f. inferendū erat. Est autē os id anterius proprio quodā tubere prominens, .g. in cuius lateribus, dextro scilicet, ac sinistro alij duo sinus existūt, .b. in quos primū par musculorū eiusdē quoq; ossis propriū .i. inferuntur, ac deinde tertiu quoq; par, .k. & quartū .l. Ob propriū igitur vōdis ossis vsū hi tres sinus in ossē primo insculpti sunt: ob insertionem scilicet quatuor partū priororū musculorū. At id nō est totius huius ossis proprium munus: sed aliud quidē triplex. Primū vt lingvę basis quedā, ac stabilitamentū sit: Secundū vt eadē ratione ab hoc ossē lingvę musculi quatuor enascantur, siue para duo: primū videlicet, .m. ac secundū .n. Primū quidem ab ossē primo exoriens: .a. secundū verò à superioribus primis ossibus, quarto scilicet, & quinto originem assumens. Quanquā aliquādo ( vbi scilicet superiora illa ligamenta potius, quā ossa sunt, vt præsertim in mulieribus cōtingere solet ) ab humilioribus, secundo scilicet, ac tertio ossibus hi musculi exoriri inueniuntur. Tertiu verò tandē totius huius ossis vōdis munus est, vt laryngis quoq; cōmuniū quatuor musculorū principia ab eitis particulari ossē primo, parte scilicet inferiore, principū duxerint: videlicet primi paris, .p. & quarti .q.

Sed de hyoide ossē dicta instantiam hæc sint. Cumq; de nasi ossē, ac sesaminibus ( vt paulo ante iam tetigimus ) satis superq; prescriptum à nobis sit. Reliquum est, vt huius

nostro commentario colophonum imponamus, Deo; Optimo;

Maximo gloriam semper, & vbiq; de bonis omnibus ascri-

bentes. De ineptijs autem nostris humiliter ve-

niam petimus: Sanctissimę interim

Romanę Ecclesię cuncta

remittentes.

T E A O R



Primi ossis  
sinus tres.  
c. 3. fig. C.  
f. a. musc.  
tab. R.  
g. 3. fig. v.  
h. Ibidem.  
A. & B.  
i. 4. tab. g.  
T.  
k. Ibidem.  
Q.  
I. Ibidem V.  
V. 1. R. S.  
Muzera  
ria.  
m. 15. tab.  
fig. 14. &  
17. D. D.  
n. Ibidem E.  
o. 4. huius  
cō. fig. D.  
p. 16. musc.  
tab. fig. 1.  
& 2. F. & G.  
musc. tab.  
O.  
q. 16. musc.  
tab. fig. 3.  
& 4. K.

E O R V M  
 Q V A E H O C I N L I B R O  
 C O N T I N E N T V R,  
 I N D E X,

In quo Numerus, paginae superficiem, P. superficiei principium,  
 M. medium, F. finem praefert.

**A** *ααβα*. 152. M.  
*Acetabulum*. 25. F.  
*Acetabuli coxendicis ligamentum*. 242. M.  
*Acetabulum coxendicis quale*. 245. P.  
*Acetabulum acromij*. 202. P.  
*Acromij significatio quadruplex*. 200. M.  
 Eiusdem vsus. 201. F.  
 Eiusdem acetabulum. 202. P.  
*Actio summi humeri*. 30. F.  
*Actiones organici attribude*. 6. M.  
*Adiufcentia*. 21. F.  
*Addamentum*. Ibidem.  
*Αγνοησις*. 203. P.  
*Αμφοτε*. 40. M.  
*Ambulatio quomodo fit*. 248. M. & 272. M.  
*Anatomie imperiti recte curare nequibunt*. 3. M.  
*Anatome ab imperitis fycophantijq; neglecta*. Ibidem.  
*Anatomes cognitio quomodo chirurgis necessaria*. Ibi.  
 Quomodo physici. Ibidem.  
*Anatomes quod*. 3. F.  
*Anatome siccæ que*. 23. P.  
*Anatomicorum quorundam veterum error*. 121. F.  
*Anchyroides processus*. 203. M. (62. M.)  
*Andernaci error in translatione dictionis cypariacus*.  
*Andernaci quaedam excessatio*. Ibidem. F.  
*Ανευρις*. 21. F.  
*Αντιπυρετις*. 42. M.  
*Antra frontis cur semper munda*. 100. F.  
*Antra que sunt ad vocem comoda*. 99. M.  
*Antrovi generatio in ossibus*. 100. F.  
*Antrovi ossium capitis vsus*. 97. F. & sequentibus.  
*Antrovi ossium capitis vsus clariores*. 98. F.  
 Cur puerulis defint. Ibidem.  
 Quod valia, & non simpliciter necessaria. 99. P.  
*Antrovi capitis motus, & vsus*. 114. P.  
*Αρσενος, siue αψιδιου quid*. 24. P. & 26. M.  
 Unde dicitur. 27. P.  
*Αρσηνα*. 82. P.  
*Αρσηνα*. 85. P.  
*Αρο*. 27. P. (seq.)  
*Αποφυσις ab Epiphysi quomodo differt*. 21. F. &  
*Αρσηνα parum supra, & 22. P.*

Eius vsus triplex. 22. P.  
*Αποφυσις in capite vndecim*. 114. P.  
*Αρσηνα αποφυσις*. 84. M.  
*Appendix que*. 21. F. (16. P.)  
*Appendicam vsus secundum Galenum duplex*. 7. P. &  
*Appendices ossium quot*. 14. F.  
*Appendix ossium que*. 15. F.  
 In senibus enantit quomodo. Ibidem.  
*Quomodo in testibus perspicua*. Ibidem.  
*Appendicam numerus secundum Galenum*. Ibidem.  
 Mellior. 16. M. & sequentibus.  
*Appendicibus dotatorum ossium numerus*. 16. M.  
*Appendicum numerus in diversis partibus diversus*.  
 Ibidem, & sequentibus.  
*Appendicam vsus octo*. 19. P. & seq.  
*Appendicam symphyfis quomodo fit*. 49. P.  
*Απλαntatio*. 21. F. (sonantia. 99. F.)  
*Αρρηνσις error circa problematis expositionem de re-*  
*Αqua pericardij*. 109. F. (4. M.)  
*Αριστοτελις, Galeniq; de ossium generatione differentia*.  
*Αριστοτελις error de papilla actione qua debetur chry-*  
*stallino*. 5. M.  
 Error alius de aere auris interno quem ponit pri-  
 mum auditus organum esse. 7. F.  
 Error alius de virorum, & mulierum futuris. 63. P.  
 Error alius de triangulis virorum futuris. Ibidem.  
 Error alius de mulierum futura rotunda. 63. M.  
 Error alius de canum futuris. Ibidem. (74. F.)  
*Αριστοτελις defectus circa ossium aurium magnitudinem*.  
 Error alius de vena quadam in cerebro descendente.  
*Αριστοτελις descensio quodam cerebri siti, & vii. uo. M.*  
*Αριστοτελις error de maris dentium numero*. 136. F.  
 Error alius de maxillaribus dentibus. 140. M.  
 Error alius, & contradictio de osse cordis. 151. M.  
*Αριστοτελις defensio circa osstrum numerum*. 190. P.  
*Αριστοτελις, & Platoni error circa vnguam vsus*. 235.  
*Αρτηριανum vsus qualis*. 5. F. (F. & 236. F.)  
 Articuli quem vsus in manu praebant. Ibidem.  
*Αρτιculus quid*. 23. P. & F. quid apud Hippocratem  
 frequenter. 23. P. & 25. M.

*Articulus laryx sumptus quid.* 23. F. & 25. M.  
*Apu'd Galenum quid.* 24. P.  
*In presenti libro propriè.* 25. M. & F. & 26. P,  
*A'phor vnde dicitur.* 26. P. & 27. F.  
*A'phorid. 28. P.*  
*A'phorid. Ibidem.*  
*Arthroides. 28. P.*  
*A'phoridia vnde dicitur.* 28. F.  
*Arthrodia quid, & quotuplex.* 36. P. & seq. (37. P.)  
*Arthrodis nomen apud Galenum largius.* 35. M. & F.  
*Articularum ossium numerus propter motum.* 30. P.  
*Articularum omnium, & ossium in quibus sunt, numerorum epilogus.* 33. F.  
*A'rgit. 40. P.*  
*Auditus ossa.* 57. F.  
*Auditus organi musculus. Ibidem.*  
*Auditorius meatus cur ossis.* 94. P. & 17. M.  
*Cur labyrinthi instar flexuosus.* 95. P.  
*Auditus cur moros penetrat, visus verò non.* 100. M.  
*Auditus per palatum, & buccas.* 97. P.  
*Astragalus. 264. F.*  
*Eiusdem latera quotus.* 265. P. & seq.  
*Eiusdem situs.* 268. F.  
*Articulatio duplex.* 269. P.  
*Duplicis articulationis eius usus.* M.  
*Eiusdem magnitudo, & figura. Ibidem.*  
*Necessitas. Ibidem.*  
*Eiusdem cum calcaneo nexus.* F.  
*A'rgim. 264. F.*

## B.

**B** *Alamij verso commendatur, verbum tamen verbo reddere nonnunquam clarius, ac tutius est.* 1. M.  
*Balanij error circa quandam partem Galeni in proemio.* 42. M. (207. F.)  
*Error alius in interpretatione verbi φησίζω.*  
*Baldus que.* 212. M. & 40. M. (212. M. & seq.)  
*Baldus necessitas, situs, & usus, figura, & locus, Blasij à Septimo casus, & historia.* 253. M.  
*Eiusdem casus declaratio.* 254. F.  
*Curandi methodus.* 268. P.  
*Bibon que.* 47. M.  
*Brachium dupliciter.* 207. P. aliàs tripliciter. Ibid.  
*Brachiale cur ex pluribus ossibus.* 223. P.  
*Cur ex ossi, & vò plurib, neq; pauciorib.* 224. P.  
*Cur duobus ordinibus. Ibidem.* M. (224. F.)  
*Brachialis os rectum cur dicitur, & chartilaginofum.*  
*Bregmatic pulsatio vnde.* 81. F.  
*Bronca cur dentata nascuntur: homo autem non.* 130. F.  
*Bronca armis munita naturaliter: homo autè nudus, & intermis.* 238. F.

## C.

**C** *Calcaneus eius figura.* 266. P. & seq.  
*Calcanei cum astragalo nexus.* 269. F. eorundem  
*Calci error.* 9. 87. P. (vsus. M.)  
*Calx.* 266. P.  
*Καπέρον. 83. P. quib' differt ab ἰγγροσπονδύ. Ibidem.*  
*Καπέρον, & καπέρα. Ibidem.*

*Caput prominens, & depressum quod est.* 28. P. & seq.  
*Caput quomodo ad cervicem refertur, in quibus cervix deest.* 39. F. (Ibid.)  
*Capitis solutionis modi quinque.* 82. F. qui periculofiores,  
*Capitis ossa propria que.* 72. F. diversa substantia. 78.  
*Capitis figura & deprivante quotus.* 64. M. (M. & seq.)  
*Caput sine cervice potius tubus, aut protuberatio, aut tuberculum, seu prominentia dicendum.* 39. F.  
*Capitis figura triplex.* 61. M. & 62. P.  
*Capitis anticuli triplex securitas.* 169. P.  
*Caput sine suturis.* 66. F. An salubris. Ibid.  
*Caput quomodo in ossium computatione capimus.* 13. P.  
*Capita monstrifera multa.* 65. F.  
*Capitis ossium magnitudo.* 74. F. (85. P.)  
*Capitis parte vulnerata quomodo altera respondet.*  
*Capitis ossium propria foramina.* 89. F.  
*Cardinamentum.* 29. P.  
*Cardinis ratio secundum Celsum.* 42. P.  
*Caroli Stephani error de bregmatic pulsatione.* 82. M.  
*Carpi, manusq; dearticulatio.* 215. P.  
*Carpi totius figura.* 226. P.  
*Καρπία. 83. P.*  
*Cavernarum ossium capitis usus clariore.* 98. F.  
*Cavitatis ossium abusus.* 11. M. (plex. Ibid. F.)  
*Cavitatis ossium ratio duplex.* 11. P. immo quadracavitatis frontis usus. 110. M.  
*Celsi error de capite sine suturis.* 66. F.  
*Error alius de capitis suturarum numero.* 71. F.  
*Error alius circa brachialis ossis numerum.* 222. M.  
*Centauroij generatio, nutritioq; impossibilis.* 247. P.  
*Κεφαλή, & κεφαλή i deit' caput.* 34. P. & 40. P.  
*Cerebrum nobilissimum omnium membrorum.* 59. M.  
*Forti septo muniri oportuit.* 60. P.  
*Cerebri vera pulsatio que.* 82. P.  
*Cervix que dicitur.* 21. P. non sine capite. Ibid.  
*Cervices que sunt.* 28. P. & seq.  
*Cervix oblonga, & depressa que.* Ibid. M. & seq.  
*Cervix oblonga, caput tamen depressum.* Ibid. F.  
*Cervix nulla, caput tamen depressum.* Ibid.  
*Interdum quoq; prominens.* 39. P.  
*Cervix depressa, caput tamen oblongum.* Ibid. M. & seq.  
*Cervicis necessitas.* 154. F.  
*Cervix humeri que.* 209. M.  
*Chartilaginij macronate usus.* 190. M.  
*χάρτιν. 40. M.*  
*χάρτιν. 162. M.*  
*χάρτιν, & χάρτιν. 49. M.*  
*Clavicula, & eius usus.* 203. F.  
*Usus alij.* 205. F.  
*Clavicularum signa & caniter.* 206. P.  
*Foramina. Ibidem.* F.  
*Claves vnde dicantur.* 204. F.  
*Cur dicantur etiam surede.* Ibid.  
*Cur dicantur etiam inguli.* Ibid.  
*Clavium cum scapulis opportuna connexio.* Ibid. M.  
*Κλαυδία. 76. M.*  
*Coccygis usus.* 188. P.  
*Vnde dicitur.* 186. F.  
*Cur ex tribus ossibus.* 156. M.

Coccyz necessitas. 155. P.  
 Cochlea in auro. 8. M.  
 Collis yfus triplex. 155. F.  
 Colli spondylorum processus bifidi. 168. M.  
 Colli vertebrarum nexus cur laxior alij. 169. P.  
 Columbi error de zygomatis cavitate. 118. M.  
 Condyli, epiphyfes, & capita quomodo differunt, vel idem sunt. 19. F. 20. P. & 40. P.  
 Condyli dupliciter. 147. M.  
 Cordis os. 151. M. & 276. P.  
 Cordis capsule aqua. 109. F.  
 Cornari error in interpretat. 87. P.  
 Corona in capite. 116. M.  
 Κορωνοειδής ἡ διήκων κνήμη. 202. F.  
 Coronalis future. 62. M.  
 Corone que dicitur. 21. P. & 40. P.  
 Κορωνοειδής ἡ διήκων κνήμη. 202. F.  
 Κορυνη, κρηνη, & κρηνη. 40. M. & 202. F.  
 Costra prima maxima ex parte sum sterni osse prima coalescit. 31. P.  
 Costra decima novamquam duplici articulo connectitur, novamquam triplex. 30. F. ut plurimum tamen duplex articulatio est. 36. M.  
 Costarum cili sterni articuli enarthroses sunt, non anarthrosidie contra Galenum. 35. M.  
 Costarum ad sternum dearticulationes. 192. P.  
 Coste notae cur dicitur. 194. M. & 195. F.  
 Coyle quid. 25. M. & 40. P.  
 Κορυνη. 40. M.  
 Coxendicis acetabulum. 245. P.  
 Coxendicis acetabuli ligamentum. 242. M.  
 Coxendicis yfus quadruplex. 243. P.  
 Coxendicis musculi. M. & sequentibus.  
 Coxendicis significatio sexplex. 241. F.  
 Coxendicis predicta. 244. M. & seq.  
 Coxae ossifera. 241. P.  
 Cranium inde dicitur. 6. F. 51. M. & 59. P.  
 Ex Gallica lue corrosio periculum. 7. P.  
 Κρηνη. 51. F. & 59. P.  
 Cribriforme os. 76. M.  
 Eius yfus. 113. M. & seq.  
 Cribrum duplex. 114. M.  
 Cribrorum differentia duplex. 107. P.  
 Cribrum nasi. 213. P.  
 Cribrum subadena an conveniat. 112. M.  
 Cranium alio que. 5. F.  
 Crux propter motum. 272. F.  
 Crystallini alio. 5. M.  
 Κρηνη. 37. P.  
 Cubitus dupliciter. 207. P.  
 Cubiti, manusq; & carpi dearticulatio. 215. M.  
 Cubiti ad carpum articulatio duplex secundum Galenum.  
 Cubiti styloidei verus yfus. 221. F. (220. F.)  
 Cubiforme os. 267. M.  
 Cuccus. 186. F.  
 Cuneus. Ibidem.  
 Cuneiforme os. 47. P.  
 Cuneiforme os. 70. P.  
 Cutis yfus. 5. F.

Κυβηδης os. 267. M. & 268. F.  
 Κνίδωρον. 137. P.

D.

Derepitis que ossa desunt. 13. F.  
 Deloidei ossis inventio prima. 7. F.  
 Dentium yfus. 7. P. & 134. F. Qui quadruplex est. Ibidem.  
 Dentes concavi. 10. F.  
 Dentium sensus. 15. P. & 135. M.  
 Dentes an habeant appendices. 16. M.  
 Primos habere appendices absurdum non est. 19. F.  
 Ipsorum substantia nuda cur dicitur. 20. P.  
 Dentium natura an sit ossis, questio pro sophyphis. 130. F.  
 Dentata cur nascuntur bruta, homo autem non. Ibidem.  
 Dentes cur renascuntur. 131. M.  
 Dentes cur bis homini nascuntur. 132. P.  
 Quomodo in eis reconditi. 132. M.  
 Quomodo ex yfium excremento. Ibidem.  
 An semper augentur. 134. M.  
 Cur quidam adentuli. 132. F.  
 Dentitionis tempora quatuor, vel quinque. 133. P.  
 Dentium nutrimentum. 134. F.  
 Dentium substantia, & medulla. 9. F.  
 Incisoriorum numerus. 136. M.  
 Caninorum numerus. Ibidem.  
 Dentium positio concinna. 137. F.  
 Dentium incisoriorum, & caninorum radices. 138. P.  
 Superiorum radices cur plures. 138. F.  
 Dentium ordo simplex. Ibidem. (141. M.)  
 Dentibus salis nervi inter ossa insunt propter sensum.  
 Dentium castitatis membrana. 142. M.  
 Dentibus sumpta prognostica. 143. P. & seq.  
 Dentium predicta. 145. P. & seq.  
 Dentiformis processus positio cur anterior. 163. F.  
 Δερμὶς. 51. M.  
 An in compositione quid. 27. P.  
 Δερμοὶς. 84. M.  
 Δερμοὶς. 27. P. (27. P.)  
 Amphymus propter motum manifestus. 2. F. 23. F. & Vnde dicitur. Ibidem.  
 Dionysiffi. 116. F.  
 Δερμὶς. 183. P.  
 Digiti pedum quomodo necessarii. 6. P.  
 Digitorum articulatio. 215. F.  
 Eorū ossa propter melius. 233. M. (stiones in seq.)  
 Digiti cur ex plurib' ossibus. Ibidem. Et multa alia que-  
 Digitorum articulationis supervilla. 235. P.  
 Chartilaginea incrustatio. Ibidem.  
 Vnctuosus humor. Ibidem.  
 Digiti concavis, vel distensis cur sonus editur. 237. P.  
 Desum quomodo in affum numero capitus. 13. P.  
 Δερμοὶς. 137. P.  
 E.  
 Ε'κτιορα. 84. P.  
 Ε'κτιορα. Ibidem.  
 Ε'κτιορα. Ibidem.  
 Ε'κτιορα. 23. P.  
 Ε'κτιορα. 75. P.  
 Ε'κτιορα. 25. M.

Edenti quomodo masticant. 7. P.  
 Elytra. 84. M. & F.  
 Elytra. 84. M.  
 Elytra. 83. F.  
 Elytra. 75. M.  
 Elytra. Ibid. & 76. P.  
 Elytra; & illo. 83. P.  
 Elytra. 25. M.  
 Elytra. vnde dicitur. 28. F.  
 Quid, & quod. 34. P. & seq.  
 Elytra. 84. P.  
 Elytra. 28. P. & F.  
 Dicitur à verbo. 28. F.  
 Elytra. 193. M.  
 Elytra. 83. M.  
 Elytra. 27. F.  
 Elytra. 15. F. & 21. F.  
 Epiphyse, capita, & condyli an idem, vel different.  
 Epiphyse quid. 21. F. & seq.  
 Epiphyse in capite sex. 114. P.  
 Excessus. 22. P.  
 Excrementorum nomenclatura. 59. F.  
 Excrementorum expurgationis modus. 107. M.  
 Excrementorum digestio. 127. F.  
 Que per nares. 108. P. & seq.  
 Que per oculos, & aures. 109. M.  
 Que per palatum. Ibidem.  
 Exollosis. 116. M.  
 Explantatio. 22. P.  
 Expurgationis situs duplex. 107. M.  
 Expurgatio per suturas inferiores. 109. P.  
 Eudem circa manus, pedesq; pollicem. 274. F.  
 Euflachij error de goniorum etymo. 139. F.  
 F.  
**F**allopj error circa sextam musculorum cervicis  
 coniugationem. 162. P.  
 Femina si pubes à viris octo modis differunt. 246. P.  
 Femoris magnitudo. 246. F. & 248. F.  
 In brachis præter finem brevior. 248. F.  
 Femoris appendices. 249. P.  
 Sinus. F.  
 Cervix. Ibidem.  
 Caput supernum. 249. M.  
 Caput infernum. 250. M.  
 Femoris figura que. 252. P. & seq.  
 Propter ambulare, & stare. Ibidem.  
 Propter sedere. Ibidem.  
 Propter similitudinem altero tantum cruce. Ibidem.  
 Femoris prædicata. 255. M. & seq.  
 Fibule vsus quadruplex. 258. P.  
 Fibule ad radium comparatio. M.  
 Fibule figura, linea, & latera. F.  
 Inferioris appendicis eius situs duplex. 261. F.  
 Figura capitis depravata quatuor. 64. F.  
 Foraminum ossium capitis epilogo. 103. F.  
 Frontis cavitas, & eius vsus. 109. M.  
 Frontis ossis figura. 74. F.

Frontis autra eor semper munda. 100. F.  
 Foramina propria quatuor. 103. P. (105. F.  
 Fuchsi, & Renati error quòd Galeni intentionem,  
 Furcula vnde dicantur. 204. F.

**G**aleni defectus circa ossium concavorum, & me-  
 dullarum numerum. 10. F.  
 Galeni error de ossium medulla. 11. M. (11. F.  
 Error alius de leonij, aquilinarumq; ossium cavitate.  
 Error alius de appendicibus vsib; 16. P. & M. & 18. F.  
 Galeni error de appendicium numero. Ibidem.  
 Galeni error de appendicium substantia & duritie. Ibidem.  
 Galeni contradictionis cuiusdam solutio circa nomina  
 epiphyse, condyles, & capita. 20. P.  
 Galeni loci. 24. M. alius. 28. P. alius. 45. P. alius  
 63. F. & 22. F. & 26. F.  
 Galeni defensio circa synarthrosos definitione. 24. M.  
 Galeni error circa costarum cum sterno articulos. 35. M.  
 Galeni sententia vna expositio circa cervicem, & ca-  
 pit. 39. M.  
 Galeni defensio circa vertebrarum zinglymon. 41. M.  
 Alia defensio à Vesalij calumnia. 50. M. (& seq.  
 Galeni increpatio à Vesalio de ossium substantia. 51. P.  
 Galeni error de sutura lambdoidis ad crassioris mēbra-  
 ne duplicationem rectitudinem. 60. F.  
 Galeni defensio quartam acuminati capitis figuram  
 abnegantis. 100. 66. P.  
 Galeni defectus in suturarum epilogo. 66. P.  
 Alius circa sextam, & septimam suturas. 74. P.  
 Alius circa quandam suturam communem. Ibidem.  
 Alius circa maxille inferioris duplicitem. Ibidem.  
 Galeni error circa ossum temporum figuram. 74. F.  
 Galeni error duplex in declaranda ossium substantia. 75. F.  
 Galeni defensio circa ossium duritie ordinem. 80. M.  
 Galeni error de Bregmatidis pulsatione. 81. F.  
 Alius error de maxilla inferioris ad caput articula-  
 tione. 88. M. (11. 90. M.  
 Error alius de foraminis primi sphenoidis latitudi-  
 Galeni error circa foramen maxilla superioris secun-  
 dum. 91. F.  
 Error alius excusabilis circa arteria carotidis pro-  
 paginem ad cerebrum ascendentem. 92. P.  
 Galeni error de obliquis aurium flexionibus. 95. M.  
 Error alius de quòd ossis resporis foramine. 95. M.  
 Galeni, & Vesalij error de arteria transitu per foramen  
 commune. 103. P.  
 Galeni detractionis error de sphenoidis cerebro. 106. M.  
 Galeni error de spongiosis similitudine. 147. 104. M.  
 Galeni error de cerebri positione. 110. M. (113. M.  
 Galeni contradictiones due proponuntur, & solvantur.  
 Galeni error circa maxille superioris suturas. 120. P.  
 Eiusdem erroris causa que. Ibidem.  
 Error alius circa foramen sutura communis subiectum.  
 120. M. Causa erroris. F.  
 Error alius circa suturam communem. 120. F.  
 Galeni error circa osse quibus capitis maxilla superior  
 committitur. 121. M.  
 Eiusdem

I N D E X.

- Eiusdem erroris excusatio. Ibidem.  
 Eiusdem excusationis reprobatio. Ibid.  
 Galeni error circa quosdam capitis suturas. 121. F.  
 Error alius circa suturas eanum, homini attributas. 122. F. (125. P.)  
 Galeni error de quodam superiorum axille extremo  
 Error alius de sutura erū max. super. numero. 126. M.  
 Galeni error de malorum osium crassitie. 127. M.  
 Error alius de molarium radicibus. 128. P.  
 Error alius de radicibus diversitate. 128. M.  
 Error alius de eisdem. Ibidem.  
 Galeni error de inferioris maxilla duplicitate. 146. P.  
 Error alius de eiusdem dearticulatione. 148. P.  
 Error alius penes eandem. Ibidem.  
 Galeni excusatio in simiis. Ibidem. (148. M.)  
 Galeni error de maxilla inferioris articuli defensione.  
 Error alius de vertebrae cavitatibus. 151. F.  
 Galeni error de osse coccygis. 155. M.  
 Galeni excusatio pro eodem. Ibidem.  
 Galeni error de osium coccygis unione. 157. F.  
 Error alius circa prima vertebrae cavitates. 161. P.  
 Error alius circa prima vertebrae musculis. 161. F.  
 Galeni error circa rationem duritiae prima vertebrae. 165. P.  
 Error alius quoad primum primae vertebrae aterioris processum osium. 166. P. (166. M.)  
 Galeni error quoad transversos primae vertebrae processus  
 Galeni error circa prima vertebrae foramen. 167. F.  
 Error alius quoad allatum vertebrae foramina, seu circulos. Ibidem.  
 Galeni contraditionis solutio duplex. 172. P. & seq.  
 Galeni error quoad lumborum vertebrae processuum magnitudinem. 173. M.  
 Error alius quoad transversorum processuum vertebrae thoracis vertebrae defectus rationem. 174. P.  
 Error alius circa eandem declivitatem. Ibidem.  
 Galeni error circa thoracis vertebrae. 230. 174. M.  
 Error alius circa foraminum vertebrae thoracis magnitudinem. 13. P. (cessus. 176. P.)  
 Error alius circa transversos thoracis vertebrae processus  
 Error alius circa eosdem. 176. M.  
 Galeni error circa processus acclives, & declives. 177. P.  
 Error alius circa nonnulla vertebrae foramina. 179. M. (179. F.)  
 Galeni error circa quosdam declives lumborum processus  
 Error alius circa os sacrum. 181. F. (P.)  
 Error alius quoad os sacri processus transversos. 182. M.  
 Galeni error quoad ossis sacri partes. 184. M.  
 Galeni apparentis contraditionis solutio. Ibidem.  
 Galeni error circa coccygis partes. 184. F. (185. M.)  
 Error alius circa nervorum ossis sacri coniugationes.  
 Galeni error de coccygis nervis. 187. P.  
 Galeni contraditio. Ibidem. (synarthrosim. 189. F.)  
 Galeni defectus quoad vertebrae articulationes siue  
 Galeni contraditionis solutio duplex. 190. M. & seq.  
 Galeni error circa cuiuslibet costarum ad vertebrae dearticulationem. 191. P.  
 Galeni error quoad humeri magnitudinem. 207. P.  
 Eiusdem excusationes. Ibidem.  
 Galeni defensio de inconstantia sibi attributa. 203. P.  
 Galeni error quoad humeri tuberculi medij usum. 20. M.  
 Error alius de tuberculi humeri interni magnitudine.  
 Erroris huius causa. Ibidem. (Ibid.)  
 Galeni error circa ossis humeri externam gibbositatem. 213. F.  
 Galeni error quoad radii ad humerum, carpiq; ad cubitum dearticulationem. 215. F.  
 Error alius circa digitorum ginglymon. 216. P.  
 Galeni error quoad styloidei processus ad brachiale dearticulationem. 221. M.  
 Galeni contraditio. 225. P. Eiusdem solutio. M.  
 Galeni error circa quartum, siue oclavi carpi os. 225. M.  
 Galeni defensio quoad osium carpi medullam. 226. P.  
 Error alius circa tertij ossiculi cavitatem. 227. F.  
 Galeni error circa ossis carpi cum radio, & carpo dearticulationem. Ibidem. (usum. 228. P.)  
 Galeni error quoad noni ossis scilicet sesamoidei carpi  
 Galeni, & Vesalii error quoad musculorum in metacarpo positorum usum. 231. M.  
 Galeni error circa digitorum articulationem. 235. F.  
 Error alius circa laterē sub poplite musculi. 230. F.  
 Galeni error quoad calcis substantiam. 266. M.  
 Galeni error quoad astragali ad naviculare os articulationem. 265. P.  
 Galeni error circa cubiforme os. 270. M. (192. F.)  
 Galeni error quoad costarum cum sterno dearticulationem.  
 Galeni vera defensio de sphenoidis cribro. 107. P.  
 Eiusdem vera sententia. F.  
 Gelasine seu ypacris, idest ridentes. 137. P.  
 Genu articulus non ginglymo, sed duplici enarthrosi  
 Genuini dentes. 140. P. (ligatur. 31. M.)  
 Ginglymos quid. 40. F.  
 Ginglymos unde dicitur. 28. F. Graec. Τγγλυμος.  
 Ginglymoides. 28. P.  
 Τγγλυμοειδής. 28. F.  
 Ginglymos apud Aristotelem. 29. P. & 43. P.  
 Ginglymos quinquagesimus. 40. F. & seq.  
 Ginglymi essentia in duobus consistit. 41. P. & 43. P.  
 Ginglymationis ratio secundum Celsum. 42. P. (43. M.)  
 Ginglymi vertebrae improprie, sed potius artrodiar.  
 Glenc. 25. M. & F.  
 Γλινκ. 40. P. & M.  
 Gomphosis synarthrosos species quomodo. 24. M.  
 Gomphosis in quibus. 30. P.  
 Gomphosis motus involuntarius. 44. M.  
 Gomphosis quid. 47. M.  
 Unde dicitur. Ibidem.  
 Gomphosis clavis. Ibidem.  
 Gomphosis quae, & quae. 47. F.  
 Gomphosis an sit symphysis. 47. M.  
 Gomphij dentes unde dicantur. 139. F. (276. M.)  
 Guttae os hyoidei, hyphloidei, & lambdoidei. 12. P.  
 Ex quae ossibus constat. 12. M.

H.

**H**armonia synarthrosos species. 24. M. & 46. M.  
 Harmonia in quibus. 30. P.  
 Harmonia motus involuntarius. 44. M.

Harmo-

Harmonia quot, & que sit. 46. M. (71. M.)  
 Hippocrati attribuiti libri error circa futuram membra  
 Hippocratis locus expofitus de capitis dolore illo,  
 quod dicitur fedet. 84. F. 1.  
 Homini offa cur neceffaria. 6. F. 1.  
 Homo folus flat erectus. 150. M. & 247. P.  
 Solus fedet. 190. M. & 247. F.  
 Solus inter animalia fapient, & finitus. 239. F.  
 Solus fine artibus, & armis uofitur. P. 1. 150. P.  
 Homo manibus, & artus in parte, & in bello utitur  
 Solus inter pedoftria uere bipes. 247. P.  
 Humerus. 207. P.  
 Humeri articulus in homine cur a thorace diftat.  
 Humeri ceruix que. 209. M.  
 Humeri processus intus ufus. 210. P.  
 Tuberculi externi ufus. 210. P.  
 Tuberculi medij ufus. 211. P.  
 Humeri articulationis profeffio quatuor. 208. P.  
 Humeri os cur fimplex. 214. F.  
 Humeri denticulatio cur laxa. 215. M.  
 Hyoidis os. 151. M.  
 Hyoidis officina pofitio ab artibus, & no per articulu  
 Hyoidis os idem hypofoides, & lambdoides dicitur  
 quod gutturis os efl. 12. M.  
 In tendis officali in aure ufus. 7. M.  
 Quod molari cur affimilatur. Ibid.  
 Infantium offa que non addit uere. 14. M.  
 Cur pauca, quia iunenum. 13. F.  
 Infantium uertebrae u diffinitio. 14. P.  
 Alorum offium diuifio. Ibid.  
 Infantium offium nomen. 13. F.  
 Infantibus, & uentriculorum crebra aqua. 109. F.  
 Intermitti. 233. P.  
 Juguli cur dicuntur. 204. F.  
 Cur unde dicuntur. 222. F.  
 Eius fignificatio fimplex. Ibid.  
 Cras. 40. M.  
 Hydus. 76. F.  
 Hydus. Ibidem.  
 Hydus. 103. M.  
 Hydus. 85. F.  
 Hydus. Ibidem.

**L**abyrinthus in auro. 8. M.  
 Labyrinthum generatio quomodo fiat. 111. M.  
 Quomodo per gaudium. 111. F.  
 Quomodo per rifum. Ibidem.  
 Lambdoides sutura. 62. F.  
 Lambdoides os. 122. M.  
 Leonis brachium. 16. M.  
 Libri praefentis titulus. 2. F.  
 Ligamenta. 50. F.  
 Quem uifum in manu praefent. 5. F.  
 Cur peris putata fuit. 134. P.

Lumborum neceffaria. 54. F.  
 Lumbi cur ea quing, uertebrae. 156. M.  
 Lumborum uertebrae reliqua expofitio. 173. F.  
 Lumborum uertebrae quae praedicata. 180. P. & feq.  
 Macecepti in capite habent oblongi. 67. F.  
 Mallei officium in auro uifum. 11. M.  
 Mammularum proceffus fubstantia. 88. M.  
 Manus, carpij, & cubiti denticulatio. 215. P.  
 Manus partium ufus. 15. F.  
 Manus actio quae. Ibidem.  
 Manus communiter quae. 106. F.  
 Cuius partes tres. Ibidem.  
 Manus proprii. 207. P.  
 Manus dupliciter. 222. P.  
 Manus organum. 238. F.  
 Manus organum organorum. 149. F.  
 Manus, & pedis conuenientia, & differentia. 268. P.  
 Maxilla inferior. cur appendicem non habet, ratio  
 duplex. 20. M. & feq.  
 Maxilla fuperior efl. Ibidem.  
 Quot musculorum principum efl. 21. M. & feq.  
 Maxilla fuperioris offa duodecim. 47. P.  
 Maxilla fuperioris futura. 119. P. & feq.  
 Capiendo tamen futurae nomen large. 119. M.  
 Sententia eufdem fecundum Galenum. 119. F.  
 Maxilla fuperioris futurae proprii & communes. 124. M.  
 Maxilla fuperioris offium ufus, & alia praedicata. 127.  
 Maxillares dentes. 140. P.  
 Maxilla inferioris cartilago peculiaris. 148. F.  
 Maxilla inferioris praedicata. Ibid. & feq.  
 Eufdem os uicium tantum. 74. M.  
 Medulla nomen dupliciter. 10. P. & F.  
 Medulla offium nutrimentum. 9. F. fecundum Galenum.  
 Medulla cephalica. 10. M.  
 Medulla offium nutrimentum non efl contra Galenum  
 Opinio propria. 11. F.  
 Membra ueris ufus. Ibidem.  
 Meletii error de gomplofofo etymologia. 140. P.  
 Membra fimplicia quadruplicia. Fuit fcilicet propter  
 affionem, tria uero propter uifum. 51. M.  
 Membrorum fimplicium ufus triplex. Ibid.  
 Metacarporum ufus. 5. F.  
 Metacarpj offa. 239. M.  
 Eorum magnitudo. 233. P.  
 Molarium nomen. 221. F.  
 Molares cur artibus dicuntur. 226. M.  
 Molarium fubstantia, forma, magnitudoq, & cur di  
 Molarium dentes. 138. P.  
 Alia. 140. P.  
 Momijs, Gracae uifum. 140. M.  
 Moftriofa capita diuerfa. 77. M.  
 Motus efl primus natura fopori. 11. M.  
 Motus uicinali quatuor maxime proprii. 23. M.  
 Mufcularum cartilagineus ufus. 190. M.  
 Mulieris uero generis offa. 18. M.  
 Mufculi, & aliorum multorum error, de fetujs mendofis  
 Mufculi in auro ufus. 6. M.



Musculus temporalis cur additus. 117. M.  
Mūs. 140. P.

N.

**N**asi cribrum. 113. P. (11. P.)  
Natura scopi in animalium generatione duo.  
Natura maxima, precipuaque intentio. 59. M.  
Natura iustitiae circa futuram numerum, & positionem. 63. M. & seq.  
Nasculare os. 167. M. (tur. 4. P.)  
Nervi, & ossa secundū Aristotelem quomodo generentur.  
Nervorum ophthalmicorum usus quis. 15. P.  
Nervi quem usum in manu praestant. Ibid.  
Nixus, & slopax. 49. M.  
Nervorum genera tria. 50. F.  
Quare sic dicantur. Ibidem.  
Nervi voluntarii. Ibidem.  
Nervi proprie dicti qui. 51. P.  
Nervi velut rami. 150. F.  
Nervorum cerebri distributio qualis. 169. M. & seq.  
Nervorum pars. 160. F.  
Nomina interdum fingere oportet. 28. F.  
Nativitatem ossium medulla secundū Galenum. 9. F.

O.

**O**ccipitis ossis substantia. 79. M. (101. P.)  
Foramina, horumque figura, magnitudo, & usus.  
Occipiti, & temporali foramina communia. F.  
Oculorum, & aurium expurgatio. 109. M.  
Oculus. 26. F.  
Olor dupliciter. 208. F.  
Olym. 40. M.  
Olym. 140. M.  
Ossium consideratio per se que, & quotuplex. 2. P.  
Ossium liber primo legendus. 3. F.  
Ossa omnium membrorum succissima. 4. P. (4. F.)  
Totius corporis fundamenta, sicut in orbe terra est.  
Ossium temperamentum, sicut & aliarum partium simularum, forma substantialis eorum est. 1. P.  
Ossium anatome quomodo ceteris praeferenda. 3. F. & 5. P.  
Ossa, & nervi quomodo secundū Aristotelem generentur. 4. P. (res differentia. 4. M.)  
Quomodo secundū Galenum, & que inter hos autbo.  
Ossium usus quinque diversi. 4. F. & 6. M. & seq.  
Ossium varietati succedit aliarum partium varietas. 4. F.  
Ossium usus in manu ad bene esse. 5. F.  
Ossibus carent multa animalia. 6. M.  
Ossa homini cur necessaria. Ibidem.  
Ossium actio nulla. 6. M.  
Ossiculorum auditus usus. 7. M.  
Ossium differentia penes magnitudinem. 9. M.  
Penes substantiam. F.  
Ossium nutrimentum medulla secundū Galenum. F.  
Ossa concava quot, & que. 11. P.  
Cur concava, & medullosa secundū Galenum. Ibidem.  
Ossium figurarum distinctiones quatuor. 12. P.  
Ossium numerus diversus secundū Galenum. M.  
Os gutturis hyoides, hypsiloideus, & lambdoideus. Ibidem.

Ossa à Galeno praetermissa lib. de ossibus quot, & que. F.  
Ossium numerus diversimode per sex conclusiones declaratur. F. & 18. M. & F.  
Ossium appendices quot sunt. 14. F.  
Foramina, & eorum usus. Ibidem. & seq.  
Ossa non sentiant. 15. P.  
Quomodo perossii ratione per accidens. M.  
Ossium numerus in praegante muliere. 18. M.  
In infantibus. F.  
Ossium compositionis causa quing. 23. M. (27. P.)  
Ossium compositio, seu coherentia, seu structura idem.  
Ossium numerus, que sunt propter motum. 29. M.  
Que sunt propter quietem. Ibidem. & seq.  
Os cultriforme. 47. P.  
Ossa auditus. 57. F.  
Ossium structura, sive compositionis figura. 58. P.  
Os palati. 72. M.  
Os sphenoides parum supra.  
Ossa capitis proprie qua. Ibidem.  
Secundum Galenum que. 73. M.  
Ossium simplicium figura. 74. P.  
Ossium temporis figura. Ibidem.  
Ossis frontis figura. Ibidem.  
Ossis occipiti capitis foramina. 76. M. & 103. M.  
Horum foraminum usus. 76. F.  
Cur tortuosa. 77. P.  
Quomodo tres usus horum sibi invicem simulantur. M.  
Ossium temporis substantia que. 78. F.  
Foramina duodecim, & usus. 94. M.  
Diversio qualis. 78. F. & 79. P. (80. P.)  
Ossium substantia duritiei ordo secundū Hippocratem.  
Os tenue apud Hippocratem largius. F.  
Ossis petrosi duritiei rationes quing. 87. M.  
Cur asperum. 88. M.  
Ossis occipiti capitis substantia. 89. P.  
Ossium capitis propriorum foramina. F.  
Ossis occipiti capitis partes quatuor. 104. P.  
Eiusdem comparatio ad palatum. Ibidem.  
Ossium capitis diversa substantia. 78. M. (& M.)  
Ossium capitis, & suorum praedicatorum epilogus. 114. P.  
Ossium cognitio quibus morbis necessaria. 115. P.  
Ossium usus precipuus duplex. 134. F.  
Os cordis. 151. M. & 276. P.  
Os sacrum vnde dicitur. 181. P.  
Eiusdem figura. M.  
Eiusdem ad vertebrae comparatio. Ibidem.  
Ossa in digitis propter melius. 233. M.  
Ossa. 22. F.  
Ossa. Ibidem.  
Ossa. Ibidem.  
Ossa. 23. P.  
Ossa. 22. F.  
Ossa. 141. F.  
Ossa. 40. M.

P.

**P**alati os. 72. M.  
Palpebrarum usus quis. 5. M.  
Patella os quale. 262. P.  
Usus triplex. 263. F.

Substan-

- Substantia eius qua. 262. M.  
 Figura qua. Ibidem.  
 Sicut ratio cur scilicet in anterioribus. 264. P.
- Παράρτημα** 4. v. d. 12. M.
- Pectus**. 189. P.
- Pectus ossa quot sunt**. 13. P.
- Pedes brutorum qui**. 150. M.
- Pedis ossa quot, & que**. 264. M.
- Pedum digiti quomodo necessarii**. 6. P. (C. M.)
- Pedis, & manuum differentia, & convenientia**. 268. P.
- Pedist.** 271. P.
- Pedes cur oblongi, & molles in homine**. 271. F.  
 Cur amplii cum longitudine sint. 272. M.  
 Cur inferius cani, superius gibbi. 273. P.  
 Cur multiformi. M.
- Pedis partium ad manus partes comparatio**. F.
- Pedes propter ambulationem**. 272. M.  
 Propter firmitatem. F.
- Pericardij aqua**. 109. F.
- Petrosum os pendens Vesalium**. 79. M.  
 Cur asperum. 88. M.
- Phalanx unde dicitur**. 232. M.  
 Cur de singulis ossibus. Ibidem.
- Phéma** qua. 47. M.
- Phlegma, & phlegma**. 83. P.
- Phlegma id est acuminata**. 61. M. & 64. M. & seq.  
 89. P.
- Pili non sunt membra, sed excrementa**. 4. P.
- Pili dupliciter**. 214. M. (F. & 236. F.)
- Platonis, & Aristotelis error circa rugam vsus**. 235.
- Planum**. 271. P.
- Plani error de maxillarum dentibus**. 140. P.
- Pollex reliquis digitis maior**. 229. F.
- Polymorphon os**. 73. M.
- Polyporum apprehensiones etiam sine ossibus fortes**. 5. M.
- Pons aëreus id est meatus antiterius**. 17. M.
- Postbrachialis ossa**. 229. M.
- Processus**. 32. P.
- Processus sine appendicibus**. Ibidem.  
 Cum appendicibus. Ibidem.
- Processus appendicum**. Ibidem.
- Processus pterygoidei**. 76. M.
- Processus pyramoides**. 77. M.
- Processus manillarum substantia**. 88. M.
- Protopariti**. 26. M. & 27. M.
- Pterygoidei processus pyramoidis**. 76. M.
- Vsus eius quis**. 89. P.
- Puberum ossa cur parviora, quam iuvenum**. 13. F.
- Pubis ossa in feminis, sicut in viris**. 245. M.
- Fabulosa circa hoc nomenclorum deliria**. Ibidem.
- Pupilla** qua. 5. M.  
 Quomodo famulari chrysalidis est ophtalmicis praestit, & quis eius vsus. Ibidem.
- Pulsatio Hæmatis** vnde. 81. F.
- Pyrenoides processus**. 159. P.

Q

**Q** Vale quid, libro de ossibus quid significat. 1. F.

R.

- R**adius. 207. P.
- Cur obliquus**. 216. M.
- Cur ab internis introrsum**. Ibidem.
- Realdi error circa dentium foramina**. 15. P.  
 Error alius de symphyseos speciebus. 44. F.  
 Error alius de symphyse vera. 49. M.
- Realdi error circa capitis foramina**. 89. P. (98. M.)  
 Error alius circa frontis, sphenoidisq; cavernulas.  
 Error alius de medicamentis ocularibus. 112. P.
- Realdi, & Vesalii error circa femoris cum tibia dearticulationem**. 250. F.
- Renati pro Galeno filatio**. 106. M.
- Renati, & Fuchsi error quoad Galeni sensum**. Ibidem.
- Resonantia vocis ratio duplex**. 99. F.
- Retæ mirabile**. 101. M.  
 Cur inuisibile in homine. Ibidem.
- Rugæ**. 83. P.
- Rugæ**. Ibidem.

S.

- S**acrum os cur ex quinque. 156. M.  
 Sacri ossis necessitas. 154. F.  
 Sacrum os vnde dicitur. 181. P.
- Sacri ossis foraminum vsus, & numerus**. 185. M.  
 246. F. & 249. P.
- Satyriasm.** 116. M.
- Scapularum vsus duplex**. 196. F.  
 Vsus tertius. 197. M.
- Scapula partium diversitates quinque**. 198. P. & M.
- Scapularum cum elaxibus opportuna conexio**. 204. M.
- Scaphoides os**. 267. M. & 269. P.
- Seclerus quid, & quomodo praeparandus**. 3. F. & 22. M.
- Secleri partes quatuor**. 13. P.
- Secleris, & ematris**. 22. M.
- Vnde dicitur**. F.
- Secleris**. 84. M.
- Scopi natura in animalium genere duo**. 11. P.
- Secleris**. 232. M.
- Scytalides**. F. (cum est 3. P.)
- Secundum naturam quod existit, in omnibus perpendiculari**.  
 Sella sphenoidis pars est. 76. M.
- Sellulares processus**. Ibidem.
- Sesamidea ossa**. 216. P. & 7. P.
- Synspondis**. 203. P.
- Silvanij error in correctione Galeni**. 62. M.
- Simpliciter animal**. 204. M. (Sunt 6. M.)
- Simpliciter membrorum vsus propter organici actionem**  
 Sincipitis ossa cur laxiora. 69. F.
- Sincipitis ossis substantia**. 79. M.  
 Raritas quare. 81. P.
- Sinum capitis numerus**. 113. M.
- Solutionem modi in capite quinque**. 82. F.
- Spondis, id est irregularum**. 206. P.
- Sphenoides os**. 72. M.
- Sphenoidis figura**. 75. M. (C. eius vsus. 75. F.)
- Sphenoidis, & maxilla superioris foramen commune**,  
 Sphenoidis pars sella. 76. M.
- Sphenoidis substantia**. 88. F. (94.)
- Sphenoidis foramina duodecim, & vsus a 90. vsq; ad**  
 Sphe-

- Sphensidis primi foraminis figura. 90. P.  
 Einftem vsus. Ibidem. § 91. P. (98. P.  
 Sphensidis canerna sine antrum cur quandoq; deest.  
 Sphensidis cribrum. 106. P. & 113. P. (P.  
 Sphensidis foramina quomodo magna, & parua. 113.  
 Ipir. 72. M.  
 Spina cur ossa. 5. F.  
 Spina ventosa vnde dicitur. 116. P.  
 Spina animalibus carina quadam. 150. P.  
 Spine vertebra quot sunt. 149. F.  
 Spine vsus quinque. 150. M. & F.  
 Spinalis medulla velut truncus. Ibid.  
 Spinalis medulla ad cerebrum comparatio duplex. Ibid.  
 Spine vsus quatuorplex. 151. P.  
 Spinales processus quare. 152. M.  
 Eorundem chartilaginei. Ibidem.  
 Spina cur ex pluribus ossibus. F.  
 Cur non ex indeterminatis pluribus. Ibid.  
 Cur non ex duobus, tribus, sed pluribus. 153. P.  
 Cur ex multis, & paruis. M.  
 Cur partes eius quatuor. 154. M.  
 Spine partes cur singule ex tot vertebra. 155. F.  
 Spinalis medulla à deorsum processu descensio. 163. F.  
 Spine processuum magnitudo. 172. F.  
 Spondyli. 76. M.  
 Spongoidis ossis latera. 77. F.  
 Spondyli cur anterioribus tantum ligati. 158. P.  
 Spondylium anterioris ligamentum mucosum. Ibid.  
 Spondyli primi summa qualitas. 168. P. & M.  
 In reliquis vide litera V. vertebra.  
 Squamosa sutura. 149. F.  
 Cur sic facta. 69. M.  
 Cur in alijs non similiter. 70. P.  
 Stapedis nomen a viua ossi. 8. P.  
 Stapha pomæ a vis ossiculo inditum à similitudine. Ibid.  
 Staphoidis ossis, aliorumque duorum vsus. M. & F.  
 Stapha. 69. M.  
 Stapha. Ibidem.  
 Stapha. Ibidem.  
 Sternum ex quot ossibus constat. 13. P.  
 Sterni ossium diuersitas. 14. M.  
 Sternum idem quod pectus. 139. P.  
 Sterni ad costas dearticulatio. 192. P.  
 Sterni vsus. 193. F.  
 Sternum vnde dicitur. Ibidem.  
 Sider. 271. P.  
 Styloides ossis in capite vsus. 87. M.  
 Quid appendix sit. F.  
 Styloides cubiti versus vsus. 221. F.  
 Superciliorum vsus quis. 5. M.  
 Sutura quod possit dici synarthrosis. 24. M. & 45. P.  
 Sutura in quibus. 30. P.  
 Sutarum motus involuntarius. 44. M.  
 Sutura nomen vnde. 45. P.  
 Sutarum in capite numerus. M.  
 Communiter, & proprie. Ibid.  
 Sutura integra que, & quot. Ibid.  
 Mistæ. Ibid.  
 Cur mistæ dicantur. Ibidem.
- Cur integra alie. Ibidem.  
 Sutarum forma triplex. F.  
 Sutarum vsus nouem. 59. M.  
 Quid non omnium suturarum singuli sint. 61. P.  
 Sutura capitis secundum variam figuram diuersa. 62. P.  
 Sutura coronalis. M.  
 Sagittalis alia multa nomina habet. F.  
 Lambdædes. Ibidem.  
 Sutarum reclinam frontis os diuidere, quod mulieribus proprium sit, fabulosum. 63. P.  
 Sutura acuminatorum capitum quales. 64. M.  
 Sutura squamosa. 69. P.  
 Cur sic facta. M.  
 Sutura sexta, & septima à Galeno ignota. 70. F.  
 Sutura capitis propria que dicantur. 71. M.  
 Sutura communes apud Galenum declarantur due. 72. P.  
 Sutura Zygomaticum. 73. P.  
 Sutarum inferiorum expurgatio. 109. P.  
 Sutura que in homine desunt. 122. F.  
 Syllanij error. 62. M.  
 Syllanij error circa cribrum sub adue. 112. M.  
 Symphysis quid. 23. P. & 27. F. & 42. M.  
 Duplex. 48. M.  
 Facta propter quietem. Ibidem.  
 Symphysis per se que. Ibidem.  
 Per accidens que. 49. M.  
 Triplaciter hec sit. Ibidem.  
 Symphysis que per medium sit, non per se vno est, sed per accidens. 48. M. (48. F.  
 Symphysis causa materialis, finalis, & efficiens que.  
 Synarthrosis propter motum occultum. 2. F.  
 Synarthrosis quid. 23. F.  
 Apud Hippocratem quoque. 24. M.  
 Synarthrosis, & eius species. F. & 25. P.  
 Quando est cum motu. 24. F.  
 Quando sine motu. Ibidem.  
 Synarthrosis. 26. M.  
 Synarthrosis vnde dicitur. Ibidem.  
 Synarthroses species tres sicut & diarthroses. 28. P.  
 Synchondrosis. 49. M.  
 Exempla. F.  
 Syndesmosis eundemque. 51. M.  
 Synchondrosis eundemque. 49. M. & 50. P.  
 Syllarosis. Ibidem.  
 Sutura ossium qualis. 2. M. & 27. M. & 26. F.  
 Sutura. 27. M. & 26. M.
- T.
- T**emperamentum ossium forma subtilitatis alij ipsorum secundum Galenum, sic alia vbi partium similitudinum. 1. F.  
 Tempori, & occipiti foramina communia. 102. F.  
 Temporalis musculus cur abditus. 117. M.  
 Temporis ossa cur diuina. 69. F.  
 Eorum foramina duodecim, & eorum vsus. 94. M.  
 Temporis ossis suauem quantitatem. 102. P.  
 Tendones. 50. F.  
 Tenuitas ossis apud Hippocratem largitas. 78. F.  
 Tendones vnde dicitur. 116. P.

Tibiae 264. F.  
 Tibiae, & Osaeus. 83. P.  
 Thorax cur ex duodecim vertebris. 156. P.  
 Tibiaris necessitas. 154. M.  
 Thorax dupliciter. 188. M.  
 Unde dicitur. F. (Ius. 195. P.)  
 Thorax cur neq; ossis totus, neq; musculosus, sed mi.  
 Thoracis officium praedicata. F. & 196. P.  
 Tibia. 255. F.  
 Tibia spina. 256. F.  
 Vfus. 257. M.  
 Praedicata. P.  
 Tibia ad femur dearticulatio. 259. F.  
 Lunares cartilagineae eiusdem. 260. P.  
 Tibia inferioris appendicis vsus tres. 261. M.  
 Titulus libri presentis. 2. F.  
 Tiquit. 137. P.  
 Tisum. Ibidem.  
 Tympanum. 40. P.  
 Tympanum. 140. F.  
 Tympanum. 116. P.  
 Tympanum. 83. P.  
 Trochanter maior. 253. P.  
 Trochanter minor. M.  
 Tympani fibrilla, seu chordula. 9. P.  
 Tympanum in aere quod. 8. M.

**V**aluerde error circa iugalis ossis figura. 117. P.  
 Valuerde, & Vesalii error circa cervicis muscu-  
 Venarum vsus. 5. F.  
 Ventriculorū cerebri, & insinibuli eiusdem aqua. 109. F.  
 Ventriculorū cerebri, & insinibuli aquae vsus sex. Ibidem.  
 Vertebrarum articuli cur ad synarthrosam redeunt,  
 praeter primam secundam, & cum capite dearti-  
 culationem. 21. M.  
 Vertebrarum articulationem an cum motu manifesto, au-  
 deculo constructio fiat. 26. F.  
 Vertebrarū superiorū cavitates cur maiores. 151. M.  
 Vertebrarum superiorum parvitas. F.  
 Eandem maior dicitur. 152. P.  
 Vertebrae cur anteriores ligantur. 158. P.  
 Vertebrarum anteriorū ligamentum mucosum. Ibidem.  
 Vertebrae primae cavitationem labia qualia. 164. M.  
 Vertebrae primae processus transversii cur longiores. 165. F.  
 Anterioris eiusdem processus vsus. Ibidem.

Vertebra prima cur caret spina. 166. P.  
 Pars posterior eius cur aspera. M.  
 Vertebrarum foemina pro nervorū transitu. 168. P.  
 Vesalii error circa sphenoidis cum tibia articulum. 32. M.  
 Vesalii error circa sphenoidis species Galeoni arguen-  
 tis. 50. M.  
 Alius eiusdem error circa Aristotelis sententiam  
 in eodem. Ibidem.  
 Vesalii error de quatuor acuminatorum figura. 74. P.  
 Error alius de frontis ossis lateribus. 75. M.  
 Vesalii error circa brevissimae pulsationem. 81. F.  
 Error alius de nervorū transitu per suturam lambdoi-  
 dis additamenta. 102. P. (101. P.)  
 Error alius circa ossis temporum foeminae quartam.  
 Vesalii, Galenique error de arteriae transitu per fora-  
 men. 103. P.  
 Vesalii error de foeminae cribri transitu. 103. M.  
 Error alius de otitani officii duplicitate. 109. P.  
 Vesalii error circa vertebrarum processuum inflexio-  
 nes. 178. P.  
 Error alius circa Galeoni praei intellectam senten-  
 tiam. 191. F.  
 Vesalii error in interpretatione Galeoni circa radiad  
 capum dearticulationem. 221. P.  
 Vesalii, & Galeoni error quoad musculorū in metacar-  
 pio pesitorum vsum. 232. M.  
 Vesalii, & Valuerde error circa foeminae cum tibia  
 dearticulationem. 250. F.  
 Vesalii error contra Galeonem imbecillitas circa tibiae  
 articulationem. 260. M.  
 Vfus cur muros non penetrat, auditus versus. 269. P.  
 Vlna. 207. P.  
 Vlna nomen tripliciter. Ibidem.  
 Vlna ossa cur duo. 214. F.  
 Vnguinum vsus sex. 235. F.  
 Vnguinum figura, & incrementum. 237. M.  
 Vfus simplicium propter organicorum actiones. 6. M.  
 Vfus organicorum dignior ipsa etiam actione. Ibidem.

**Z**ygomatici ossis substantia. 88. M.  
 Zygomatici vsus quadruplex. 117. M.

